




B

5

WORTABET (John)

SL/25-5-4-32


611(02)"18"



A Book of explanations
on the Elements of Anatomy
with 364 Figures.

By Dr. John Wortabet
Professor of Anatomy and
Physiology in the Syrian
Protestant College, compiled
from recent English works,
and translated into the
Arabic language

Printed at Beyrout 1871
Price 40 Francs



- الأوردة الكبدية ٢٧٤ و ٥٧٠
 الوريد الكمبري ٢٦٥
 الكلوي ٢٧٤
 الأوردة اللسانية ٢٥٩
 الوريد الماضي ٢٧٢
 المبيضة ٢٧٤
 المتوسط ٢٦٥ . المتوسط الباساقي ٢٦٦
 المتوسط الراسي ٢٦٦
 الأوردة الخفية ٢٦
 الخفية ٢٦١
 الوريدان الخيان الغائران لجالينوس ٢٦١
 المزوجة ٢٦
 المسارقي السفلي ٢٧٥ . المسارقي العلوي ٢٧٦
 المشبي ٢٦١
 المنوي ٢٧٤
 المعدي ٢٧٦
 الموخري ٢٥٧
 الوجهي ٢٥٦
 الوداجي الباطن ٢٥٩ . الوداجي الظاهر ٢٥٨
 الظاهر الخلفي ٢٥٨ . المقدم ٢٥٨
 الوريدان اللا اسم لها ٢٦٧

٢٦٧ تحت الترقوة	الوريد	٥٥. الحلبي . ٤٠. الخنجري . ٧٧. المحنكي . ٥٣. الزيتوني
٢٧٧ تيبسيوس	اوردة	٤٢. الزوجي . ٤٩. السريري الخلفي . ٤٤. المتوسط . ٤٤
٢٦٨ الثدي الباطن		المقدم . ٤٦. السنخي . ٥٣. الشوكي الوتدي . ٤٥. الغرابي
٢٦١ جالينوس	وريدا	٨٦. الغدي . ٤٢. القاعدي . ٢١. الكلابي . ٤٦. المرفقي
٢٥٥ الجبهي		٩١. المقاري للزود . ٩١. المنفاري للفك السفلي . ٦٣.
٢٧٤ الحجابية	الاوردة	الذابي . ٢١. الوتدي . ٥٨. الوجني . ٥٣
٢٧٢ المحرفي الباطن . المحرفي الظاهر	الوريد	التنوعات الشوكية . ١٩. المستعرضة . ١٩. المفصالية . ١٩
٢٧٣ المحرفي المشترك		النخاع المستطيل . ٤٠٧
٢٦٨ الدرقية السفلى		النقطة الدمعية . ٥١٢
٢٥٩ الدرقي المتوسط		٥
٢٦٠ الدماغية		هبوط الخصيتين . ٦٣٠
٢٦٦ الراحبة الغائرة		الاهذاب . ٥١٤
٢٦٥ الراسي		الهرم الخلفي . ٤٠٨. المقدم . ٤٠٨
٢٧٧ الرئوية		الهيكال العظمي . ٨
٢٥٥ الزاوي		الهيكال . ٥١٧
٢٦٤ الخلفي . ٢٦٤ المقدم		و
٢٦٩ الشعبية		وتر الباسطة الرباعية الرووس . ٢٥١
٢٧٠ الشوكية		الوتر العيني وهو وتر الجفنين . ١٧٩. وتر اكيللس . ٢٦٣
٢٧١ الصافن الانسي . الصافن الوحشي	الصفيرة	الوتر المشترك . ٢١٦
٢٥٧ الصدغي . الصدغي الفكي	الباسورية	الاورار (كلام كلي) . ١٧٤
٢٧٣ الرحمة . الثانية	البروستاتية	اورار الحجرية . ٥٩٣
٢٧٣ المهبلية	الطحالي	الاوردة (كلام كلي) . ٢٥٢. قدامها . ٢٥٢. انقسامها الى سطحية
٢٧٦ العجزي المتوسط	الوريد	وغائرة وجببية . ٢٥٤. صماماتها . ٢٥٤
٢٦٦ العضدية		الوريد . الابطي . ٢٦٦
٢٦٨ العلوي بين الاضلاع		الاجوف السفلي . ١٧٣. العلوي . ٢٦٩
٢٦٣ العيني		الاذني الخلفي . ٢٥٧
٢٦٩ الفرد الايسر . الايمن		اعلى الكلية . ٢٧٤
٢٧٣ الفيزي		البابي . ٢٧٦
٢٥٩ الفقري		الباسليفي . ٢٦٥
٢٥٧ الفكي الباطن	الاوردة	البلعومي . ٢٥٩
٢٧٤ الفطنية	الوريد	بين العظمين . ٢٦٦
٢٧٧ القلي الخلفي . القلي العظيم		
٢٧٧ القامية المقدمة		
٢٥٦ القوس الانفي		

الغدد	المحصية ٢٨٧. الدرقية ٢٩٠. الراسية ٢٨٢	المركز البيضي ٤١٥. الدماغي الشوكي ٢٩٩
والاوعية	الرحم ٢٨٧. الزوجية ٢٨٢. الشعبية ٢٨٩	المري ٥٤٢
الليبفاوية	اوعية الصدر ٢٨٩. الصفن ٢٨٦. واوعية	المحلب ٤١٨
	الطحال ٢٨٨. الطرف السفلي ٢٨٤. الطرف	المزدوجة ٢٢
	العلوي ٢٨٤. العجزية ٢٨٦. العنقية ٢٨٢	المستقيم ٥٥٩
	العجان ٢٨٦. العنقية ٢٨٢. الفية ٢٨٢	المستقيم في الاناث ٦٣٥
	القطنية ٢٨٦. الغضيب ٢٨٦. القلب ٢٨٩	الميزاب الاذيني البطني ٥٧٩. البصري ٤٢. الدمعي ٥٢
	الكبد ٢٨٧. الكلية ٢٨٧. المابضية ٢٨٥	ذات الراسين ٨٨. الفقري ٢٩. الكففي ٤٤
	المعدة ٢٨٨. المعاديق واوعية ٢٨٨	المفاصل (كلام كلي) ١٢٨. انواعها وحركتها ١٢١
	المعا الغليظ واوعية ٢٨٨. المنصفية	المفصل الرسغي القدي ١٦٥. الرسغي اليدي ١٥٥. الرسغية
	المقدمة والمخلفية ٢٨٩. الموخرية ٢٨٢	المشطية ١٥٧. الرسغية المشطية ١٦٩. الركبة
	الثانة ٢٨٧. المرئية ٢٩٠. المستقيم ٢٨٧	١٦١. الصدغي الفكي ١٢٩. الضلعية الفقرية ١٤٠
	المعدة ٢٨٨. النكفية ٢٨٢. الوجهية السطحية	الفصية ١٤٢. العجزية المحرقفي ١٤٥. الفصي الشظوي
	٢٨٢. الوجهية السطحية ٢٨٢. الوجهية	١٦٥. الفصي الترقوي ١٤٨. الكففي ١٥٠. الكعبري
	الغائرة ٢٧٣	الزندي ١٥٢. اللوحي الترقوي ١٤٩. المرفقي ١٥٢
		المشطية السلامية والسلامية ١٥٩. المشطية السلامية
		والسلامية ١٧٠. الوريكي ١٥٩
		المشيمية ٥٠٧
		المطريقي ٥٢٢
		المعا الدقيق ٥٥٢. الغليظ ٥٥٧
		المعدة ٥٤٩
		المتنم ٥١٤
		المنجل الحفي ٤٠٤. المنجني ٤٠٥
		المنصف المقدم والمتوسط والمخلفي ٦٠٠
		المنقار الوتدي ٤٥
		المني ٦٢٩
		المهبل ٦٣٥
		ن
		التنوالابري ٤٢. الاخرى ١٥. الانفي ٥٣. الجناحي
		الوتدي ٤٦. التنوان الجناحيان ٤٦ و ٥٨. المنجاني
		المحصية ٢٨٧. الدرقية ٢٩٠. الراسية ٢٨٢
		الرحم ٢٨٧. الزوجية ٢٨٢. الشعبية ٢٨٩
		اوعية الصدر ٢٨٩. الصفن ٢٨٦. واوعية
		الطحال ٢٨٨. الطرف السفلي ٢٨٤. الطرف
		العلوي ٢٨٤. العجزية ٢٨٦. العنقية ٢٨٢
		العجان ٢٨٦. العنقية ٢٨٢. الفية ٢٨٢
		القطنية ٢٨٦. الغضيب ٢٨٦. القلب ٢٨٩
		الكبد ٢٨٧. الكلية ٢٨٧. المابضية ٢٨٥
		المعدة ٢٨٨. المعاديق واوعية ٢٨٨
		المعا الغليظ واوعية ٢٨٨. المنصفية
		المقدمة والمخلفية ٢٨٩. الموخرية ٢٨٢
		الثانة ٢٨٧. المرئية ٢٩٠. المستقيم ٢٨٧
		المعدة ٢٨٨. النكفية ٢٨٢. الوجهية السطحية
		٢٨٢. الوجهية السطحية ٢٨٢. الوجهية
		الغائرة ٢٧٣
		م
		المأبض ٢٤٤
		المبيضان ٦٤٠
		الثانة ٦١٢
		المثلث تحت الترقوة ٢٩٤ تحت الفك ٢٩٢. المخلفي ٢٩٤
		السباتي السفلي ٢٩٢. السباتي العلوي ٢٩٢
		سكاريا ٢٤٠. الثاني ٦١٦. المنتم ٢٩١
		الموخري ٢٩٤
		مثلثات العنق ٢٩١
		مجمع هيروفيلوس ٢٢
		مجرى البول في الاناث ٦٣٥. في الذكور ٦١٧
		المجمع البصري ٤١٢
		المحفظة البلورية ٥١٠
		المحفظتان اعلى الكليتين ٦١١
		المحل الاسود ٤١٤
		المخ ٤١٠. تلافيفه بناوده وفصوصه ٤١١
		المخنج ٤٢٢. بناوده وسوقه ٤٢٥. فصوصه ٤٢٤

كف هيمور ٥٢	الفضيب ٦٢١
الكوريون ٤٩٤	القلب ٥٧٧. اقسامه ٥٧٨
الكوة البيضاء ٥٢٠. المستديرة ٥٢٠	القلقة ٦٢١
الكيس الاذلي ٥٢٦. المخجري ٥٩٢. الدمعي ٥١٦. الزلاي ١٢١. المخاطي ١٢١	القمع الدماغي ٤١٢. الجعبي ٢٧. قمع القوقعة ٥٢٥
ل	القناة الانفية ٥٢ و ٥١٦. الاربية ٦٥٠. قناة اوستاكيوس ٥٢١. قناة برثولين ٥٤٠. البنكرياسية ٥٧٢. قناة بيت ٥١٢. تحت الحجاج ٥١. المجناحية الحنكية ٤٥
اللبن ٦٤٤	القناة الحنكية الخلفية ٥١. الحوصلية ٥٧١. القناة السباتية ٤٠. قناة ستينو ٥٢٩. السمعية ٥١٩. السنية السفلى ٦٢. السنية المقدمة ٥١. السنية الخلفية ٥١
اللثتان ٥٢١	الشادة للطلبة ٥٢١. الشرايينية ٥٨٨. الشوكية ١٩
اللحمة الدمعية ٥١٥	الصدرية ٢٨١. العجزية ٢٦. الفخذية ٦٥٩. قناة فديان ٤٧. قناتا فلويوس ٦٢٩. الفاذفتان ٦٢٩
اللسان ٤٩٨	القوقعية ٥٢٥. الكبدية ٥٧١. القنوات الكلوية ٦٠٩
لسان المزمار ٥٩٠	اللولبية ٥٢٥. المركبة ٤٠٢. المشتركة الصفراوية ٥٧١. المنوية ٦٥٠. الناقلية ٦٢٨. المضمية ٥٢٩
اللفافة الاخضية ٦٢٧. تحت الشوكية ٢٢٨. المحرفية ٦٢٤	القنوات الهلالية ٥٢٤. قناة هوارتن ٥٤٠
المحوصية ٦٧٢. الراحية ٦٤٢. السادة ٦٧٤	الفناتان الدمعيتان ٥١٥
الساعدية ٢٢٢. الساقية ٢٦٠. الصدرية ٢٢٢	قنطرة القدم ١٢٧
الصدغية ١٨٧. العجائية ٦٦٨. العريضة ٢٤٩	القوس الحجابي ٢٦. الفخذي ٦٤٧. الفخذي الغائر ٦٥٨
العضدية ٢٢٩. العنقية ١٩٠. الفظنية ٢١٧	قوس الفقرات ١٨. المعدي الاصغر ٥٥٠. المعدي الاكبر ٥٥٠
الغربالية ٦٥٥. الغمدية ٦٢٥. المسقية المتأخرة ٦٧٤. المعلقة ٦٢٤ و ٦٤٨. المنوية الباطنة ٦٢٤	القوقعة ٥٢٥
المنوية الظاهرة ٦٢٤ و ٦٤٧	القولون الصاعد ٥٥٨. المستعرض ٥٥٩. النازل ٥٥٩
اللفائف ١٧٤. السطحية ١٧٤. الغائرة ١٧٥	القيثارة ٤١٩
اللفائف ٥٥٤	ك
اللهاء ٥٢٧	الكبد ٥٦٢
اللوزتان ٥٢٨	الكتف ٨١
الليهماوية (غدد واوعية كلام عام) ٢٧٩. صماماتها ٢٨٠. طبقاتها ٢٨٠	الكريات العمودية ٥٦٢. الفشرية ٥٦٢. كبدية ٥٦٨
الابطية ٢٨٤. الاذنية الخلفية ٢٢٨	الكروية ٥٦٢. الهدبية ٥٦٢
الاربية ٢٨٤. الاولية ٢٨٦. بين الاضلاع ٢٨٢	الكليتان ٦٠٧
البطن ٢٨٦. تحت الفك ٢٨٢	
التيديية الباطنة ٢٨٩. المحاصل الكيلوسية ٢٨٦	
المحرفة الباطنة ٢٨٦. الظاهرة ٢٨٦	
المحوص ٢٨٦. الحجابية ٢٨٩. المحوص ٢٨٦	

عقد الاعصاب ٣٩٧

عقد الاعصاب الشوكية ٤٥٥

العقدة الاذنية لارنولد ٤٤١ . تحت الفك ٤٤٢ . الحجرية

٤٤٧ . المحوضية ٤٩١ . السفلى السباتوي ٤٨٥

السفلى للعاشر ٤٤٨ . الصدرية ٤٨٨ . العنقية العليا

٤٨٤ . العنقية المتوسطة ٤٨٥ . العنقية ٤٢٦ . القطنية

٤٩٠ . كاسيريوس ٤٢٣ . الهلاليتان ٤٨٩ . العنقية

السفلى ٤٨٥ . الوتدية المخنكية ليكل ٤٢٧ . الوداجية

للتاسع ٤٤٧ . الوداجية للعاشر ٤٤٨

العمل الجراحي لاستخراج الحصاة ٦٧١

العمود الفقري (كلام كلي) ٢٧ . خطوطه المنحنية ٢٨

عمود القوقعة ٥٢٥

العبد للحمية ٥٨٢

عنكبوتية الدماغ ٤٠٥ . المحل الشوكي ٤٠٠

العين وطبقاها ٥٠٤ . اوساطها الكاسرة ٥٠٤

الاعور ٥٥٨

غ

الغدة تحت الفك ٥٤٠ . تحت اللسان ٥٤٠ . النيموسية

٦٠٥ . الدرقية ٦٠٤ . الدمعية ٥١٥ . الشحمية ٤٩٧

غدة الصنوبرية ٤٢٠ . الغدة النكفية ٥٢٩

غدتا برثولين ٦٢٤ . الغدتان الثدييتان ٦٤٢ . غدتا

كوبرا ٦٢١

غدد باير ٥٥٦ . الغدد البيتونية ٥٥٢ . غدد برونر ٥٥٦

الغدد الشفوية ٥٢٠ . العرقية ٤٩٧ . الغدد الفمية

٥٢١ . الغدد اللعابية ٥٢٩ . غدد ميوبوميوس ٥١٤

الغدد الوحيدة ٥٥٦

غشاء البكارة ٦٢٣ . المحدقي ٥٠٨ . الزلالي المفصلي ١٣٠

الساد ١٤٧ . الضلعي الغزالي ٢٢٤ . الطيلي ٥٢١

اللامي اللساني ٤٩٩ . الخاطي للنجرة ٥٩٦ . النخاي

٥٠٣

الغضروف وانواعه ١٢٨

الغضاريف بين الفقرات ١٣٤

الغضروف الجفني ٥١٣ . المحلني ٥٩٠ . الدرقي ٥٨٩

غضروف الصيوان ٥١٧

الغضروفان الطرحهاليان ٥٩٠

غضاريف الانف ٥٠٠

الغضاريف الضلعية ٨١

الغصبة ٥٢٨

الغدد الفخذي ٦٥٨

ف

الفاصل اللامع ٤١٨

الفتحة الاذنية البطينية ٥٨١ . الفتحة البوابية والمرئية ٥٥٠

فتحة الزمار ٥٩٢

الفتحان الانفيتان الخليفيتان ٥٤١

الفتق الاربي المستقيم ٦٥٢ . المتخرف ٦٥١ . الفخذي ٦٦١

فرجة سلفيوس ٤١٢ . الطولية للدماغ ٤١١ . كلاسيروس

٢٩ . المستعرضة للدماغ ٤١٨ . الوتدية ٤٧ . الوتدية

الفكية ٧١ . الجناحية الفكية ٧١

الفرجات الكبدية ٥٦٤

الفهر ٥٢٠ . فم الرحم ٦٢٧

الفصوص الكبدية ٥٦٥ . الرئوية ٦٠٢

ق

القبوة وقوائمها ٤١٨

القرن المحلني ٤١٧ . المتوسط ٤١٨ . المقدم ٤١٧ . الكبشي

الاصغر ٤١٧ . الاكبر ٤١٨

القرنان العجزيان ٢٥ . العصعصيان ٢٧ . العظيمان

والصغيران للامي ٧٥

القرنية ٥٠٥

القرحجية ٥٠٧

القشري (قسم من العظم الصدغي) ٢٨

القصبه الرئوية ٥٩٦

العظام العالي ١٠٦	العضلات الممدتان للانف ١٨٢
العجز ٢٤	المخرقة الباطنة البطنية ٢١٦. الظاهرة البطنية
العصص ٢٧	٢١٤
العضد ٨٧	المخرقتان الراسيتان ٢١٢. المخرقتان العيبتان
العقب ١١٩	١٨١
الغذ ١١٠	الموخرية المجبية ١٧٧
الفقرات صفاتها العامة ١٨	الناصبة للبطر ٦٦٨. الشوكية ٢٠٩. للفضيب ٦٦٦
الفقرات الظهرية ٢٢. العنقية ١٩. الفطنية ٢٢	العلوية ٢٦٣
الفك السفلي ٦١	الهدبية ٥٠٨
الفكان العلويان ٥٠	الهرمية الانفية ١٨٢. البطنية ٢١٨. المحوضية ٢٥٦
التربتين السفليان ٥٩. القزبي العلوي ٤٩	الوترية النصف ٢٥٩
المتوسط ٤٩	العضيلات المشطية ٥٨١
الفض ٧٦	العظام (كلام كلي) ٨
القصبة ١١٥	العظام الاسفينية ١٢٢
الكبير ٩١	عظم الاطلس ٢٠
الكعب ١٢٠	الانفيان ٤٩
الكعبرة ٢٣	البارزة ٢١
الكلابي ٩٩	البسلي ٩٧
اللاحي ٧٥	الترقوة ١٢
اللوح ٨٣	الجمهي ٢٥
المحور ٢١	الجداريان ٢٤
عظام مشط القدم ١٢٤. مشط اليد ٩٩	عظام الجمجمة ٢٠
المربع المخرف ٩٧. الشبيه به ٩٨	المخرفي ١٠٢
المصنوي ٤٧	المحكبان ٥٦
المكعب ١٢١	الدمعيان ٥٤
الموخرى ٢٠	عظام رسغ القدم ١١٩. رسغ اليد ٩٥
الميكمة ٦٠	الرضفة ١١٤
الهرمي ٩٧	الزند ٩١
الهلالي ٩٦	الزورقي القدي ١٢٢. انزورقي البيدي ٩٦
الوتدي ٤٢	سلاميات القدم ١٢٥. سلاميات اليد ١٠١
الوجنيان ٥٥	السمسانية ٢٧
الوزكي ١٠٤	الشظية ١١٧
عظام وريوس ٤٩	الصدغيان ٢٨
العظليات الاذنية ٥٢٢	الاضلاع ٧٨. صفاتها العامة ٧٨. صفاتها الخاصة ٧٩

- العضلات الشوكية الظهرية ٢١٠. الظهرية النصف ٢١١. العضلات الكفنية اللامية ١٩٣
العنقية ٢١٠. العنقية النصف ٢١١
الصدرية الصغيرة ٢٢٤. الكبيرة ٢٢٣
الصدغية ١٨٧
الصلبية الصغيرة ٢٤٨. الكبيرة ٢٤٧
الصبوان ٥١٨
الضاغطة للجعري ٦٦٩
الضاغطان للانف ١٨٣
الضرسية اللامية ١٩٤
الطالية ٢٠٨
الظهرية بين العظام القدمية ٢٧١. اليدية ٢٤٦
الظهرية الطويلة ٢١٠. العريضة ٢٠٥
عضلات العجان في الاناث ٦٦٧
العجانية المستعرضة ٦٦٦
العجزية الفظنية ٢٠٩
العصصية ٢٧٠
العضدية المقدمية ٢٢١
العنقية الطويلة ٢٠٢
عواصر البلعوم ١٩٧
الغراية العضدية ٢٢٠
الغشائية النصف ٢٥٩
الغليصية المفردة ٢٠٠
الفخذية ٢٥١
فوق الشوكية ٢٢٧
الفايضة الاضافية ٢٦٩. المختصر ٢٤٥. الزندية
للرسغ ٢٢٥. السطحية للاصابع ٢٢٥
الطويلة لايهام القدم ٢٦٤. لايهام اليد
٢٢٧. للاصابع ٢٦٥ الغائرة للاصابع ٢٢٦
الفصيرة لايهام القدم ٢٧٠. لايهام اليد
٢٤٢. للاصابع ٢٦٨. مختصر القدم ٢٧١.
لمختصر اليد ٢٤٥. الكعبرية للرسغ ٢٢٤
انفصية المقدمية ٢٦٠ الخلفية ٢٦٥
الفصية الترقوية المحلية ١٩٠. الدرقية ١٩٢.
اللامية ١٩٢. الثلثة ٢٢٠
الكابة المربعة ٢٢٧. المستديرة ٢٢٤
- اللامية اللسانية ١٩٦
اللسانية ١٩٦
اللهمية اللسانية والهمية البلعومية ٢٠٠
عضلات لسان المزمار ٥٩٥
المابضية ٢٦٤
المبعلة لايهام القدم ٢٦٨. لايهام اليد والمقربة له
والمقاومة له ٢٤٢. لمختصر القدم ٢٦٩. لمختصر
اليد والمقاومة له ٢٤٥
الموقية ١٨٥
المنتعنان ٢٥١
العضلة المثلثة الفصية ٢٢٠
المجمدة للمحاجب ١٧٩
المحيطة الجفنية ١٧٨. المحيطة الشفوية ١٨٥
العضلات المخططة ١٧١. الغير المخططة ١٧٢
العضلة المربعة المخرفقة ٢٠٤. الفخذية ٢٥٧. الفظنية ٢١٨
المرفقية ٢٤١
المستديرتان الصغيرة والكبيرة ٢٢٨
المستقيمة البطنية ٢١٧
المستقيمت الراسية ٢١٢ و ٢٠١
المستقيمة الفخذية ٢٥٠
المستقيمت العينية ١٨٠
المستعرضة ٢١٦. المقدمية ٢٧١
المسننة الكبيرة ٢٢٥
المستننات الخلفيتان ٢٠٧
المشطية ٢٥٢
المضاعفة ٢١٠
المضجكة ١٨٦
المضغية ١٨٦
المججلة للبول ٦٦٥
المعلقة ٦٤١
المعينتان ٢٠٦
المفلجة الشوكية ٢١١
المقربة لايهام القدم ٢٧٠
المقربات الفخذية ٢٥٢

العظام	الاعصاب المعدية
تحت المرفقية ٢٢٢	٤٥١
التوامية الساقية ٢٦٢	المنفصلة الاخصوي الانسي ٤٨٠ . المنفصلة الرسغية
التوامية السفلى والعليا ٢٥٧	للزندي ٤٦٦ . المنفصلة للركبة للمابضي
ثلاثة الرؤوس ٢٢٢	الانسي ٤٧٩ . المنفصلة للركبة للمافن
المجلدية ١٩٠	الانسي ٤٧٥ . المابضي الوحشي الشطوي
المناحية الانسية والوحشية ١٨٧	٤٨١ . المرفقية للزندي ٤٧٥ . الوركية للوركي
المحرفية ٢٤٨	العظيم ٤٧٨
عضلات مخجرة ٥٩٤ . اعماها ٥٩٥	المنعكف ٤٦١
المخافضة لجناح الانف ١٨٣ . لزواوية الفم ١٨٤ .	الموخرى الصغير ٤٥٧ . العظيم ٤٥٩
للشفة السفلى ١٨٤	المهدية الطويلة ٤٣٥ . القصيرة ٤٣٦
المخراطينية القدمية ٢٦٩ . اليدوية ٢٤٥	الكفنية ٤٩٢
المخياطية ٢٤٩	الوتديان المحنكيان ٤٢٧
الدرقية اللامية ١٩٣	الوجهي (السابع) ٤٤٢
ذات البطنين ١٩٤ . ذات البطنين العنقية	الوجهي ٤٢٧
٢١٠ . ذات الراسين العضدية . ٢٣٠ . ذات	الوركي الصغير ٤٧٨ . العظيم ٤٧٨
الراسين الغذائية ٢٥٨	
الذالية ٢٢٦	العضلات (كلام كلي) ١٧١ . شكلها وتسميتها ١٧٣
الذقنية اللامية ١٩٥ . الذقنية اللامية المسانية	العضلة الابرية البلعومية ١٩٩ . الابرية اللامية ١٩٤ .
١٩٥	الابرية اللسانية ١٩٧
الراحية بين العظام ٢٤٦ . الطويلة ٢٢٥ .	الاخعيات الثلاث ٢٠٢
القصيرة ٢٤٤	الاذنية العليا والمخلفية والمقدمة ١٧٨
الراحية للطلبة ٥٢٣	الاخصية ٢٦٣
الرافعة للامت ٢٦٩ للمخن العلوي ١٨٠ . لزواوية	الاخصية بين العظام ٢٧١
الفم ١٨٣ . لزواوية اللوح ٢٠٦ . للشفة السفلى	الاولوية الصغيرة ٢٥٥ . الكبيرة ٢٥٤ . المتوسطة
١٨٤ . للشفة العليا ١٨٣ . للشفة العليا وجناح	٢٥٥
الانف ١٨٣ . للهاء ١٩٩	الباسطة لايهام القدم ٢٦٦ . الباسطة للمخنصر ٢٢٩
الروافع للاضلاع ٢٢٠	الزندية للرسغ ٢٤٠ . المشتركة للاصابع
الركابية ٥٢٣	٢٢٩ . للسبابة ٢٤٢ . الطويلة للاصابع ٢٦١
رباعية الرؤوس ٢٥٠	القصيرة للاصابع ٢٦٨
الرفيقة ٢٥٢	الباسطتان الكعبريتان للرسغ ٢٢٨
الزوجيتان ١٨٤	البواسط لايهام اليد ٢٤١
السادة الباطنة ٢٥٦ . الظاهرة ٢٥٧	البالحة الطويلة ٢٢٨ . القصيرة ٢٤١
الشادة للجفن . ١٧٩ . للطلبة ٥٢٢ . لغمد الفخذ	العضلات بين الاضلاع ٢١٩
٢٤٩ . للهاء ١٩٩	العضلة تحت الاضلاع ٢٢٠ . تحت الترفوة ٢٢٥ . تحت
الشطوبية الثلاثة ٢٦١ . الطويلة والقصيرة ٢٦٦	الشوكة ٢٢٨ . تحت الفخذية ٢٥١ . تحت اللوح

الاعصاب الزندي ٤٦٤

- الساد ٤٧٣. الاضافي ٤٧٣
 السباتية للتاسع ٤٤٧
 السباتي للعقدة الوتدية المحيكية ٤٣٩
 السبعي (الثامن) ٥٢٨ و ٤٤٦
 السني السفلي ٤٤١. الخلفي ٤٣٧. المقدم ٤٣٧
 الشبي (الاول) ٤٢٨
 الشوكي الاضافي (الحادي عشر) ٤٥١
 الصافن الطويل الانسي ٤٧٥
 الصافن القصير الوحتي ٤٧٩
 الصدري الخلفي ٤٦٠
 الصدران المقدمان ٤٦١
 الصدرية القلبية ٤٥٠
 الصديغي ٤٣٧
 الصديغي الوجي ٤٤٥
 الصديغان الغائران ٤٤٠
 الضربي اللامي ٤٤١
 الضفيرة اعلى الكلية ٤١٩
 الضفيرة الاكليلية الخلفية ٤٨٧. المقدمة ٤٨٧
 الاورطية ٤٩٠. الباسورية السفلى ٤٩١.
 البروستاتية ٤٩٣. البطنية ٤٨٩ الخجائية.
 ٤٨٩. الختلية ٤٩١. الختلية السفلى ٤٩١.
 الرحية ٤٩٣. الرضية ٤٧٥.
 السباتية ٤٨٤. الشمسية ٤٨٩.
 الطحالية ٤٩. العجزية ٤٧٦. العضدية
 ٤٥٩. العنقية ٤٥٦. الفظنية ٤٧٠. القلبية
 السطحية ٤٨٧. القلبية الغائرة ٤٨٧.
 الكبدية ٤٩٠. الكهفية ٤٨٤. الكلوية ٤٨٩
 المسارية السفلى ٤٩٠. العليا ٤٩٠
 المهبلية ٤٩٣ الميضية ٤٨٩. المثانية ٤٩٣.
 المعدية ٤٩. المنوية ٤٨٩
 الضلي العضدي ٤٦٩
 الطلي (للسابع) ٤٤٤. ايعتوب ٤٤٧
 الظهري للزندي ٤٦٥. الظهري للفضيب ٤٧٧.
 الظارية ٤٦٧

الاعصاب العجالي ٤٧٧

- العجزية ٤٧٥. فروعها الخلفية ٤٧٦. فروعها
 المقدمة ٤٧٦
 العصعصي ٤٧٥. فروع الخلفي ٤٧٥. فروع المقدم
 ٤٧٥
 العضلي الجملدي للصفيرة العضدية ٤٦٣ العضلي
 الجملدي للشظوي ٤٨٣. العضلي المغزلي ٤٦٦
 العضلية للاخصي الانسي ٤٨٠. المتوسط ٤٦٣.
 للزندي ٤٦٥. للصفيرة العجزية ٤٧٧.
 للفخذية المقدم ٤٦٣. للفروع العنقية
 ٤٥٨. للفصي المقدم ٤٨٠. للمابضي الانسي
 ٤٧٩. للمتوسط ٤٦٣. للوركي العظيم ٤٧٥
 العنقي السطحي ٤٥٧. الوجي ٤٤٥
 العنقية ٤٥٥. فروعها الخلفية ٤٥٨. المقدمة ٤٥٦
 العنقية القلبية (للعاشر) ٤٥٠
 العيني للخامس ٤٢٣
 فديان ٤٣٩
 الفخذي المقدم ٤٧٣
 الفكلي السفلي ٤٣٩. الفكلي العلوي ٤٣٦
 الفسي (الخامس) ٤٤٠. الفمية (للسابع) ٤٤٥
 الفصي الخلفي ٤٧٩. المقدم ٤٨١
 الفظني العجزية ٤٧٠
 الفظنية ٤٧٠ (كلام عام فيها فروعها) ٤٧٠
 الفلبي السفلي ٤٨٧ العلوي ٤٨٦. المتوسط ٤٨٧
 الكعبري ٤٦٦
 الكلوي المحشوي ٤٨٨
 اللسانية ٤٤٧
 اللساني البلعومي (للتاسع) ٤٤٦
 اللوزية ٤٤٧
 المابضي الانسي ٤٧٩. المابضي الوحشي ٤٨١
 المبعد للمقلة (للسادس) ٤٤٣
 المتوسط ٤٦٣
 المحرك للمقلة (الثالث) ٤٣١
 المريثة ٤٥١
 المضغي ٤٣٩

- العصب والجو بصلي ٢٩٢. اعصاب الحيوة الحيوانية
والالية ٢٩٨. العصب السباتوي ٤٨٢. اقسامه
٤٨٢. الاعصاب الحسية ٤٢٧. تقسيمها ٤٢٧.
الشوكية ٤٥٤. (كلام عام فيها) ٤٥٥
الابري اللامي ٤٤٥
الاخصي الانسي ٤٨٠. الوحشي ٤٨١. المجلدي
٤٨٠
الاذني الخلفي ٤٤٥. الصدغي ٤٤٠.
الاذني للعاشر ٤٤٩. الاذني العظيم ٤٥٧
الاستحيائي ٤٧٧. الاستحيائي السفلي ٤٧٨
الاستطراقي التاسع ٤٥٨. الاستطراقي الشطوي
٤٨١. الاستطراقي للضفيرة العضدية ٤٦٠
الاستطراقي للضفيرة العنقية ٤٥٨
اسفل البكرة ٤٣٥
اسفل الفك ٤٤٥
الاعصاب اسفل اللوح ٤٦١
الاشفاقي (الرابع) ٤٢٢
الاصبعية للاخصي الانسي ٤٨٠
الاصبعية للمتوسط ٤٦٢
اعلى البكرة ٤٣٥
اعلى الترقوة ٤٥٧
اعلى الحجاج ٤٣٥
اعلى الفك ٤٤٥
اعلى اللوح ٤٦١
الاولوي السفلي ٤٧٨. العلوي ٤٧٧
الانفي ٤٣٥. الانفي الحنكي ٤٣٩
الباسوري السفلي ٤٧٧
البصري (الثاني) ٤٣
البصلة الشمية ٤٢٩
البلعومية للتاسع ٤٤٧
البلعومي للعاشر ٤٤٩
البلعومي للعقدة الوتدية الحنكية ٤٣٩
بين الاضلاع السفلى ٤٦٩
بين الاضلاع العليا ٤٦٨
بين العظمين الخلفي ٤٦٧
- بين العظمين المقدم ٤٦٣
التاسع النازل ٤٥٢
تحت اللسان (الثاني عشر) ٤٥١
تحت الموخري ٤٥٩
التناسلي الخنذي ٤٧٢
الثلاثي الوجي (الخامس) ٤٢٢
الحبيبي ٤٢٤
المجلدي للاخصي الانسي ٤٨٠. المجلدي الانسي
للفنذي المقدم ٤٧٤. المجلدي الانسي للضفيرة
العضدية ٤٦٢. المجلدي الانسي الاصغر للضفيرة
العضدية ٤٦٢. المجلدي للزندي ٤٦٥. المجلدي
للعضلي المغزي ٤٦٦. الجلدية المابضي الوحشي
٤٨١. المجلدي المتوسط للفنذي المقدم ٤٧٤
المجلدي الوحشي للضفيرة القطنية ٤٧٢
الجلدية الجانبية ٤٦٩
الجناحيان ٤٤٠
الحبيل الطبلي ٤٤٥
الحجابي ٤٤٨
الحجابي ٤٣٦
الحجري العظيم ٤٣٩
الحرقفي الاربي ٤٧١. الحنكي ٤٧١
الحشوي الكبير ٤٨٨. الصغير ٤٨٨
الحشوي السفلي الرابع ٤٥٠
الحشوي العلوي ٤٥٠
الحنكية ٤٢٨
الدمعي ٤٣٤
الدرقي اللامي ٤٥٣
ذات البطنين ٤٤٥
الذقني ٤٤١
ذنب النرس ٤٧٥
الذوقي للتاسع ٤٤١
الرتوي المعدي (العاشر) ٤٤٨
الرتوية الخلفية ٤٥٠. المقدمة ٤٥٠
الراحي المجلدي ٤٦٣. السطحي ٤٦٦. الغائر ٤٦٦
الرحمية ٤٩٢

- الشربان المعدي الثربي الابسر ٢٢٦ المعدي الثربي الامين الصفن ٦٢٤
 ٢٢٥
 المعدي للطحاى ٢٢٦
 المعلي ٢٢٩
 المعوية الدقيقة ٢٢٧
 المغذي الشطوي ٢٥٠
 المفرد المنصلي ٢٤٦
 المنصليان السفليان ٢٤٦. العلويان ٢٤٦
 المقدمة بين الاضلاع ٢٠٨
 المنصية ٢٠٨. المنصية الخلفية ٢٢١
 المنعكف الانسي ٢٤٢. الوحشي ٢٤٢. الخلفي
 والمقدم ٢١٢
 المنوي ٢٢٩
 المهبلي ٢٢٤
 الموخري ٢٨٥
 الهدية الطويلة ٢٩٨. القصيرة ٢٩٨
 المقدمة ٢٩٨
 الوجي ٢٨٢. الوجي المستعرض ٢٨٧
 الوركي ٢٢٧
 اللا اسم لة ٢٧٨
 الشعبة اليسرى ٥٩٧. اليمنى ٥٩٧
 الشعر ٤٩٦
 الشفران الكبيران ٦٢٢. الصغيران ٦٢٢
 الشفتان ٥٢٠
 الشفة المتوسطة ٤١٩
 الشوكة الانفية ٢٦. الانفية المقدمة ٥٤. الخلفية ٥٧
 البلعومية ٢١ العانية ١٠٦. اللوح ١٥
 المصفوية ٤٢. الزركية ١٠٥
- ص
 الصائم ٥٥٢
 الصدر ٥٧٦
 الصفاق تحت اللوح ٢٢٧. الصفاق الفقري ٢٠٨
 الصفق ١٧٥
- الصفحة الافقية للمخني ٥٧. الرمادية ٤١٢. الغربالية ٤٧
 العمودية للمضوي ٤٨. العمودية للمخني ٥٧
 صفحة الفقرات ١٨. اللولبية ٥٢٦
 الصلبة ٥٠٤
 اصححة الانف ٧٤. الصماخ البولي ٦١٨. الصماخ البولي
 في الاناث ٦٢٢. الصماخ السهمي الظاهر ٤٠
 والباطن ٤١
 صمام اوستاكيوس ٥٨٠. الصمام الناجي ٥٨٤. الثلاثي
 الرووس ٥٨١. صمام فيونسس ٤٢١. اللفانفي
 الاعوري ٥٥٨
 الصمامات المنطبقة ٥٥٤. الهلالية ٥٨٢ و ٥٨٤
 الصيون ٥١٧
- ض
 الضفيرة المشمية ٤١٧
- ط
 طبقات العين ٥٠٤
 الطلبة ٥١٩
 الطحال ٥٧٢
 الطرفان السفليان ١٠٢. العلويان ٨١
 الاطراف ٨١
- ظ
 الاظفار ٤٩٦
- ع
 العرف الجبلي ٦١٨. المحرقى ١٠٤. النصبه ١١٦
 الديك ٤٨
 العدسة البلورية ٥١٠
 الاعصاب (كلام عام في مجموعها) ٢٩١ بناء الجوه
 العصبي ٢٩٢. البناء المكمسكوي للاعصاب
 ٢٩٨. تركيبها الكيمياوي ٢٩١. جودرها الانبوي

فوق الاخرم ٢٠٦. فوق الحجاج ٢٩٧. فوق اللوح
 ٢٠٦. فوق الكلية ٢٢٩
 القاعدي ٢٠٤
 القصي المحلي ٢٨٢
 القصي الخلفي ٢٤٩. الراجع ٢٤٧. المقدم ٢٤٦
 الفطنية ٢٣٠
 الفوس الاخصي ٢٥١. الاورطي ٢٧٦. الراجي
 السطحي ٢١٨. الراجي الغائر ٢١٦
 القولوني الايسر ٢٢٨. الايمن ٢٢٧. المتوسط ٢٢٧
 الكبدى ٢٢٤
 الكعبري ٢١٥. الكعبري الراجع ٢١٧
 الكعيان ٢٤٨
 الكلوي ٢٢٩
 اللاهي للدرقي العلوي ٢٨١. اللاهي للسالي ٢٨٢
 للسالي ٢٨٢
 اللفائقي القولوي ٢٢٧
 اللهوي السفلي ٢٨٤
 اللوحي الخلفي ٢٠٧
 اللوزي ٢٨٤
 المسارفي السفلي ٢٢٧. العلوي ٢٢٦
 المابضي ٢٤٤
 المثاني السفلي ٢٢٢. العلوي ٢٢٢. المتوسط ٢٢٢
 المنغم الكبير للعضدي ٢١٥. الكبير للغذي ٢٤٤
 المحور البطني ٢٢٢. المحور الذرقي ٢٠٥
 الخي الخلفي ٢٠٤. المتوسط ٢٩٩. المقدم ٢٩٩
 الخنزيرة ٢٩٦
 الخنجي السفلي ٢٠٤. العلوي ٢٠٤
 المرافق للعصب الوري ٢٢٧
 المرهية للاورطي النازل ٢٢١. للدرقي السفلي ٢٠٦
 المستعرضة للقاعدي ٢٠٤
 المشطي للكعبري ٢١٧ المشطي للقدم ٢٤٨
 المشي المقدم ٢٩٩
 المصفوي الخلفي ٢٩٧. المقدم ٢٩٧
 المضني ٢٩٠
 المعدي ٢٢٤. المعدي الاثنا عشري ٢٢٥

الشریان السبني ٢٢٨
 الشبكي المركزي ٢٩٨
 الشراسيفي للعرفي الظاهر ٢٢٩. الشراسيفي
 السطحي ٢٤٢. الشراسيفي العاوي ٢٠٨
 الشظوي ٢٥٠. الشظوي المقدم ٢٥٠
 الشعبية ٢٢١
 الشفوي السفلي ٢٨٤
 الشوكية الجانبية ٢٠٢. الشوكي الخلفي ٢٠٤. المقدم
 ٢٠٢
 الصدري الاخرى ٢١٢. الجناحي ٢١٢. الطويل
 ٢١٢. العلوي ٢١٢
 الصدغي ٢٨٧. الصدغيان الغائران ٢٩٠
 الضدعي ٢٨٢
 الطبلي للسباتي ٢٩٦. الطبلي للفكي الباطن ٢٨٨
 الطحالي ٢٢٥
 الظهري لايهام القدم ٢٤٨. الظهري السباتي
 ٢١٧. المقدم ٢٤٨. للفضيب ٢٢٦. للسالي
 ٢٨٢. اللوحي ٢١٢
 الظهريان الايهاميان ٢١٧
 العجاني المستعرض ٢٢٥. العجاني السطحي ٢٢٥
 العجزي المتوسط ٢٢١. العجزية الجانبية ٢٢٨
 العصعصي ٢٢٧
 العضدي ٢١٢
 العضلي الخجالي ٢٠٨
 العقبى الانسي ٢٥١
 العلوي بين الاضلاع ٢٠٨
 العنقي الرئيسي ٢٨٥. السطحي ٢٠٧. الغائر ٢٠٩
 الصاعد ٢٠٦. المستعرض ٢٠٧
 العيني ٢٩٦
 الغائر السفلي للعضدي ٢١٥. العلوي ٢١٤
 فديان ٢٩١
 الغندي ٢٤٠. الغندي الغائر ٢٤٢
 الغفري ٢٠٢
 الفكي الباطن ٢٨٨
 الفتي ٢٩٠

الشرايين الخلفية للفوس الاخصي ٢٥١. المقدمة ٢٥٢

- للكعبري ٢١٨
 الجمبي ٢٩٨
 الجفنيان ٢٩٧
 الجناحية ٢٩٠. الجناحي الحنكي ٢٩١
 الحجابي الحجازي ٢٣٠
 الحجابي العلوي ٢٠٧
 الحرقني الاصيلي ٢٢١. الباطن ٢٢٢. الظاهر
 ٢٢٩. الفظني ٢٢٨. المنعكف ٢٤٠. المنعكف
 السطحي ٢٤٢.
 الحلقني الدرقي ٢٨٢
 الحنجري ٢٠٦
 الحنجري العلوي ٢٨٢
 الحنكي الخلفي ٢٩٠
 الحوصلي ٢٢٥
 الحنلي ٢٢٢
 الدرقي السفلي ٢٠٦. العلوي ٢٨١
 الدمعي ٢٩٧
 الراحي السطحي ٢١٧. الراحبة بين العظام ٢١٨
 الرحي ٢٢٢
 الرسغي للمقدم ٢٤٨ الخلفي للزندي ٢٢٠. المقدم
 للزندي ٢٢٠. الخلفي للكعبري ٢١٧.
 المقدم للكعبري ٢١٧
 الرئوي ٢٥٢
 الزاوي ٢٨٥
 الزندي ٢١٨. الراجع الخلفي ٢١٩. الراجع المقدم
 ٢١٩
 الساد ٢٢٤
 السبائي الكعبري ٢١٨
 السبائي الاصيلي ٢٧٩. الباطن ٢٩٥. الظاهر ٢٨٠
 السعائي الخلفي ٢٠٢. السفلي ٢٨٥. الصغير ٢٨٩
 المتوسط ٢٨٨. المقدم ٢٩٦
 السطحي النازل ٢٨٢
 السنخي ٢٩٠
 السني السفلي ٢٨٩

الشريان الاجوفي ٢٢٦

- الاخصي الانسي ٢٥١. الاخصي الوحشي ٢٥١
 الاذني للاذني الخلفي ٢٨٦. الاذني الخلفي ٢٨٦
 الاذني للوخري ٢٨٥
 الاستحيائي الباطن ٢٢٤. الظاهر السطحي ٢٤٢.
 الظاهر الغائر ٢٤٢.
 الاستطراقي للزندي ٢٢٠. الاستطراقي المقدم
 والخلفي ٢٩٩. للظري للمقدم ٢٤٩ للشظوي ٢٥٠
 الاصعية للزندي ٢٢٠
 الاصعية للفوس الاخصي ٢٥٢
 الاكليبي السفلي ٢٨٤. العلوي ٢٨٥
 الاكليبيان ٢٧٨
 الالوي ٢٢٧
 الالوية السفلي ٢٢٧
 الانفي للفكي الباطن ٢٩١. الانفي الجانبي ٢٨٥.
 الانفي للعيبي ٢٩٨
 الاورطي ٢٧٥. الاورطي البطني ٢٢٢. الصدري
 ٢٢٠
 الباسوري السفلي ٢٢٥. العلوي ٢٢٩. المتوسط
 ٢٢٢
 البصلي ٢٢٥
 البلعومي الصاعد ٢٨٦
 البنكرياسي الاثناعشري السفلي ٢٢٧. الاثناعشري
 العلوي ٢٢٥
 البنكرياسية ٢٢٥
 البوابي ٢٢٥
الشرايين بين الاضلاع ٢٢١
 بين العظمين الخلفي ٢١٩. المقدم ٢١٩
 التامورية للاورطي الصدري ٢٢١
 التامورية للذني الباطن ٢٠٨
 تحت الترقوة وازوائه ٢٠٠
 تحت الحجاب ٢٩٠. الذقن ٢٨٤. الفك ٢٨٤.
 اللسان ٢٨٢. اللوح ٢١٢
 الندي الباطن ٢٠٧
 الناقبة للذني الباطن ٢٠٨. للفخذي ٢٤٢

الارتفاع الانفي ٢٦. الجبهي ٣٥. الجداري ٢٤ المحرقفي

المشطي ١٠٦

الارتفاع الذقني ٦١. العالي ١٠٦

الرحم ٦٢٦

الرطوبة الزجاجية ٥١٠. الرطوبة المائية ٥١٠

الركابي ٥٢٢

الرتمان ٦٠٠

ز

الزاوية العجزية النقرية ٢٤. العانية ١٠٦

الزائدة الاذنية ٥٧٩. الزوائد الهدبية ٥٠٧

س

ساقا الحجاب ٢٢٢. الخ ٤١٣. سوق الخنج ٤٢٦

السريان البصريان ٤١٩

سكاربا مثلثة ٢٤٠

السلم الدهليزي ٥٢٦. الطلي ٥٢٦

السمحاق ١١

الاسنان ٥٢١. الدائمة ٥٢١. الزمنية ٥٢٢. تولدها ونوها

وبروزها ٥٢٦

السنداني ٥٢٢

ش

الشبكة المخاطية ٤٩٥

الشبكية ٥٠٨

الشرم الانفي ٢٦. بين العقدتين ١١٢. السيني ٦٢. العجزي

الوركي الصغير والكبير ١٠٥. فوق الحجاج ٢٦

فوق اللوح ٨٥. المصفوي ٢٥

الشرابين (كلام كلي) ٢٧٢. تنبها ٢٧٤. طبقاتها ٢٧٤.

او عيها ٢٧٥

الشريان الابري الحلي ٢٨٦

الابطي واقسامه ٢١٠

الابهامي الرئيسي ٢١٧

والحفطي ١٤١

العالي المقدم والمخلفي والعلوي والسفلي ١٤٧

العجزي المحرقفي المقدم والمخلفي ١٤٥

العجزي العصصي المقدم والمخلفي ١٤٦

العجزي الوركي الصغير ١٤٦

العجزي الوركي الكبير ١٤٥

الغرابي الاخري والمستعرض ١٥٠

الغرابي العضدي والعضدي الحفطي والعالي ١٥٠

القضية الشظوية ١٦٤

القصي الترقوي المقدم والمخلفي ١٤٨

القصي المقدم والمخلفي ١٤٤

القطني العجزي والقطني المحرقفي ١٤٤

القنوي ٢٠٤

الاربطة الكبدية ٥٦٤

الرباط الكعبري الزندي المحيط والمخرف وبين

العظمين ١٥٢

الكعبري الزندي المقدم والمخلفي ١٥٤

كبيرات ٢١٥

اربطة المائة ٦١٥

المثلث ٢١٥ المثلث للعجزي ٢٨١

المرفقي المقدم والمخلفي والانسي والوحشي ١٥٢

المسنن ٤٠١

المشترك المقدم والمخلفي ١٢٣

المشطية السلامية ١٠٩

المشطية والمشطية السلامية والسلامية ١٧٠

المعلق للعدسة ٥١١

الموخريان المحامليان المقدمان والمخلفيان

والمجانبيان والحفطيان ١٢٧

الموخري المحوري والنايبة ١٢٨

النبوت المنصلية ١٢٥

الهدبي ٥٠٨

الرباطة الهلالية ٤١٧

الرباط الوركي الحفطي والمحرقفي للخذني والمستدير

والمحفي والمستعرض ١٦٠

د

دائرة ويلس ٣٠٥
 الدرز الأكليلي ٦٣ السهي ٦٣ اللامي ٦٣
 دروز جانب الحجيبة ٦٣ . قاعدتها ٦٤ . الوجه ٦٤
 الدماغ وفسامه ٤٠٦ . اغشيته ٤٠٣ . ثقله ٤٠٧
 الدهليز ٥٢٤ و٦٣٢
 الدورة الجينية ٥٨٦

✓
 الاربطة (كلام كلي) ١٢٩
 الرباط الاخري الترقوي العلوي والسفلي والغرابي
 الترقوي ١٤٩
 بوبارت ٢٥١
 الاربطة بين الشوكات والرباط اعلى الشوكات ١٣٥
 بين النتوات المستعرضة ١٣٥
 الرباط الجاني الوحشي للعصل الصدغي الفكي والجاني
 الانسي والابري الفكي والمخفي ١٣٩
 الجفني ٥١٣
 الحامليان المحوريان المقدم والمخفي والمستعرض
 والمخفيان ١٣٦
 الاربطة الخلفية لرسغ الندم ٢٦٧ . الرسغ القدي ١٦٥
 الرسغ اليدي ١٥٦ . الرسغية المشطية البيدي
 ١٥٨
 اربطة الرحم ٦٢٧
 الرباطان الخلفيان المقدم والمخفي للبد ٢٤٢
 الاربطة الرسغية المشطية القدمية ١٦٩ . الرسغي الجاني
 الانسي والوحشي والمقدم والمخفي ١٥٥
 اربطة الركبة الباطنة ١٦٢ . الظاهرة ١٦١
 الاربطة الصفراء ١٣٤
 الرباط الضلي الترقوي ١٤٨
 الضلي الفقري المقدم والمخفي المتوسط ١٤٠
 الضلي القضي المقدم والمخفي والمخفي ١٤٢
 الضلي المستعرض المقدم والمتوسط والمخفي

٤٦ . تحت الشوكة ٨٤ . الخنكية ٦٧ . الزوجية ٧٠
 الصدغية ٧٠ . العناية ٨٦ . فوق الشوكة ٨٤
 المرفية ٨٩ . المقارية ٨٩ . النابية ٥١ . الوندية
 الفكية ٧١ . الوداجية ٤٢ . الوركية المستقبسية ٦٦٣
 الحفرتان الانفيتان ٥٠٢ و٧٣
 الحن الحرقفي ١٠٦
 الحلقة البنية الظاهرة ٦٤٦ و٢١٥ . البنية الباطنة ٦٥٠ .
 الفخذية ٦٥٩
 حلبة الثدي ٦٤٢ . الحمة الدمعية ٥١٣
 الحليمات الجلدية ٤٩٤ . اللسانية ٤٩٩
 الخنجر ٥٨٩ . اربطتها ٥٩١
 الحنك ٥٢٧
 الحوصلة المرارية ٥٧٠
 الحو بصلتان المنويتان ٦٢٨
 حو بصلات كرافيموس ٦٤٠
 الحوض ١٠٨ و٦١٢ . مدخلة ١٠٠ . محاوره ١٠٩ . حوض
 الانثى والذكر ١١٠

خ

الخدان ٥٣٠
 الخزانة الخلفية للعين ٥١٠ . المقدمة ٥١٠
 الخصيتان ولقائهما ٦٣٢ و٦٣٥ . الخصيتان للدماغ ٤٢١
 الخط الصدغي ٣٤ . الابيض ٢١٥ و٢١٨ . الخفي بين
 المدورين ١١٢ . المقدم بين المدورين ١١٢ . الحرقفي
 المشطي ١٠٤ . الخشن ١١٢ . المربع ١١٢
 الخيطان الهاليليان البطينان ٢١٨
 الخلاء المابضي ٢٤٤ . المنقوب المخفي ٤١٢ . المنقوب المقدم
 ٤١٣
 الخلايا الحلمية ٤٠ . المنصوية ٤٨ . الهوائية ٦٠٣
 الخبل المعوي ٥٥٥
 الخيبة الخنكية ٤٠٤

- التيه ٥٢٣. التيه الغشائي ٥٢٦
 الثدي ٦٤٢
 الثرب الصغير ٥٤٧. الكبير ٥٤٧. المعدي الطحالي ٥٤٨
 الثقب الابري المحلي ٤٢. البصري ٤٦. البيضي ٤٥. تحت
 الحجاج ٥١. المجداري ٢٤. المحلي ٤٠. الذقني ٦١
 الساد ١٠٦. السباتي ٤١. الشوكي ٤٥. العظيم ٢١
 الاعور ٦٥. الفقري ٢٠. فوق الحجاج ٢٦. اللقي
 الخلفي ٢١. المقدم ٢١. المستدير ٤٥. المنزق الخلفي
 ٦٧. المقدم ٦٦. المصفويان ٧٢. منرو ٤١. الوتدي
 الحنكي ٥٨. الوجني ٥٥. ونسلو ٥٤٧
 الثقوب بين الفقرات ١٩. ثقب ثيبسيوس ٥٨٠
 العجزية الخلفية ٢٥. المقدمة ٢٤. المصفوية ٢٧
 الثانية الهلالية ٥١٥
 ج
 الحاجبان ٥١٢
 الحالبان ٦١٠
 الحاجز الخنذي ٦٦٠
 الحاصل الدمعي ٥١٢
 الحبل الشوكي ٤٠١. اغشيتة ٢٩٩. بناو ٤٠٢. فرجانة
 ٤٠٢. قوائمه ٤٠٢
 الحبل المنوي ٦٢٥
 الحبال الوترية ٥٨٢
 الحجاب الحاجز ٢٢١. المنتصف ٦٠٠
 الحجران الاذنيان ٥٢٧
 الحدة الرمادية ٤١٢. حدة لوبروس ٥٨٠. الحدة
 الوركية ١٠٥
 الحزمة الزيتونية ٤٠٨
 الاحشا ٥٢٩
 الحشفة ٦٢١
 الحفرة الآسية ٥١. البيضية ٥٨١. البيضية النصف ٥٢٤.
 الكروية النصف ٥٢٤. ذات البطنين ٤٠. الجناحية
 التيه ٥٢٣. التيه الغشائي ٥٢٦
 الثدي ٦٤٢
 الثرب الصغير ٥٤٧. الكبير ٥٤٧. المعدي الطحالي ٥٤٨
 الثقب الابري المحلي ٤٢. البصري ٤٦. البيضي ٤٥. تحت
 الحجاج ٥١. المجداري ٢٤. المحلي ٤٠. الذقني ٦١
 الساد ١٠٦. السباتي ٤١. الشوكي ٤٥. العظيم ٢١
 الاعور ٦٥. الفقري ٢٠. فوق الحجاج ٢٦. اللقي
 الخلفي ٢١. المقدم ٢١. المستدير ٤٥. المنزق الخلفي
 ٦٧. المقدم ٦٦. المصفويان ٧٢. منرو ٤١. الوتدي
 الحنكي ٥٨. الوجني ٥٥. ونسلو ٥٤٧
 الثقوب بين الفقرات ١٩. ثقب ثيبسيوس ٥٨٠
 العجزية الخلفية ٢٥. المقدمة ٢٤. المصفوية ٢٧
 الثانية الهلالية ٥١٥
 ج
 جبل الزهرة ٦٢٢
 الجراب الاذني ٥٢٦
 الاجربة المعدية ٥٥٢. المعوية البسيطة ٥٥٥
 الجسد (كلام عام) ٤
 جسر قرولبوس ٤٠٩
 جسم ارتيبوس ٥٨٢. الجسم الاسفنجي للعجزي ٦٢٢. المحلي
 ٤٠٨. الزيتوني ٤٠٨. الاصفر ٦٤١. الصلب ٤١٥
 السنن ٤٠٨. المشرشر ٤١٧. المضلع ٤١٧. النخاعي
 ٤١٢
 الجسمان الابيضان ٤١٢. الاجوفان ٦٢٢. المعتلان
 ٤٢١
 اجسام باسيفي ٤٦٤. الاجسام الرباعية ٤٢١. اجسام
 ملبيبوس ٦٠٩ و ٥٧٤
 الجفنان ٥١٢
 الجلد ٤٩٢
 الجحيفة جانبها ٧٠. قاعدتها ٦٥. قمتها ٦٤. مقدمها ٧١

فهرس خاص

البطين الابسر ٥٨٣. الايمن ٥٨١. الثالث للدماغ ٤٢٠.
 الرابع ٤٢٤. الخامس ٤١٨. بطين الخنجره ٥٩٢
 البطينان الجانبيان للدماغ ٤١٦
 البظر ٦٢٣
 بقعة سويدرين ٥٠٩
 البلعوم ٥٤١
 البليورتان ٥٩٨
 البنكرياس ٥٧١
 البواب ٥٥٠
 البواسير الظاهرة ٦٦٢
 البيضه ٦٤١

ت

النامور ٥٧٦
 التجويف الحجاجي ٧٢. الرحي ٦٣٧. السيني الكبير والصغير
 للزند ٩١. الطلي ٥٢
 التراكوس ٥١٧
 التشرح حقيقته واقسامه ١. تاريخه ٢. الجراحي للفتق
 الاربي ٦٤٥. للفتق الخذي ٦٥٤. للعجان ٦٦٤
 للقسم الوركي المستقي ٦٦٢
 تشرح البطن والمحوض ٧٠٢. الراس والعنق ٦٧٧
 الصدر ٦٩٩. الطرف السفلي ٧١٣. الطرف العلوي
 ٦٩١
 التعريج السيني ٥٥٩
 تغييرات المجموع الوعائي عند الولادة ٥٨٨

٤

الابط ٢٠٩
 الايشيليوم ٥٦١
 الاثنا عشري ٥٥٢
 الأدمه ٤٩٢
 الاذن ٥١٦. الباطنه ٥٢٢. الظاهره ٥١٧. المتوسطه ٥١٩
 الاذنين اليسرى ٥٨٢. اليمنى ٥٧٩
 الألتويس ٦١٢
 الايتان للدماغ ٤٢١
 الام الجافية للجل الشوكي ٤٠٠. للدماغ ٤٠٢
 الام الحنونه للجل الشوكي ٤٠٠. للدماغ ٤٠٥
 الامتداد البصري ٤٢٠
 الاتيتراكوش ٥١٧
 الاتيبيلكس ٥١٧
 الأندوكرديوم ٥٨٤
 الانف ٥٠٠
 الاوراكوش ٦١٤
 البرنج ٦٢٦
 البروستنا ٦٢٠
 البريتون ٥٤٥
 البشره ٤٩٥
 البطن واقسامه ٥٤٢

ب

صواب	خطاء	سطر	صفحة
والاطفار	والاطفار	١٢	٢٧٩
وفي العنق	والعنق	١٨	٢٨٠
والاوعية	والاوعية	١	٢٨١
اليمنى	اليمنى	١٥	٢٨١
اليسار	الايمن	٢	٢٨٢
اليمين	الايمن	٢	٢٨٢
اليمنى	اليمنى	١٢	٢٨٢
عدداً	عدداً	٢	٢٨٢
بالاوعية	الاوعية	١	٢٨٧
العصية	العصيبة	١٢	٢٩٢
$\frac{1}{2000}$	$\frac{1}{2000}$	١٤	٢٩٢
انبوي	انبوية	١٠	٤٠٠
منتهى	منتهى	٢	٤٠١
الجانبية	والفرجة الجانبية	١٥	٤٠٢
واخرى	واخر	٤	٤٠٤
الطولية	الطويلة	١٤	٤٠٤
السفلى	السفلي	٢٠	٤٠٧
ويضيمان	ويضيمان	٢٥	٤٠٨
بيضاء	بيضاء	١١	٤١٢
من منتصف	منتصف	١٢	٤١٢
المتوسطة	الفاصلة	١	٤١٩
المخلفي	المخلفي	١٥	٤١٩
اللذان يتحدان	يتحدان	٢٠	٤١٩
المضلعين	المخططين	٨	٤٢٠
المضلعان	المخططان	٢٢	٤٢٠
الجزء	الوجه	٦	٤٢٧
مؤخرها	مؤخرها	١٢	٤٢١
الوجه المخجاجي	الوجه العيني	١١	٤٢٢
عضلات الوجه الا العضلات المضغية	عضلات الوجه	٢٤	٤٤٢
البطن	البطن	١١	٤٤٥
فيرسل	فيقدم	٦	٤٤٨
البطنية	الحشوية	٦	٤٤٩
البطنية	الحشوية	٥	٤٥١
القائمة الخلفية ومنفذ من الفرجة الجانبية الخلفية	القائمة الخلفية	١٢	٤٥٤
والمربعة المنخرقة	والمربعة والمنخرقة	٢٤	٤٥٨
يتحدان	ويتحدان	١٩	٤٦٠
تحت	تحت	٦	٤٦٦
الباطنة	الباطة	١٦	٤٦٦
العجزية	الفطنية	١١	٤٧٧
الواقع	الواقع	٥	٤٨١
البطنية	الحشوية	٢١	٤٨٨
غدة	الغدة	٦	٤٩٢
الثغثان	الثغثان	١٤	٥٠٠
المخفي	السفلي	١٩	٥١٤
المتوسط	المخاني	١٥	٦٨٠

صواب	خطاء	سطر	صفحة
المربعة المنخرقة	والمعينة المنخرقة	١٠	٢٠٦
التكوين الشوكيين للفترين	التنورات الشوكية للفترات	٢٥	٢٠٦
بالقسم النطفي	الفتفي بالقسم	٤	٢٠٨
شكل ١٢٦	شكل ١٢٦	٨	٢٠٩
الابضية	الاربطية	٢٦	٢٢٤
الوحشية	الوحشة	٢٦	٢٢٤
الابضية	الاطية	١٦	٢٢٧
عظمية	عظمية	١٩	٢٢٧
الرأسين	الرأسين	١٤	٢٣٠
للساعد	الساعد	١٢	٢٣٢
يتبسّط ويغيب	تنبسّط وتغيب	١٠	٢٣٥
تحت	تحت	١٤	٢٣٥
عريضة	عريضة	٢	٢٣٦
الانبساط	الانبساط	٢٤	٢٤٩
الانسية	الباطنة	١٥	٢٥٢
العجزي الوركي الكبير والعجزي المحرقني الخلفي	العجزي الوركي والعجزي المحرقني	٢٧	٢٥٤
العلويين	الوحشين	١٤	٢٦٠
منه	موضوع بجواره	١١	٢٨٠
يقارب منه	يقرب	١٤	٢٨٠
والغدة	والغدة والغدة	١٦	٢٩٢
والخلفية	والسفلى	٨	٢٩٤
العضلة	الوريد	٢٦	٢٩٤
العظمية	واعظمها	١	٢٩٧
الطولية	الطويلة	٢	٢٩٩
المضلع	المخطط	١٦	٢٩٩
يتقسم	تقسم	١٢	٣٠٤
ذاهباً	ذاهباً	٢	٣٠٦
والشرايين	والشريان	٨	٣١٢
الحافة السفلى للوح ويفارق الخلاه الابطي وينفذ من الخلاه الواقع بين المستديرة الصغيرة من الاعلى والمستديرة الكبيرة من الاسفل والراس الطويل لثلاثية الروموس من المقدم	الحافة السفلى للوح	٢٦	٣١٢
وهو المجذع الاكبر للظهري اللوحي	وهو الظهري اللوحي	١	٣١٣
تنوزع	تنوع	١٠	٣٢٧
بالقولوني الايمن	بالقولوني الايسر	١٨	٣٢٧
العلوي والسفلي	العلوي السفلي	٢٤	٣٣٣
الانسي	الباطن	١٨	٣٣٤
متفصلاً بالناقبين	بالناقبين	٥	٣٤٤
(تخذف الكلمتان)	والباسطة للايهام	٤	٣٤٨
الباسطة	القابضة	١١	٣٤٨
الصغيرة جداً	الصغيرة	٥	٣٥٥
والاوردة	الاوردة	١٧	٣٦٤
الميزابين	الميزابين	٥	٣٧٠
الميزاب الخلفي بين البطنين	الخلفي بين الميزاب البطنين	٧	٣٧٧
مصاحبين	مصاحباً	٨	٣٧٨

صفحة	سطر	خطأ	صواب
٥	٨	الناثرة	الفاثرة
٢٠	٢١	والميكمة	والميكمة والنك السفلي
٢٤	١١	المحفر	المحفرة
٢٦	١٨	الدمعبين	الانفيين
٤٠	١٠	الخلفية	السفلى
٤٤	٥	التفاح المستطيل	جسرفر وليوس
٥٢	٢٠	مثنوب	مثنوب
٥٢	١٢	المتوسطة	المتوسط
٥٩	٢٤	لمصفوي	المصفوي
٦٢	١٢	المضغية	الصدغية
٦٥	٢٢	الذنان	اللذنان
٦٨	٢٢	الغاصبية	البلعومية
٦٩	١٢	من	منه
٨٦	٥	الصغيرة	الكبيرة
٨٨	٧	بواسطة	بواسطة
٨٩	١١	والراس الانسي	والراس الانسي للثلاثية الروثوس
١٠٤	١٢	والسفلي	والعلوي
١١٨	٨	النصبة	النصبة
١١٨	١٥	بسطح	بسطح
١٢٠	٥	بالكعب	بالكعب
١٢٤	عنوان الصفحة	المطشبة	المطشبة
١٢٠	١٢	المحرفي	الوركي
١٢٠	١٩	٨٢٢٠	٢٢٠
١٢١	٢٠	بالمحفرة	بالمحفرة
١٤١	١٢	الضلعي	الضلعي المستعرض - المتوسط - الخلفي
١٤٦	١٤	الاروية	الاروية والعصب الالوي واسفلها الالوية والاعصاب الوركية
١٥٢	١٤	وروية	وروية
١٦٠	١٩	يبطن رأس	يغطي عنق
١٦٤	١٩	للتصبة	النظية
١٦٤	٢١	النظية	للتصبة
١٦٧	٢٥	التجاورة	التجاورة
١٦٨	٥	بالكعب	بالكعب
١٧٢	٧	وصفها	وصفها
١٧٤	٤	البقاء	البقاء
١٧٨	٦	الفرع	الفرع
١٧٩	١٠	متينة	متينة
١٨١	٥	يصعد	ينشا
١٨٢	٢	المحفرة الاسمية	المحفرة الآسية
١٨٧	١٢	لجميع	لجميع
١٨٧	٢٥	الباطن	الانسي
١٩٥	٢٢	المخنكية اللسانية	اللهرية اللسانية
١٩٧	عنوان الصفحة	المجهة البلعومية	المجهة البلعومية

مفصل الركبة وتقلب بقايا العضلة الباسطة الرباعية الفخذية. فيشاهد في باطن المفصل الرباط المخاطي والرباطان الجناحيان والزوائد الدهنية للغشاء الزلالي وينظر جيداً الى سعة التجويف الزلالي والى الرباطين المتصاليين . ثم تقطع محفظة المفصل لاجل اظهار عمل الاربطة الجانبية والمتصالبة وحركة الغضروفين الهلاليين. غير ان بناء الغضروفين المذكورين لا يشاهد كما ينبغي الا بعد فصل الفخذ عن القصبة

ثم يبحث عن حركة المفصل الرسغي (صفحة ١٦٥) وتنظف اربطته الرئيسة من الظاهر وهي الجانبي الوحشي المؤلف من ثلاث قطع متميزة والجانبي الانسي والخلفي. ثم ينظر الى اتصال القصبة بالشظية من الاعلى والاسفل والى الغشاء الذي بينها. وتنظف الاربطة الكثيرة القصيرة على ظهر القدم الخاصة بعظام الرسغ والمشط. واما في اخمص القدم فيشرح الرباط العقبي المكعبي ومنذغم وتري القصيبة الخلفية والشظوية الطويلة والاربطة الاخمصية القصيرة

وما بقي من مفصل القدم فيبحث عنه بحسب الترتيب الآتي: اتصال الكعب بالعقب من الخلف الذي يحدّه من المقدم الرباط المتين بين العظمين واتصال الكعب والعقب والزورقي ولاسيما الرباط العقبي الزورقي السفلي واتصال المكعب بالمشطي الرابع والخامس واتصال الزورقي بالعظام الاسفينية الثلاثة واتصال الاسفيني الوحشي بالمشطي الثالث والاسفيني المتوسط بالمشطي الثاني والاسفيني الانسي بالمشطي الاول وينظر الى دخول المشطي الثاني بين الاسفيني الانسي والوحشي للاتصال بالمتوسط القصير. ويبحث عن اتصال العظام المشطية بعضها ببعض وينظر الى الاربطة التي بينها واربطتها الظهرية والاخمصية عند قواعدها والرباط المشطي المستعرض عند رؤوسها. وفي شرح الابهام ينظر الى وضع العظمين السهمانيين

في ظهر القدم معدودة من الانسية الى الوحشية وهي القصية المقدمة والباسطة للابهام والشريان
الظهري للقدم والباسطة الطويلة للاصابع والشظوية الثالثة فتشرح الى محال اندغامها (صفحة
٢٦٠) وتشرح ايضاً الباسطة القصيرة للاصابع الموضوعة على ظهر القدم مع المحافظة على الاوعية
والاعصاب. ثم تنظف الشظويتان الطويلة والقصيرة اللتان تنشآن من الوجه الوحشي للشظية
(صفحة ٢٦٦) وتستقصي القصيرة منها الى محل اندغامها واما سير وتر الطويلة مقاطعاً لاختص
القدم فلا يظهر جيداً الا بعد تشرح الاربطة. ويستقصي العصب العضلي الجليدي نحو الاعلى الى
منشئه من العصب المابضي الوحشي او الشظوي وعند ثقبه الياف الشظويتين وهو منعكف
حول الشظية تشاهد فروع اليها. ثم يتبع العصب القصبي المقدم تحت العضلات منعكفاً حول
الشظية ثم مستقراً على الغشاء بين العظمين فيشاهد انه يتوزع في الباسطة الطويلة للاصابع
والقصية المقدمة والباسطة للابهام والشظوية الثالثة من عضلات الساق وفي الباسطة القصيرة
للاصابع من عضلات القدم (صفحة ٤٨١). ويشرح حينئذ ايضاً الشريان القصبي المقدم
وتستقصي فروعهُ وهي فرعهُ الراجع الذي يسير نحو الاعلى على القصية وينفذ من العضلة القصية
المقدمة ليتفم بالفروع المفصالية للشريان المابضي وفروعهُ العضلية وفرعاه الكعيبان الوحشي
والانسي ويشاهد غالباً الوحشي منها متممهاً بالشريان الشظوي المقدم (صفحة ٢٤٦) ثم يتبع
الشريان الظهري للقدم المتمد من القصبي المقدم نحو الاسفل الى اتحادهِ بالقوس الاخصي في
الخلاء الاول بين العظمين ويبحث عن فرعهِ الرسغي وفرعهِ المشطي الذي يرسل فروعاً
للاخية الثلاثة الوحشية بين العظام (صفحة ٢٤٨) واخيراً تشرح العضلات بين العظام الظهريّة
والاخصية (صفحة ٢٧١)

٨. مفصل الركبة والمفصل الرسغي ومفاصل القدم. - تنظف اولاً الاوتار التي تسير
بقرب مفصل الركبة ويبحث جيداً عن تلمات الاوعية الدموية على الركبة وهي الفرع المتفم من
الشريان الفخذي والعلويان والسفليان المفصالية فهما انسيان ووحشيان من الشريان المابضي
والفرع الراجع من القصبي المقدم. ثم تُظهر الاقسام الثلاثة الاندغامية للعضلة الغشائية النصف
والرباط الخلفي (صفحة ٢٥٩) ويُشرح وتر العضلة ذات الراسين حتى مندغمها مع الرباط الجانبي
الوحشي في راس الشظية (صفحة ٢٥٨) وكذلك العضلة المابضية ويستقصي وترها الى منشئهِ
(صفحة ٢٦٤) ويظهر ايضاً الرباط الجانبي الانسي (صفحة ١٦١) ثم ينظف الرباط الرضفي الى
المقدم ويبحث جيداً عن امتداد كيس الركبة الزلالي الى الاعلى ثم يشق الكيس المذكور فينتفخ

والمبعدة للخنصر (صفحة ٢٦٨). وتُشق اغداد اوتار القابضة القصيرة للابهام لاجل اظهار اندغامها ويقطع ارتباطها الخلفي ويطلب الفرع الذي ياتيها من العصب الاخصي الانسي. وعند ذلك تظهر اوتار القابضة الطويلة للاصابع والقابضة الطويلة للابهام فينظر الى سيرها ثم تشرح القابضة الاضافية والعضلات الخراطينية (صفحة ٢٦٩) ويشاهد الشريان والعصب الاخصيان الوحشيان مقاطعين للقابضة الاضافية فينبع الشريان المذكور الى ان يسير سيراً غائراً فيكون القوس الاخصي. وتطلب فروع العصب التي تذهب الى القابضة الاضافية وتستقصى فروعه الى الاصبعين الوحشيين ومنشأ فرعه الغائر (صفحة ٤٨١). ثم تقطع القابضة الاضافية عند منشأها العريض وكذلك اوتار القابضة الطويلة للابهام والقابضة الطويلة للاصابع. ويشرح الشريان الاخصي الانسي نحو المقدم الى الجانب الانسي للابهام وينظر الى فروع العصب الاخصي الانسي للمبعدة للابهام والقابضة القصيرة له والخراطينيتين الانسييتين ويستقصى الى المقدم الى توزيعه لكل من جانبي الابهام والاصبعين الانسيين ونصف الاصبع الثالث (صفحة ٢٥١ و ٤٨٠). ويستقصى الفرع الغائر من العصب الاخصي الوحشي الى توزيعه للخراطينيتين الوحشيتين والمستعرضة للقدم والمقربة للابهام والعضلات بين العظام الا الوحشيتين اللتين تتوزع فيهما وفي القابضة القصيرة للخنصر فروع من الفرع الاصبعي الوحشي. وينبع حينئذ قوس الشريان الاخصي الوحشي الى الخلاء الاول بين العظمين وتشرح فروعه الاصبعية وغيرها (صفحة ٢٥١). ثم ينظر الى ارتباطات القابضة القصيرة للابهام والمبعدة له والمستعرضة للقدم والقابضة القصيرة للخنصر

٧. مقدم الساق وظهر القدم. - يشق الجلد ويسلخ عن مقدم الساق وظهر القدم على ما يشاهد في الرسم (شكل ٣٦٤) ثم تستقصى الوردية والاعصاب الجلدية فتشاهد على الحافة الانسية للقدم الفريعات الانتهائية للعصب الصافن الانسي والى مقدم الكعب الانسي الفروع الابتدائية للوريد الصافن الانسي (صفحة ٤٧٥ و ٢٧١) وعلى وحشي القدم وراء الكعب الوحشي الوريد والعصب الصافنان الوحشيان (صفحة ٢٧١ و ٤٧٦). ويشاهد على منتصف الساق الى الوحشية العصب العضلي الجلدي ثاقباً للفاقة بحيث يصير سطحياً فتتبع فروعه الى جانبي الابهام والى كل من جانبي الاصبع الاول والثاني ونصف الثالث (صفحة ٤٨٢) واما الخلاء الانسي بين الاصبعين فيأتيه فرع من العصب القصي المقدم. ويشاهد اعلى المنفصل الرسغي والى انسيه القسم العلوي العمودي والقسم السفلي الافقي للرباط الخلفي المقدم الذي يثبت اوتار العضلات البواسط (صفحة ٢٦٧). ويحفظ الرباط المذكور ويقطع ما بقي من اللفاقة فتتكشف هذه الاجزاء

ثم يسلمه الى الجانين كما يرى في الرسم (شكل ٢٦٢). ويستقصى الوريدان الصافنان الوحشي والانسي الى الكعيبين (صفحة ٢٧١) ويشاهد ان العصب الصافن الانسي مرافق للوريد الصافن الانسي (صفحة ٤٧٥) وان العصب الصافن الوحشي ينشأ من اتحاد القصي الاستطراقي والشظوي الاستطراقي وهما فرعان من العصيين المابضيين الانسي والوحشي ويرافق الوريد الصافن الوحشي (صفحة ٤٧٩) ويشاهد ايضاً فرع اخر جلدي من العصب المابضي الوحشي متفرعاً في الجانب الوحشي للساق . ثم تنظف العضلة التوأمية الساقية وينظر الى الاعصاب والاعوية التي تدخلها (صفحة ٢٦٢) ثم يفصل بالانتباه وترها الرقيق المسطح عند اسفله عن وتر النعلية وتقلب العضلة الى الاعلى فتتكشف النعلية وتُشاهد الاخمصية مستقرة عليها الا انها تكون احياناً مفقودة. ويشاهد ان العضلة المابضية الواقعة بين النعلية ومفصل الركبة محمية بالصفاق المابضي وان الجزء السفلي للشريان والوريد المابضيين والعصب المابضي الانسي تقاطعها فتُرسل فروعاً اليها (صفحة ٢٦٤ و ٢٤٥). ثم تُترك العضلة المابضية لتشرح بعد ذلك مع مفصل الركبة وتقطع الاخمصية والنعلية عند ارتباطهما من الاعلى ويبحث عن وتر اكيلس (صفحة ٢٦٢) ثم يقطع بقرب مندغمه. ثم تعزل اللفافة الغائرة وتشرح العضلات الغائرة للساق وهي من الانسية الى الوحشية القابضة الطويلة للاصابع والقصية الخلفية والقابضة الطويلة للابهام (صفحة ٢٦٤) ويشاهد الشريان القصي المقدم ثاقباً الغشاء بين العظمين ليصل الى مقدم الساق ويدرس الشريان والعصب القصيان الخلفيان والوريدان المرافقان للشريان وتتبع فروع العصب الى المابضية والعضلات الثلاث الاخر الغائرة ويستقصى الشريان الشظوي الى الاسفل بين الياف القابضة الطويلة للابهام فيشاهد انه يرسل الشظوي المقدم وفرعاً استطراقياً الى الشريان القصي الخلفي (صفحة ٤٧٩ و ٢٥) وينظر على الخصوص الى مجاورة الاوتار والشريان والعصب وراء واسفل الكعب الانسي (صفحة ٢٦٧)

٦. اخص القدم. - يُسَلخ الجلد على ما يرى في الرسم (شكل ٢٦٢) ويستقصى الفرع الاخصي الجلدي من العصب القصي الخلفي وعند عزل الدهن من اللفافة الاخمصية يشاهد ان مجموعتين من الاعصاب الصغيرة انسباً ووحشياً يتقنانها (صفحة ٤٨٠). ثم ينظف الرباط الخلفي الانسي اسفل الكعب الانسي وتشرح العضلة القصية الخلفية الى مندغمها (صفحة ٢٦٧ و ٢٦٥). ثم يشق جلد الابهام والاصابع شقاً طويلاً في خطها المتوسط وتظهر اغداد اوتار القوابض وتستقصى الشرايين والاعصاب الاصبعية الى كل من جانبيها. ثم تسليخ اللفافة الاخمصية عن العضلات التي هي تغطيها بقدر الامكان بحيث تظهر المبعدة للابهام والقابضة القصيرة للاصابع

(صفحة ٢٤٢) ثم تنظف العضلة المستقيمة وينظر الى وترها المستقيم والمنعكس (صفحة ٢٥٠) ثم ينظف جذع العصب الفخذي المقدم وتشرح فروعه للعضلات البواسط ويعرئ العصب الصافن الانسي الى الركبة وتشاهد الفروع الدقيقة التي تسير الى العضلة المشطية وراء الشريان والوريد الفخزيين ولا سيما بعد قطعها (صفحة ٤٧٢). وان كان العصب الاضافي الساد موجوداً فيشاهد سائراً على شفة الحوض الى الحافة الوحشية للعضلة المشطية ليتوزع فيها (صفحة ٤٧٢) ثم تقطع المشطية والمقربة الطويلة ويشرح ارتباطها بالاتباه وينظف امتداد الشريان الفخذي الغائر وراء المقربة الطويلة وتشاهد فروعه الاربعة الثاقبة نافذة من المقربة الكبيرة الا ان الفرع الرابع منها انما هو امتداد الشريان المذكور (صفحة ٢٤٢) ثم تقلب العضلة المشطية ويستقصى العصب الاضافي الساد الى اتصاله بالعصب الساد والعضلة المشطية والمفصل الوريكي. ويتبع الفرع المقدم للعصب الساد النازل الى مقدم المقربة القصيرة وعند قطع العضلة المشطية يشاهد فرعه الخلفي الناهب الى المقربة الكبيرة فيشاهد ان العصب المذكور يتوزع في جميع العضلات المقربة (صفحة ٤٧٢). ثم يستقصى الشريان المنعكف الانسي فيشاهد انه مقسوم الى فرعين احدهما يسير نحو الانسية الى مقدم العضلة السادة الظاهرة والمقربة القصيرة والاخر يتجه نحو الخلف لينتم بالشريان الوريكي ويرسل فرعاً للمفصل الوريكي فيدخله من شرم الحق الحرقفي (صفحة ٢٤٢). ثم تنظف السادة الظاهرة ويعرئ بين اليافها الفرع الانسي والفرع الوحشي للشريان الساد (صفحة ٢٢٤) ثم تنظف العضلة المقربة الكبيرة ويبحث عنها (صفحة ٢٥٢) وبعد ذلك ينظر الى المندغم المشترك بين العضلتين الصليبية والحرقفية (صفحة ٢٤٧) ثم يبحث عن التسعة الوحشية والتسعة الانسية والفخذية والعضلة تحت الفخذية التي تنتهي جميعها في الوتر المشترك (صفحة ٢٥١)

٤. المفصل الوريكي. - تراجع ارتباطات جميع العضلات التي تتعلق بالمفصل الوريكي ويقطع جميع ما بقي منها غير مقطوع ثم ينظف الرباط المحفظي وينظر الى رفته او نقصه من المؤخر والى الرباط الحرقفي الفخذي الذي يقويه من المقدم (صفحة ١٦٠) ثم ينظر الى وضع راس عظم الفخذ بالنسبة الى الحق الحرقفي باعتبار تغيير وضع الطرف السفلي والقدم. ثم تشق المحنظة وينظر الى الرباط الحقي والرباط المستعرض والرباط المستدير والسطحين المنفصلين والغشاء الزلالي. ثم يفصل الطرف السفلي من الجثة

٥. مؤخر الساق. - بعد فصل الطرف من الجذع وتنظيف الاجزاء المقطوعة وقطع ما كان طويلاً منها ليشرح التاميد بتشرح مؤخر الساق فيشق الجاد في الخط المتوسط الى العقب

التمع وهو الغد الفخذي المحيط بالشريان والوريد الفخذي بين. فيُنظر الى الاقسام الثلاثة التي ينقسم اليها الغد المذكور وتتضمن الشريان والوريد وغدة ليفاوية كلاً على حدته والغدة المذكورة تسد الفتحة الفخذية الواقعة بين الوريد الفخذي ورباط كبرنات التي يهبط منها الفتق الفخذي. وتدرس مجاورات هذه الاجزاء بكل تدقيق باعتبار اعمال الجراحية التي تتعلق باخناق الفتق الفخذي (صفحة ٦٦٠)


ثم يدام التشرح الى الاسفل على مقدم الفخذ على ما يري في الرسم (شكل ٢٦٤) وعند سلخ الجلد يشاهد الفرعان المتوسطان والفرعان الانسيان للعصب الفخذي المقدم وفرع من العصب الصافن الانسي ذاهباً الى جلد الركبة (٤٧٥) والوريد الصافن الانسي فتشرح ثم تنظف اللقافة العريضة الى مقدم الفخذ (صفحة ٦٥٥). ثم تعزل اللقافة وتطلب مواصلة العصب الجلد الانسي والشافن الانسي والساد في الجزء السفلي لانسي الفخذ (صفحة ٤٧٤). ثم ينظف مثلث سكاريا ويشرح الشريان والوريد الفخذيان في الخلاء المذكور وفي سيرهما الى الاسفل (صفحة ٣٤٠) ويشاهد ان الشريان الفخذي مغطى عند منتهاه اسفل منتصف الفخذ بانسباط وتري يجب بعض سيره قبل ان يثقب وتر العضلة المقربة العظيمة. ويقال للمسلك المذكور قناة هنتر واذ يسير الشريان الفخذي فيها مصحوباً بالعصب الصافن الطويل يرسل الفرع المنغم (صفحة ٣٤٤)

ثم يشرح الشريان الفخذي الغائر الى الحافة العليا للعضلة المقربة الطويلة ويظهر الشريان المنعكف الانسي الناشئ منه مع فروعه (صفحة ٣٤٢) وكثيراً ما ينشأ احد الشريانيين المنعكفين او اثناهما من الشريان الفخذي اعلى منشا الفخذي الغائر. ثم تُنظف العضلة الخياطية والرقبة والوجه الظاهر للمقربات وينظر الى مجاورات الاوتار السفلى للخياطية والرقبة والوترية النصف (صفحة ٣٤٤). وبعد ذلك يلتفت التلميذ الى الجزء الوحشي للفخذ بقرب الورك فيتزع اللقافة العريضة عن ما بقي من الالوية المتوسطة وعن الشادة لغد الفخذ الاقطة منها ممتدة الى وحشي الركبة ثم يكشف الرباطة الغائرة من اللقافة المذكورة التي تسير نحو الباطن الى المفصل الوريكي. ويشاهد بين الشادة لغد الفخذ والالوية المتوسطة الفرع الذي يتوزع في اولها الناشئ من العصب الالوي (صفحة ٤٧٧) ثم تقطع الشادة لغد الفخذ ويشرح ما بقي من الالوية المتوسطة والصغيرة الى ارتباطها السفلي بحيث يظهر الكيسان الخاطيان الواقعا بينهما وبين المدور الكبير ومجاورة الالوية الصغيرة لمخظة المفصل الوريكي (صفحة ٢٥٥) وبينما يكون مشتغلاً بذلك ليشرح الفروع الصاعدة والمستعرضة للشريان المنعكف الوحشي وينظر الى تفهمها بالشريان الالوي

والصغير (صفحة ٤٧٨) وفروع العصب الوريكي العظيم التي تتوزع في العضلات المذكورة والمقربة الكبيرة وسير الشريان الوريكي وفروعه (صفحة ٢٢٧) والفروع الثابتة الناشئة من الشريان الفخذي الغائر (صفحة ٢٤٢) والوجه الخلفي للعضلة المقربة العظيمة

٢. مقدم الفخذ. - يبدأ بتشرح مقدم الفخذ في اليوم الذي نلقى الجثة على الظهر. ولاجل

شكل ٢٦٤



كشف عضلات ولثائف هذه الجهة يشق الجلد بجانب رباط يويارت من الشوكة العليا الحرقفية الى العانة ويشق شق اخر عمودي في الخط المتوسط لمقدم الفخذ ممتد من مركز الشق السابق الى اسفل مفصل الركبة وشق ثالث عرضي اسفل سابقه ممتد من الجانب الانسي للساق الى جانبه الوحشي ثم يسلم الجلد الى الوحشية كما يرى في الرسم (شكل ٢٦٤). ان كان التلميذ متقدماً فليبدأ بتشرح هذه الجهة بعد مراجعة التشرح الجراحي للعنق الفخذي (صفحة ٦٥٤) ومثلت سكاريا (صفحة ٢٤٠). ثم تعرى اللقافة السطحية بعزل الدهن والاصوب ان يتوافق على ذلك مشرح الطرف السفلي مع مشرح البطن (صفحة ٢٤٨) فتشاهد شرايين واوردة صغيرة سطحية هي الشراسيفي السطحي والحرقفي المنعكف السطحي والاستحيائيان السطحيان العلوي والسفلي (صفحة ٢٤٢) ثم تعرى اللقافة العريضة واللقافة الغربالية التي تغطي الفتحة الصافية فيشاهد على سطح اللقافة العريضة الوريد الصافن الانسي وهو الطويل داخلاً الفتحة الصافية وكثيراً ما يكون منقسماً الى فرعين (صفحة ٢٧١) والى مقدم الشريان الفخذي الفرع الفخذي للعصب التناسلي الفخذي والى مقدم الشوكة الحرقفية المقدمة العليا العصب الجليدي الوحشي (صفحة ٤٧٢) ويشاهد فرع من العصب الحرقفي الاربي متوزعاً في جلد الفخذ بقرب العانة. وتوضع حافة الفتحة الصافية بعزل اللقافة الغربالية ويكشف ارتباط القرن العلوي وهو الزائدة المنجلية بالقسم العاني للفقافة العريضة (صفحة ٦٥٥)

ثم تفصل الزائدة المذكورة عن اللقافة العريضة وتقلب نحو الوحشية الى مسافة تمكن من اظهار


عضلية . ويشاهد على شوكة الوري الشريان والعصب الاستحيائيان وعصب العضلة السادة الباطنة (صفحة ٢٢٤ و ٤٧٧) والعصب الصغير الذي ينزل تحت وتر السادة الباطنة الى المربعة الفخذية

وبعد ذلك يقطع الارتباط العلوي للالوية الكبيرة فلا يبقى الا وتر اندغامها وترفع الالوية المتوسطة عن العظم الحرقفي الى ثلاثة ارباع مسافتها وتترك حافنها المقدمة والحافة المقدمة للالوية الكبيرة لاجل التشرح من المقدم . ثم ينظر الى ارتباطات الالوية المتوسطة وفرعي الشريان الالوي وهما العلوي والسفلي وتوزيع العصب الالوي (صفحة ٢٢٧ و ٤٧٧) ثم ترفع الالوية الصغيرة عن العظم الحرقفي لاجل اظهار مسافة ارتباطها به ومجاورتها لمحفظة المفصل الوري

٢. الخلاء المابضي . - يُستصوب تشرح هذا الخلاء قبل الجهة الخلفية للفخذ فيشق الجلد شقاً عمودياً نحو ثمانية قراريط على مؤخر مفصل الركبة ويشق ايضاً شقان عرضيان في الاعلى والاسفل متصلان بالشق الاول وممتدان من الجانب الانسي الى الجانب الوحشي ثم تُسلخ القطعتان الواقعتان بين الشقوق المذكورة الى الناحية المشار اليها في الرسم السابق . فاذا سُخِجَ الجلد والدهن السطحي ظهرت اللفافة العريضة وهي متينة في هذه الجهة وظهرت ايضاً في الجزء السفلي للخلاء الفروع الانتهائية للعصب الوري الصغير (صفحة ٤٧٨) والجزء العلوي للوريد الصافن التصير (صفحة ٢٧١) ثم تقطع اللفافة العريضة ويعزل الدهن بالانتباه من الخلاء وتنظف حدوده وتُستفصى الاعوية والاعصاب مع فروعها (صفحة ٢٤٤) ويشاهد العضلة ذات الراسين الى الوحشية والوترية النصف والغشائية النصف الى الانسية ورأسا التوأمية الساقية مع بطين الاخمصية الى الاسفل . ويشاهد في الخلاء العصبان المابضيان الانسي والوحشي مع فروعها المنصلية والعضلية (صفحة ٤٧٦ و ٤٨١) والشريان والوريد المابضيان موضوعين وضعاً غائراً ومضمينين في غمدٍ واحدٍ (صفحة ٢٤٤) . ثم تتبع فروع الشريان المابضي وهي العلوي والفرد والسفلي والفروع العضلية . ويشاهد على سطح الشريان المابضي عند نفوذه الى الخلاء فرع من العصب الساد (صفحة ٤٧٢)

وعند الانتهاء من تشرح الخلاء المابضي يشرع بتشرح مؤخر الفخذ فيشق شق عمودي على الخط المتوسط ممتد من الجهة الالوية الى الخلاء المابضي ويسلخ الجلد على ما بُرى في الرسم السابق مع اللفافة فتظهر عضلات هذه الجهة وهي ذات الراسين الى الوحشية والوترية النصف الى الانسية والغشائية النصف تحتها (صفحة ٢٥٨) وينظر الى سير العصبين الوريين الكبير

المخلف الفروع الجانبية للعصب الظهري الاخير والمحرفي الخثلي (صفحة ٤٦٩ و ٤٧١) وفروع من الاعصاب القطنية (صفحة ٤٧٠) وثقب الالوية الكبيرة عند ارتباطها الخلفي فريعات جلدية ناشئة من الفروع الخلفية للاعصاب العجزية العليا (صفحة ٤٧٦) ونعكف شكل ٢٦٢ حول حافتها السفلى فروع من العصب الوريكي الصغير (صفحة ٤٧٨).



ويُشاهد ان اللقافة العريضة كثيفة على الالوية المتوسطة الى مقدم الالوية الكبيرة وانها تنفصل عند الحافة العليا للالوية الكبيرة الى طبقتين فتمتد احداها على وجهها الظاهر والثانية على وجهها الباطن. ثم تنظف الحافة السفلى للالوية الكبيرة الى جميع طولها ويطلب الكيس المخاطي الموضوع على الحدبة الوريكية. ثم تقطع هذه العضلة بقرب ارتباطها المحرفي والعجزية وتقلب نحو المقدم فيظهر الشريان الوريكي والفرع العلوي للشريان الالوي ثم تتبع قليلاً فروع الشريانين المذكورين وفروع العصب الوريكي الصغير التي تدخل العضلة وتقطع لاجل تكميل قلب الالوية. وعند ذلك يشاهد كيس مخاطي كبير موضوع بين المدور الكبير ومدغم الالوية الكبيرة في اللقافة العريضة

ثم تُنزع اللقافة العريضة عن الجزء العلوي للعضلة الالوية المتوسطة وتنظف الاجزاء التي انكشفت بعد رفع الالوية الكبيرة على ترتيبها من الاعلى الى الاسفل وهي موخر الالوية المتوسطة والشريان الالوي (صفحة ٢٢٧) والعضلة الهرمية والشريان الوريكي والعصبان الوريكيان الكبير والصغير (صفحة ٤٧٨) والعضلتان التوأمتان العليا والسفلى اللتان يمر بينهما وتر السادة الباطنة (صفحة ٢٥٧) ثم يشرح الوتر المذكور ويقطع ويقلب الى الوراء لاجل اظهار التجويف الزلالي الذي يدور فيه على السطح الاملس

البكري للعظم الوريكي. ثم تُكشَف المربعة الفخذية وتر السادة الظاهرة والجزء العلوي للمقربة الكبيرة ومنشا عضلات موخر الفخذ فيشاهد ان العصب الوريكي الصغير يرسل الفروع الاستحيائية السفلى ما عدا الفروع التي سبق ذكرها وان الشريان الوريكي يرسل الفرع العصبي والفرع الذي يثقب العصب الوريكي وفرعاً يتغم بالشريان المنعكف الانسي وفروعاً

ايضاً اللجئات الآسية عند مدخله وعنق الرحم بارزاً فيه من الاعلى (صفحة ٦٢٥) ثم يشرح المبيض ورباطه وقناة فلوبيوس والرباط المستدير للرحم وينظر الى شكل الرحم الظاهر (صفحة ٦٢٦) ثم يبحث عن وضع فم الرحم الظاهر ومنظره ويشق الرحم من وجهه المقدم شقاً طولياً ينقسم في الاعلى الى شقين واصلين الى زاويتييه (صفحة ٦٢٧) فيشاهد حجم التجويف الرحمي المثلث الشكل وتجويف العنق وثنيات غشائه المخاطي والتم الباطن للرحم

١٠. الاربطة الحوضية. - عند نهاية التشرح السابق ينظر الى مفاصل الحوض ان كانت الجثة باقية تحتل التشرح المذكور (صفحة ١٤٤) فيبحث اولاً عن الغضروف الليفي عند الارتفاق العاني ثم عن اتصال الحوض بالفقرة القطنية الخامسة ولاسيما الرباط العجزي الفقري والرباط الحرقفي القطني. وينظف الرباطان العجزيان الوريكان الكبير والصغير والرباط الساد. ثم ينظر الى الرباطين المقدم والخلفي والغضروف المتوسط للمفصل العجزي العصصي. واخيراً يشرح الرباطان العجزيان الحرقفيان وهما الخلفي المتين والمقدم الرقيق ويحلل المفصل العجزي الحرقفي لاجل اظهار سطوحه الغضروفية

تشرح الطرفين السفليين

كل من الطرفين السفليين قسم من الاقسام العشرة شامل لجميع ما اسفل رباط پوپارت وعرف العظم الحرقفي ما علا العجان

١. الجهة الالوية. - يكمل تشرح الجهة الالوية وموخر الفخذ والخلاء المابضي بينما تكون الجثة ملفاة على البطن. توضع قرمة تحت الحوض بحيث تتوتر الاليتان ويدلى الطرفان علي طرف الطاولة مع ادارة القدم الى الانسية وتبعد الفخذ ثم يشق الجلد شقاً موازياً لموخر العرف الحرقفي والحافة الجانبية للعجز الى راس العصص ويشق شقاً ثانياً ممتداً من راس العصص بانحراف نحو الاسفل والوحشية الى الجانب الوحشي للفخذ اسفل المدور الكبير باربعة قراريط. ثم يسليخ الجلد الواقع بين الشقين المذكورين مع اللفافة السطحية الى الناحية المشار اليها في الرسم فتظهر العضلة الالوية الكبيرة واللفافة الكثيفة التي تغطي الالوية المتوسطة

ان كان التلميذ مبتدئاً ينظف الالوية الكبيرة تابعاً اتجاه اليافها (صفحة ٢٥٤). وان كان متقدماً ينظر الى الاعصاب الجلدية لهذه الجهة النازلة على العرف الحرقفي وهي من الامام الى

الاناث الرحي والمهبلية (صفحة ٢٢٢) والاصوب ان ينظر الى المجموع الاول في الجانب الذي لم يتشرح والى المجموع الثاني والثالث في الجانب الذي تشرح. ثم تكشف في الجانب الاول الاعصاب العجزية (صفحة ٤٧٥) ويبحث عن منشأ العضلة الهرمية فيشاهد اتحاد العصب القطني العجزى بالفروع المقدمة للاعصاب العجزية الثلاثة الاولى مع فرع من العجزى الرابع بحيث يتكوّن من ذلك الضفيرة العجزية (صفحة ٤٧٦) ويشاهد العصب الاووي ناشئاً من العصب القطني العجزى (صفحة ٤٧٧) والعصبان الوركبان الكبير والصغير والاستحيائي وعصب السادة الباطنة وفروع اخر عضلية ناشئة من الضفيرة العجزية (صفحة ٤٧٧) وما بقي من فروع العصب العجزى الرابع تذهب مع اعصاب الضفيرة الخنثية الى الاحشاء وبعد ذلك يطلب العصب العجزى الخامس والعصب العصعصي (صفحة ٤٧٦) ثم ينظف الوجه العلوي للعضلة العصعصية والرافعة للاست فيشاهد انه تتكون منها ارض التجويف الحوضي (صفحة ٦٦٩) ثم تشرح العقد السيمبانونية الموضوعة الى مقدم العجز وان امكن تتبع السلسلتان الى نقطة اتحادهما الى مقدم العصعص (صفحة ٤٩١)

٩. الاحشاء الحوضية. - يبحث عن الجدران العضلية للمثانة وهي منقوخة قبل اخراجها

من الحوض (صفحة ٦١٢) ثم تفصل الاحشاء عن ارتباطاتها بجدران الحوض وتخرج بجهتها ثم يشرح المستقيم بالانتباه عن بقية الاحشاء وينظر الى اتصالاتها بها (صفحة ٥٥٩) وبعد النظر الكافي الى طبقاته العضلية يشرط ويغسل ويتامل بغشائه المخاطي وثنياته. ثم ان كانت الجثة لذكر تشرح بالانتباه البروستتا مع النظر الى محفظتها الليفية والحويصلتان المنويتان والقناتان الناقتان (صفحة ٦٢٠ و٦٢١) ثم تشرط المثانة من المقدم غير ان العنق يترك سليماً في اول الامر ويبحث عن فتحتي الحالبين وفتحة المجرى والمثلث الذي بينهما (صفحة ٦١٦) ثم يشرط من الاعلى القسم البروستتي والقسم الغشائي والقسم البصلي للمجرى وينظر الى اختلاف قطر الاقسام المذكورة والى العرف الجبلي والجبب الكاسي الذي نصب فيه القناتان الناقتان (صفحة ٦١٧) ويطلب اتحاد القناة الناقلة بالقناة الحويصلية لتتكوّن منها القناة الفاذفة وتقطع البروستتا قطعاً طويلاً لاجل اظهار سماكتها وبنائها وينظر على الخصوص الى مجاورة قاعدتها لعنق المثانة والصفيرة الوريدية الواقعة في الزاوية التي بينها

واما في الانثى فتشرط المثانة ويبحث عنها كما في الذكر وينظر الى طول المجرى وقطره (صفحة ٦٢٥) ثم يشق المهبل من المقدم الى جانب الخط المتوسط فتظهر ثنيات غشائه المخاطي وتُشاهد

للاست والمستعرضة واللفافة السادة (صفحة ٦٦٧). ويعزل الدهن من الجزء المتقدم وتشرح ساقا البظر والعضلتان الناصبتان المعانقتان لها وبصلتنا الدهليز (صفحة ٦٣٤) وتطلب غدنا برثولين عند مؤخر الطرف السفلي للمهبل وتتبع قناتها الى مصبها بجانب غشاء البكارة او اللحيمات الآسية. ويشاهد الى الانسية من ساق البظر الرباط المثلث وهو اللفافة تحت العانة ممتداً من القوس العاني الى المهبل (صفحة ٦٣٤ و٦٦٨)

ثم تنفخ المثانة نفخاً معتدلاً ويبحث عن انعكاسات البريتون في التجويف الحوضي ولا سيما الاربطة الكاذبة للمثانة وفي الاناث الرباط العريض للرحم والمبيض وقناة فلوبيوس والرباط المستدير (صفحة ٦١٥ و٦٢٩) ثم يعكس البريتون عن جدران الحوض لاجل اظهار الاربطة الصحيحة للمثانة والوجه الباطن للفائف الحوض (صفحة ٦١٥) غير انه لاجل الوقوف التام على الفائف المذكورة ينبغي نشر جزء من العظم اللا اسم له فينظر اولاً الى شكل العظم المذكور ثم يقطع بالمشار من شفة الحوض الى الاسفل بحيث يقطع معظم سكاكة الحدة الوركية بقرب الشرمين العجزيين الوركيين من غير ان يصل القطع اليهما وعلى ذلك ينفصل المتصل الوركي سليماً وينظر اليه والى اربطته ولا سيما الرباط المستدير (صفحة ١٦٠)

ثم يعاد الى الحوض وتوسع الفتحة التي في جداره الجانبي ان لزم بالمقراض العظمي وتخرج العضلة السادة الباطنة وينظر الى وترها (صفحة ٢٥٦) ويشاهد الى الوجه الباطن للعضلة المذكورة من الاعلى اللفافة الحوضية ومن الاسفل اللفافة السادة وما بينهما رباطة بيضاء ممتدة من الارتفاق العاني الى الشوكة الوركية تدل على الخط الذي عنده تنفصل اللفافة الحوضية الى اللفافة المستقيمة المثانية واللفافة السادة ويشاهد في اعلى الثقب الساد الشريان والعصب السادان نافذين من الباطن الى الظاهر. وعند ذلك اذا نظفت جيداً الحفرة الوركية المستقيمة تشاهد طبقتا اللفافة ومجاورتها للعضلة الرافعة للاست (صفحة ٦٦٨). ثم تنشر شفة الحوض بقرب الارتفاق العاني على الجانب الذي حصل فيه التشریح وتترع وان كانت الخثة لذكر ظهرت مجاورة اللفافة الى البروستتا. ويتبع الحابلان والفناتان الناقتان الى المثانة واعصاب اصفيرة الخلفية الى توزيعها في الاحشاء الحوضية (صفحة ٤٩١) وتشرح فروع الشريان والوريد المحرقين الباطنين. فيشاهد ان الشريان المحرقني الباطن يرسل فروعاً الى جدران الحوض والاجزاء الظاهرة وهي الالوي والمحرقني القطني والعجزبان الجانبيان وهي فروع جذعه الخلفي واما الجذع المقدم فيرسل الى الاجزاء السابقة الساد والاستحيائي الباطن والوركي والى الاحشاء المثاني العلوي الذي ينشأ منه المثاني المتوسط والمثاني السفلي الذي ينشأ منه الباسوري المتوسط وفي

٧. الجدار العلوي والموخر للبطن. - بعد التشرح السابق يشرح الحجاب (صفحة ٢٢١) فيشاهد انه مرتبط من المقدم بالاَضلاع الست السفلى بواسطة زوائد داخلية بين زوائد العضلة المستعرضة ومن الخلف تشاهد ساقاه والرباطان القوسيان الانسي والوحشي . وتبع الالياف الناشئة من الاجزاء المذكورة الى الوتر المركزي وينظر الى فتحاته الثلاث التي يمر منها الاورطي والمرى والاجوف السفلي . ثم ينظف سطح العضلة الصليبية الكبيرة وتطلب الصليبية الصغيرة المستقرة عليها ان وجدت (صفحة ٢٤٨) ويشاهد العصب التناسلي الفخذي نافذاً من اليافها فيتبع الى الاسفل وتشاهد اعصاب الضفيرة القطنية نافذة من حافتيها الانسية والوحشية (صفحة ٤٧٠) . وتفصل الياف الصليبية عن اعصاب الضفيرة القطنية فيشاهد ما عدا الفروع الاستطراقية العصب الحرقفي الخنثي والحرقفي الاربي ناشئين من العصب القطني الاول (وكثيراً ما يكونان متحدين) والجلدي الوحشي والتناسلي الفخذي من العصب القطني الثاني والفخذي المقدم والساد من العصب القطني الثاني والثالث والرابع والعصب القطني العجزي مؤلفاً من بعض العصب الرابع وجميع الخامس (صفحة ٤٧١) . ويشاهد على اجسام الفقرات القسم القطني المعصب السمباتوي فتشرح فروع الاستطراقية الى الاعصاب الشوكية (صفحة ٤٩٠)

وعند ذلك يعود المشرحان الى موخر العضلة المستعرضة فيشاهد ان قسمها المذكور يصير صفاقاً متصلاً من الخلف بثلاث طبقات الخلفية منها هي اللفافة القطنية التي شوهدت في تشرح الظهر والثانية موضوعة الى مقدم العضلة الناصبة الشوكية والمقدمة غشاء ارق منها جداً موضوعة الى مقدم العضلة المربعة القطنية . ثم تشرح العضلة المربعة القطنية والعضلة الحرقفية (صفحة ٢١٨ و٢٤٨) وعند اخراج العضلة الحرقفية من الحفرة الحرقفية يستصى توزيع الشريان الحرقفي القطني وتظهر تفماته بالشريان القطني الاخير والحرقفي المنعكف (صفحة ٢٢٨)

٨. تشرح الحوض. - بعد التشرح السابق يُفصل الحوض مع بعض الفقرات القطنية عن بقية الجذع وينظف جيداً الوجه الظاهر للعظام من الكتل العضلية والاجزاء الرخوة التي سبق تشرحها

اعضاء الانثى التناسلية. - ان كانت الجثة لاثني يبدأ بتشرح العجان وتطلب اولاً فتحة المجرى وينظر بالتدقيق الى وضعها ويتفحص ادخال القشاطر الاثوي منها الى باطن المثانة (صفحة ٦٢٢) ثم يخرج الدهن من الحفرة الوركية المستقيمة وينظر الى الاوعية الباسورية السفلى والعجانة السطحية (صفحة ٦٦٢ و٦٦٦) وتشاهد العضلة العاصرة للمستقيم والعاصرة للمهبل والرافعة

الوريد السري وخلفي تستقر فيه بقايا القناة الوريدية وفرجة الحوصلة المرارية وفرجة الاجوف (صفحة ٥٦٥). وينظر ايضاً الى فتحات الاوردة الكبدية التي تصب في الاجوف وهو غائص في الحافة الخلفية للكبد وتبع تفاريع الشريان الكبدي والوريد الباني والقناة الكبدية بقدر الامكان الى جوهر الكبد والتفاريع المذكورة مغلقة باغداد من محفظة كليسون. ثم يقطع الكبد وينظر الى بناء جوهره وتشرط الحوصلة المرارية وتغسل وينظر الى طبقاتها وغشائها المخاطي

٦. القسم الموخر الغائر للتجويف البطني. - ثم يعود المشرحان الى الاجزاء الباقية في البطن ويشرعان في استقصاء صفائر الاعصاب السمباتوية فتتبع الضفيرة المساريقية العليا والسفلى نحو الاعلى الى الضفيرة الشمسية وتتبع الاعصاب النازلة من الضفيرة الاورطية الى الضفيرة الختلية. وت شاهد الضفيرة الشمسية محيطة بالاورطي عند جذر المحور البطني وكذلك عقدناها الهلاليتان واحدة الى كل جانب منها والاعصاب المحشوية نافذة من ساقى الحجاب ومنتهية في الضفيرة المذكورة (صفحة ٤١٩) ثم تتبع الصفائر التي تنشأ من الضفيرة الشمسية وتحيط بالشرايين المجاورة لها وهي المحور البطني المنتسم الى الكبدي والطحالي والمعدي والشريانات اعلى الكلية والكليويان والمنويان. ثم تنظف المحفظتان اعلى الكلية وتقطعان وينظر الى بناءهما (صفحة ٦١١)

ثم يشرح الاورطي والوريد الاجوف السفلي والوعية الحرقفية الاصلية والظاهرة والكليتان والحالبان. فيبدأ بفروع الاورطي وهي الحجابيان والمحور البطني والمساريقي العلوي والشريانات اعلى الكلية والكليويان والمنويان والمساريقي السفلي ومنشا الشرايين القطنية الاربعة والشريان العجزي المتوسط الناشئ من الاورطي عند انقسامه الى الحرقفيين الاصليين. ثم ينظف الشريانات والوريدان الحرقفيان الاصيليان الى منشا الشريان الشراسيفي والحرقفي المنعكف الى كل من الجانبيين وينظر الى مجاورة الشرايين والاوردة الحرقفية (صفحة ٢٢٢ و٢٧٢ و٢٢٢) ثم يبحث عن وضع الكليتين ومجاورتها وعلى الخصوص وضع الشريان والوريد الكليويين والحالب عند دخولها الكلية (صفحة ٦٠٧) ثم تخرج الكليتان من الجثة وتقطعان قطعاً عمودياً لاجل اظهار المحوض والكؤوس والاهرام والجوهر القشري والجوهر الليي واجسام ملبسيوس وينظر ايضاً الى الغلاف الليفي المحيط بالكلية. واما الحاصل الكيلوسي وهو بداية القناة الصدرية فيشاهد تحت الساق اليمنى للحجاب (صفحة ٢٨١) وكذلك منشا الوريد الفرد من بعض الاوردة القطنية (صفحة ٢٦٩)

باعتبار توزيع الحمل والصامات الكاذبة (صفحة ٥٥٤) ويقع يابر (صفحة ٥٥٦). ثم يقطع المعاء الغليظ اعلى صمام الاعور ببعض قراريط ويشرط وينظر الى غشائه الخاطي. ثم يغسل الاعور غسلًا جيدًا وينظر الى بناء صمام الاعور وعمله (صفحة ٥٥٨) باملاء قطعة القولون ماء فيشاهد ان الماء لا يخرج من اللفائفي ولو كان غير مربوط لسبب انسداد الصمام. ثم يشرط الاعور مقابل الصمام وتشرط ايضا الزائدة الدودية لاجل اظهار بنائها الغدي

٥. المعدة والاثنا عشري والبنكرياس والطحال والكبد. — يُفخ الاثنا عشري والمعدة نفخًا معتدلاً وتشرح الشرايين الناشئة من المحور البطني (صفحة ٢٢٢) وليبدأ بتشرح الشريان الطحالي ويتبع سيره الى الطحال وينظر الى فروعه للبنكرياس وفروعه المعدة اي الاوعية القصيرة والشريان المعدي الثري الايسر. ثم يتبع الشريان المعدي بجانب القوس الصغير للمعدة واذا تبع الشريان الكبدي الى قسميه اليمين واليسر شوهد الفرع البوابي متفهماً بالمعدي والحوصلي ذاهباً الى الحوصلة المرارية والمعدي الاثني عشري منتسماً الى المعدي الثري اليمين الذي يتفم بالمعدي الثري الايسر والبنكرياسي الاثني عشري العلوي الذي يتفم بالبنكرياسي الاثني عشري السفلي الناشئ من الشريان المساريقي العلوي

ويستقصى الوريد المساريقي السفلي وراء البنكرياس الى الوريد الطحالي الذي يسير عرضاً الى ان يتحد بالوريد المساريقي العلوي فيتكوّن منها جذع الوريد البابي (صفحة ٢٧٦) وينظر الى وضع القناة الصفراوية المشتركة بالنسبة الى الشريان الكبدي والوريد البابي وتستقصى القناة المذكورة الى القناة الكبدية والقناة المرارية والى الاسفل الى الاثني عشري (صفحة ٥٧١). ثم يبحث عن مجاورة البنكرياس وبنائه وتستقصى القناة البنكرياسية من وجهها الخلفي الى مصبها في الاثني عشري مع القناة الصفراوية المشتركة (صفحة ٥٧٢). ثم يخرج الطحال من التجويف البطني وتشرح اوचितه الدموية ويقطع وتفسل بعض مادته اللبية لاجل اظهار بنائه (صفحة ٥٧٢). ثم ترفع المعدة مع الاثني عشري ويبحث عن بنائها بحثاً مدققاً وينظر على الخصوص الى شكل المعدة وطبقات اياها العضلية الثلاث وبناء الصمام البوابي (صفحة ٥٤٩)

وبعد ذلك ينظر الى الكبد فيبحث اولاً عن اربطته وهي الطولي والمستدير والاكليبي والجانبين (صفحة ٥٦٤). ثم يقطع الاجوف السفلي اعلى الكبد واسفله ويخرج الكبد من البطن وينظر الى فصوصه وهي اليمين واليسر والمربع وفص سيجيلوس والفص الذني ثم الى فرجاته وهي المستعرضة والبوابية والظولية او الامامية الخلفية المتسومة الى قسمين مقدم تستقر فيه بقايا

ارتباط المساريقا بجدار البطن. ثم ينظر الى وضع ثقب ونسلو والترب الكبير ولاجل اظهار باطن كيس الترب المذكور يُشق شقاً مستعرضاً اسفل قوس الاوعية الموضوعه بجانب الحافة السفلي للعدة فينكشف الوجه الخلفي للعدة والوجه المقدم للبنكرياس. وبعد ذلك يستقصى بالسهولة الترب الصغير وهو المعدي الكبدي والترب المعدي الطحالي ورباط القولون ومجاورات الاثني عشري للبريتون

وبعد الانتهاء من البحث عن البريتون يُنمض القولون المستعرض نحو الاعلى وتقلب الامعا الدقيقة الى الجانب الايسر بحيث ينكشف جميع التسم العلوي وهو الايمن للمساريقا ثم يُظهر بالتشرح توزيع الشريان المساريقي العلوي من الحافة السفلي للبنكرياس الى الاسفل مع الوريد والضفيرة العصبية التي ترافقه (صفحة ٢٢٦ و ٢٧٥) فيشاهد ان الشريان المذكور يرسل من جانبه الايمن الفرع القولوني المتوسط والقولوني الايمن والفائقي القولوني ومن جانبه الايسر نحو اثني عشر فرعاً الى المعاء الدقيق مكونة اقواساً تهمية اولى وثانية وثالثة. ثم يتبع المشرح الفرع الايسر من فرعي الشريان القولوني المتوسط فيتوصل الى القولوني الايسر ومنه الى جذع الشريان المساريقي السفلي الموضوع الى يسار المساريقا مع وريده واعصابه المرافقة فتقلب الامعا الى الجانب الايمن لاجل النظر الى ما ذكر. وما عدا الفرع القولوني الايسر يشاهد الفرع السيني من الشريان المساريقي السفلي والتسم العلوي من الفرع الباسوري العلوي قبل هبوطه الى الحوض على الرباط المستقي (صفحة ٢٢٩)

ثم يربط المعاء اسفل منتهى الاثني عشري قليلاً برباطين بعد احدها عن الاخر نحو قيراط ونصف ويقطع بين الرباطين وكذلك يربط ويقطع المعاء الغليظ عند الطرف السفلي للتعريح السيني. ثم يخرج جميع المعاء الواقع بين الرباطين العلوي والسفلي من التجويف البطني فيبدأ من الاعلى بجذب الطرف مربوط نحو الاعلى باليد اليسرى وقطع حافة المساريقا بالمشرب بقرب المعاء باليد اليمنى. وعلى الكيفية المذكورة يخرج جميع المعاء الدقيق بالسهولة وتبقى المساريقا في البطن ثم يخرج المعاء الغليظ الى الطرف المقطوع عند اعلى المستقيم. ثم يوخذ الى الحوض ويغسل غسلاً جيداً بادخال الماء فيه من طرفه الصائفي وبعد ذلك يمد على الطاولة وينفخ لكي يظهر الطول والقطر النسبيان لكل من اقسامه وترتيب حزم القولون العضلية (صفحة ٥٥٧ و ٥٦٠). ثم يفصل المعاء الدقيق عن الغليظ اعلى الاعور بجهاة قراريط وتفصل قطعة من قسمه العلوي وتنفخ وتجفف لاجل اظهار الصامات الكاذبة. واما ما بقي من المعاء فيشرط على جميع طولها بالمقص بعد وضع قطعة فلين في راس احدي نصليتيه ويتأمل بالخشاء المخاطي في اقسام المعاء ولا سيما

تحت البريتون عن خط اتصال اللفافة المستعرضة واللفافة المحرفية يشاهد القوس الفخذي الغائر والحلقة الفخذية والحاجز الفخذي (صفحة ٦٥٨) فيجب التأمل بها جيداً باعتبار نسبتها الى الفتق الفخذي (صفحة ٦٦٠). ثم يشرط غمد العضلة المستقيمة البطنية فتشرح العضلة المذكورة والعضلة الهرمية (صفحة ٢١٨) ويتبع الشريان الشراسيفي في جوهه المستقيمة من الاسفل والفرع الشراسيفي من الثديي الباطن من الاعلى ويتامل بنقص الغمد في موخر الربع السفلي للعضلة المستقيمة

٢. اعضاء التناسل في الذكور. - ان كانت الجثة لذكر يشرع الان في تشرح التضييب. فاذا سلخ الجلد ظهر الشريانان والعصبان الظهران والوريد الظهرى والرباط المعلق (صفحة ٢٢٦ و٢٧٢ و٦٢١) ثم يشرح الجسمان الاجوفان والجسم الاسفنجي والحشفة وتفصل الحشفة بالانتباه عن الجسمين الاجوفين (صفحة ٦٢٢) ثم يقطع ما تدلى من التضييب قطعاً عرضياً ويتامل بالقطع المذكور ويشرط المجرى

ثم تشرح الحصينان والحبل المنوي فتشرط اللفافة المعلقة ويطلب الفرع المعالي للشريان الشراسيفي والفرع التناسلي للعصب التناسلي الفخذي (صفحة ٦٢٢) ثم تنزع اللفافة الخاصة ويبحث عن الاجزاء التي يتالف منها الحبل وهي القناة الناقلة والشريان المنوي والاوردة والاعصاب المنوية. ثم تخرج الحصىة وتفتح الطبقة الغدية ويتامل بالقناة الناقلة والبرنج (صفحة ٦٢٦) ثم ينهض راس البرنج ويشرح البرنج ثم تقطع الطبقة البيضاء ويكشف وضع القنيات المنوية تحت الماء ويظهر المنصف الخصوي

٤. التجويف البطني: البريتون والمعادق والقولون. - يُفتح التجويف البطني بواسطة شقين احدهما عمودي والاخر مستعرض يتقاطعان الى يسار السرة غير ان الشق العمودي لا يتجاوز السرة في اول الامر بل يتوقف هناك لاجل النظر الى الاوراكس وبقايا الشريانين الشريين. ثم ينظف جيداً التجويف البريتوني ولا سيما التسم الحوضي بالاسفنجية بحيث لا يبقى سائل وتوضع قطعة من القطن مغموسة بالالكول في الحفرة المستقيمة الثانية. واعلم ان استعمال الاحترازات المذكورة ضروري لتشرح ما يتاخر من اجزاء هذا القسم

وبعد ذلك يبيث اولاً عن وضع الاحشاء العام ثم وضع ومجاورات المعدة والطحال والكبد والاثنى عشري والصائم واللفائفي والاعور واقسام القولون والمستقيم والكليتين (صفحة ٥٤٢). ثم يبحث عن ثنيات البريتون (صفحة ٥٤٥) ويتبع طولاً وعرضاً في التجويف البطني ويكشف

السطحيين والشريان والوريد المنعكفين المحرقفين السطحيين والى امتداد الطبقة الباطنة للفاقة السطحية اعلى الجبل المنوي في الذكور والرباط المستدير في الاناث الى الصفن والشفرين (صفحة ٢٤٢ و ٦٤٦) ويبحث بالتدقيق عن الحلقة البطنية الظاهرة وقائمتها والفاقة بين الفائتين ونفوذ الجبل المنوي في الذكور والرباط المستدير في الاناث (صفحة ٦٤٦) وينظر الى الفروع الانتهاية للعصيين الحرقفي الاري والحرقفي الخنلي (صفحة ٤٧١)


ثم يسلخ الجلد مع الطبقة الدهنية التي اسفله من الجزء العلوي للبطن وانما يبقى من الفاقة السطحية ما يكفي لوقاية الاعصاب الجلدية فيشاهد انها مصنوفة صفين احدها موضوع بقرب الخط المتوسط ومؤلف من الفروع المقدمة للاعصاب بين الاضلاع السفلى والثاني نافذ من جانب البطن ومؤلف من الفروع الجانبية للاعصاب المذكورة (صفحة ٤٦٩). ثم تشرح العضلة المنخرقة الظاهرة وتكشف ان امكن حافتها الخلفية (صفحة ٢١٤) وبعد ذلك يقطع صفاقها بواسطة شق مستعرض ممتد من الشوكة الحرقفية المقدمة العليا الى الانسية واما الجزء السفلي من الصفاق المذكور فيتترك كما هو لاجل البحث عنه بعد ذلك. ثم يشرع في فصل ارتباطات العضلة المذكورة اولاً عن عرف الحرقفي ثم عن الاضلاع الثانية السفلى الواحد بعد الاخر وتقلب العضلة نحو الخط المتوسط ما امكن. ثم ينظر الى العضلة المنخرقة الباطنة وتقلب كسابقتها وكذلك العضلة المستعرضة (صفحة ٢١٦)

وبعد التشرح السابق يبحث عن الاجزاء الغائرة التي تتعلق بهبوط الفتق الاري. فيقطع صفاق المنخرقة الظاهرة عند ارتباطه الانسي من الاعلى الى الاسفل حتى الارتفاق العاني وينظر الى الحافة السفلى للمنخرقة الباطنة وان كانت الجثة لذكر تستقصى الياف العضلة المعلقة الممتدة من العضلة المذكورة الى الاسفل حتى الخضبة. ثم يقطع الجزء السفلي للمنخرقة الباطنة والمستعرضة الواحدة بعد الاخرى من رباط پوپارت ويظهر وترها المشترك. ثم تكشف الفاقة المستعرضة والحلقة البطنية الباطنة ويشاهد وراءها الدهن الذي تحت البريتون (صفحة ٦٥٠). وليتأمل على الخصوص بالانبة التي تجاور الجبل المنوي وهو سائر من الحلقة الباطنة الى الحلقة الظاهرة والتي تتكون منها جدران القناة الارية (صفحة ٦٥٠) ثم تنهض الفاقة المستعرضة ويتأمل بالفاقة القمعية والشريان المنعكف الحرقفي والشريان الشراسيفي (صفحة ٦٥١) وينظر الى مجاورة الشريان الشراسيفي للفتق الاري المستقيم والمنخرق والى الاعطية التي تغلف هذين النوعين من الفتق مدة هبوطها (صفحة ٦٥١)

ثم يبحث عن رباط پوپارت ورباط كهبرنات من الوجه الباطن واذا فصل الدهن الذي

من العصب الوركي الصغير فتستقصى الى الخلف (صفحة ٤٧٧ و ٤٧٨) ويشرح الشريانان العجانين السطحي والمستعرض (صفحة ٢٣٥) ثم تنظف العضلات التي تستقر عليها الابنية المذكورة وهي المعجلة للبول المعانقة للمجرى والناصبة للفضيب المستقرة على ساقه والعجانية المستعرضة (صفحة ٦٦٥). ويشاهد في الخلاء بين هذه العضلات واسفلها الرباط المثلث فيبحث عن مجاوراته ولا سيما للمجرى (صفحة ٦٦٨) ثم يقطع بقرب العظم فيشاهد على وجهه الباطن العاصرة للمجرى وشريان البصلة وبعد تشریحهما تطلب غدنا كوير في الخط المتوسط تحت العضلة العجانية المستعرضة (صفحة ٦٦١). واما في الجانب الايسر فيستقصى الشريان والعصب الاستحيائيان وينظر الى فرعي الشريان الذاهيين الى البصلة والجسم الاجوف (صفحة ٤٧٧ و ٢٣٥). واخيراً تُنظف العاصرة للاست من المعجلة للبول عند النقطة المركزية للعجان (صفحة ٦٦٣) فيظهر الوجه السفلي للبروستنا. وفي تشرح العجان يجب ان يكون النظر موجهاً دائماً الى تعلق الاجزاء بالعمل الجراحي لاستخراج الحصاة (صفحة ٦٧١) ثم تخرج احدى الخصيتين لاجل تشرحها وهي حديثة العهد

شكل ٢٦٢




٢. مقدم الجدار البطني - يبدأ بتشرح الجدران البطنية

في اليوم الذي تلقي فيه الجثة على الظهر مع النظر الدقيق الى لفائف الجهة الاربعة في العجانين حتى رباط پوپارت. ويقضي للتشرح المذكور الموافقة ان امكن مع التاميد الذي يشرح الطرف السفلي. - يشق شق عمودي من الغضروف المخجري الى العانة منحرف قليلاً عن السرة وشق ثانٍ من السرة منحرف نحو الاعلى والوحشية الى الحافة السفلى للضلع الخامس او السادس وشق ثالث ممتد عرضاً من نقطة متوسطة بين السرة والعانة الى الشوكة المقدمة العليا الحرقفية ثم على العرف الحرقفي الى ثلثه الخلفي. ثم يسلخ الجلد على ما برى في الرسم من الانسية الى الوحشية تبعاً لاتجاه الالياف العضلية. وقد يلزم توتير العضلات البطنية بنفخ التجويف البريتوني من السرة. بعد سلخ الجلد تسلخ الطبقة الدهنية واللفافة السطحية كما سلخ الجلد

وينظر الى ارتباط طبقتها الظاهرة برباط پوپارت والى سير الشريان والوريد الشراسيفيين

عرضي للاول ممد من الحدة الوركية الواحدة الى الاخرى الى مقدم الاست . ثم يسليح الجلد
شكل ٢٦١



بالاتباه على ما يرى في الرسم فتظهر العاصرة الظاهرة للاست (صفحة ٦٦٢) وتنظف الحفرة
الوركية المستقيمة اليسرى من الدهن تنظيفاً جيداً الا انه يحذر من اذى انعكاس اللفافة التي
تحدها من المقدم على خط مواز للنتطة المركزية للعجان ثم تدرس جدران الحفرة (صفحة ٦٦٢).
واما في الجانب الايمن فيتترك من الدهن في الحفرة الوركية المستقيمة ما يكفي لوقاية الرافعة للاست
واللفافة السادة وتشرح الاوعية الباسورية السفلى والعصب الباسوري السفلي نحو حافة العضلة
العاصرة (صفحة ٢٣٥ و ٤٧٧) ويشاهد الفرع الباسوري من العصب العجزي الرابع نافذاً الى
الظاهر بين الرافعة للاست والعصمية (صفحة ٤٧٦). ثم يشرح جلد العجان على ما يرى في
الرسم وقد تقدم الكلام عليه مفصلاً (صفحة ٦٦٤) الا انه يحرص على فصل طبقتي اللفافة السطحية
فان الظاهرة منها عبارة عن النسيج الدهني الذي تحت الجلد وممتدة على الحفرة الوركية المستقيمة واما
الباطنة فتنتهي في الورا بان تغوص غوصاً غائراً الى مقدم الحفرة المذكورة وتحد باللفافة الغائرة
(صفحة ٦٦٤). ثم تنزع الطبقة الظاهرة وتدخل انبوبة النخ تحت الطبقة الباطنة في النصف المقدم
للعجان فاذا نُفخ النسيج الموصل الذي تحنها ظهرت حدودها الوحشية والفاصل الذي يمتد منها
في الخط المتوسط وامتدادها الى المقدم . ثم تشرط فيشاهد انها مرتبطة بالقوس العاني من
الوحشية ومختلطة بالصفن من المقدم ومنعكسة الى الرباط الثالث من الخلف وممتدة به (صفحة
٦٦٥) ويشاهد تحنها الفرعان العجائمان السطحيان من العصب الاستحيائي والفرع الاستحيائي

٥. الاجزاء الموضوعة في المنصف الخلفي. - يعود المشرحان الى التجويف الصدري وبخصان المريء (صفحة ٥٤٢) والاورطي النازل مع فروعه بين الاضلاع (صفحة ٢٢٠) والوريد بين الفردين (صفحة ٢٦٩) والقناة الصدرية الواقعة بين الوريد الاكبر والاورطي (صفحة ٢٨١) ثم يتوافقان مع المشرحين للراس والعنق لاجل استقصاء القناة الصدرية الى مصبها في زاوية اتحاد الوداجي الباطن بالوريد تحت الترقوة ويتوافقان مع المشرحين للبطن لاجل استقصائها الى بدائنها اسفل ساق الحجاب. ثم يتبع العصب السيمباتوي وسلسلة عقده على رؤوس الاضلاع والعمود الفقري وتطلب اتصالاته بالاعصاب بين الاضلاع وتشرح الاعصاب الحشوية الناشئة منه (صفحة ٤١٨)

ثم ينظف الوجه العلوي للحجاب بالسكين ويتوافق المشرحون للصدر والبطن على درس هذه العضلة فينظرون الى اجزائها العضلية والوترية وفتحاتها التي يمر منها الاورطي والمريء والاجوف السفلي والى الاعصاب والاعوية الدموية التي تنوزع في جوفها

٦. المفاصل. - بعد الانتهاء من تشرح التجويف الصدري ينظران امكن الى مفاصل العمود الفقري والاضلاع (صفحة ١٤٠) وعلى الخصوص الى الرباطين المشتركين المقدم والخلفي والغضاريف المتوسطة بين اجسام الفقرات والاربطة الصفراء بين الاقواس وشكل التواتر المفصلي وحركتها والاربطة الضلعية الفقرية والضلعية المستعرضة وغيرها. ويبحث بالانتباه عن حركة الاضلاع وتأثير حركات العمود الفقري بها

تشرح البطن والحوض

كل من جانبي هاتين الجهتين قسم فيها قسمان يشملان العجان واعضاء التناسل والمجدران البطنية والاحشاء البطنية والحوضية والاجزاء الغائرة للبطن والحوض والوجه السفلي للحجاب الحاجز

١. العجان. - ان كانت الجثة جثة ذكر يعين اليوم الاول لتشرح العجان فيدخل مجس الى باطن المثانة وتربط اليدين بالرجلين وتوضع الجثة كوضعها لعل استخراج الحصىة بقرب حافة الطاولة وتوضع قرمة تحت الحوض ويربط الصفن بقبضة المجس. ثم يشق الجلد في الخط المتوسط من مؤخر الصفن الى الاست ويدام الشق حول حافة الاست الى العصعص ويشق شق اخر

بالتدقيق (صفحة ٥٧٦) ثم ينزع وترفع بقاياها عن اجناع الاوعية الداخلة والخارجة من القلب. ثم يدرس جيداً قوس الاورطي ويظهر حبل القناة الشريانية الممتد بين بداية الشريان الرئوي والقوس المذكور (صفحة ٢٧٦ و ٥٨١). وبعد ذلك ينظر الى الشكل الظاهر للقلب (صفحة ٥٧٧) ويشرح الشريانان الاكليليان الايمن والايسر والجيب الاكليلي (صفحة ٢٧٨ و ٢٧٧). ثم تشق الاذنين اليمنى من مدخل الاجوف العلوي الى قرب مدخل الاجوف السفلي ويشق شق اخر من الزائدة الاذينية الى منتصف الشق الاول ثم يمسح او يغسل الجانب الايمن للقلب من الدم وينظر الى باطن الاذنين فتشاهد العضلات المشطية والحلقة البيضية وصمام اوستاكيوس الحافظ للاجوف السفلي وفتحة الوريد الاكليلي التي يحفظها صمام ثيبسيوس وثقوب ثيبسيوس (صفحة ٥٧٩). وعند الانتهاء من فحص الاذنين اليمنى تدخل سبابة اليد اليسرى من الفتحة الاذينية البطنية ويفتح البطن الايمن بواسطة شقين احدهما بجانب المحافة المقدمة بقرب الفاصل القلبي نحو الاعلى الى بداية الشريان الرئوي والاخر ممتد من الاول بجانب المحافة العليا للبطين اسفل الميزاب الاذيني البطنية من غير ان تؤذي القطعة المقدمة للصمام الثلاثي الرووس. واما الاجزاء الرئيسة التي تشاهد في هذا البطن فهي الصمام الثلاثي الرووس والحبال الوترية والعهد اللحمية والصمامات الهلالية للشريان الرئوي التي تشاهد من وجهها السفلي. وفي اظهار الصمامات المذكورة يدام الشق الى الشريان الرئوي بين قطعتين من صماماته (صفحة ٥٨١). ثم يفحص الجانب الايسر للقلب فيقطع الاجوف العلوي ويدفع القلب الى الاعلى وتفتح الاذنين اليسرى بواسطة شق مستعرض بقرب حافتها السفلى وهي البطنية وشقين قصيرين على زاوية قائمة للشق الاول. ثم يمسح باطنها وينظر الى تجويفها وزائدها الاذينية وبقايا الثقب البيضي ومصب الوردية الرئوية في جانبيها (صفحة ٥٨٢). ثم يفتح البطن الايسر كما فتح الايمن فينظف وينظر الى الصمام التاجي ومجاورته للفتحة الاورطية والصمامات الهلالية للشريان الاورطي التي تشاهد من وجهها السفلي (صفحة ٥٨٢)

٤. الاعصاب القلبية الغائرة والشعب. - يقطع الاورطي اعلى منشئه بنحو قيراط ويشق ما بقي منه متصلاً بالقلب لاجل مشاهدة الصمامات الهلالية وجيوب قلسلنا (صفحة ٥٨٤) ثم ينظر الى الاعصاب القلبية التي تتكون منها الضفيران القلبيتان السطحية والغائرة وتطلب العقدة القلبية وتستقصى قليلاً الضفيرة الاكليلية المصاحبة للاوعية الاكليلية (صفحة ٤٨٧). ثم تقطع القصبة اعلى تشعبها بقيراط او قيراطين ويرفع القلب والرئتان من التجويف الصدري ويبحث بالتفصيل عن تفرع الشعب وبنائها (صفحة ٥٩٧)

تشرح باطن التامور والقلب

وتطلب بقايا الغدة التيموسية في جزئه العلوي (وقد لا توجد) وتدرس جيداً بقية انعكاسات البليورا وينظر الى القلب وهو موضوع في التامور. وقد يضطر التلميذ في تشرح ما سبق من هذا القسم الى تمزيق الالتصاقات الالتهابية التي كثيراً ما تشاهد بين البليورتين الصدرية والرئوية وذلك باصابعه او بقبضة السكين . وعليه ايضاً ان ينتبه جداً الى تنظيف باطن الصدر وظاهر الرئتين بالاستنجة والغسل اولاً بالماء ثم بالسائل الواقي (١)

٢. الاجزاء التي الي ظاهر التامور. - يشاهد العصب الحجابي في الجانبيين اسفل البليورا والى مقدم جذر الرئة فيشرح ويبحث عن مجاورته الى الشريان الثديي الباطن ويصالب العصب الشريان في الجزء العلوي من الصدر ويصاحبه فرع من الشريان الى الحجاب (صفحة ٤٥٨). ثم تشرح الابنية التي اعلى التامور فيشاهد الى مقدمها جميعها الوريدان اللا اسم لها والاجوف العلوي ومصب الوريد الفرد واوردة اخر صغيرة هي الدرقيان السفليان والثديان الباطنان والعلويان بين الاضلاع (صفحة ٢٦٩) والى وراء الاوردة الشريان اللا اسم له والسباتي الايسر وتحت الترقوة الايسر الناشئة من قوس الاورطي (صفحة ٢٧٧). ويشاهد ايضاً العصبان الرئويان المعديان الايمن منها الى الوحشية من الشريان اللا اسم له وفرعه الراجع منعكف وراء الشريان تحت الترقوة والايسر نازلاً الى مقدم قوس الاورطي وفرعه الراجع منعكف وراء الاورطي (صفحة ٤٤٩). وتقاطع قوس الاورطي الاعصاب الآتية من الرئوي المعدي الايسر والسيمايوي الايسر التي تدخل في تكوين الضفيرة القلبية السطحية وهي الفرع العنقي القلبي من الرئوي المعدي وغالباً القلبي العلوي من السيمياتوي (صفحة ٤٨٧) واما الاعصاب الاخر القلبية الناشئة من الرئوي المعدي والسيمايوي التي تتكون منها الضفيرة القلبية الغائرة فتشاهد نازلةً على مقدم القصبة وجانبيها. ثم يستقصى العصبان الرئويان المعديان الى الرئتين والمريء وتكشف ان امكن الضفيرتان الرئويتان المقدمة والخلفية (صفحة ٤٥٠) وبعد ذلك يشرح جذرا الرئتين تشرحاً جيداً وينظر الى مجاورة الشريانين الرئويين والاوردة الرئوية والشعبتين الرئويتين وتستقصى الشرايين الشعبية الى منشأها (صفحة ٦٠٢ و٢٢١)

٣. باطن التامور والقلب. - بعد التامل بظاهر التامور يُشرط وينظر الى باطنه

(١) السوائل الواقية الاجزاء التشريحية من العطب كثيرة . منها الالكول مع الكربوزوت والماء مع الحامض الكربوليك . واجودها عشرون جزءاً من حامض زرنخيوس وعشرة اجزاء من حامض كربوليك منبلور وثلاثمائة جزء من الالكول وسبعائة جزء من الماء المقطر. قيل انه يحفظ الاستحضارات التشريحية زمناً طويلاً

والعضلات التي ترتبط بالعقدتين الانسية والوحشية للعضد والى مجاورة العصب المتوسط والعضلي المغزلي والزندي للمفصل والى تفرع الغائر العلوي والغائر السفلي والمنعم الكبير بالفروع الراجعة من الزندي والكعبري والشريان بين العظمين. ثم ينظر بالتفصيل الى الرباطين الجانبيين الانسي والوحشي والرباطين المقدم والخلفي الرقيق والرباط المحيط والغشاء الزلالي والسطوح الغضروفية (صفحة ١٥٢) ثم تدرس انواع حركة المفصل والعوامل لها والتغيرات التي تحدث بواسطتها في الاربطة والاجزاء الظاهرة. ثم يُبحث عن الاتصال الكعبري الزندي ولا سيما مجاورة الغضروف الليفي المثلث وحميئة حركتي الكعب والبطح لليد. وتدرس المفاصل الرسغية واغشيتها الزلالية ووضع الغضروف بالنسبة اليها والاربطة بين العظام

تشرح الصدر

كل من جانبي الصدر قسم يعم التشرح للغائر للجدران الصدرية واحشاء التجويف الصدري والوجه العلوي للحجاب الحاجز. ولا بد من الموافقة بين المشرحين للجانبين الخالفين

١. الجدران الصدرية والبليورا. - يبدأ أولاً بتشرح العضلات بين الاضلاع الظاهرة والباطنة والشرايين والاعصاب بين الاضلاع وهي سائرة الى المقدم والبليورا الجدارية (صفحة ٢١٩ و٢٢١ و٤٦٨). ثم يُكشَف الشريان الثديي الباطن الايمن بنزع الغضروف الضلعي الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس ويطلع على مجاورته القص وفروعه المقدمة بين الاضلاع والثاقبة (صفحة ٢٠٧). ثم تقطع الغضاريف الضلعية اليسرى المقابلة للسابقة بقرب الاضلاع وتشر الاضلاع الخاصة بالغضاريف المذكورة من الجانبين على بعد نحو ثلاثة قراريط من زواياها غير انه يجذر من اذى اليدين بواسطة الشظايا الحادة التي تبرز من اطراف الاضلاع المنشورة. ثم يبحث عن الحدود المقدمة للتجويفين البليوروين وعن وضع المنصف المقدم ووضع القلب والوعية العظيمة باعتبار مجاورتها الى الرئتين وجدان الصدر (صفحة ٥٩٨) ولجل اظهار ذلك على نوع جلي تُفخ الرئتان بواسطة انبوبة تدخل الى الحلق او القصبة وينظر الى اختلاف وضعها ومجاورتها في حالي الانتفاخ والهبوط للرئتين. ثم يفصل جسم القص عن القطعة العليا وينزع مع الغضاريف الضلعية المتصقة به من اليسار فتشاهد العضلة القصية المثلثة على الوجه الباطن للقص وينظر الى مجاورتها للشريان الثديي الباطن. ثم يعاد النظر الى المنصف المقدم

الراحة وشق ثالث مستعرض اعلى انقسام الاصابع وشق طولي في منتصف كل اصبع (شكل ٢٦٠). ثم تُكشَف اللقافة الراحية (صفحة ٢٤٣) مع المحافظة على العضلة الراحية القصيرة التي ترتبط بالحقافة الانسية لللقافة المذكورة (صفحة ٢٤٤). ويُعكس الجلد عن مقدم الاصابع والابهام بحيث تظهر اغماد الاوتار والفروع الاصبعية الشريانية والعصبية الى كل من جانبي الاصابع والابهام (صفحة ٢٢٦). ثم تُرفع اللقافة الراحية فيظهر العصب الزندي والعصب المتوسط (صفحة ٤٦٦ و٤٦٣) والشريان الزندي والفرع السطحي الراجي من الشريان الكعبري والقوس الراجي السطحي (صفحة ٢١٨) وتشرح العضلات القصيرة للابهام وهي المبعدة والمقاومة والقابضة القصيرة والمقربة ووتر العضلة القابضة الطويلة للابهام ثم المبعدة والمقاومة والقابضة للخنصر. ثم ينظف الرباط الخلفي ويبحث عن الغمد الزلالي الذي وراءه وتُتبع اوتار العضلات القوابض السطحية والغائرة الى مندغها وتشرح العضلات الخراطيمية. ويستقصى الفرع الغائر من الشريان الزندي الى القوس الراجي الغائر ويبحث جيداً عن القوس المذكور وفروعه (صفحة ٢١٦)

٨. مؤخر الساعد واليد. - يُسلخ ما بقي من الجلد واللقافة بالانتباه ويستقصى توزيع العصب الزندي والعصب الكعبري الى الوجوه الظهرية للاصابع (صفحة ٤٦٧) ثم تشرح العضلات الواحدة بعد الاخرى بحسب الترتيب الآتي وهو الباطحة الطويلة والباسطتان الكعبريتان للرسغ الطويلة والقصيرة والباسطة الزندية للرسغ والباسطة المشتركة للاصابع والباسطة للخنصر والباسطة للسبابة والباواسط الثلاث للابهام واخيراً المرفقية والباطحة القصيرة (صفحة ٢٢٨). ويشاهد العصب الخلفي بين العظمين ماراً بين الياف الباطحة القصيرة والشريان الخلفي بين العظمين مع فرعه الراجع مستقراً على الغشاء بين العظمين فيتبعان الى حيث يتوزعان (صفحة ٤٦٧ و٢١٩) ويبحث الان عن الجزء السفلي للشريان الكعبري الذي كان محبوباً عن النظر في تشرح مقدم الساعد وتطلب فروعه وهي الرسغي الخلفي والمشطي والفروع الظهرية للابهام والظهري السبابي (صفحة ٢١٧) وينظر ايضاً الى منتهى الشريان المقدم بين العظمين في مؤخر الرسغ بعد ثقبه للغشاء بين العظمين. واخيراً تشرح العضلات بين العظام على الوجه الراجي والوجه الظهرى لليد (صفحة ٢٤٦)

٩. مفاصل الساعد واليد. - بعد التشرح السابق يلتفت اولاً الى المفصل المرفقي وينظر الى العضلات التي ترتبط بجوارره كالثلاثية الرووس والعضدية المقدمة والباطحة القصيرة

ثم يتبع العصب العضلي المغزلي الى انقسامه الى الكعبري والخلفي بين العظمين وتكشف فروعهُ الى العضلة العضدية المقدمة والباطحة الطويلة والباسطة الكعبرية للرسغ الطويلة. ثم يشرح الخلاء الذي الى مقدم المرفق لاجل اظهار مجاورة الشريان العضدي والزندى والكعبري والكعبري الراجع والزندى الراجع المقدم والعصب المتوسط والكعبري (صفحة ٤٦٢ و ٤٦٦) ثم تكشف العضلة العضدية المقدمة الى مثل اندغامها

٥. المفصل الكتفي. - بعد التشرح السابق يُبحث عن الاتصالات المنفصلة عند اعلى العضد (صفحة ١٤٩) فيُنظر اولاً الى الرباط الهرمي والمربع المنحرف اللذين يوصلان الترقوة بالتوغراي ثم الى الاتصال الاخرى الترقوي والرباطين الاخرمين الترقويين واخيراً يفتح المفصل الكتفي وتنظف المحفظة ويشرح الرباط الغراي العضدي ويبحث عن اوتار العضلات المجاورة للمفصل. وعند فتح المحفظة يشاهد الراس الطويل للعضلة ذات الراسين وغدهُ المتد من الغشاء الزلاي

٦. مقدم الساعد. - تُزرع اللقافة الغائرة لمقدم الساعد وتشرح العضلات السطحية الخمس الناشئة من العقدة الانسية للعضد. فيبدأ بالكابة المستديرة ويظهر راسها اللذان يمرّ بينهما العصب المتوسط ثم تشرح القابضة الكعبرية للرسغ ثم الراحية الطويلة (التي كثيراً ما تكون مفقودة) ثم القابضة السطحية للاصابع ثم القابضة الزندية للرسغ (صفحة ٢٣٤) وتظهر فروع العصب المتوسط للعضلات الاربع الاول وفرع العصب الزندي للقابضة الزندية للرسغ والقابضة الغائرة للاصابع (صفحة ٤٦٢ و ٤٦٥). ويُنظر ايضاً الى سير الشريانيين والعصيين الزنديين والكعبريين في الساعد. ويشاهد ان الشريان الكعبري (صفحة ٢١٥) يرسل الكعبري الراجع وفروعاً عضلية والرسغي المقدم والراحي السطحي. وينشا من الشريان الزندي (صفحة ٢١٩) الزنديان الراجعان المقدم والخلفي والفرع بين العظمين الذي ينقسم الى مقدم وخلفي ويرسل فرعاً يصاحب العصب المتوسط. وتكشف ايضاً الفروع العضلية للشريان الزندي وفرعاه الرسغيان المقدم والخلفي. ثم تشرح الطبقة الغائرة للعضلات وهي القابضة الطويلة للابهام والقابضة الغائرة للاصابع والكابة المربعة (صفحة ٢٢٦) ويكشف الفرع بين العظمين الذي ينشا من العصب المتوسط ويستقر على الغشاء بين العظمين ويرسل فروعاً للعضلات ويصاحبه الشريان بين العظمين المقدم (صفحة ٢١٩)

٧. مقدم اليد. - يُشق شق مستعرض على مقدم الرسغ وشق ثانٍ طولي في منتصف

٤. العضد. - يشقّ الجلد ويسلخ على الكيفية المرسومة في شكل ٢٦٠ ثم ان كان العضو بجالة مناسبة فليظهر التلميذ الاعصاب الجلدية والاوردة السطحية الى الرسغ. وان لم يشاء كشف الجلد الى المحل المذكور فليكن الشق الى منتصف الساعد. فيستقصي العصب الضلعي العضدي الى توزيعه (صفحة ٤٦٩) وعصب رزبرج والعصب الجلدي الانسي من منشأها (صفحة ٤٦٢) ويرى ان العصب الجلدي الانسي يتقب اللقافة الغائرة على الجانب الانسي للعضد اعلى المرفق بيضع قراريط واما في الجانب الوحشي فيشاهد الفرعين الجلد بين الوحشين للعصب العضلي المغزلي نافذين على موازاة خط الفاصل العضلي الوحشي ويشاهد عند ثنية المرفق الى الوحشية العصب العضلي الجلدي نافذاً من الاجزاء الغائرة. ويقرب المرفق الى الانسية غدة ليمفاوية صغيرة وعلى الوجه الخلفي للتو المرفقي كيس مخاطي صغير. ويشاهد الى الاسفل من ذلك الى الانسية فرع جلدي من العصب الزندي والى الوحشية العصب الكعبري الذي يصير سطحياً اعلى الرسغ بغيراطين او ثلاثة والى المقدم الفرع الجلدي الراحي للعصب المتوسط اعلى الرباط الخلفي. ويشاهد على مقدم الساعد الوريد الكعبري والمتوسط والزندي والى مقدم المرفق الراسي المتوسط والباسليقي المتوسط وفي العضد الراسي والباسليقي

ثم تُرفع اللقافة الغائرة من مقدم العضد ويبدأ بتشرح الشريان العضدي والوريدين المرافقين له والعصب المتوسط الذي يصله من المقدم (صفحة ٤٦٢) فيُشاهد الشريان الغائر العلوي ناشئاً من الجانب الانسي للشريان العضدي ومنعكفاً الى الخلف مع العصب العضلي المغزلي واسفله قليلاً الشريان الغائر السفلي مصاحباً للعصب الزندي واعلى المرفق الشريان المتمم مستقراً على العضلة العضدية المقدمة ومن الجانب الوحشي للشريان العضدي فروع عضلية. وقد ينشأ الغائر السفلي من الغائر العلوي وكثيراً ما يكون الشريان العضدي منقسماً الى قسمين وهو في العضد قبل وصوله الى ثنية المرفق وقد يكون الكعبري او الزندي منها الى السطحية من اللقافة الغائرة للعضد. ثم تشرح العضلة ذات الراسين والغرايبة العضدية والجزء الغائر للعصب العضلي الجلدي الذي يرسل فروعاً الى العضلتين المذكورتين (صفحة ٢٢٠ و٤٦٢). وليحافظ المشرح على الفسحة الصفاقية التي تمتد من الجانب الانسي للعضلة ذات الراسين وتغطي الاوعية عند ثنية المرفق (صفحة ٢٢١). ثم تنزع اللقافة الغائرة من مؤخر العضد ويبحث عن الفاصلين بين العضلات اي الانسي والوحشي (صفحة ٢٢٩) وتشرح العضلة الثلاثية الرؤوس ويستقصي الشريان الغائر العلوي والعصب العضلي المغزلي الى جانبها الوحشي (صفحة ٢١٤ و٤٦٦)

والراس الوحشي للعصب المتوسط ومن الانسي الراس الانسي للعصب المتوسط والعصب الجلدي الانسي وعصب رزبرج والعصب الزندي ومن الخلفي الاعصاب تحت اللوح الثلاثة والمنعكف والعضلي المغزي . وبعد ذلك يُترع الغشاء الضلعي الغراي وتنظف العضلة تحت الترقوة ويبحث عنها (صفحة ٢٢٥)

ثم تُشر الترقوة عند منتصفها او تنصل عند اتصالها بالنص فيقطع مشرّح الطرف العلوي ومشرّح الراس والعنق على القسم العلوي للضفيرة العضدية ويستقصيان منشا العصب اعلى اللوح والعصب الصدري الخلفي (صفحة ٤٦١) وبعد ذلك يربط الشريان والوريد الاطيان وحبال الضفيرة العضدية حذاء الحافة الظاهرة للضلع الاول وتقطع اعلى الربط وتثبت في مكانها يربطها بالقسم الذي يبقى من الترقوة مع الطرف العلوي . ثم توتر العضلة المسننة الكبيرة ويبحث عنها جيداً (صفحة ٢٢٥) وينصل الطرف العلوي من الجذع

٢. العضلات والاعوية والاعصاب اللوحية. - بعد فصل الطرف العلوي من الجذع لينظف المشرّح جميع الاجزاء التي انكشفت والعضلات المقطوعة بحيث تظهر ارتباطاتها ثم ينظف العضلة الذالية مبتدئاً من الخلف لاجل وقاية الفروع الجلدية للعصب المنعكف ما امكن (صفحة ٢٢٦ و ٤٦١) ويشرّح العضلة المستديرة الكبيرة والخلاء المربع والخلاء المثلث اللذين يفصلهما الراس الطويل لثلاثية الرؤوس والواقعين بين العضلة المستديرة واللوح ويعرّي الاجزاء التي تمرّ من الخلائين المذكورين وهي العصب المنعكف مع فرعه للمستديرة الصغيرة والشريان المنعكف من الخلاء المربع العلوي والفرع الظهري للشريان تحت اللوح من الخلاء المثلث السفلي (صفحة ٢٢٢) ثم تُقطع العضلة الذالية من ارتباطها العلوي فيشاهد اسفلها الكيس المخاطي الموضوع بين الاخرم والمفصل الكتفي وفروع الاعوية المنعكفة والعصب المنعكف . وتشرّح العضلة المستديرة الصغيرة والعضلة فوق الشوكة والعضلة اسفل الشوكة وتقلب ويستقصى توزيع العصب والشريان فوق اللوح بدون اذى للرباط المستعرض والرباط الهرمي والرباط الاخرمي . ويبحث ايضاً عن العضلة تحت الشوكة وبعد قلبها يشاهد الكيس المخاطي الذي يستطرق الى باطن المفصل الكتفي . وعند قطع العضلات المرتبطة باللوح يجب على التلميذ ان يظهر قسم الشريان اللوحي الخلفي والشريان فوق اللوح والاخرمي الصدري والفرع الظهري للشريان تحت اللوح والشريانين المنعكفين بعضها ببعض . ثم تقطع العضلات اللوحية عند ارتباطها بالعضد


علي جانب الصدر الى الثانية الخلفية للابط فيتم اظهار القسم الابطي ان كان التلميذ مبتدئاً فليشرح الجلد عن العضلة الصدرية الكبيرة (صفحة ٢٢٢) وان كان متقدماً فليظهر الياف العضلة الجلدية والفروع القصية والترقوية النازلة من الضفيرة العنقية (صفحة ١٩٠ و٤٥٧) والفروع الجلدية المقدمة الناشئة من الاعصاب بين الاضلاع والفروع المصاحبة لها من الشريان الثديي الباطن بقرب الخط المتوسط (صفحة ٤٦٩). وان كانت الجثة جثة انثى تشرح ايضاً الغدة الثديية الموضوعة بين طبقتي اللفافة السطحية غير انه في تشرح الجلد لا يتعرض لجلد الحلمة بل يشق شق حلقى حولها قطره نحو قيراطين (صفحة ٦٤٢) ثم تشرح القطعة المذكورة وحدها لاجل اظهار القنوات اللبنية واتفاخاتها

ثم يقطع المنشأ الترقوي للصدرية الكبيرة بقرب الترقوة لاجل البحث عن الخلاء اسفل الترقوة وانما يحافظ على العصب الصدري المقدم الوحشي وهو سائر الى العضلة المذكورة (صفحة ٤٦١) ثم يبحث عن الغشاء الضلعي الغرابي وعن غمد الاوعية الابطية (صفحة ٢٢٤) ثم يتزع الغمد وينظر الى منتهى الوريد الراسي ويتأمل باقسام الشريان والوريد الابطين وبالشريان الصدري العلوي والاخري الصدري (صفحة ٢١١ و٢١٢)

ثم يُشرع في تشرح الخلاء الابطي فيسلخ كل من الجلد واللفافة على حدته عن سطح الخلاء المذكور (صفحة ٢٠٩) وتكشف الاوعية والاعصاب الابطية وهي سائرة من الابط الى العضم غير تعرض لوضعها. ثم يتبع الشريان والوريد الابطيان نحو الاعلى ويتزع الدهن من باطن الخلاء فيشاهد الشريان الصدري الطويل نحو الحافة المقدمة للخلاء المذكور والشريان تحت اللوح نحو الحافة الخلفية والفرع الجناحي بقرب المنتصف. ويشاهد حينئذ ايضاً على الجدار الانسي للابط العصب الضلعي العضدي وغيره من الفروع الجلدية الجانبية الناشئة من الاعصاب بين الاضلاع اني تنقب العضلة المسننة الكبيرة (صفحة ٤٦٩) والعصب الصدري الخلفي (وهو التنفسي الظاهر صفحة ٤٦٠) نازلاً على سطح العضلة المذكورة ليتوزع فيها. وتشاهد الاعصاب اسفل اللوح على الجدار الخلفي (صفحة ٤٦١). ثم بعد التأمل الكافي بالخلاء الابطي يقطع ما بقي من الصدرية الكبيرة وتشرح الصدرية الصغيرة وتقطع ويطلب العصب الصدري المقدم الانسي الذي يتوزع فيها. فعلى الكيفية المذكورة تظهر الاوعية الابطية في جميع سيرها ويبحث عن منشأ فروع الشريان الابطي وهي الاخري الصدري والصدري الجناحي والصدريان القصير والطويل والشريان تحت اللوح والمنعكفان المقدم والخلفي. وتشاهد ايضاً الحبال الثلاثة للضفيرة العضدية فينشا من الحبل الوحشي العصب العضلي الجلدي والصدري المقدم الوحشي

ويكون حد المشار متجهاً نحو الباطن ويدام النشر في الاسفل على ظهر العجز الى طرف القناة العجزية. ثم تُرفع بالسهولة الاجزاء المنشورة بالازميل والصفائح بالمقراض. وتنزع بعض التوات المفصلية في الجزء السفلي من القسم الظهري بحيث يظهر عصب او اكثر من الاعصاب الشوكية نافذاً من القناة الشوكية فيشرح الى ابعد من عقده قليلاً ليخرج بعد ذلك مع الحبل. ثم تنظف الام الجاقية من الشحم المحيط بظاهرها وبعد دراستها تشق لاجل البحث عن بقية الاغشية وبجاورة الحبل وهي في وضعها الطبيعي. وينظر على الخصوص الى الرباط المسنن وذنب الفرس والحيط الانتهايي (صفحة ٤٠١ و٤٧٥) ثم يخرج الحبل الشوكي مع اغشيته من القناة ويمد على طاولة وينظر الى الاصول المقدمة والخلفية للاعصاب والعقد الموضوعة على الاصول الخلفية والى الشكل

شكل ٢٦٠



الظاهر للحبل وبنائه وقوائمه الثلاث المقدمة والمتوسطة والخلفية وفرجنيه المتوسطين المقدمة والخلفية الى غير ذلك. واخيراً يُقطع الحبل قطعاً عرضياً في جملة اماكن لاجل اظهار النسبة الكائنة بين الجوهرين السنجابي والابيض

٢. الجهة الصدرية والابط . - يمد الطرف

العلوي على زاوية قائمة بالنسبة الى الجذع ثم يشق الجلد شقاً عمودياً في الحيط المتوسط للصدر من الطرف العلوي الى الطرف السفلي للقص وشقاً ثانياً من الغضروف الخجري الى الحافة السفلى للابط ممتداً على الحافة السفلى للعضلة الصدرية الكبيرة وشقاً ثالثاً من الطرف العلوي للقص بجانب الترقوة الى مركزها وشقاً رابعاً ممتداً من منتصف الترقوة الى نقطة تقابل الحافة السفلى للابط بجانب الخلاء الواقع بين العضلة الصدرية والذالية. ثم يسلم الجلد على ما يري في الرسم ولكنه لا ينزع بالكلية بل يعاد الى محله بعد الانتهاء من تشرح الابط. وبعد ذلك يشق شقاً مستعرضاً من الطرف السفلي للقص

شكل ٢٦٠. تشرح الطرف العلوي ١ تشرح الجهة الصدرية والابط ٢ تشرح المرفق ٢ تشرح الكتف والعضد ٤ تشرح الساعد ٥ تشرح راحة اليد

به في العضد (صفحة ٢٠٥). وان كان التلميذ متقدماً فليظهر الفروع الجلدية الآتية من الفروع الخلفية للاعصاب الشوكية قبل تشرح العضلات المذكورتين وتشاهد الفروع المذكورة موضوعة على سطحها (صفحة ٤٦٨)

وبعد تشرح العضلة المربعة المنحرفة نُقَطَّعُ قطعاً عمودياً على بعد نحو قيراطين من ارتباطها الفقري فيشاهد على وجهها الغائر العصب الشوكي الاضافي والشريان العنقي السطحي (صفحة ٤٥١ و ٢٠٧). ثم تشرح العضلتان المعينتان والرافعة لزاوية اللوح (صفحة ٢٠٦) والعصب النازل الى الوجه الغائر للمعينتين من الضفيرة العضدية من الاعلى (صفحة ٤٦٠). ونُقَطَّعُ العضلة الظهرية العريضة عند ارتباطها الفقري الى الاسفل والوحشية نحو حافتيها الوحشية واما فسحها المرتبطة بالاضلاع السفلى والعرف الحرقفي فتبقى من غير قطع. ونقطع المعينتان ويشرح الشريان اللوحي الخلفي (صفحة ٢٠٧) ثم تشرح المسنتان الخلفيتان العليا والسفلى وينظر الى الصفاق الفقري (صفحة ٢٠٨) والوجه الباطن للعضلة المسننة الكبيرة (صفحة ٢٢٥)

ثم نقطع المسنتان الخلفيتان والصفاق الظهرى ويشرع بتشرح العضلات التي تتالف منها الناصبة الشوكية (صفحة ٢٠٩) وليبدأ التلميذ بالعجزية القطنية فيشرح فسحها الست او السبع التي تندغم في الاضلاع السفلى ثم الفسخ التي ترتبط بالاضلاع العليا والتي تتالف منها العضلة الاضافية للعجزية القطنية وبعد ذلك يقلب العضلة الى الوحشية ويتبع الرؤوس المشائية للعضلة الاضافية من الاضلاع السفلى الى ارتباطها في الاعلى وكذلك منشأ العنقية الصاعدة من الاضلاع العليا. وعلى هذا الاسلوب يشرح الظهرية الطويلة فيشرح اولاً اندغاماتها الضلعية الى الوحشية ثم يفصلها عن الظهرية الشوكية ويتبع ارتباطها بالتوات المستعرضة لل فقرات. ثم يُسْتَقَصَى الى العنق امتداد العضلات الطويلة وهما العنقية الصاعدة والعنقية المستعرضة ويبحث عن منشأ القنوية الحلمية التي لا تشاهد الا بعد تشرح العضلة الطحالية وقطعها عمودياً ثم ينظر الى الشوكية النصف الظهرية والشوكية النصف العنقية. واخيراً تشرح العضلات الغائرة وهي المنفجة الشوكية والمدبرات الشوكية وبين الشوكات وبين التوات المستعرضة. وفي اثناء هذا التشرح تشاهد الحافة السفلى للعضلتين البطنييتين المنحرفة الظاهرة والمنحرفة الباطنة والطبقة الخلفية والطبقة المتوسطة للصفاق القطني اللتان تختلطان من الوراها بالعضلة المستعرضة غير ان تشرح هذه العضلات خاص بالقسم البطني فلا يُعْرَضُ لها


ثم ان كان التلميذ متقدماً فليكشف الحبل الشوكي وذلك بان توضع قرم تحت البطن بحيث تستقيم الفقرات القطنية ويدلّى العنق قليلاً. ثم تُشَرَّحُ صفائح الفقرات الظهرية والقطنية من الجانبين

تشرح الطرفين العلويين

كل من الطرفين العلويين قسم مع الابط والابنية الواقعة بين الجذع وعظام الكتف والعضد. ولذبن يشرحانها ايضاً عضلات الظهر والحبل الشوكي. واما العضلة الكتفية اللامية والاجزاء العليا للمربعة المنخرقة والرافعة لزاوية اللوح والطحالية والقنوية الحلمية والمضاعفة فتترك من غير اذى للذبن يشرحان الراس والعنق. والحذ السفلي لهذا القسم على الجذع خط ممتد على الحافة الوحشية والسفلى للظهرية العريضة والمسنة الكبيرة والصدرية الكبيرة

١. عضلات الظهر والحبل الشوكي. - ينهى تشرح عضلات الظهر والحبل الشوكي

شكل ٢٥٩



بينما تكون الجثة ملقبة على البطن. فتوضع قرم تحت الصدر والبطن بحيث تتوتر عضلات الظهر ثم يشق شق طولي ممتد في الخط المتوسط من الحذبة المؤخرية الى العصص ويوصل الشق المذكور من طرفه العلوي بالتواجلي بواسطة شق مستعرض ومن طرفه السفلي بمنتصف العرف الحرقفي بواسطة شق اخر مستعرض ممتد على العرف المذكور. وبها ان الخلاء الواقع بين الشقوق المذكورة كثير الانساع يشق شق رابع ممتد بانحراف من التتو الشوكي للفقرة الظهرية الاخيرة نحو الاعلى والوحشية الى التتو الاخرم وهذا الشق الاخير يقابل الحافة السفلى للعضلة المربعة المنخرقة. ثم يسليخ

الجلد نحو الجهة المرسومة في شكل ٢٥٩

فان كان التلميذ مبتدئاً فليشرح العضلة المربعة المنخرقة تبعاً لاتجاه اليافها (الاقسمها الواقع ضمن حدود تشرح الراس والعنق) ثم العضلة الظهرية العريضة تابعاً لليافها ما امكن الى وترها الذي تندغم

العضلات الخاصة باللسان (صفحة ١٩٥) ثم يشرح المشرحان في درس الحجرة فتتظف جيداً (صفحة ٥٨٦) وينظر الى الوترين الصحيحين والوترين الكاذبين وبعد ذلك يُسلخ الغشاء المخاطي ويتبع توزيع العصبين المنجربين العلوي والسفلي والفرع المنجربي من الشريان الدرقي العلوي. ثم تشرح عضلات الحجرة تشريحاً تاماً فتشاهد الحلقية الدرقية والطرجهالية والطرجهالية المزمارية والحلقية الطرجهالية الخلفية من غير تعرض للغضاريف واما الحلقية الطرجهالية الجانبية والدرقية الطرجهالية فلا تظهران الا بعد نزع الجزء العلوي من احدى صفيحتي الغضروف الدرقي. واخيراً يبحث عن بطيني الحجرة وتشرح الاوتار الصوتية وبعد نزع النسيج العضلي عن الغضاريف يُنظر الى الاربطة التي تربطها بعضها ببعض والمفاصل التي تحركها بعضها على بعض

وعند انتهاء هذا القسم من الشرح تقطع الفتحات الانفية والحنك الصلب قطعاً عمودياً الى احد جانبي الفاصل الانفي وتدرس اصحفة الانف والقناة الانفية وكهف هيكتور (صفحة ٧٤). وقد ينظر الى العصب الحنكي والعصب الانفي الحنكي وهما فرعان من العقدة الودية الحنكية والى الشريان الحنكي النازل (صفحة ٢٩٠)

١٢. العضلات الغائرة والمفاصل للعنق والراس. - يشرح التلميذ العضلات

المرتبطة بالفقرات العنقية وهي الى مقدم العمود الفقري الاخمعيات الثلاث والراسيتان المستقيمتان المقدمتان الكبيرة والصغيرة والمستقيمة الجانبية (صفحة ٢٠١) ثم يتحوّل الى الجهة الخلفية ويشرح بقايا الرافعة لزاوية اللوح (صفحة ٢٠٦) والطحالية والنفوية الحلمية والمضاعفة (صفحة ٢٠٨) وليتأمل بقسم الشريان المؤخري الذي تغطيه العضلة الطحالية وبفرعه العنقي الرئيسي (صفحة ٢٨٥) ثم تشرح الراسيتان المستقيمتان الخلفيتان الكبيرة والصغيرة والمنحرفتان الراسيتان العليا والسفلي مع العصب تحت المؤخري الذي يتوزع فيها (صفحة ٢١٢ و٤٥٩) ويكشف سير الشريان الفقري وهو في ميزاب الحاملة (صفحة ٢٠٢) واخيراً تنزع اقواس الفقرات ويبحث عن المفاصل والاربطة ولا سيما اربطة الحاملة والمحور والعظم المؤخري وينتبه على الخصوص الى الرباط المستعرض للحاملة والاربطة النابية (صفحة ١٢٦ و١٢٨)

(٤٥١) ثم يبحث عن العضلة اللامية اللسانية والذقنية اللامية والذقنية اللامية اللسانية والابرية اللسانية والابرية البلعومية (صفحة ١٩٥) والعصب اللساني البلعومي (صفحة ٤٤٦) ثم تقطع العضلة اللامية اللسانية ويتبع الشريان اللساني الى فرعيه تحت اللسان والضفدي ويشاهد ايضاً فرعه الصغير اللامي وفرعه الظهري اللساني ويطلب الفرع الهوي الصاعد والفرع اللوزي للوجي (صفحة ٢٨٤)

١٠. الاجزاء الواقعة بقرب الوجه السفلي لقاعدة الحوذنة. - اذا قُرِضَ التواليري عند قاعدته وطُرِحَ الى الاسفل مع العضلات الابرية الثلاث المرتبطة به امكن المشرح ان يبحث بالنديقين عن الضفيرة البلعومية العصبية (صفحة ٤٤٩) ثم يبحث عن مجاورة الشريان السباتي الباطن والوريد الوداجي الباطن (صفحة ٢٩٥) ويستقصي نحو الاعلى العصب تحت اللسان والشوكي الاضافي والرئوي المعدي واللساني البلعومي والاعصاب السباتوية الى قاعدة الحنجرة ويبحث عن اتصالات العقدة العنقية العليا السباتوية بالاعصاب الاخر المذكورة وبالفروع المقدمة للاعصاب العنقية العليا (صفحة ٤٨٤) ثم يفتح الثقب الوداجي والثناة السباتية ويتبع العصب الثامن لوللس والشريان السباتي الباطن والضفيرة السباتية المرافقة له الى باطن الحوذنة (صفحة ٤٨٤). وقبل الانتهاء من تشرح هذا الجزء يراجع التلميذان اللذان يشرحان الراس جميع الاجزاء التي تتعلق بقاعدة الحنجرة

١١. البلعوم والحنجرة واللاهة واللسان وباطن الانف. - تنزع بقايا الشريانين السباتيين ويجذب البلعوم من اتصالاته الرخوة بالفقرات العنقية العليا وتشرح قاعدة الحنجرة بين البلعوم والعضلتين الراسيتين المقدمتين المستقيمتين ثم يشرح بتشرح البلعوم والاجزاء المجاورة له. فيملاً البلعوم بالكتان بحيث يتمدد جدرانه ثم تنظف العضلات العواصر له والعضلة الرافعة لللاهة والشادة لها (صفحة ١٩٩) ثم يفتح البلعوم من الخلف بان يشق أولاً في الخط المتوسط ثم شقاً مستعرضاً بقرب قاعدة الحنجرة ويبحث عن الفتحات المستطرفة اليه وهي الفتحتان الانفيتان الخلفيتان وفتحة الحلق وفتحة المزمار وفتحة المرئ وفتحتا قناتي اوستاكيوس (صفحة ٥٤١) ثم تشرح عضلات اللاهة وخصوصاً اندغام الرافعة والشادة لها ويبحث عن نسبة العضلة الهوية البلعومية والهوية اللسانية الى القائمة الخلفية والقائمة المقدمة لللاهة (صفحة ٢٠٠) وتشارك العضلة الغلصمية المفردة في الخط المتوسط وتشرح قناة اوستاكيوس

تنصل الحنجرة واللسان من الفك العلوي وينظر الى سطح اللسان واللوزتين وما ظهر من

تشرح الجهة تحت الفك والجهة تحت اللسان

وفروعها الحنكية النازلة (صفحة ٤٢٧) ثم تفتح قناة قديان ويشرح عصب قديان الى الوراء حتى العصب الحجري العظيم (صفحة ٤٢٩). وينظر الى فروع الشريان الفكي الباطن وهي اسفل الحجاج والوتدي الحنكي اي الانفي والحنكي الخلفي وقديان (صفحة ٢٩٠) ويشاهد بعض العقدة الاذنية بكسر الثقب البيضي واستئصال عصب العضلة الجناحية نحو الاعلى وقلب العصب الفكي السفلي (صفحة ٤٤١) غير ان العقدة الاذنية لا تشاهد كما ينبغي الا اذا كان التشرح من الجهة الباطنة للعضلة الجناحية الانسية والعصب الفكي السفلي. ثم تفتح قناة اوستاكيوس ويظهر ارتباط الشادة للطلبة اعلاها (صفحة ٥٢٢)

ثم ينشر جدار الحجة الى حافة الصماخ السمعي الظاهر وينزع بالمقرض الجدار المقدم للصماخ المذكور مع شدة الانتباه فيظهر الغشاء الطبلي ثم يدام فتح قناة اوستاكيوس نحو الوراء فينزع سنّف التجويف الطبلي ويظهر المطرقي والسندانى والركابى مع وتر الشادة للطلبة ويبحث عن عمل العضلة المذكورة ويشاهد الحبل الطبلي (وهو فرع من العصب الوجي) سائراً في التجويف. ثم يرفع المطرقي والسندانى بالانتباه وتوضع الشفرة الواحدة للمقرض العظمي في القناة السمعية الباطنة ويفتح بالاخري الدهليز والتوقعة وتدرس نسبة العصب الوجي والعصب السمعي الى هذين التجويفين (صفحة ٤٤٣ و٤٤٦) وعند ذلك يشاهد احكام وضع الركابى في الكوة البيضية الا انه لا يمكن رفع هذا العظيم من محله قبل قطع العضلة الركابية. وقد تظهر بالمقرض العضلة الركابية نازلة في القسم الحلي للعظم الصدغي بقرب العصب الوجي وقد يستنقى الحبل الطبلي الى العصب المذكور

٩. الجهة تحت الفك والجهة تحت اللسان. - ينشر الفك السفلي الى مقدم العضلة المضغية ويتبع العصب الذوقي والعصب الضرسى اللامي من الجهة الجناحية الى الجهة تحت الفك. ثم يقطع البطن المقدم لذات البطنين عند الذقن ويقلب الى الاسفل وتُفصل الضرسية اللامية عن رفيقتهما في الخط المتوسط وعن العظم اللامي وتقلب الى الاعلى لاجل اظهار الاجزاء الغائرة. ويمدّد اللسان الى المقدم ويثبت هناك وينشر الفك السفلي نشرّاً عمودياً بين السنين القاطعين الاول والثاني بحيث لا يمس ارتباط العضلة الذقنية اللامية ويشترط الغشاء المخاطي للفم الى راس اللسان. ثم يتبع المشرح اولاً سير العصب الذوقي نحو الظاهر الى الغدة تحت الفك ويظهر العقدة تحت الفك المتصلة به (صفحة ٤٤٢) ثم ينظف حول الغدة تحت الفك والغدة تحت اللسان ويتامل بجواررة قناة هوارتن وقنوات الغدة تحت اللسان والعصب الذوقي والعصب تحت اللسان (صفحة

فيشاهد في الجزء العلوي والخلفي ما يتضمنه الحجاج العصب الرابع الذي يجب ان يستقصى من الجيب الكففي الى ان يثقب العضلة المنخرقة العليا من وجهها العلوي وتكشف العضلة المذكورة (صفحة ٤٢٢ و ١٨١). ويستقصى العصب الجبهي الموضوع في منتصف الخلاء الى الوراء الى منشئه من التسم العيني للعصب الخامس (صفحة ٤٢٤). وتُظهِر الغدة الدمعية (صفحة ٥١٥) ويتبع العصب الدمعي من حافتها الخلفية الى منشئه من العصب العيني. ثم تكشف العضلة الرافعة للجفن العلوي والمستقيمات العليا والوحشية والانسية وتنظف وجوهها العينية (صفحة ١٨٠) فيشاهد العصب السادس منتهياً في المستقيمة الوحشية وفروع العصب الثالث في المستقيمات الثالث الاخر ثم يستقصى هذان العصبان الى الوراء بين راسي المستقيمة الوحشية الى الجيب الكففي. ويشاهد اسفل العضلة المستقيمة العليا العصب الانفي الناشئ من العيني مقاطعاً للعصب البصري فيتبع الى الثقب المصفوي المقدم ويتبع فرعه اسفل البكرة الى الجفن السفلي ثم يستقصى الى منشئه ويطلب الاصل الطويل الدقيق للغدة العدسية الى الجانب الوحشي من العصب البصري. والعقدة العدسية وهي العينية واقعة الى الجانب الوحشي من العصب البصري وتوجد بسهولة باستقصاء الفرع القصير الغليظ الذي يذهب اليها من التسم السفلي للعصب الثالث وتشاهد الى مقدم العقدة فروعها الهدبية (صفحة ٤٢٦). ثم يعزل ما بقي من الدهن في اسفل الحجاج ويظهر توزيع الشريان العيني (صفحة ٢٩٦) ويتبع التسم السفلي للعصب الثالث الى المستقيمة السفلى والمنخرقة السفلى. ويظهر في المقدم اندغام العضلات المذكورة في الصلبة ثم تقطع من الوراء جميع الاجزاء التي يتضمنها الحجاج وتثقب الى المقدم لكي يمكن تشريح العضلة الشادة للغضروف الجفني وتشريح الكيس الدمعي. واخيراً ان امكن يستقصى العصب الانفي من العظم المصفوي الى توزيعه في باطن الانف ويتبع فرعه الظاهر الى راس الانف

٨. التشريح الغائر للعصب الخامس : العقدة الودية الحنكية والعقدة الاذنية :

الاذن الباطنة . - بعد الانتهاء من تشريح الحجاج يشق الثقب المستدير والقناة اسفل الحجاج ويُشَرِّح العصب الفكي العلوي وفروعه الحجاجية والسنية (صفحة ٤٢٦). ثم يُنَزَع بالمشار قسم اخر من الحجمة نحو الصماخ السمي الظاهر ويوصل النشر الى الثقب الشوكي ويقطع بالازميل او المقراض العظمي الى الثقب البيضي وينزع ايضاً قسم من العظم اعلى التتو الجناحي بحيث تنفتح الحفرة الودية الفكية فتظهر العقدة الودية الحنكية . وعند ذلك تتبع مواصلة العقدة المذكورة بالعصب الفكي العلوي ويستقصى فرعها الانفي وفرعها الانفي الحنكي من الثقب الودي الحنكي

الباطن مع فروعه وإنما يجذر من اذى العضلة الجناحية الوحشية التي يكون الشريان موضوعاً غالباً على وجهها الوحشي وكثيراً ما تغطيه. ويشاهد العصب الذوقي والعصب السني السفلي اسفل الحافة السفلى للعضلة الجناحية الوحشية واما العصب السني السفلي فيرسل الفرع الضرسى اللامي قبل دخوله الثقب السني السفلي ويستقر على الرباط الجانبي الانسي للفك. ويمر بين الرباط المذكور والفك الشريان الفكي الباطن. ويشاهد اعلى الحافة العليا للعضلة المذكورة الشريانان والعصبان الصدغيان الغائران المقدم والخلفي وبين قسميها السطحي والغائر العصب الفسي والاوعية الفمية. ثم بعد دراسة العضلة الجناحية الوحشية (صفحة ١٨٨) يبحث عن المفصل الصدغي الفكي (صفحة ١٢٩) ويُفَعَّ بقطع الرباط الجانبي الوحشي وشقَّ محفظة المفصل اعلى واسفل الغضروف اللبني المتوسط ويفصل التواقي للفك وإنما يجذر من قطع العصب الاذني الصدغي الناشئ من العصب الفكي السفلي والملاصق لجانب المحفظة الانسي (صفحة ٤٤٠) ثم تُردَّ العضلة الجناحية الوحشية مع راس الفك ويُطلب عصبها وبعد ذلك تُعزَل

وعلى ذلك تظهر فروع الشريان الفكي الباطن بجوار العضلتين الجناحيتين فيشاهد اولاً السني السفلي والسحائي المتوسط والسحائي الصغير والصدغيان الغائران والجناحية والمضغي والنسي ثم بين العضلتين الجناحيتين السني والفرع اسفل الحجاج (صفحة ٢٨٨). ويشرح الحبل الطبلي وهو فرع من العصب الوجهي من نقطة اتصاله بالعصب الذوقي اسفل العضلة الجناحية الوحشية الى شق كلاسير بوس (صفحة ٤٤٥) وتُستقصى فروع العصب الفكي السفلي الى الثقب البيضي (صفحة ٤٢٩) وكثيراً ما يشاهد العصب الاذني الصدغي معانقاً للشريان السحائي المتوسط. وتشرح العضلة الجناحية الانسية نحو الباطن ما امكن (صفحة ١٨٧) ثم يتبع العصب الاذني الصدغي من الفكي السفلي الى الاجزاء التي يتوزع فيها ويشرح الصيوان وتكشف غضاريفه وعضلاته الصغيرة واعصابه (صفحة ٥١٧)

٧. الحجاج - بعد تشرح الاجزاء السابقة يُشرَع بتشرح الحجاج فيُنشَر العظم الجهي نشرًا عمودياً بقرب الزاوية الانسية للحجاج اعلى ارتباط البكرة الليفية ويُنشر ايضاً الجدار الجانبي للجحمة من اعلى الاذن نحو الفرجة الوتدية اي الى الاسفل والمقدم. ثم يُعزَل الجزء الوحشي للعظم الوجهي بالمقراض العظمي ويُفصل السمحاق وما في باطن الحجاج بيد السكين عن الجدار العلوي والجدار الوحشي ويوصل الشق الانسي بالفرجة الوتدية الى الوحشية من الثقب البصري بواسطة الازميل. ثم تُرفع بالمقراض قطعة العظم المنشورة بحيث يُكشَف سقف الحجاج ويشق السمحاق طولاً ويعكس.

(صفحة ٢٨٧) وتتبع فروع العصب الوجهي الى المقدم وتستقصى ان امكن اتصالاتها بفروع العصب الخامس وهي الفروع تحت الحجاج والقمية والشفوية السفلى . ثم يقطع الارتباط العلوي للرافعة للشفة العليا ويطلب المشرح الثقب تحت الحجاج ويتبع توزيع العصب والشريان تحت الحجاج النافذين منه (صفحة ٤٣٧ و ٢٩٠) وليقطع ايضاً نحو الثقب الذقني ويتبع العصب والشريان النافذين منه (صفحة ٤٤١ و ٢٨٩)

ثم يُشرِّح الشريان والوريد الوجهيين مع فروعها من حافة الفك السفلي نحو الانسية والاعلى . وتُظهِر الفروع الرئيسة للشريان الوجهي وهي الشفوي السفلي والاكيليليان العلوي والسفلي والانفي الجانبي والزاوي (صفحة ٢٨٤)

وتستقصى فروع العصب الوجهي الى الورا من جوهر الغدة النكفية الى نفوذ الجذع الاصلي من الثقب الابري الحلمي . وفي اثناء ذلك تحفظ اتصالات هذا العصب بالفرع الاذني الصدغي من الخامس والعصب الاذني العظيم من الضفيرة العنقية ويطلب فرعا للبطن الخلفي من العضلة ذات البطنين والعضلة الابرية اللامية بقرب الحنجمة (صفحة ٤٤٥) ويشاهد امتداد الشريان الصدغي السطحي من السباتي الظاهر . وفي تشريح ما بقي من الغدة النكفية يُبحث عن وضع الغدة المذكورة ومجاورتها (صفحة ٥٢٩) وفي اثناء هذا التشريح لينتبه التلميذ الى اللقافة الفاصلة بين الغدة النكفية والغدة تحت الفك وهي قطعة من اللقافة العنقية مختلطة بالرباط الابري الفكي (صفحة ١٩٠) اخيراً يُنظَّف الغضروفان الجفنيان والغضاريف الانفية وتراجع دراستها (صفحة ٥١٣ و ٥٠٠)

٦. التشريح الغائر للوجه . — يُبحث عن العضلة المضغية والشريان والعصب اللذين ياتيان من الشرم السيني ويتوزعان في وجهها الباطن (صفحة ٦٢) وتُعزَل اللقافة الصدغية ويطلب الفرع الحجاجي من العصب الفكي العلوي بين طبقتيها (صفحة ٤٣٦) ثم يُقَطَّع القوس الزوجي بالمنشار والمقرض العظمي من الانسية والوحشية بحيث يتضمن القطع المذكور منشا العضلة المضغية الذي يُقَلَّب نحو الاسفل والخلف مع المحافظة على العصب والشريان المضغيين . ثم يُقَطَّع التتو المنقاري بالمنشار والمقرض قطعاً عمودياً وقطعاً افقياً الى الاسفل ما امكن من غير ان يصاب العصب المضغي الملامس للعضلة الصدغية . ويُقَلَّب التتو المنقاري والعضلة الصدغية المندغمة فيه الى الاعلى ويُقَطَّع عنق الفك اسفل التتو اللقي بقليل ويُقَطَّع من فرع الفك ما امكن من غير ان يوذى الشريان والعصب السنيان السفليان اللذان يدخلان الثقب . ثم يكشف الشريان الفكي

هذين الوريدين (صفحة ٢٥٩ و ٢٨١) وتُكشَفُ فروع الشريان تحت الترقوة وهي الشريان الفقري والشريان الثديي الباطن والمحور الدرقي الذي ينشأ منه الدرقي السفلي مع فرعه العنقي الصاعد والشريان اعلى اللوح والعنقي المستعرض غالباً الذي ينقسم الى العنقي السطحي واللوي الخلفي. واخيراً يشرح الشريان العنقي الغائر والعلوي بين الاضلاع اللذان ينشآن مجذع مشترك او كل منهما على حدته (صفحة ٢٠٨) وكثيراً ما ينشأ الشريان اللوي الخلفي من القسم الثالث او للشريان تحت الترقوة. ويشرح جذع العصب السمباتوي وفروعه القليلة الثلاثة وفروعه الآخر (صفحة ٢٨٤) ويبحث عن العصب الخنجري الرابع الناشيء من الرئوي المعدي بين المريء والقصبه ويستقصي الى الخنجره (صفحة ٤٥٠)

٥. التشريح السطحي للوجه. - في تشريح هذه الجهة يجب ان يتوافق المشرحان على اظهار العضلات السطحية في الجانب الواحد من الوجه بقطع النظر عن الاوعية الدموية والاعصاب الأريسة منها. واما في الجانب الآخر فينظران الى الاوعية والاعصاب خاصة ولولزم هناك بعض العضلات لاجل هذا المقصد. فان لم يتوافقا ليظهر كل منهما ما يمكن من العضلات اولاً ثم الاجزاء الاخر

لاجل اظهار عضلات الوجه يلام الشق السابق من جذر الانف الى راسه ومنه الى الشفة العليا في الخط المتوسط. ويشق شق اخر من الشفة العليا على حافتها الى زاوية الفم ومنها عرضاً للوجه الى زاوية الفك وشق ثالث الى مقدم الاذن من الشق العرضي العلوي الى زاوية الفك. فالشقوق المذكورة تتضمن قطعة مربعة الشكل تسلخ الى الناحية المرسومة في شكل ٢٥٨ باتتياه شديد لثلاث ترفع معها العضلات المتصلة بالجلد التصاقاً شديداً. والاصوب ان يبدأ بكشف العضلة المحيطة الجفنية بان يسلخ الجلد من محيط الجفنين الى حافتها ثم يقطع عند الحافة (صفحة ١٧٨) ثم تكشف العضلات التي بين العين والانف والشفة العليا واخصها الضاغطة للانف والرافعة للشفة العليا وجناح الانف والرافعة للشفة العليا والزوجيتان والغائرة منها المجدعة للحاجب والرافعة لزاوية الفم والهرمية الانفية الممتدة من الجبهة والممددة للانف. وتشاهد اسفل الانف الرافعة للذقن والحافضة للشفة السفلى والحافضة لزاوية الفم

ولاجل اظهار اعصاب الوجه واوعيته الدموية يعكس الجلد كما ذكر آنفاً اي من الخط المتوسط الى الوحشية. ثم ينظف سطح الغدة النكفية وتطلب فروع العصب الوجهي وهي نافذة من اسفل حافتها العليا والمقدمة (صفحة ٤٤٢) ثم تكشف قناة الغدة المذكورة والشريان الوجهي المستعرض

٤. المثلث المقدم والاجزاء الغائرة للعنق. - تُشرح اللقافة الغائرة والعضلتان القصية اللامية والدرقية اللامية في الخط المتوسط بين الحجرة والقص لاجل اظهار مجاورات القصة ولتأمل خصوصاً بوضع الشريان اللا اسم له والشريانين السباتيين الاصليين والجسم الدرقي والوريدين الدرقيين السفليين. ثم تُنظف القصة الحلمية والقصة اللامية والقصة الدرقية والبطن المقدم للكثفية اللامية ويعرَى العصب التاسع النازل الموضوع الى مقدم عمد الاوعية الكبيرة وفروعه الثلاثة الى العضلات الثلاث المذكورة (صفحة ٤٥٢). ويفتح غمد الاوعية ويكشف الجزء العلوي للسباتي الاصلي والعصب الرئوي المعدي والوريد الوداجي الباطن الى جانبه ولتأمل بحمل تشعب الشريان المذكور الى السباتي الظاهر والسباتي الباطن ولينبع اولها الى الغدة النكفية. وتنظف العضلة ذات البطنين والابرية اللامية وتكشف هذه الاجزاء في المثلث تحت الفك وهي الجزء السطحي للغدة تحت الفك والشريان تحت الذقن الناشئ من الوجهي والعضلة الضرسية اللامية وعصمها الآتي من السني السفلي (صفحة ١٩٤) ولتأمل بالعصب تحت اللسان وهو بقرب العضلة الابرية اللامية ويشرح فرعه للعضلة الدرقية اللامية (صفحة ٤٥٢)

وتقطع العضلة القصية الحلمية اسفل طرفها العلوي بنحو ثلاثة قراريط ويشرح جزءها العلوي الى العظم وانما يُجذَر من قطع العصب الشوكي الاضافي الذي يتقبها. ثم تقطع القصة اللامية والقصة الدرقية بقرب طرفها السفلي ويشرح الجسم الدرقي ويتأمل بشكله ومجاوراته. ثم يلتفت المشرح الى فروع الشريان السباتي الظاهر فيشرح اولاً الشريان الدرقي العلوي وينتبه الى فرعه القصي الحلمي الذي قطع وفروعه الباقية وهي اللامي والحجري والحلقي الدرقي ثم بداءة الشريان البلعومي الصاعد والشريان الموخري الى ميزابه في العظم الصدغي والشريان الاذني الخلفي والشريان اللساني الى حافة العضلة اللامية اللسانية والشريان الوجهي الى الفك السفلي (صفحة ٢٨٣) ويعرَى العصب الرئوي المعدي الى ما يمكن من الاعلى ويتبع فرعيه الحجري العلوي والحجري الظاهر (صفحة ٤٥٠)

واما في الجزء السفلي للعنق فينظر الى الاقسام الثلاثة للشريان تحت الترقوة والى مجاوراته ومجاورات الشريانين السباتيين الاصليين في قسمها الاول بالنظر الى اختلافها في الجانبين الايمن والايسر (صفحة ٢٧٩) ثم يشرح الوريدان الوداجي الباطن وتحت الترقوة مع الفروع التي تصب فيها ومن الجانب الايسر الجزء المتقوس من القناة الصدرية التي تصب في زاوية ملتقى

٣. الجهة السطحية والمثلث الخلفي للعنق. - توضع قرمة تحت موخر العنق ويدر الوجه الى الجانب المخالف للذي يراد تشرجه بحيث تنوتر الاجزاء ويشق شقان مستعرضان احدهما من الذقن علي حافة الفك السفلي الى التواحلبي والاخر من النص علي حافة الترقوة الى الاخرم ويوصل الشقان بشق منحرف من التواحلبي علي مسير العضلة النصية الحلمية الى النص. ثم يسليح الجلد علي الكيفية المرسومة في شكل ٢٥٨ فتظهر اللفافة السطحية التي يعسر فصلها عن العضلة الجلدية الا انه في تشرح الجلد يجب الانتباه الشديد من هتك الياف العضلة المذكورة. ثم يبحث عن العضلة الجلدية (صفحة ١٩٠) وتُعكس نحو الاعلي ويُعرى الوريدان الوداجي الظاهر والمقدم واعصاب الضفيرة العنقية السطحية وهي من الاعلي العنقي السطحي والاذني العظيم والموخرى الصغير ومن الاسفل الاعصاب النصية والترقوة والاخرمية وجميعها اعصاب جلدية نافذة من الباطن عند الحافة الخلفية للقصبة الحلمية (صفحة ٤٥٧) وتُدرس ايضاً اللفافة العنقية الغائرة (صفحة ١٩٠)

ثم يشق المشرح الشحم عند اسفل الحافة الخلفية للعضلة القصية الحلمية ويكشف العضلة الكتفية اللامية التي ينفذ بطنها الخلفي من وراء القصية الحلمية فيكون الحد العلوي للمثلث تحت الترقوة. ثم ينزع الشحم والغدد الليمفاوية من المثلث المذكور الى ان تظهر العضلة الاخمعية المقدمة فتكون له دليلاً الى القسم الثالث من الشريان والوريد تحت الترقوة والاجذاع العليا للضفيرة العصبية العضدية (صفحة ٢٠١ و ٤٦٠) وبينما يكون المشرح مشغلاً بهذا الخلاء يرى العصب الحجابي نازلاً علي مقدم العضلة الاخمعية المقدمة اذا كانت النصية الحلمية ضيقة ويرى ان العصب اعلي اللوح والفرع الصغير الذي يذهب الى العضلة تحت الترقوة ناشئين من الجذع المكوّن من العصب الخامس والسادس العنقيين ويشاهد الشريان العنقي المستعرض والشريان اعلي اللوح وبعض الاخمعيتين المتوسطة والخلفية والسلسلة السفلى من الغدد الليمفاوية الموضوعه بجانب الحافة الخلفية للقصبة الحلمية (صفحة ٤٦١ و ٢٨٢) ثم ينظف القسم العلوي من المثلث الخلفي فتظهر ارتباطات الاخمعيات والطحالية العنقية والرافعة لزاوية اللوح وتشاهد الضفيرة العنقية ومنشا العصب الحجابي (صفحة ٤٥٨) والعصب الشوكي الاضافي نافذاً من العضلة القصية الحلمية ومتواصلاً بالضفيرة العنقية قبل غيابه اسفل المربعة المنحرفة (صفحة ٤٥١) ثم تنظف الاعصاب العنقية السبعة السفلى والظهري الاول وتستقصي الى نفوذها من الثقوب بين الفقرات ويطلب العصب الصدري الخلفي وهو التنفسي الظاهر (صفحة ٤٦٠)

للفصين المقدمين من الخ وناشئاً بثلاثة اصول. ويشاهد العصب الثاني والرابع سائرين حول ساق الخ والامتدادان البصريان من الاجسام الرباعية والجسمان المعقدان والعصب الرابع من صام فيوسنس. والزوج الثالث على الحافة الانسية لساق الخ والزوج الخامس نافذ باصلين من مقدم جسر فروليوس والزوج السادس الى مقدم الهرمين المقدمين والعصب السابع والثامن وهما الصلب واللين او الوجهي والسمعي في الزاوية التي بين الخناص المستطيل وجسر فروليوس والخنخخ والعصب التاسع وهو اللساني البلعومي والعاشر وهو الرئوي المعدي والحادي عشر وهو الشوكي الاضافي الى مقدم الحبل الشوكي والثاني عشر وهو تحت اللسان الى مقدم الجسم الزيتوني والعصب تحت الموخري وهو العنقي الاول الشوكي اسفل العصب تحت اللسان

وبعد درس اصول الاعصاب الحجمية يفصل الخنخخ من الابنية التي يتصل بها بان يُقَطَّع سوقه العلويتان اللتان توصلانه بالخ والمتوسطتان اللتان توصلانه بالجسر والسفليتان اللتان توصلانه بالخناص المستطيل. وينظر الى الوضع العام لتلافيفه والزائدة الدودية العليا والسفلى. ثم يُقَطَّع من الاعلى الى الاسفل لاجل اظهار شجرة الحيوة والمركز السنجابي وهو الجسم المسنن. ويقطع الجسر لاطهار اليافه المستعرضة والطولية والخنخخ المستطيل لاطهار الجسم الزيتوني المسنن وساق الخ لاطهار الحبل الاسود

ثم يُبْحَثُ عن الجيوب الوريدية والشرايين والاعصاب التي في قاعدة الحجمية فيستقصى الجيب الطولي العلوي والطولي السفلي والمستقيم (الذي يصب فيه وريدا جالينوس) والجيب الموخري الى مجتمع هيروفيلوس ويستقصى الجيبان الجانبيان من المجتمع المذكور الى التقيين الوداجيين. ثم يشق الجيبان الكهفيان اللذان يتصلان بواسطة الجيب الحلقى وكذلك الجيوب الحجرية العلويان والسفليان والجيب المستعرض (صفحة ٢٦٢) ثم يبحث عن وضع الاعصاب والشريان السباتي الباطن بالنسبة الى الجيب الكهفي وهوان العصب الثالث والرابع والقسم العيني للخامس موضوعة ضمن الام الجافية في الجدار الوحشي للجيب الكهفي وذلك تبعاً لترتيب عددها من الاعلى الى الاسفل ومن الانسية الى الوحشية والشريان السباتي الباطن موضوع الى الانسية من الجيب بجانب السرج التركي والى الوحشية منه العصب السادس. وعقدة كاسيريوس موضوعة على الوجه المقدم للقسم الحجري من العظم الصدغي بقرب قته. ثم ترد الاعصاب الى محالها وتغطي باللفظن الغموس بالالكول لكي تستقصى بعد ذلك الى المقدم في تشرح الحجاج. ويرفع الجسم الخلامي من مقره في السرج التركي ويبحث عن شكله وبنائه (صفحة ٢١٢)

من المججمة

واما ما بقي من الدماغ فيخرج من المججمة بان تقطع الخيمة من الجانبين وينهض المخيخ ويقطع الحبل الشوكي والشريانان الفقريان الى ما يمكن من الاسفل والعصبان الشوكيان الاضافيان والعصبان تحت المؤخري ثم الاعصاب المججمية على ترتيبها من المقدم الى الخلف مع الفمع والشريانين السباتيين الباطنين. فاذا اخرج الدماغ وضع على صفحة مسطحة وقاعدته نحو الاعلى. وان اخير اخراج الدماغ سليماً بجمته فيتم ذلك على الكيفية المذكورة آنفاً او تلقى الجمثة على الظهر وينهض الفصان المقدمان للسخ برفق وترفع البصلتان الشميتان عن وجه الصفيحة الغربالية ثم يقطع العصبان البصريان والشريانان السباتيان الباطنان والقمع والزوج الثالث من الاعصاب من المقدم الى المؤخر ثم يقطع اتصال الخيمة المخيخية من الجانبين لكي يمكن قطع الزوج الرابع من الاعصاب من غير ان يتمزق. ثم يكمل قطع الخيمة ويقطع ما بقي من الاعصاب مع الشريانين الفقريين والحبل الشوكي

وفي درس قاعدة الدماغ يجب الالتفات اولاً الى توزيع الشرايين واتحادها في دائرة وليس (صفحة ٢٠٥) ثم تقطع وتعرى اجزاء العنكبوتية والامر الحنونة القليلة الالتصاق الآ عند الزاوية التي بين المخيخ والنخاع المستطيل ويبحث عن الاجزاء الرئيسة التي تشاهد في قاعدة الدماغ وهي: فرجة سلفيوس الفاصلة بين الفص المقدم والفص الخلفي والمتضمنة التلافيف المحجوبة اي جزيرة ريل. وعند بداء الفرجة الخلاء المثقوب المقدم وينتهي فيها الجزء السفلي من الفرجة المستعرضة للسخ. وساقا المخ نافذان من مقدم جسر قروليموس والطرف المقدم للجسم الصلب مستقر في قعر الفرجة الطولية واسفله من المقدم الى المؤخر في الخط المتوسط الصفيحة الرمادية والمجمع البصري والحلبة الرمادية والقمع والجسمان الابيضان والخلاء المثقوب الخلفي (صفحة ٤١١) واما الاجزاء الرئيسة التي ينظر اليها في النخاع المستطيل فهي الهرمان المتقدمان وتصلب اليافهما والجسمان الزيتونيان والجسمان الحليليان ومن الخلف الهرمان الخلفيان وقلم الكتابة مع امتداده الى الاسفل الى الاثر الدقيق للقناة المركزية في الحبل الشوكي (صفحة ٤٠٣). والبطين الرابع واقع بين النخاع المستطيل والمخيخ ويشاهد في جانبيه شرشرة ام الحنونة التي يقال لها الضفيرة المشيمية للبطين الرابع وعند جانبي النخاع المستطيل فصيصان من المخيخ هما الجزازتان ووراءهما اللوزتان. واعلى النخاع المستطيل الاجزاء الخاصة بالفص المتوسط للمخيخ التي سيأتي الكلام عليها

ثم يبحث عن اصول الاعصاب المججمية. فيشاهد الزوج الاول وهو الشهي ملقياً على الوجه السفلي

والام الخنونة والاوردة الدماغية التي تصب في الجيب الطولي العلوي . واذا قطعت الاوردة المذكورة شوهد المنجل المنخي غائصاً بين النصفين الكرويين . ثم يقطع المنجل المنخي عند ارتباطه بعرف الديك ويقرب الى الخلف (صفحة ٤٠٤)

وللمشرح الان طريقتان يخار ايها شاء فله ان يرفع الدماغ من الجسد او يقيه في وضعه الطبيعي ويبحث فيه حتى البطينات . فان اخنار الطريقة الثانية وهي الاجود ينظر الى تلافيف ظاهر الدماغ والى انحناء الشريانين الخيين المتقدمين نحو الخلف والخلفيين نحو المقدم . ثم يقطع النصفان الكرويان الى مساحة الجسم الصلب وليشاهد التمهيدان امتداده وخطوطه العرضية وقيدته وخطوطه الطولية (صفحة ٤١٥) ثم يُشق جانبا الجسم الصلب ليظهر كل من البطينين الجانبيين على حدته بحيث يُكشَف تجويفهما مع القرن المقدم والقرن الخلفي والاجزاء الموضوعة في ارضها . ثم يقطع الجسم الصلب بقرب مقدمه ويرفع بالانتباه ويُقَصِّص بالمتص الفاصل اللامع الذي يفصل البطينين الجانبيين وينظر الى البطين الخامس الواقع بين طبقتيه . وحينئذٍ يخلط البطينان الجانبيان فتشاهد الابنية المكونة لارضها وهي الجسمان المضلعان والرباطتان الهاليتان وبعض السريرين البصريين والصفيرة المشيمية والوجه العلوي للقبوة وثقب منرو والقرن المقدم والقرن الخلفي والقرن الكبشي الاصغر . ثم يُكشَف القرن النازل من الجانب الواحد فقط بان يقطع الجوهر الدماغى الى الاعلى والوحشية منه فيشاهد فيه القرن الكبشي الاكبر والمخرب الكبشي والجسم المشرشر والنفافة المسننة

واما القبوة فتقطع اعلى ثقب منرو وتُعكس الى الوراء فيظهر وجهها السفلي والوجه العلوي للشقة المتوسطة . ثم تقص اتصالات الشقة من المقدم وتعكس الى الوراء فيظهر البطين الثالث غير انه يجب الحذر في ذلك من رفع الغدة الصنوبرية من مكانها لانها ملتصقة بالوجه السفلي للشقة عند مؤخره . واما الاشياء التي تشاهد في البطين الثالث وبقربه والتي يُبحث عنها الان فهي السريران البصريان والمجامع الصغيرة الثلاثة اي المقدم والمتوسط والخلفي والجسم الصنوبري وساقاه والاجسام الرباعية والفتحة المقدمة للمسلك المستطرق بين البطين الثالث والبطين الرابع وتستقصى ايضاً الساقان المقدمتان للقبوة ما امكن نحو الاسفل الى الجسمين الابيضين . ثم تُعاد الشقة الى مكانها وتُفتح الفرجة المستعرضة للتحق بقطع ما بقي من الجسم الصلب والقبوة في الخط المتوسط وتستقصى على جميع طولها الى طرف القرن النازل فيشاهد وريدا جالينوس مخترقين الشقة الى حافة الخيمة واذا قطعت الشقة شوهد صمام قيوسنس ومنشا العصب الرابع ومنشا الامتداد البصري . واذا لم يكن منظر هذه الاجزاء واضحة فيعاد النظر اليها بعد رفع الدماغ

التام على جميع الاجزاء التي يتضمنها. واما المتدي فلا يلتفت الى التفاصيل الدقيقة التي منها ما لا يشاهد جيداً الا في بعض الجثث

١. جلد الخوذة. - يُجلى الرأس وتوضع قرمة تحت قفا العنق ثم يشقّ الجلد شقاً عمودياً من جذر الانف من المقدم الى الحدبة المؤخرية من المؤخر وشقاً ثانياً افقياً ممتداً على الجبهة وحول جانب الرأس من الطرف المقدم للشق الاول الى طرفه المؤخر. ثم يسلمح الجلد عن العضلة المؤخرية الجبهية وصلاحها المتوسط بين قطعتيها العضليتين على ما في الرسم . ولما كان التصاق العضلة المذكورة بالجلد شديداً وجب الحذر الكلي من رفعها معه . والفواصل بينها الذي يكون دليلاً للمشرح هو الوعية والاعصاب

واما الاجزاء التي يبحث عنها في مؤخر الخوذة فهي الشريان والوريد المؤخريان والعصب المؤخري الكبير الذي يتقب العضلة المضاعفة والمربعة المنخرقة (صفحة ٢٨٥ و٤٥٩) والعصب المؤخري الصغير الذي يسير الى الاعلى بجانب الحافة الخلفية للعضلة القصية الحملية (صفحة ٤٥٧) واسفل ما ذكر القطعة المؤخرية للعضلة المؤخرية الجبهية التي تسير نحو الاعلى من الحظ المنخني العلوي للعظم المؤخري. ووراء الاذن العضلة الاذنية الخلفية والشريان والعصب الاذنيان الخلفيان (صفحة ٢٨٦ و٤٤٥) واعلى الاذن العضلة الاذنية العليا والى مقدم الاذن العضلة الاذنية المقدمة والشريان والوريد الصدغيان والفرع الصدغي الصغير من القسم الثالث للعصب الخامس (صفحة ٢٨٧ و٤٤٠) وفي الجبهة القطعة الجبهية للعضلة المؤخرية الجبهية والوريد الجبهي والشريانان اعلى الحجاج والجبهي والعضبان اعلى الحجاج واعلى البكرة (صفحة ٢٩٧ و٤٢٥)

٢. باطن الخوذة والدماع. - بعد التشرح السابق تُفتح الخوذة ويُخرج الدماغ واغشيته ويشرح باطن قاعدة الجمجمة لاجل اظهار الجيوب والوعية الدموية والاعصاب وقد يُشرح التجويف الحجاجي من الاعلى . فلاجل رفع قبوة الجمجمة يسلمح الصفاق والجزء العلوي للعضلة المؤخرية الجبهية ويُجرّ المشروط من نقطة اعلى الحدبة المؤخرية بقليل الى الجبهة اعلى الحجاجين بنحو قيراط ثم تُنشر الصفيحة الظاهرة للجمجمة دون الباطنة . ثم تُفصل الصفيحة الباطنة بالمطرقة والازميل وتُفعل قبوة الجمجمة عن ام الجافية المبطنة لها . ولينأمل المشرح الان بالوجه الظاهر للام الجافية ثم يشقّ الجيب الطولي العلوي ويتأمل به (صفحة ٢٦١) ثم يقطع الام الجافية على مساحة الحافة المنشورة للخوذة الا عند الحظ المتوسط وينقلها الى الاعلى فتظهر له العنكبوتية

٥ . ينبغي للمبتدئين ان يبدأوا بتشرح احد الطرفين اي العلوي والسفلي ثم الثاني بعد ان يكونوا قد درسوا جيداً العظام والمفاصل ويكفيهم في تشرحهم الاول ان يظهروا العضلات والشرايين والاوردة والاعصاب الكبيرة ثم في تشرحهم بعد ذلك يظهروا جميع الاجزاء

٦ . في تشرح الاطراف لا تقع معارضة بين المشرحين للجانبين . واما في تشرح الراس والعنق والصدر والبطن فلا بد من الموافقة بين التلاميذ الذين يشتغلون في الجانبين وذلك على الكيفية الآتية : اولاً ليدرس التلميذ ان الاحشاء سويةً ثانياً اذا لم يمكنها العمل في الوقت الواحد فليقرأ احدها للاخر وهو يشرح اوليعة بطريقتي اخرى . ثالثاً قد يتوافقان على تشرحين متميزين للجانبين فيظهر مثلاً احدها العضلات في الجانب الواحد ويظهر الاخر الاوعية والاعصاب في الجانب الثاني

تشرح الراس والعنق

كل من جانبي الراس والعنق يكون قعماً لتلميذ واحد . الحد الفاصل بينهما الخط المتوسط والحد الفاصل السفلي خط يمتد من القص على الترقوة الى التواخرم ثم منه الى التواشوكي



شكل ٢٥٨

للفقرة العنقية الثالثة . ويجب على التلميذ ان يشرح هذا القسم اكثر من مرة لاجل الوقوف

شكل ٢٥٧ تشرح الراس والوجه والعنق ١ تشرح جلد الراس ٢ و٣ تشرح الجهة الاذنية ٤ و٥ و٦ تشرح الوجه ٧ تشرح العنق

الفصل الثاني عشر

في التشريح العملي

يُراد بالتشريح العملي تشريح الجثث وهو الصناعة التي لا يتأتى للتلميذ تحصيل علم التشريح كما ينبغي بدونها. وقد وُضع هذا الفصل ليكون له دليلاً بسيطاً مختصراً على اظهار ابنية الجسد حتى اذا تتبع الاعضاء والاجزاء على الترتيب الذي سنذكره نال منها من الفائدة ما امكن من غير ان يقع معارضة بين المشرحين للجنة الواحدة

١. قد اختلفت المدارس من جهة كيفية تقسيم الجثة بين التلاميذ المشرحين. واصوبها ان تُقسَم الى عشرة اقسام خمسة لكلٍ من شطري الجسد وهي جانباً الراس والعنق وجانباً الصدر وجانباً البطن والاطراف الاربعة. غير ان الاقسام المذكورة تبقى متصلة بعضها ببعض الى ان يبلغ التشريح درجة من العمل تمكن من انفصالها. والحدود المعيّنة لها تمنع على جانب عظيم حدوث المعارضة بين المشرّحين


٢. ان كانت الجثة جثة ذكر يُعيّن اليوم الاول لتشريح العجان ثم تُلقَى في بداءة اليوم الثاني على البطن وتشرّح الاجزاء الخلفية ثم نُقلَب على الظهر وتشرّح الاجزاء المقدمة على ما ياتي

٣. يبدأ بتشريح الراس والعنق والاطراف يوم وضع الجثة على البطن وتشرّح البطن يوم قلبها على الظهر. ولا يُفتح الصدر الا عند فصل الطرفين العلويين ولا تُفصل الاطراف الا بعد تشريح الاجزاء التي توصلها بالجذع واطلاع الذين خصّ بهم الراس والعنق والبطن على التشريح الجراحي للشريان تحت الترقوة وللنقرة. واما ما بقي من تشريح الاقسام فيجري على ما سيذكر من جهة كل قسم مفرد.

٤. لاجل المعرفة التامة بعلم التشريح ينبغي للتلميذ ان يشرّح بعض الاقسام مرتين ولا سيما الراس والعنق. وذلك لان بعض الاعضاء الدقيقة قد تغيب عنه في المرة الاولى فيحتاج الى تشريح ثانٍ لاجل اظهارها ودراستها

المجانِب المخالف. ومنها زائدة اخرى تنعكس حول الطرف السفلي للمستقيم. واما الرافعة للاست
فتنشا من نقطة انفصال اللفافة الحوضية بحيث تنزل الطبقة المحشوية على الوجه العلوي للعضلة
المذكورة وتلتصق بها التصاقاً شديداً. وتغطي وجهها السفلي طبقة رقيقة ناشئة من اللفافة السادة
هي اللفافة الوركية المستقيمة التي مرّ ذكرها. وفي الاناث يتقب المهبّل اللفافة المستقيمة الثانية
ويقبل زائدة منها

الارتفاق العاني الى الشوكة الوركية رباطة غليظة لونها يميل الى البياض تدل على ارتباط الرافعة للاست باللفافة الحوضية ومنها تنفصل هذه اللفافة الى طبقتين وهما السادة والمستقيمة الثانية فاللفافة السادة تنزل من جانب الحوض وتغطي العضلة السادة الباطنة فهي امتداد اللفافة الحوضية اسفل الخط الابيض المذكور آنفاً وترتبط بالقوس العاني وبحافة الرباط العظيم العجزي الوريكي. وهذه اللفافة تكون قناةً لمرور الاوعية الاستحيائية والعصب الاستحيائي الى المقدم نحو العجان وتتصل بغشاء رقيق يغطي الوجه العجاني للرافعة للاست ويقال للغشاء المذكور اللفافة الوركية المستقيمة



شكل ٢٥٧


واللفافة المستقيمة الثانية (وهي الطبقة المحشوية لللفافة الحوضية) تنزل الى الحوض على الوجه العلوي للرافعة للاست وتغلف البروستاتا والمثانة والمستقيم. وتفصيل انبساطها هو انه يمتد من الوجه الباطن للارتفاق العاني رباط قصير مستدير الى الوجه العلوي للبروستاتا وعنق المثانة هو الرباط العاني البروستاتي اوها الرباطان المقدمان الصحيجان للمثانة. ومن الجانبيين تتصل هذه اللفافة بجانبي البروستاتا فتغلفها ثم تمتد الى الاعلى على وجه المثانة فتكون الرباطين الجانبيين الصحيجين لها. ومنها زائدة تغلف الحويصلة المنوية ثم تذهب عرضاً بين المثانة والمستقيم وتتصل برفيقتها من

شكل ٢٥٧ منظر جانبي لاجزاء الحوض لاجل اظهار توزيع اللفافة الحوضية ١ الارتفاق العاني ٢ المثانة ٣ التنية المستقيمة الثانية من البريتون التي تدير من الوجه المقدم للمستقيم الى موخر المثانة ثم من قمة المثانة الى الجدران البطنية ٤ الحالب ٥ القناة الناقلة السائرة وراء الحالب ٦ الحويصلة المنوية ٧ و٨ و٩ الغدة البروستاتا مقطوعة طولاً ٩ القسم البروستاتي للجعري ١٠ قسمة الغشائي الذي يعانقه العضلة الضاغطة للجعري ١١ بداية الجسم الاسفنجي للخصيب وهي البصلة ١٢ الرباطان المقدمان للمثانة ١٣ اللفافة الحوضية منعكسة على المستقيم ١٤ خلاص بين اللفافة الحوضية والرباط المثلث تشغله ضفيرة وريدية ١٥ الرباط المثلث ١٦ غدة كوبر ١٧ اللفافة العجانية السطوية صاعدة الى مقدم جذر الخصيب لتتباط بمنسلخ الصفن (١٨) ١٩ اللفافة الممتدة الى المستقيم ٢٠ الجزء السفلي للرافعة للاست ٢١ طبقة من اللفافة موضوعة بين المثانة والمستقيم

الشريان البصلي من الاستحيائي حذاء الحدبة الوركية وعند ذلك قد يُجرَح في سيره الى المقدم نحو البصلة مدة العمل. وقد يُجرَح الاستحيائي الاضافي بقرب الحافة الخلفية للبروستتا اذا بضعت على جميع طولها. ثم ان الاوردة البروستتية كبيرة الحجم ولا سيما في المتقدمين في السن فاذا قُطعت ادَّت الى نزيف شاق

في اللفافة الحوضية.

اللفافة الحوضية غشاء رقيق مبطن لجميع التجويف الحوضي موضوع اسفل البريتون ومتصل



شكل ٢٥٦

باللفافة المستعرضة واللفافة الحرقفية. وهي مرتبطة بشفة الحوض الى مسافة قصيرة وبالوجه الباطن للعظم حول ارتباط العضلة السادة الباطنة وعند الحافة الخلفية للعضلة المذكورة تدوم الى الورا على هيئة غشاء رقيق جداً الى مقدم العضلة الهرمية والاعصاب العجزية خلف فروع الشريان والوريد الحرقفيين الباطنين التي تنقبها. ومن المقدم تتبع ارتباط العضلة السادة الباطنة بالعظم ثم تنفوس اسفل الاوعية السادة فتحوّل الشرم الساد الى قناة ثم ترتبط عند مقدم الحوض بالجزء السفلي للارتفاق العاني وتصل اسفله باللفافة التي على الجانب الخالف فتسد الجزء المقدم لمخرج الحوض مختلطةً بالطبقة الخلفية للرباط المثلث. ويشاهد على مساحة خط ممتد من اسفل

شكل ٢٥٦ قطع عرضي عمودي للحوض لاجل اظهار توزيع اللفافة الحوضية ١ المثانة ٢ الحويصلة المنوية من الجانب الواحد مقطوعة ٣ المستقيم ٤ اللفافة الحرقفية التي تغلف العضلتين الحرقفية والصلبية (٥) وتكون غمدًا للشريان والوريد الحرقفيين الظاهرين (٦) ٧ العصب الفخذي المقدم الذي لا يدخل الغمد المذكور ٨ اللفافة الحوضية ٩ طبقتها الصاعدة التي تكون الرباط الجانبي المثانة من الجانب الواحد وغمدًا للفتحة الوريدية المثانة ١٠ طبقة من اللفافة المذكورة سائرة بين المثانة والمستقيم ١١ طبقة سائرة حول المستقيم ١٢ العضلة الرافعة للاست ١٣ العضلة السادة الباطنة مغطاة باللفافة السادة التي تكون أيضاً غمدًا للاوعية والاعصاب الاستحيائية الباطنة (١٤) ١٥ اللفافة العجانبة التي تغطي الوجه السفلي للرافعة للاست. وقد وضع الرقبان ١٤ و١٥ في الحفرة الوركية المستقيمة

البضع نحو الوحشية والخلف . وعلى ذلك يُشقَّ الجزء الغشائي للمجرى وبعض الفص الايسر للبروستنا الى مسافة نحو قيراط . ثم يُخْرَج الموضع من المرح وتُدخَل سبابة اليد اليسرى تابعة المجلس الى باطن المثانة وحينئذٍ يُخْرَج المجلس من المثانة وتبقى السبابة فاذا شعر الجراح بموضع الحصاة ادخل الملقط على الاصبع الى المثانة ولكن ان كانت الحصاة كبيرة جداً يُشْرَم الجانب الخالف للبروستنا قبل ادخال الملقط . ثم يُخْرَج الاصبع ويُفْع الملقط وتُقَبَض الحصاة وتُسَخَّرج استخراجه بطيئاً حذرًا بمركات متموجة

واما الاجزاء التي تقطع مدة العمل فهي الجلد واللفافة السطحية والاوعية والعصب الباسورية الظاهرة والالياف الخلفية للمعجلة للبول والعضلة العجانبة المستعرضة والشريان العجاني المستعرض واللفافة العجانبة الغائرة والالياف المقدمة للرافعة للاست وبعض الضاغطة للمجرى والجزء الغشائي والجزء البروستي للمجرى وبعض غدة البروستنا وربما قُطِع ايضاً الاوعية العجانبة السطحية

في الاجزاء التي يجب اجتنابها مدة العمل . ان كانت البضعات الاول قريبة الى الخط المتوسط اكثر ما ينبغي يُخْرَج البصلة او المستقيم . وان كانت الى الوحشية اكثر ما ينبغي قد يُقَطَع الشريان الاستيمائي في سيره الى الاعلى بجانب الحافة الانسية للقوس العاني . وان كانت الى المقدم اكثر ما ينبغي يُقَطَع الشريان البصلي وان اُدِمَّت الى الخلف اكثر ما يجب نُقَطَع البروستنا وعنق المثانة على جميع طولها فيجري البول لا الى الظاهر ولكن الى الباطن وراء اللفافة المحوضية الى النسيج الخلوي الرخو الكائن بين المثانة والمستقيم فيكون ذلك سبباً لحدوث الالتهاب في النسيج المذكور وامتداده الى البريتون نظراً لمجاورة الثنية البريتونية المستقيمة المثانية خلافاً للبضع الذي يكون الى مقدم قاعدة البروستنا فان البول حينئذٍ يجد مصرفاً الى الظاهر ويقع الأمن من تخلله الخطر

وفي اثناء العمل لا يجوز على الاطلاق ان يُخْرَج المجلس من المثانة قبل ادخال الاصبع الى باطنها . لان اذا كان البضع في البروستنا وعنق المثانة اصغراً ما ينبغي تعسر ادخال المجلس بعد اخراجه ومحاولة ادخال الاصبع عند ذلك في الاولاد الذين ارتباط المثانة فيهم بالاجزاء المجاورة رخو جداً يُوَدِّي الى دفع المثانة نحو الاعلى اية نحو البطن بحيث لا يتمكن الجراح من الوصول اليها . وهذه الحادثة كثيرة الوقوع فيرتبك الجراح وتنتهي بعدم نجاح العمل ويجب ان يُذَكَّر ايضاً ان سير شرايين العجان قد يكون على غير العادة . فقد ينشا احياناً

القصير مستعرض عند قاعدتها ولذلك يكون البضع الأطول الذي يمكن عمله من دون فصل جوهرها فصلاً كاملاً هو ما كان منحرفاً إلى الوحشية والوراء وهذا هو اتجاه البضع الذي يُستعمل في استخراج الحصاة فيندر جواز امتداده إلى أكثر من قيراط في الطول. ثم يجب التأمل في مجاورة البروستتا للمستقيم فان الجراح اذا ادخل اصبعه إلى المستقيم شعر حالاً بمجم البروستتا من جهة تعاضها او مرضٍ اخر يصيبها. وبهذه الوسطة ايضاً يستطيع ان يهدي راس الثناطير اذا تعسر ادخاله لعله مرض في الجزء الغشائي او البروستتي للجري

وإلى الوراء من البروستتا الوجه الخلفي لعنق المثانة وقاعدتها. وهناك يشاهد المثلث الظاهر للمثانة الذي تحده من المقدم البروستتا ومن الخلف الثنية المستقيمة المثانية للبريتون ومن كلا الجانبين الحويصلة المنوية والقناة الناقلة. والخلاء المثلث المذكور مستقر على المستقيم الا انه توسط بينهما اللفافة المستقيمة المثانية. ومعرفة مجاورة هذا الجزء من المثانة للمستقيم في غاية ما يكون من الاهمية للجراح. فان في احتباس البول يشاهد هذا الخلاء المثلث بارزاً إلى المستقيم إلى مسافة ثلاثة اواربعة قيراط من حافة الاست فيمكن ثقبها بسهولة من المستقيم مدة الحيوة من غير ضرر لجزء مهم ولذلك كثيراً ما يخنار بزل المثانة من القسم المذكور. ثم اذا ادخل الجراح اصبعه إلى المستقيم عرف وضع الحصاة في المثانة وحجمها وثقلها وقد يحدث في عمل استخراجها انها تكون مستقرة وراء الغدة البروستتية اذا كانت هذه الغدة متعاطلة فيمكن دفع الحصاة من موقعها بسهولة بواسطة ضغط قاعدة المثانة إلى الأعلى من المستقيم

في الاجزاء التي تتعلق بعمل استخراج الحصاة. يُعاد الرباط المثلث إلى موضعه ويُحذب المستقيم إلى المقدم بحيث يشغل مثله الطبيعي ثم يتأمل التلميذ بوضع الاجزاء المختلفة من حيث العمل الجانبي في استخراج الحصاة. ويُخنار في العمل المذكور الجانب الايسر للعجان لانه اسهل لليد اليمنى التي يشتغل بها الجراح. وطريقة ذلك انه يدخل مجس إلى المثانة ويُجرى العمل بشق اول يبدأ من مقدم الاست نحو قيراط ونصف وقليلاً إلى الجانب الايسر من القيد ويدام بانحراف نحو الخلف والوحشية إلى نقطة متوسطة بين الاست والحذبة الوركية. فالشق المذكور يبضع الجلد والنفافة السطحية والوعية والاعصاب الباسورية الظاهرة والشرياني العجانين السطحي والمستعرض. وعند ذلك تدفع سبابه اليد اليسرى في الجرح إلى الأعلى والمقدم ضاغطةً المستقيم إلى الانسية والخلف فيشعر بالمجس في الجزء الغشائي للجري ثم يثبت الاصبع المذكور على المجس وتشق الابنية التي تغطيه بحيث يكون راس الموضع متجهاً إلى ميزاب المجس نحو المثانة ويكون

الانفصال بين الطبقة السادة والطبقة المستقيمة المثانية للفاقة الحوضية . سير اليافها الى الاسفل حتى الخط المتوسط لارض الحوض فتندغم الخلفية منها بجانب قمة العصص . والتي الى مقدمها تتحد برفيقتها من الجانب المخالف فيتكوّن من الاتحاد المذكور قيد ليفي متوسط ممتد بين العصص واللاست والالياف المتوسطة تندغم بجانب المستقيم فتخلط بالياف العاصرتين . والالياف المقدمة تنزل على جانب البروستتا فتتحد بالياف عضلة الجانب المخالف وتخلط بالياف العاصرة الظاهرة والعجانية المستعرضة عند المركز الوتري للعجان . وقد تكون هذه الالياف المقدمة منفصلة عن ما بقى من العضلة . بنسج خلوي فيقال لها حينئذٍ الرافعة للبروستتا . مجاورتها . من وجهها العلوي وهو الحوضي للفاقة المستقيمة المثانية التي تفصلها عن احشاء الحوض وعن البريتون . ومن وجهها السفلي وهو العجاني تكوّن الحد الانسي للحفرة الوركية المستقيمة والوجه المذكور مغطى بكمية من الدهن وبطبقة رقيقة ممتدة من الفاقة السادة . حافتها الخلفية مخالطة بالعضلة العصصية وحافتها الامامية منفصلة عن رفيقتها من الجانب المخالف بخلاء مثلث يخرج منه المجرى في الذكور والمجرى والمهبل في الاناث وذلك من باطن الحوض الى الظاهر . عملها انها تسند الطرف السفلي للمستقيم والمهبل وتسند ايضاً المثانة مدة افراغها للبول

والعضلة العصصية موضوعة الى الوراء من سابقتها وموازية لها . وهي مثالثة الشكل تنشأ برأسها من شوكة العظم الوركى ومن الرباط العظيم العجزي الوركى وتندغم بقاعدتها في حافة العصص وفي جانب القطعة الاخيرة من العجز . وهي متصلة بالحافة الخلفية للرافعة لللاست وتسد مؤخر المخرج الحوضي . مجاورتها . من وجهها الباطن وهو الحوضي للمستقيم ومن وجهها الظاهر للرباط الصغير العجزي الوركى ومن حافتها الخلفية للهرمية . عمل العصصيتين انها ترفعان وتسندان العصص عقب دفعه الى الوراء عند النفوط او الولادة

في وضع الاحشاء عند مخرج الحوض . اذا قُطعت النقطة الوتريّة المركزية للعجان والياف الرافعة لللاست عند اتصالها بالمستقيم ورفّع المستقيم نحو العصص ظهر الوجه السفلي للبروستتا وعنق المثانة وقاعدتها والحويصلتان البنويتان والقناتان الناقلتان فالغدة البروستتا موضوعة الى مقدم عنق المثانة (ومن ذلك اسمها البروستتا اي المتقدمة) ومحيطه بالجزء البروستتي للمجرى بحيث تكون قاعدتها الى الخلف ووجهها السفلي نحو المستقيم . ويشبها في مكانها الرافعة للبروستتا والرباطان العانيان البروستتيان وتغلّفها طبقة ليفية كثيفة ممتدة من الطبقة الخلفية للفاقة العجانية الغائرة . قطرهما الطويل ممتد من الامام الى الخلف وقطرهما

فالإمامية تمتد إلى المقدم حول الجزء الغشائي للمجرى ثم تضيع على البصلة. والخلفية ناشئة من اللقافة المحوضية وتمتد إلى الوراء حول موخر الجزء الغشائي للمجرى والوجه الظاهر للبروستا. وفائدة هذه اللقافة أنها تسد قناة المجرى. وهي التي تعارض دخول الفناطير إلى المثانة إذا انحرف ولو قليلاً عن سير المجرى

ثم إذا رُفعت الطبقة الإمامية لللقافة العجانبة الغائرة ظهر بينهما وبين الطبقة الخلفية الرباط تحت العانة في الأعلى والوريد الظهرية للقبضيب والجزء الغشائي للمجرى وعضلات المجرى وغدتا كوبر وقناتها والأوعية الاستحيائية والعصب الاستحيائي وشريان البصلة وعصمها وضميرة وريدية

فالضاغطة للمجرى وهي العاصرة له عضلة محيطة بجميع طول الجزء الغشائي للمجرى مضمنة بين طبقتي اللقافة العجانبة الغائرة: تنشأ من الجزء العلوي لفرع العاني من كل من الجانبين ثم تحيط العضلتان بالمجرى من البروستا إلى البصلة وتحدان عند الوجه العلوي والسفلي للمجرى بواسطة قيد وتري

والإلياف الخلفية العضلية واقعة أسفل سابقتها ومحيطة بالجزء الغشائي للمجرى من البروستا في الخلف إلى البصلة في الإمام وهي ممتدة من الألياف الخلفية التي للمثانة وغير خاضعة للإرادة وغدتا كوبر موضوعان أسفل الجزء الغشائي للمجرى وراء البصلة وأسفل الشريان البصلي

والأوعية والأعصاب الاستحيائية موضوعة بجانب الحافة الأنسية للقوس العاني


والشريان البصلي ينشأ من الاستحيائي الباطن ويسير عرضاً إلى الأنسية بجانب قاعدة الرباط المثلث بين طبقتي اللقافة

إذا رُفعت الطبقة الخلفية لللقافة العجانبة الغائرة وفصل الساق الواحد للقبضيب عن العظم ظهر الوجه السفلي وهو العجانبي للرافعة للإست. وهذه العضلة مع الرباط المثلث إلى المقدم والعضلة العصبية الهرمية إلى المؤخر تسد مخرج الحوض

والرافعة للإست عضلة رقيقة عريضة موضوعة في جانب الحوض. ترتبط بالوجه الباطن للحوض الصحيح وتنزل وتتصل برفيقتها من الجانب المخالف فتكونان أرض التجويف الحوضي وتحملان الأحشاء الكائنة فيه. منشأها في المقدم من جسم العظم العاني وفرعه إلى الوحشية من الارتفاق العاني وفي المؤخر من الوجه الباطن لشوكة العظم الوركاني وفي ما بينهما من زاوية

المهبل وهي بمنزلة المعجزة للبول في الذكور. ترتبط من الخلف بالوتر المركزي للعجان حيث تتناط بالعاصرة لللاست وتسير اليافها الى المقدم على جانبي المهبل وتندغم بالجسمين الاجوفين والبظر. والناصبة للبظر شبيهة بالناصبة للفضيب في الذكور الا انها اصغر منها. والعجانية المستعرضة تندغم بجانب العاصرة للمهبل. والرافعة لللاست تندغم بجانب المهبل. وما بقي من عضلات العجان في الاناث كعضلات العجان في الذكور

واللفافة العجانية الغائرة (وهي الرباط المثلث للجري) صفيحة غشائية كثيفة سادة لمقدم المخرج الحوضي. شكلها مثلث راسه الى الاعلى نحو القوس العاني وقاعدته الى الاسفل نحو المستقيم وطولها نحو قيراط ونصف. وهي مرتبطة من الاعلى بالوجه السفلي للارتفاق العاني وبالرباط تحت العانة ومن الجانبين بفرعي الوركي والعاني ومن الخلف وهو قاعدة المثلث تتناط بالطبقة الغائرة للفاقة السطحية الى مؤخر العضلتين العجانيتين المستعرضتين فتكون الحد المقدم للخرة الوركية المستقيمة. ويتجهها مجرى البول اسفل الارتفاق العاني بنحو قيراط والثقب المذكور مستدير الشكل قطره نحو ثلاثة او اربعة خطوط والى الاعلى منه ثقب اخر يمر منه الوريد الظهري للفضيب والى الوحشية من ثقب الوريد ينفذ العصب الاستحيائي والشريان الظهري للفضيب.



شكل ٢٥٥


واللفافة المذكورة مؤلفة من طبقتين امامية وخلفية منفصلتين في الاعلى متحدتين في الاسفل.

شكل ٢٥٥ القوس العاني واللفافات العجانية او اللفافة العجانية السطحية مقطوعة على هيئة رقم ١ الى ثلاث قطع. فالقطعان الجانبيان مقلوبتان على فرعي العاني والوركي الى كل من الجانبين وها مرتبطتان بالعظمين المذكورين ارتباطاً شديداً. واما القطعة الخلفية فمتصلة باللفافة العجانية الغائرة وهي الرباط المثلث ٢ الرباط المثلث وهو اللفافة العجانية الغائرة ٣ فتحة مرور النسم الغشائي من الجري قبل دخوله البصلة ٤ بروزان في الرباط المثلث يدلان على وضع غدتي كوبر

المقدم الشريان والوريد العجانين السطحيان والعصب العجاني السطحي فيكون وضع الشريان العجاني المستعرض على الحد الخلفي للمثلث مستقراً على العجانية المستعرضة ففي العمل الجانبي لاستخراج الحصاة يُجرّ الموضع جراً منحرفاً مقاطعاً لمؤخر الخلاء نحو الاسفل والوحشية الى الحنرة الوركية المستقيمة فيقطع العضلة العجانية المستعرضة والشريان العجاني المستعرض والاياف الخلفية للمعجلة للبول والشريان العجاني السطحي ووريده وعصبه والى الخلف من ذلك الاوعية الباسورية الظاهرة. وقد مرّ الكلام على الشريان السطحي العجاني والشريان العجاني المستعرض في باب الشرايين (صفحة ٢٢٥)

اذا رُفِعَت المعجلة للبول والناصبة للفضيب ظهرت اللفافة العجانية الغائرة ممتدة عرضاً على الجزء المقدم لمخرج الحوض ويشاهد الجرى ثاقباً لمركزها وراء البصلة ويشاهد ايضاً الى كل من الجانبيين ساق التضيب رابطاً الجسم الاجوف بفرع العظم الوركى وفرع العظم العاني. وسنعود الى اللفافة العجانية الغائرة بعد ذكر عضلات العجان في الاناث

عضلات العجان في الاناث العاصرة للمهبل والناصبة للبظر والعجانية المستعرضة



شكل ٢٥٤

والضاغطة للجري والعاصرة للاست والرافعة له والعصصية . فالعاصرة للمهبل محيطة بفتحة


شكل ٢٥٤ عضلات عجان الانثى ١ الحدبة الوركية ٢ العاصرة للمهبل ٣ و٢ اندغامها في البظر ٤ الحلقة المهبالية للعضلة المذكورة التي تقبل بعض الياف الرافعة للاست ٥ مقاطعة العاصرة للاست والعاصرة للمهبل عند المركز العجاني ٦ الناصبة للبظر ٧ البظر مغطى بقائتي ٨ العضلة العجانية المستعرضة ٩ العاصرة للاست ١٠ الرافعة له ١١ الرقيقة له ١٢ المقربة الكبيرة ١٣ الالوية الكبيرة

ونظراً الى ما تقدم قد سى بعض المشرحين هذه العضلة البصلية الاجوفية . عملها انها اذا انقبضت اعانت في قذف البول او المني الى المقدم . وقد اختلفوا من جهة كونها اثنتين واحدة من كل جانب او واحدة مزدوجة

والناصبة للقضيب تغطي الجزء الغير المرتبط من ساق القضيب وهي عضلة مستطيلة منتصفها اعرض من طرفيها موضوعة على الحد الجانبي للعجان . تنشأ من الوجه الانسي للحدبة الوركية ومن سطح ساق القضيب ومن فرع العاني . وتنتهي الالياف المذكورة بصفاق يندغم بجانبي ساق القضيب ووجهه السفلي . عملها انها تضغط الساق فتحفظ القضيب منتصباً

والعجانبة المستعرضة حزمة عضلية ضيقة مقاطعة لمؤخر العجان عرضاً . تنشأ من الوجه الباطن للفرع الصاعد الوركى بوتر صغير ثم تسير منحرفة الى المقدم والانسية وتندغم بالوتر المركزي للعجان فتتصل بالعضلة التي تقابلها من الجانب الخلف وبالعاصرة للاست من الخلف وبالمجلة للبول من المقدم

ويشاهد بين العضلات الثلاث المذكورة خلاء مثلث تحده من الانسية المجلة للبول ومن الوحشية الناصبة للقضيب ومن الخلف وهو قاعدة المثلث العجانبة المستعرضة . وارض الخلاء




شكل ٢٥٢

مكوّنة من الرباط المثلث للمجرى البولى (وهو اللفافة العجانبة الغائرة) ويسير فيه من الخلف الى

شكل ٢٥٢ شرايين العجان . السطحية منها في الجانب الايمن والغائرة في الايسر ١ القضيب وقد قُطع ساقه في الجانب الايسر ٢ المرغمان للبول المغلقتان القسم البصلي للجسم الاستنجي ٣ الناصبة للقضيب منتشرة على ساقه اليمنى ٤ الاست مخاطاً بالعاصرة ٥ فرعا الوركى والعاني ٦ الحدبة الوركية ٧ الرباط العجزى الوركى الصغير مرتبطاً من طرفه الصغير بشوكة الوركى ٨ العصص ٩ الشريان الاستنجي الباطن منعكفاً حول الشوكة الوركية وداخلاً العجان ١٠ الفروع الباسورية السفلى ١١ الشريان العجانى السطحي الذي يرسل فروعاً صغيراً هو العجانى المستعرض الموضوع على العضلة العجانبة المستعرضة ١٢ الشريان المذكور الايسر مقطوعاً ١٣ الشريان البصلي ١٤ الفرعان الانتهاءان للاستنجي الباطن . يشاهد احدهما وهو شريان الجسم الاجوف داخلاً الطرف المقطوع للساق . والثاني وهو الظهري للقضيب صاعداً الى ظهر هذا العض

فائدتها انها تربط عضلات جذر القضيبي . تتصل من المقدم بمنسلخ الصفن ومن كلا الجانبين بحافة الفرع الوريكي والفرع العاني الى الوحشية من ساق القضيبي ومن الخلف تنعكف الى الاسفل وراء العضلتين المستعرضتين العجانيتين وتحد بالحافة السفلى للنافذة العجانية الغائرة . وهذه النفاذة تغطي عضلات هذا التسم وترسل حاجزاً عمودياً من وجهها السفلي يقسم مؤخر الخلاء الواقع تحت النفاذة الى قسمين واما من المقدم فالحاجز غير تام . فاذا انفتق الجزء الخلفي للبحري جرى البول تحت النفاذة المذكورة ودخل النسيج الخلوي للصفن والقضيبي والجزء المقدم والجانبى للبطن ويندرائه يمتد الى النسيج الخلوي الذي على انسي الفخذين او الى الورا حول الالست والممانع لذلك هو ارتباطات هذه النفاذة

اذا سلّخت الطبقة المذكورة ظهرت اسفلها العضلات التي تتعلق بالقضيبي والجرى وهي في الخط المتوسط المعجلة للبول والى كل من الجانبين الناصبة للقضيبي ومن الخلف العجانية المستعرضة فالمعجلة للبول موضوعة في الخط المتوسط للعجان الى مقدم الالست وموئنة من شطرين متصلين بقيد وتري في الخط المتوسط . تنشأ من الوتر المركزي للعجان ومن القيد المتوسط ثم تنفرج اليافها الى كل من الجانبين كأنفراج زغب الريشة . فالالياف الخلفية تضع على الوجه المقدم للرباط المثلث (وهو النفاذة العجانية الغائرة) والالياف المتوسطة تعانق البصلة وما جاورها من الجسم الاسفنجي والالياف المقدمة اطولها واوضحها تنتشر على الجسم الاجوف فيندغم بعضها به



شكل ٢٥٢

الى مقدم مندغم الناصبة للقضيبي وينتهي بعضها بانسباط وتري يغطي الاوعية الظهرية للقضيبي .

شكل ٢٥٢ عضلات عجان الذكر ١ المعجلة للبول وقد وُضع الرم على الجسم الاسفنجي للقضيبي ٢ الجسم الاجوف الايسر ٣ الناصبة للقضيبي اليسرى ٤ العجانية المستعرضة اليسرى ٥ خلاصة مثلث يشاهد فيه الرباط المثلث ٦ العاصرة للالست الظاهرة وقد قُطع طرفها المقدم ٧ الرافعة للالست اليسرى ٨ الحدبة الوركية . واما الخلاء الغائر الواقع بين الحدبة المذكورة والالست فهو الحفرة الوركية المستقيمة ٩ الشوكة الوركية ١٠ العصية اليسرى . وتناهد جلياً في هذا الرسم حدود العجان المذكورة في المتن

ونصف الأناها تقرب من السطحية عند سيرها الى الامام بجانب المحافة الانسية للفوس العاني وجميعها مغلف بغمد مكوّن من اللفافة السادة والعصب الاستحيائي واقع اسفل الشريان . وتقاطع الخلاء المذكور عرضاً نحو مركزه الاوعية والاعصاب الباسورية السفلى وهي فروع من الاستحيائية فتتوزع في جلد الاست وفي عضلات الطرف السفلي للمستقيم . وقد يكون الشريان والوريد كبيرين فاذا قُطِعَا في العمل الجراحي لاستخراج الحصىة اولنا سور الاست ربما عقب ذلك نزيل شاقّ على الجراح . ويشاهد عند مؤخر الخلاء فرع من العصب العجزي الرابع وعند مقدمه فرع جلدي من العصب العجاني

العجان

الخلاء العجاني مثلث الشكل قاعدته خط وهي ممتد عرضاً بين الحدبتين الوركيتين . ويحد جانبيه فرعا العظيمين الوركين والعانيين . ورأسه الى المقدم عند الفوس العاني . طول الحد الجانبي في البالغ من ثلاثة قراريط الى ثلاثة قراريط ونصف وعرض القاعدة من قيراطين الى ثلاثة قراريط ونصف فيكون معدّل القطر نحو قيراطين وثلاثة ارباع . ويجب الانتباه للاختلاف المذكور من جهة العرض في العمل الجراحي لاستخراج الحصىة من المثانة فانه اذا كانت الحدبتان الوركيتان متقاربتين طبعاً يجب ان يكون البضع في العمل الجانبي اقل انحرافاً مما لو كانتا متباعدين والخلاء عريضاً . والقيد المتوسط يقسم العجان الى قسمين متساويين ويختارون غالباً الايسر منها في عمل استخراج الحصىة

العجان في الخط المتوسط محدب والتحدب المذكور ناشئ عن انتفاخ بصلة الجرى . والجلد المغطي له اسمر اللون رقيق سهل الحركة على الاجزاء التي دونه وهو مغطي بشعر قصير مجعد يجب حلقه قبل التشريح . والى مقدم الاست يبدأ خط بارز هو القيد ويمتد الى المقدم الى ان يتصل بقيد الصفن . فاذا سلخ جلد العجان ظهرت اللفافة السطحية مؤلفة من طبقتين كباقي اللفائف السطحية احدها سطحية والاخرى غائرة

فالطبقة السطحية سمبكية رخوة خلوية البنا تتضمن في خلاياها مادة دهنية تختلف في الكثرة والقلة بحسب الاشخاص . وهي متصلة من المقدم بمنسلخ الصفن ومن الخلف بالنسيج الخلوي الذي تحت الجلد المحيط بالاست ومن الجانيين باللفافة السطحية الخاصة بانسي الفخذين . فاذا سلخت هذه الطبقة بانتباه ظهرت الطبقة الغائرة

والطبقة الغائرة للفاقة السطحية وهي اللفافة العجانية السطحية رقيقة صفاقية البنا متينة

يُشَقُّ الجلد في الخط المتوسط من الصفن الى الحافة المقدمة للاست ثم يدام الشق حول محيط الاست الى الطرف الخلفي ومن هناك يدام الى خلف راس العصعص بنحو قيراط ثم يُشَقُّ شق عرضي مفاطع للشق الاول عند قاعدة الصفن وشق اخر مثله الى مقدم الاست وشق ثالث الى موخره . ويجب ان تصل الشقوق المذكورة من الجانبين الى الجهة الانسية للفتد ثم يُسَلَّحُ الجلد من القسم الوريكي المستقيمي بكل انتباه لئلا تُسَلَّخَ معه العاصرة الظاهرة لانها شديدة الالتصاق به (انظر شكل ٢٦١)

فاذا سُخِّحَ الجلد ظهرت اللفافة السطحية . وهي سميقة جداً خلوية البناء تتضمن كثيراً من المادة الدهنية في خلاياها . ويشاهد فيها تقاريع فرعين او ثلاثة جلدية ناشئة من العصب الوريكي الصغير

العاصرة الظاهرة طبقة رقيقة من الياف عضلية بيضية الشكل وهي ملتصقة بالجلد المحيط بالاست التصاقاً شديداً . طولها نحو ثلاثة او اربعة قيراط من المقدم الى المؤخر وعرضها نحو قيراط حذاء الاست . تنشأ من راس العصعص بوتر ضيق ومن اللفافة السطحية التي الى مقدمه وتندغم بالمركز الوتري للعجان مع العجانية المستعرضة وغيرها . مجاورتها من الظاهر للجلد ومن الباطن للعاصرة الباطنة وتنفصل عن الرافعة للاست بواسطة نسج خلوي رخو . وهي من العضلات الخاضعة للإرادة وعصبها من الفرع الباسوري للعصب العجزي الرابع

والعاصرة الباطنة حلقة عضلية عرضها نحو نصف قيراط ومحيطه بالطرف السفلي للمستقيم الى بعد نحو قيراط من حافة الاست وسماكتها نحو خطين . تاليئها من اجتماع الالياف الحلجية الغير المخططة للمستقيم وهي ابهت لوناً والطف بناءً من العاصرة الظاهرة

والحفرة الوريكية المستقيمية واقعة بين طرف المستقيم والحذبة الوريكية الى كل من الجانبين . وهي مثلثة الشكل قاعدتها متجهة الى الظاهر مكونة من جلد التسم الوريكي المستقيمي ورأسها متجه الى الاعلى . عرضها نحو قيراط عند القاعدة ومسافة غورها نحو قيراطين . يجدها من الانسية العاصرة الباطنة للاست والرافعة له والعصعصية . ومن الوحشية الحذبة الوريكية واللفافة السادة التي تغطي الوجه الباطن للعضلة السادة الباطنة . ومن الامام خط الاتصال بين اللفافتين العجانيتين السطحية والغائرة . ومن الخلف حافة الالوية العظيمة والرباط العظيم العجزي الوريكي . وهذا الحلاء مشغول بكثرة عظيمة دهنية تعلل عن غور التجمعات الصديدية التي تحدث في جوار المستقيم

ثم ان كانت الجثة متقونة فاذا وُضِعَ الاصبع على الجدار الوحشي لهذه الحفرة يُشعر بالشربان الاستحيائي الباطن والعصب والاوردة المصاحبة له وذلك اعلى حافة الحذبة الوريكية بنحو قيراط

الفصل الحادي عشر

التشريح الجراحي للعجان والقسم الوري المستقيمي

لاجل تشريح هذا الجزء تخنار جثة نامية العضلات خالية من الدهن وليبدأ بنشرهما في القسم المذكور لكي تُشاهد اجزاءه وهي حديبة العهد قبل عطيها. يُدخَل بحس الى المثانة وتثنى اساقان على الفخذين وتربط البدان بالرجالين ثم يُرفَع الصفن الى الاعلى ويثبت في مكانه ويمدّد المستقيم تمداً معتدلاً باللكان

فعند ذلك يظهر خلاء يقابل مخرج الحوض حدوده الغائرة من المقدم القوس العاني والرباط تحت العانة ومن الخلف راس العصص والى كل من الجانبيين الفرع النازل للعظم العاني والفرع الصاعد للوركي والحديبة الوريكية والرباط العظيم العجزي الوريكي. والخلاء المذكور من الظاهر قريب الشكل من المعين يحده من الامام الصفن ومن الخلف الاليتان ومن الجانبيين الجهتان الانسيبتان للفخذين طوله من الامام الى الخلف نحو اربعة قراريط وقطره المستعرض الواقع بين الزاويتين المنفرجتين اي بين الحدبتين الوريكيتين نحو ثلاثة قراريط. اذا رُسم خط من مقدم الحديبة الوريكية من الجانب الواحد الى ما يقابله من الجانب الاخر الى مقدم الاست انقسم الخلاء الى قسمين. فالقسم المقدم يتضمن القضيبي ومجرى البول ويقال له العجان. والقسم الخلفي يتضمن نهاية المستقيم ويقال له القسم الوري المستقيمي

القسم الوري المستقيمي

يشاهد في هذا القسم في الخط المتوسط فتحة الاست والى كل من جانبيها اي بينها وبين الحديبة الوريكية حفرة غائرة مملوءة دهناً هي الحفرة الوريكية المستقيمية. وحول الاست الجلد مجمد على هيئة ثنيات تغيب عند تمدد المعاء. والجلد في هذا القسم يجهلته داكن اللون متصل بالغشاء المخاطي المبطن للمستقيم وفيه اجربة كثيرة اذا التهب وسال منها الصديد ربما ادت الى الوهم انها نواسير. وقد تمتد كثيراً الاوردة التي حول الاست فتكون اجساماً صلبة مدلاة لونها مائل الى الزرقة الداكنة يغطي بعضها الغشاء المخاطي وبعضها الجلد يقال لها البواسير الظاهرة

المقدم دافعاً امامه اللفافة الغربالية ثم ينحني نحو الاعلى الى الزائدة المنجلية للفاقة العريضة والجزء السفلي لوتر المنخرقة الظاهرة فتغطيه اللفافة السطحية والجلد. وما دام الفتق مضمناً في القناة الفخذية يكون صغير الحجم غالباً لسبب مقاومة الاجزاء المحيطة به فاذا نفذ من الفتحة الصافية الى النسيج الخلوي الرخول للاربية صار كبيراً. وعلى ذلك يكون اتجاه الفتق الفخذي اولاً الى الاسفل ثم الى المقدم والاعلى فيجب الانتباه الى هذا الامر لانه ينبغي ان يُضغَط على نوع مخالف للترتيب المذكور اذا قُصِد ردهُ بالغمز

واما اغطية العنق الفخذي فهي من الباطن الى الظاهر البريتون والنسيج الخلوي الذي تحته والحاجز الفخذي والغمد الفخذي واللفافة الغربالية واللفافة السطحية والجلد

انواع الفتق الفخذي. اذا هبط المعاً في القناة الفخذية الى الفتحة الصافية ولم ينفذ منها سمي الفتق الفخذي غير المتكامل وهو عسر التحقيق جداً ولا سيما في السمان لصغر حجمه وصلابة القناة الواقع هو فيها. واما اغطيته من الظاهر الى الباطن فهي الجلد واللفافة السطحية والزائدة المنجلية للفاقة العريضة واللفافة الخاصة والحاجز الفخذي والنسيج الخلوي الذي تحت البريتون والبريتون. واذا نفذ الفتق من الفتحة الصافية واتجه نحو المقدم والاعلى سمي الفتق الفخذي المتكامل. وقد يهبط الكيس الفتقي الى الوحشية من الاوعية الفخذية او الى مقدمها او الى مؤخرها

واما مجلس اخنثاق الفتق الفخذي فقد يكون في البريتون عند عنق الكيس الفتقي. وقد يكون عند نقطة اتصال الزائدة المنجلية للفاقة العريضة بالحافة الهلالية لرباط كبرنات وهو الاكثر. وقد يكون عند حافة الفتحة الصافية. ويجب ان يكون الشق دائماً نحو الاعلى والانسية وان لا يمتد في اكثر الاحوال الى ابعد من خطين او ثلاثة فتسلم الاوعية والابنية المهمة المجاورة لعنق الكيس الفتقي من خطر العمل

والشريان الساد ينشا من جذع مشترك بينه وبين الشراسيفي مرتين كل سبع مرات فينزل نارة على الجانب الانسي للوريد الحرقفي الظاهر الى الثقب الساد ويكون وضعه حينئذ الى الجانب الوحشي من الحلقة الفخذية خارجاً عن دائرة الخطر في الشق لاجل الفتق الفخذي. وتارة ينحني بجانب الحافة السائبة لرباط كمبرنات وهو سائر الى الثقب الساد فيسير على معظم محيط القناة الفخذية ولذلك يتعسر خلاصه من القطع مدة العمل الجراحي

الحاجز الفخذي طبقة من النسج الخلوي الكثيف سادة للحلقة الفخذية فهو حاجز يمنع بروز الفتق من الجزء المذكور. وجهه العلوي متعر قليلاً تستقر عليه غدة ليفاوية صغيرة تفصله عن النسج الخلوي والبريتون. وجهه السفلي مشرف نحو القناة الفخذية. وهو مثقوب بثقوب كثيرة لمرور اوعية ليفاوية توصل الغدد الاربعية الغائرة بالغدد المحيطة بالشريان الحرقفي الظاهر. ثم ان الحاجز مفصول عن البريتون بنسج خلوي قد يكون كثير الشحم بحيث اذا اندفع الى مقدم الكيس الفتقي ربما اوهم بانه جزء من التراب

ويختلف حجم القناة الفخذية ودرجة توتر فتحنها ودرجة اخنناق الفتق بحسب وضع الطرف السفلي. فان كان الساق والفخذ مبسوطين او مبعدين او محولين الى الوحشية كانت القناة الفخذية وفتحناها في غاية ما يكون من التوتر نظراً لضغط رباط پويارت واللفافة العريضة عليها كما يستعلم بادخال الاصبع. فاذا عكس الوضع بان يقبض الفخذ على الحوض ويقرب ويدار الى الانسية ارشفت القناة وفتحناها ولذلك يخنار دائماً هذا الوضع لاجل رد الفتق الفخذي بالغز

هبوط الفتق. انه يظهر ما تقدم ان الحلقة الفخذية مثل ضعيف في جدار البطن بحيث اذا حصل ضغط شديد او طويل على الاحشاء البطنية ربما اندفع اليها جزء من المعافيتكون من ذلك الفتق الفخذي. ولما كانت هذه الفتحة كبيرة في الاناث عرف سبب كثرة حدوث هذا النوع من الفتق فيهن

اذا هبط جزء من المعاف من الحلقة الفخذية دفع امامه قسماً من البريتون فيحيط به على هيئة جراب هو الكيس الفتقي. ويقبل غلافاً من النسج الخلوي الذي تحت البريتون وغلافاً اخر من الحاجز الفخذي ثم يسير في القناة الفخذية سيراً عمودياً الى ان يصل الى الفتحة الصافية حيث يتغير سيره. فانه في النقطة المذكورة يضيق الغمد فتملاه الوعية وترتبط اللفافة السطحية والغد الفخذي بالحافة السفلى لمحيط الفتحة الصافية ولذلك لايتاتي للفتق ان ينزل في الغد بل يتجه الى

بعض المعاني في الفتق الفخذي

القناة الفخذية هي الخلاء الضيق الكائن بين الوريد الفخذي والجدار الانسي للغد الفخذي. طولها من ربع الى نصف قيراط وتمتد من رباط كهبرنات الى الجزء العلوي من الفتحة الصافية. جدارها المقدم ضيق جداً مكوّن من اللفافة المستعرضة ورباط پويارت والزائدة المنحنية للفاقة العريضة. وجدارها المؤخر مكوّن من اللفافة المحرقفية والقسم العاني للفاقة العريضة. وجدارها الوحشي مكوّن من الحماجز الليفي الذي يغطي الوجه الانسي للوريد الفخذي. وجدارها الانسي مكوّن من اتصال اللفافة المستعرضة باللفافة المحرقفية الذي يكون بجانب الانسي للغد الفخذي ويغطي الحافة الوحشية لرباط كهبرنات

وللقناة الفخذية فتحتان سفلى هي الفتحة الصافية التي تسدها اللفافة الغربالية وقد مرّ الكلام عليها وعليها هي الحلقة الفخذية التي يسدها الحماجز الفخذي الذي سيأتي الكلام عليه اما الحلقة الفخذية فهي الفتحة العليا للقناة الفخذية المستطرفة الى التجويف البطني. يجدها من المقدم رباط پويارت والقوس الفخذي الغائر ومن الخلف العانة التي تغطيها العضلة المشطية والقسم العاني للفاقة العريضة ومن الانسية رباط كهبرنات والوتر المشترك واللفافة المستعرضة والقوس الفخذي الغائر ومن الوحشية الوريد الفخذي وغمده. والحلقة الفخذية بيضية الشكل طول قطرهما الطويل المتجه عرضاً نحو نصف قيراط. وهي اكبر في الاناث منها في الذكور وهذا من جملة الاسباب لحدوث الفتق الفخذي في النساء اكثر من الرجال

وضع الاجزاء حول الحلقة الفخذية. الحمل المنوي في الذكور والرباط المستدير في الاناث موضوعان اعلى الحافة المقدمة للحلقة الفخذية فقد يُقطعان في العمل الجراحي للفتق الفخذي ما لم يكن الشق لاجل اطلاق الفتق قصيراً. ولا اهمية في القطع المذكور من جهة الاناث واما في الذكور فقد يُقطع الشريان المنوي والقناة الناقلة

الوريد الفخذي موضوع الى الجانب الوحشي من الحلقة. والشريان الشراسيفي الذي ينشأ من المحرقفي الظاهر ويسير نحو الانسية الى السرة يقاطع الزاوية العليا والوحشية للحلقة الفخذية فيكون في خطر عظيم من ان يصاب اذا كان الشق نحو الاعلى والوحشية. والفرع الاستطراقي بين الشراسيفي والساد موضوع الى مقدم الحلقة

فيرى ما تقدم ان دائرة الحلقة محاطة بالاعوية الا من الانسية وهي الجهة التي يشق اليها في اخنناق الفتق الفخذي

خلاء صغير بيضي الشكل بين الوريد الفخذي والجدار الانسي للغمد مشغول بنسيج خلوي رخو وقد تكون فيه غدة ليمفاوية صغيرة. ويقال للخلاء المذكور الاخير القناة الفخذية التي يسير فيها بعض المعادن عند هبوط الفتق الفخذي

ورباط كبريات جزء من صفاق العضلة المنخرقة الظاهرة ينعكس نحو الاسفل والوحشية ويندغم في الخط المشطي للعظم العاني. طوله نحو قيراط وهو اكبر في الذكور منه في الاناث وضعه يقرب من الافقي اذا كان الجسد منتصباً شكلاً مثلث وقاعدته متجهة نحو الوحشية. قاعدته المذكورة وهي حافته الوحشية مقعرة رقيقة حادة ملاصقة للغمد الفخذي ومختلطة بالنسج العاني للفاقة العريضة. راسه عند شوكة العاني. حافته الخلفية مرتبطة بالخط المشطي وحافته المقدمة متصلة برباط پوپارت

الغمد الفخذي. اذا قُطع رباط پوپارت شوهد ان الغمد الفخذي مكوّن من امتداد اللفافة المستعرضة نحو الاسفل الى مقدم الاوعية الفخذية ومن هبوط اللفافة الحرقفية الى مؤخرها. وهاتان اللفافتان مختلطتان الى الجانب الوحشي من الشريان الفخذي وإلى الجانب الانسي من الوريد الفخذي الاّ انه يبقى بين الوريد ونقطة الاتصال الانسي خلاء صغير هو القناة الفخذية. والغمد الفخذي ملتصق التصاقاً شديداً بالاوعية التي يتضمنها اسفل الفتحة الصافية بنحو قيراط ولكنه واسع قعبي الشكل حذاء رباط پوپارت. والعصب التناسلي الفخذي ينقب الحافة الوحشية للغمد. والوريد الصافن الانسي واوعية ليمفاوية كثيرة تنقب حافته الانسية. يغطيه من المقدم القسم الحرقفي للفاقة العريضة وإلى الوراء منه قسمها العاني

القوس الفخذي الغائر حزمة الياف غليظة تقاطع مقدم الغمد الفخذي وتتصل به اتصالاً شديداً. ويظهر انه سماكة حادثة في اللفافة المستعرضة ترتبط من الوحشية بمركز رباط پوپارت ثم تنقوس على مقدم الغمد الفخذي وتندغم بواسطة طرف عريض في الخط المشطي وراء الوتر المشترك. والقوس المذكور قليل الظهور في بعض الاجساد وكثيراً ما لا يوجد على الاطلاق اذا تُرِع الجدار المقدم للغمد ان الشريان والوريد موضوعان الواحد بجانب الاخر وحاجز رقيق فاصل بينهما وحاجز اخر فاصل بين الوريد والجدار الانسي للغمد. ولما كان الحاجزان ممتدين من الجدار المقدم الى الجدار المؤخر للغمد كان كل من الوعائين مضمناً في خلاء بنفسه. واما الخلاء الكائن بين الوريد والجدار الانسي للغمد فلا يشغله الا نسيج خلوي رخو وبعض اوعية ليمفاوية وقد تكون هناك غدة ليمفاوية والخلاء المذكور هو القناة الفخذية التي يهبط منها

العاني. وإذا استقصيت نحو الأسفل شوهد أنها متصلة بحافة ثانية منحنية تسميها مشرف نحو الأعلى والانسية يقال لها القرن السفلي للفتحة الصافية. والحافة المنحنية المذكورة متصلة بالقسم العاني للنافذة العريضة الذي يغطي العضلة المشطية. والحافة الانسية للفتحة واقعة على سطح اغور من الحافة الوحشية ووراء مساحة الاوعية الفخذية. وهي اقل بروزاً ووضوحاً من الحافة الوحشية لسبب تمددها على العضلة المشطية الواقعة تحته. والفتق الفخذي ينفذ من الفتحة الصافية بعد هبوطه وسيره في القناة الفخذية التي سيأتي الكلام عليها

إذا أدخل الأصبع الى الفتحة الصافية وتحرك الطرف السفلي الى جهات مختلفة وجد ان الفتحة تضيق كثيراً اذا كان الطرف السفلي مبسوطاً او مداراً الى الوحشية وانها تتسع اذا كان مقبوضاً او مداراً الى الانسية ولذلك يضطر الى وضع العضو على الكيفية الاخيرة عند رد الفتق الفخذي بالغمز

ثم يفصل القسم المحرقفي للنافذة العريضة مع الزائدة المخلية بان يشق عند ارتباطه بالحافة السفلى لرباط بويارت و يسلمح بالانتباه عن الابنية الواقعة تحته ثم يقلب فيظهر غمد الاوعية الفخذية تارلاً اسفل رباط بويارت

شكل ٢٥١




القوس الفخذي وهو رباط بويارت هو الحافة السفلى لصفاق العضلة المنخرقة الظاهرة الممتدة بين الشوكة المقدمة العليا للمحرقفي وشوكة العاني والخط المشطي ويقال للقسم الذي يرتبط بالخط المشطي رباط كبرينات. اتجاه رباط بويارت مشين الى الاسفل نحو الفخذ نصفه الوحشي منحرف الوضع ونصفه الانسي يقرب من الافقي. والحلاء الواقع بين القوس الفخذي والعظم اللا اسم له مشغول بالاجزاء التي تهبط من البطن الى الفخذ. فالنصف الوحشي للحلاء المذكور مشغول بالعضلة المحرقفية والصلبية والعصب

المجلدي الوحشي والفخذي المقدم ونصفه الانسي بالاوعية الفخذية المضممة في غدها الا أنه يوجد

شكل ٢٥١ قطع الابنية التي تمر اسفل القوس الفخذي ١ رباط بويارت ٢ القسم المحرقفي للنافذة العريضة الذي يرتبط بالشفة الظاهرة للعرف المحرقفي ويربط بويارت الى شوكة العاني ٣ شوكة العاني ٤ القسم العاني للنافذة العريضة الذي يتصل عند شوكة العاني بالنسج المحرقفي ثم يسير الى الوحشية وراء غمد الاوعية الفخذية فاذا بلغ الحافة الوحشية للغمد المذكور عند ٥ انقسم الى طبقتين احدهما تحتل غمد العضلة الصلبة (٦) وغمد المحرقفية (٧) والثانية (٨) تغيب في عمق المنقلب الوري (٩) ١٠ العصب الفخذي مماطلاً بغمد العضلة الصلبة والمحرقفية ١١ رباط كبرينات ١٢ الحافة الفخذية الواقعة ضمن الغمد الفخذي الى الانسية من الوريد الفخذي منفصلة عنه بمجاز غشائي ١٣ الوريد الفخذي ١٤ الشريان الفخذي. والشريان والوريد والحلقة الفخذية واقعة ضمن الغمد الفخذي الا انها تفصلها بعضها عن بعض حواجز رقيقة كما يشاهد في الرسم

السفلى بالقسم الحرقفي. اذا استقصي الى الاعلى شوهد انه يغطي المشطية والمقربة الطويلة والرقبة ثم يسير وراء غمد الاوعية الفخذية فيلتصق به ويخلط بهند العضلة الصليية والحرقفية واخيراً يغيب في المحفظة الليفية للمفصل الوركى. وهو مرتبط من الاعلى بالخط المشطى ومن الانسية بحافة القوس العاني. فيرى ما تقدم ان القسم الحرقفي للفاقة العريضة يسير الى مقدم الاوعية الفخذية والقسم العاني الى مؤخرها فتتكون بينها فتحة ينفذ منها الوريد الصافن الانسي عند مصبه في الوريد الفخذي

الفتحة الصافية بيضية الشكل طولها نحو قيراط ونصف وعرضها نصف قيراط واقعة في



شكل ٢٥٠

الجزء العلوي والانسي للفخذ اسفل رباط يوبارت والى الجانب العاني من مركزه واتجاهها بانحراف نحو الاسفل والوحشية. حافتها الوحشية هلالية الشكل رقيقة متينة واضحة موضوعة على سطح اقرب الى المقدم من الحافة الانسية. اذا استقصيت الحافة المذكورة نحو الاعلى شوهد انها تكون زائدة منحنية طويلة هي القرن العلوي او الزائدة المنحنية التي تصعد الى مقدم الاوعية الفخذية ثم تحني نحو الانسية وترتبط برباط يوبارت وشوكة العاني والخط المشطى حيث تخلط بالقسم

شكل ٢٥٠ الفتحة الصافية في الفاقة العريضة ١ القسم الحرقفي للفاقة العريضة وقد وُضِعَ الرَّمْ بحيث يدل على وضع الشريان الفخذي ٢ الحافة الخلفية للفتحة الصافية ٣ القسم العاني للفاقة العريضة الذي يكون الحد الانسي وهو الخلفي للفتحة الصافية ٤ العضلة الجباطية مغطاة بالفاقة العريضة ٥ الوريد الصافن الانسي ٦ وريد صغير يصب في الصافن ٧ الشوكة المحرقفية المقدمة العليا ٨ شوكة العاني ٩ صفاق اشرف الظاهرة ١٠ محل انفصال الصفاق المذكور لاجل تكوين قائمي الحافة الظاهرة ١١ اللقانة بين القائمتين

العليا تقبل الاوعية الليمفاوية من القضيبي والصفي والحزء السفلي للبطن والعجان والالية والسلسلة السفلى تقبل الاوعية الليمفاوية من الطرف السفلي والاعصاب التي تتوزع في جلد هذه الجهة ناشئة من الحرقفي الاري والتناسلي الفخذي والفخذي المقدم. فيشاهد العصب الحرقفي الاري الى الانسية من الوريد الصافن والفرع الانتهاي للعصب التناسلي الفخذي الى الوحشية منه والعصبان الجلديان المتوسط والوحشي الى الوحشية من الفرع المذكور

واما الطبقة الباطنة للفاقة السطحية فتشق بحسب الشقوق الظاهرة وتُفصل عن اللفاقة العريضة. وهي غشاء رقيق كثيف سهل الفصل عن اللفاقة العريضة موضوع تحت الاوعية والاعصاب الجلدية. وتلتصق الطبقة المذكورة التصاقاً شديداً من الاعلى بالحافة السفلى لرباط بويارت وتغطي اسفل الرباط المذكور بنحو قيراط الفتحة الصافية للفاقة العريضة فتلتصق بحيطها وتتصل بعقد الاوعية الفخذية من وجهها السفلي. والتسم المذكور من الطبقة الذي يغطي الفتحة الصافية يتقبه الوريد الصافن الانسي واوعية كثيرة دموية وليمفاوية فهو غربالي المنظر ولذلك يُسمى باللفافة الغربالية. اذا نفذ الفتق الفخذي من الفتحة الصافية كانت اللفاقة الغربالية احد اغطيته

عند سلخ الطبقة الغائرة للفاقة السطحية مع اللفاقة الغربالية تظهر اللفاقة العريضة

اللفافة العريضة وقد سبق وصفها (صفحة ٢٤٩) صفاق ليفي كثيف يغلف الفخذ. وتشاهد فيها عند الجزء العلوي والانسي للفخذ فتحة كبيرة بيضية الشكل هي الفتحة الصافية. ولجل الوقوف التام على كيفية تكوين الفتحة المذكورة اصطالحوا على قسم اللفاقة العريضة في هذا الجزء من الفخذ الى قسمين حرقفي وعاني

فالقسم الحرقفي للفاقة العريضة واقع الى الجانب الوحشي من الفتحة الصافية يغطي الوجه الظاهر للخياطية والمستقيمة والصلبية والحرقفية. ويرتبط من الوحشية بعرف الحرقفي وشوكته المقدمة العليا ثم بجميع طول رباط بويارت الى شوكة العاني من الانسية وبالخط المشطي مع رباط كهبرنات حيث يختلط بالقسم العاني. وينعكس من شوكة العاني نحو الاسفل والوحشية فيكون حافة مقنوسة هي الحد الوحشي للفتحة الصافية يقال لها احياناً الزائدة المنحنية للفاقة العريضة. والزائدة المذكورة تغطي عقد الاوعية الفخذية الواقعة اسفلها وتلتصق به. وترتبط بحافتها اللفاقة الغربالية وتختلط من الاسفل بالقسم العاني بواسطة حافة منحنية واضحة

والقسم العاني للفاقة العريضة واقع الى الجانب الانسي من الفتحة الصافية ويختلط عند حافتها

التشريح الجراحي للفتق الفخذي

لاجل تشريح الاجزاء التي تتعلق بالفتق الفخذي يُختار اذا امكن جثة انثى خالية من الدهن وتُلقَى على الظهر وتوضع فرمة تحت الحوض ويدار الفخذ الى الوحشية وتُخنى الركبة قليلاً وتثبت على الهيئة المذكورة. ثم يُشق شق من الشوكة المحرفية المقدمة العليا الى الارتفاق العاني ممتدً بجانب رباط پوپارت وشق ثانٍ مقاطع للفخذ على بعد نحو ستة قراربط من سابقه ثم يوصل الشقان المذكوران بشق ثالث عمودي ممتد على الجانب الانسي للفخذ. وهذه الشقوق يجب ان تشق الجلد فقط ثم يُسلخ الى الوحشية فتظهر اللقافة السطحية (انظر شكل ٣٦٤)

اللقافة السطحية في الجزء العلوي من الفخذ مؤلفة من طبقتين بينهما الوعية والاعصاب الجلدية وغدد ليمفاوية كثيرة. فالطبقة الظاهرة غشاء ليفي خلوي سميك كثيف بين خلاياه نسج دهني مختلف الكمية. وتُستقصى الطبقة المذكورة الى الاعلى فوق رباط پوپارت فيرى انها مختلطة باللقافة السطحية للبطن والى الاسفل وجانب الفخذ الانسي والوحشي فيرى انها مختلطة باللقافة السطحية التي تغطي ما بقي من الفخذ

ثم تُشق هذه الطبقة تبعاً للشقوق السابقة ويسهل فصلها اذا بدى سلخها من الزاوية السفلى الانسية للخلاء الى مقدم الوريد الصافن الانسي نحو الوحشية على ما تقدم من سلخ الجلد. فتظهر حينئذ الوعية والاعصاب الجلدية والغدد الاربية السطحية وهي الوريد الصافن الانسي والشريان والوريد الشراسيفيان السطحيان والشريان والوريد الحرقفيان المنعكفان والشريان والوريد الاستحيائيان السطحيان ووعية ليمفاوية كثيرة

الوريد الصافن الانسي وعاء كبير الحجم يصعد منحرفاً الى الاعلى على الجانب الانسي للفخذ اسفل رباط پوپارت ثم يمر من الفتحة الصافية الكائنة في اللقافة العريضة ويصب في الوريد الفخذي. وترافقه وعية ليمفاوية كثيرة تحمل الليمفا من ظهر القدم والجانب الانسي للساق والفخذ وتصب في الغدد الليمفاوية المجمعة حول الفتحة الصافية. ويتجه نحو الفتحة المذكورة الشريان والوريد الشراسيفيان السطحيان اللذان يقاطعان رباط پوپارت بانحراف نحو الاعلى والانسية الى الجزء السفلي للبطن والشريان والوريد الحرقفيان المنعكفان السطحيان اللذان يسيران بانحراف الى عرف العظم الحرقفي بجانب رباط پوپارت والوعية الاستحيائية الظاهرة السطحية التي تسير نحو الانسية الى العجان والصفن. والوعية المذكورة تتوزع في الجلد والنسج الخلوي الذي تحته وترافقها وعية ليمفاوية كثيرة تجمع الليمفا من الاجزاء المذكورة وتنتهي في الغدد الاربية والغدد الليمفاوية الاربية السطحية مقسومة الى مجموعتين احدهما موضوع وضعاً موازياً لرباط پوپارت والثاني موضوع حول منتهى الوريد الصافن وقد يتبع سيره قليلاً في الفخذ. فالسلسلة

حافة العضلة المستقيمة ومن الاسفل رباط بويارت . ويمتد الوتر المشترك على الثنتين الانسيين للخلاء المذكور وما بقي منه مسدود باللفافة المستعرضة

فينفذ نارة البروز الفتقي من البطن الى الجانب الوحشي للوتر المشترك دافعاً امامه البريتون والنسيج الخلوي واللفافة المستعرضة . ثم يدخل القناة الاربية فيسير فيها وينفذ من الحلقة الظاهرة حيث يقبل غلافاً من اللفافة بين الفأتمين . واما اغطية هذا النوع من الفتق فلا تختلف على الاطلاق عن اغطية الفتق المنحرف

غير ان المعايندفع غالباً بين الياف الوتر المشترك او يمتد الوتر المذكور الى مقدمه فيكون له غلافاً تاماً . ثم يدخل المعالجزة السفلي للقناة الاربية وينفذ من الحلقة الظاهرة الى الجانب الانسي من الحبل فيقبل غلافين اخرين من اللفافة السطحية والجلد . واغطية هذا النوع من الفتق كاغطية الفتق المنحرف الا ان الوتر المشترك عوض عن العضلة المعلقة واللفافة المستعرضة عوض عن اللفافة القمعية

واما مجلس الاختناق في النوعين المذكورين من الفتق المستقيم فعلاً عند عنق الكيس الفتقي او عند الحلقة الظاهرة . واذا كان الفتق نافذاً بين الياف الوتر المشترك كثيراً ما يكون الاختناق عند حافتي الشق الذي ينفذ منه المعالجزة . الا انه في كل حال يجب ان يكون الشق في العمل الجراحي نحو الاعلى

الفتق الاربي المستقيم غير المتكامل هو اذا دخل المعالجزة المنفتحة القناة الاربية ولم يخرج من الحلقة الظاهرة . وهذا النوع صغير الحجم غالباً ويصعب تحقيقه في السمان

والفتق الاربي المستقيم قليل الحدوث بالنسبة الى المنحرف فهو كنسبة واحد الى خمسة على ما قاله المعلم كلوكي . وهو اكثر حدوثاً في الرجال منه في النساء لكبر حجم الحلقة الظاهرة فيهم . ويختلف عن المنحرف بصغر حجمه واستدارة شكله وربما كان السبب في ذلك مقاومة اللفافة المستعرضة والوتر المشترك لسيره . ويختلف عنه ايضاً في وضعه فانه واقع فوق العانة لا في مسير القناة الاربية . والشريان الشراسيفي يسير حذاء الجانب الوحشي اي المحرقفي للكيس الفتقي ويسير الحبل المنوي حذاء جانبه الوحشي والمخلفي لا خلفه راساً كما يكون في الفتق الاربي المنحرف

معدودة من الظاهر الى الباطن المجدد واللفافة السطحية واللفافة بين القائمتين والعضلة المعلقة واللفافة المستعرضة والنسيج الخلوي والبريتون . ووضع هذا النوع من الفتق الى مقدم اوعية الحبل المنوي ويندران يهبط اسفل الخصية لسبب الالتصاق الشديد الكائن بين اغشية الحبل والطبقة الغدية

واما مجلس الاختناق في الفتق الاربي المنحرف فيكون في القناة الاربية عند الحلقة الظاهرة او عند الحلقة الباطنة وهو الاكثر . فان كان عند الحلقة الظاهرة كان مسبباً عن الياف العضلة المنحرفة الباطنة او المستعرضة فتقطع بعض الالياف المذكورة عند نقطة من محيط الاختناق ويرد الفتق . وان كان عند الحلقة الباطنة او في القناة الاربية يُشق صفاق المنحرفة الظاهرة بحيث تُكشَف القناة الاربية ثم يُشق مجلس الاختناق شقاً نحو الاعلى

اذا سار المعالِمُ المنفتق بجانب الحبل المنوي ونفذ من الحلقة الظاهرة يُسمى الفتق المذكور الاربي المنحرف او الصفي . فاذا لم ينفذ من الحلقة الظاهرة بل بقي في القناة الاربية سمي الاربي غير المتكامل . وفي كل من الحالين تكون الاغشية التي تغلفه موقوفة على المسافة التي يمتد اليها . ومن انواعه ايضا نوعان اخران هما الخلقي والطفلي

فالفتق الخلقي قد يحدث في الاطفال الذين يبقى فيهم الجراب البريتوني المرافق للحبل والخصية عند هبوطها في الجنين مفتوحاً ومستطراً رأساً الى التجويف البريتوني . فينزل المعالِمُ الجراب المذكور الى تجويف الطبقة الغدية ويجاور الخصية . وليس لهذا النوع كيس خاص لانه مضمّن في الطبقة الغدية

وفي الفتق الطفلي يهبط الكيس الفتقي الى القناة الاربية ومنه الى الصفن وراء الجراب البريتوني الذي يرافق الحبل والخصية . فتكون الفتحة البطنية للجراب مسدودة ولكن جزؤه الموضوع في القناة الاربية غير منسد . ولذلك يكون الكيس الفتقي مغلفاً تاماً او ناقصاً بالطبقة الخلفية الغدية فتشق في العمل الجراحي لهذا النوع من الفتق ثلاث طبقات من البريتون الاولى والثانية طبقتا اللفافة الغدية والثالثة الطبقة المقدمة للكيس الفتقي

الفتق الاربي المستقيم وهو اكه سي

الفتق الاربي المستقيم عبارة عن بروز المعالِم من الجدار البطني الى الانسية من الشريان الشراسيفي بحيث ينفذ رأساً من الجدار البطني والحلقة الظاهرة . وكيفية ذلك انه يوجد في الجزء السفلي لجدار البطن خلاء مثلث (هو مثلث هيسلباخ) يحده من الوحشية الشريان الشراسيفي ومن الانسية

وبين المفافة المستعرضة والبريتون كمية من النسيج الخلوي الرخو الذي يكون سميكاً كثير
الدهن في بعض الأشخاص. ويدوم النسيج المذكور مقابل الحلقة الباطنة حول الحبل فيكون له
غمداً رخوياً

والشريان الشراسيفي (وهو فرع من الحرقفي الظاهر) نسبتُهُ للحلقة الباطنة مهمة جداً. وهو
موضوع بين المفافة المستعرضة والبريتون وسيره منحرف نحو الاعلى والانسية من منشئه من
الحرقفي الظاهر الى حافة غمد العضلة المستقيمة. ونسبته الى الحلقة الباطنة انه واقع بجانب
حافتها السفلى والانسية اسفل بداية الحبل المنوي واما القناة الناقلة فتعكف حوله وهي نازلة من
الحلقة الى الحوض

والبريتون مقابل الوجه الباطن للحلقة الباطنة عليه تغير ظاهر وتدموم منه رباطة ليفية رقيقة
على مقدم الحبل الى انما تغيب وقد تصل الى الطبقة الغدية. والرباطة المذكورة اثر الكيس
البريتوني الذي يرافق الحبل والخصية الى الصفن في الجنين ثم ينسد بعد الولادة

الفتق الاربي

يراد بالفتق الاربي بروز المعاء من التجويف البطني في الجهة الاربية. وهو على نوعين احدهما
وحشي او منحرف والثاني انسي او مستقيم. فالفتق الاربي الوحشي وهو المنحرف اكثرها حدوثاً
ويسير كسير الحبل المنوي. ويقال له الوحشي لان عنق الكيس الفتقي واقعة الى الجانب الوحشي
اي الحرقفي من الشريان الشراسيفي. والفتق الاربي الانسي وهو المستقيم لا يسير كسير الحبل
ولكنه يبرز من الجدار البطني الى الجانب الانسي اي العاني للشريان الشراسيفي

الفتق الاربي المنحرف

في الفتق الاربي المنحرف يبرز المعاء من التجويف البطني الى القناة الاربية بواسطة الحلقة الباطنة
دافعاً امامه جراباً من البريتون يتكون منه الكيس الفتقي. وعند دخوله القناة الاربية يقبل
غلافاً من النسيج الخلوي وتحيط به الزائدة القمعية الممتدة من المفافة المستعرضة. وعند سيره في
القناة الاربية يدفع نحو الاعلى الالياف المنحنية للعضلة المستعرضة والعضلة المنحرفة الباطنة وتحيط
به الياف العضلة المعانة. ثم يسير على مقدم الحبل وينفذ من القناة الاربية بواسطة الحلقة الظاهرة
فيقبل غلافاً من المفافة بين القائمتين. واخيراً يهبط الى الصفن فيقبل غلاطين من المفافة
السطحية والجلد. وعلى ذلك تكون اغطية هذا النوع من الفتق بعد نفوذه من الحلقة الظاهرة

متحدًا بصفاق المنخرقة الباطنة فيكون الوتر المشترك. وبين الحافة السفلى للمستعرضة ورباط يويارت خلافاً تشاهد فيه اللفافة المستعرضة


والقناة الاربية ويقال لها المنوية ايضاً تتضمن الحبل المنوي في الذكور والرباط المستدير في الاناث. وهي قناة منحرفة الوضع طولها نحو قيراط ونصف متجهة نحو الاسفل والانسية موضوعة على خط مواز لرباط يويارت وقليلاً اعلاه. وتتصل من الاعلى بالتجويف البطني بواسطة الحلقة البطنية الباطنة من حيث يدخلها الحبل المنوي وتنتهي من الاسفل في الحلقة الظاهرة من حيث يخرج الحبل الى الصفن. يجدها من المقدم المجلد واللفافة السطحية وصفاق المنخرقة الظاهرة على جميع طولها والمنخرقة الباطنة على ثاشها الوحشي ومن الخلف الوتر المشترك للمنخرقة الباطنة والمستعرضة والرباط المثلث واللفافة المستعرضة والبريتون ومن الاعلى الالياف المنحنية للمنخرقة الباطنة والمستعرضة ومن الاسفل اتصال اللفافة المستعرضة برباط يويارت. فاذا اندفع المعاء في مسير الحبل المنوي في القناة الاربية سُمي بالفتق الاربي المنخرق

واللفافة المستعرضة غشاء صفاقي رقيق موضوع بين الوجه الباطن للعضلة المستعرضة والبريتون. وهي قسم من اللفافة العامة التي تبطن التجويف البطني والتجويف الحوضي ومتصلة باللفافة المحرفية واللفافة المحوضية. واللفافة المذكورة في القسم الاربي سمبكة كثيفة البناء تُحد بها الياف من صفاق العضلة المستعرضة ثم تصير رقيقة خلوية اذا صعدت الى الحجاب. واما اتصالاتها من الاسفل فهي انها ترتبط الى الوحشية من الاوعية الفغذية بالحافة الخلفية لرباط يويارت حيث تضالط باللفافة المحرفية والى الانسية من الاوعية المذكورة ترتبط بالعانة والخط المشطي. وفي ما يقابل نقطة مخرج الاوعية الفغذية الى الفخذ تنزل اللفافة المستعرضة الى مقدمها فتكون الجدار المقدم للغد الفغذي. وفيها فتحة هي الحلقة البطنية الباطنة

الحلقة البطنية الباطنة (شكل ١٢٨) واقعة في اللفافة المستعرضة على نقطة متوسطة بين الشوكة المقدمة العليا للحرقفي وشوكة العاني اعلى رباط يويارت بنحو نصف قيراط. شكلها بيضي قطرها الطويل من الاعلى الى الاسفل مختلفة الحجم في الاشخاص الا انها اكبر في الذكور منها في الاناث. تحدها من الاعلى الالياف المنحنية للعضلة المستعرضة ومن الانسية الشريان والوريد الشراسيفيان ويمر منها الحبل المنوي في الذكور والرباط المستدير في الاناث. ويمتد من محيطها غشاء رقيق قعي الشكل يغلف الحبل والخصية بجراب خاص هو القمع. وعند مرور كيس الفتق الاربي المنخرق من الحلقة الباطنة تصير اللفافة المستعرضة غطاءً من اعطيتها

تكون موضوعة في اسفل وموَّخر التجويف البطني ثم عند هبوطها نحو الصفن قبل الولادة تسير اسفل المحافة المنقوسة للمخرفة الباطنة وتدفع امامها بعض الياف العضلة المذكورة التي تصاحب الخصية والحبل الى الصفن وتُسمى بالعضلة المعالقة للخصية. وفي هبوط الفتق الاربي المنحرف الذي يسير كسير الحبل المنوي تكون العضلة المعالقة احد اغطيته. وتعاظم جدًّا في القيلة والفتق الصفني الكبير القديم. وهذه العضلة عديمة الوجود في الاناث غير انه يتولد بناءً شبيه بها مكتسب من المحافة السفلى للمخرفة الباطنة اذا اصابهن الفتق الاربي المنحرف

ثم تفصل المخرفة الباطنة من رباط بوبارت وتسلخ عن المستعرضة الى مسافة الشقوق السابقة نحو الانسية الى عهد المستقيمة. والاعوية المنعكفة المحرفية الواقعة بين المخرفة الباطنة والمستعرضة دليل معتبر في الشرح المذكور العضلة المستعرضة قد سبق وصفها (صفحة ٢١٦) جزءها السفلي بعضه عضلي البناء وبعضه وتري ينشا من الثلث الوحشي لرباط بوبارت ثم ينحني نحو الاسفل والانسية متموساً فوق الحبل



شكل ٢٤٩

المنوي وينتهي بصفاق يندغم في الخط الابيض وعرف العانة والخط المشطي الى مسافة قيراط

٢٤٩ القناة الاربية وهي المنوية في الذكور ١ العضلة المخرفة الظاهرة ٢ المخرفة الباطنة وقد قلب جزءها السفلي نحو الاعلى ٣ العضلة المستعرضة . ويشاهد عليها فرع من الشريان الحرفي المنعكف واوردة مرافقة له. والى الانسية الياف ونزيرة صاعدة على الوتر المشترك بين المستعرضة والمخرفة الباطنة ٤ اللقافة المستعرضة ٥ الحبل المنوي مغطى باللقافة التامعية الناشئة من اللقافة المستعرضة ٦ الزاوية العليا للقسم الحرفي من اللقافة العريضة ٧ عهد الاعوية الفخذية ٨ الشريان الفخذي ٩ الوريد الفخذي ١٠ الوريد الصافن الانسي ١١ فرع صاب في الصافن

العليا للتحرفي الى شوكة العاني. ويرتبط ايضاً بالخط المشطي الى مسافة نحو قيراط فيتكوّن من ذلك رباط كهربات. اتجاهه منحني نحو الفخذ حيث يخالط باللفافة العريضة. نصفه الوحشي مستدير منحرف الاتجاه يخالط باللفافة المحرفية. ونصفه الانسي يتسع عند ارتباطه بالعانة ويقرب ان يكون اتجاهه افقياً ووضعته تحت الحبل المنوي

ورباط كهربات قسم من صفاق المنخرقة الظاهرة يندغم في الخط المشطي. وهو رقيق غشائي البناء مثلث الشكل قاعدته متجهة نحو الوحشية يسير نحو الاعلى والخلف اسفل الحبل المنوي من شوكة العظم العاني الى الخط المشطي الى مسافة نحو نصف قيراط

والرباط المثلث مكوّن من الياف وترية ممتدة من رباط پويارت عند ارتباطه بالخط المشطي نحو الاعلى والانسية اسفل القائمة الانسية للحلقة الظاهرة الى الخط الابيض

والعضلة المنخرقة الباطنة قد سبق وصفها (صفحة ٢١٦) واما القسم الذي يكشف منها في هذا التشريح فبعضه عضلي البناء وبعضه وتري. والالياف التي تنشأ من الجزء الوحشي لرباط پويارت رقيقة باهتة اللون تنحني نحو الاسفل وتنتهي بصفاق يسير الى مقدم العضلة المستقيمة والهرمية البطيبتين ويتحد بوتر العضلة المستعرضة فيتكوّن من ذلك الاتحاد الوتر المشترك الذي يندغم في عرف العظم العاني والخط المشطي الى مسافة نصف قيراط. والوتر المشترك المذكور موضوع وراء رباط كهربات والحلقة الظاهرة وفائدته وقاية الامعاء من الانفتاق بواسطة الحلقة الظاهرة التي الى امامه. فاذا ساركيس الفتق الاربي من الحلقة الظاهرة راساً سبي بالفتق الاربي المستقيم وهو يدفع الوتر المشترك الى مقدمه فيصير الوتر المذكور احد اغطينه

والعضلة المعلقة حزمة عضلية دقيقة تنشأ من منتصف رباط پويارت وتصل بالجانب الانسي للمنخرقة الباطنة وقد تتصل ايضاً بالمستعرضة ثم تسير على الجانب الوحشي للحبل المنوي فاذا نفذت معه من الحلقة الظاهرة كوّنّت عروا على مقدمه وجانبه. فالعروا العليا قصيرة جداً ثم تطول كلما هبطت الى ان يصل اطولها الى الخصية حيث يندغم بعضها في الطبقة الغمدية. وتتصل العروا المذكورة بعضها ببعض بواسطة نسج خلوي فتكوّن غطاءً للحبل هو اللفافة المعالقية. وتصدد الالياف على الجانب الانسي للحبل وتندغم بوتر مستدق صغير في عرف العانة ومقدم غمد المستقيمة

فيري ما تقدم ان منشأ وندغم العضلة المعلقة والالياف السفلى للمنخرقة الباطنة متشابهة وهذا يعلّل عن كيفية تغليف الخصية والحبل بالعضلة المعالقية. فان الخصية مدة حلالة الحيوة الجنينية

وعرضها نحو نصف ذلك وهي اوسع جداً في الذكور منها في الاناث ولذلك يتغلب فيهم حدوث الفتق الاربي. يحدها من الاسفل عرف العظم العاني ومن الاعلى الياف متقوسة تقاطع الزاوية العليا للحلقة فتزيد ما قوة هي الالياف بين القائمتين ومن الجانبين الحافتان السائبتان للصفاق وهما قائمتا الحلقة

فالقائمة الوحشية وهي السفلى اقواها ومكوّنة من قسم رباط بويارت الذي يتدغم في شوكة العاني. وهي مقعرة على هيئة ميزاب يستقر عليها الجبل المنوي في الذكور. والقائمة الانسية وهي العليا رباطة عريضة رقيقة مسطحة تتضفر برفيقتها من الجانب الخالف الى مقدم الارتفاق العاني. والقائمة الانسية اليمنى اقرب الى السطحية من اليسرى

والالياف بين القائمتين وترتبه البناء قوسية الشكل تقاطع الجزء السفلي للصفاق المنخرقة الظاهرة وسميت بهذا الاسم لانها ممتدة بين قائمتي الحلقة الظاهرة. فائديها انها تقوي الغشاء الذي يحد القسم العلوي للحلقة وتمنع انفراج القائمة الواحدة عن الاخرى. وهي غليظة من الاسفل حيث تتصل بالثلث الوحشي لرباط بويارت ثم تسير سيراً منحنياً تحديبه الى الاعلى وتتدغم في الخط الابيض. وهي غليظة قوية عند الزاوية الوحشية للحلقة اكثر من الزاوية الانسية واشد ظهوراً في الذكور من الاناث. وهذه الالياف مختلطة بلقافة رقيقة يقال لها اللقافة بين القائمتين او اللقافة المنوية الظاهرة التي تتصل اتصالاً شديداً بجواري الحلقة الظاهرة وتكوّن زائدة انبوبية حول الوجه الظاهر للجبل والخصية فتغلظها بغمد خاص. وعند مرور كيس الفتق الاربي من الحلقة البطنية الظاهرة يقبل غلاقاً من اللقافة بين القائمتين

اذا ادخل الاصبع في الحلقة الظاهرة مسافة قصيرة وكان الطرف السفلي مبسوطاً ومداراً الى الوحشية يُشعر بان صفاق المنخرقة الظاهرة متوتراً والحلقة الظاهرة منقبضة ضيقة جداً. فاذا قبض التخذ على الحوض وادبر الى الانسية يُشعر بان الصفاق قد ارتخى والحلقة الظاهرة اتسعت بحيث يمكن ادخال الاصبع فيها بالسهولة ولذلك يجب ان يعتمد دائماً على هذا الوضع الاخير في رد الفتق الاربي اذا كان العمل بالغمز لان الجدران البطنية تكون حينئذٍ مرتخية غاية ما يمكن

ثم يشق صفاق المنخرقة الظاهرة على ما مضى من الشقوق الظاهرة وبلخ نحو الوحشية الا انه يجب على المشرح الانتباه العظيم في فصله عن صفاق العضلة التي اسفله. وعند ذلك يظهر الجزء السفلي للمنخرقة الباطنة والعضلة المعلقة والقناة الاربية التي تتضمن الجبل المنوي. وينظر الى اندغام رباطي بويارت وكبريات في العانة

رباط بويارت (شكل ٣٥١) ويقال له القوس التخذني ايضاً ممتد من الشوكة المقدمه

الجراحي لاجل الفتق الاربي وقد يُمنّاج الى ربطه لاجل قطع التزيف
والشريان الحرقفي المنعكف يسير الى الوحشية نحو عرف الحرقفي . والوريد المرافق له اكبر
منه غالباً ويصب في الصافن الانسي . وكذلك الوريد المرافق للشريان الاستحيائي الظاهر
السطحي

والاوعية الليفافية سيرها كسير الاوعية الدموية وتنتهي في ساسلة عدد عددها من ثلاث
الى اربع موضوعة على مساواة رباط يويارت
والاعصاب منها الفرع الانتهاي للعصب الحرقفي الاربي الذي ينفذ من الحلقة البطنية
الظاهرة والفرع الختلي من العصب الحرقفي الختلي الذي يثقب صفاق المنخرقة الظاهرة اعلى
الحلقة الظاهرة والى جانبها الوحشي

والطبقة الغائرة للفاقة السطحية تُشق وتُسلخ كما الطبقة السطحية . وهي منفصلة عن صفاق المنخرقة
الظاهرة بواسطة نسج خلوي لطيف رقيقة صفاقية البناء متينة شديدة الالتصاق بالخط الابيض
في الخط المتوسط ويجمع طول رباط يويارت والقسم العلوي من اللفاقة العريضة في الاسفل .
وتكون زائدة انبوية حول الوجه الظاهر للحبل فتلتصق بالطبقة السطحية وتخلط بمنسلخ الصفن .
وتستصى الطبقتان المتصقتان من مؤخر الصفن الى العجان حيث تخلطان بالطبقة الغائرة
للفاقة السطحية والطبقة المذكورة مرتبطة من الخلف بالرباط المثلث ومن الجانين بفرعي
العاني والوركي . ومن الارتباطات المذكورة يفهم انه اذا انفتق المجرى البولي سار البول تحت
هذه الطبقة في العجان الى الصفن ثم يصعد على البطن ولا يتانى انتشاره الى الفخذين لسبب
ارتباطها بفرعي العاني والوركي من الجانين ورباط يويارت من المقدم

وصفاق العضلة المنخرقة الظاهرة يظهر عند سلخ الطبقة السابقة . وهو رقيق متين اليافه
منخرقة الوضع نحو الاسفل والانسية مرتبط بالشوكة المقدمة العليا للحرقفي وبشوكة العاني
والخط المشطي ومقدم العانة والخط الابيض . فالقسم منه الذي يمتد من الشوكة المقدمة العليا
للحرقفي الى شوكة العاني يقال له رباط يويارت او القوس الفخذي والقسم الذي يرتبط بالخط
المشطي هو رباط كمبرنات

والحلقة البطنية الظاهرة (شكل ١١٢٨) خلاصه مثلث الشكل واقع في صفاق المنخرقة الظاهرة
اعلى العرف العاني وقليلاً الى الوحشية منه . يمر من الفتحة المذكورة الحبل المنوي في الذكور
والرباط المستدير في الاناث . وهي منخرقة الاتجاه كانهرف الياف الصفاق طولها نحو قيراط

الفصل العاشر

التشريح الجراحي للفتق الاربي

لاجل تشريح الاجزاء التي تتعلق بالفتق الاربي تختار جثة ذكر خالية من الدهن . وتُلقَى على الظهر ويُنض البطن والمحوض بوضع قروم تحتها ويدر الطرفان السفليان الى الوحشية حتى تنوتر الاجزاء بقدر الامكان . وان كانت الجدران البطنية مرتخبة تنقب السرة وينف التجويف البطني . ثم يشق شق على المخط المتوسط من السرة الى العانة ويدام على مقدم الصفن وشق اخر من الشوكة المقدمة العليا للحرقفي الى اسفل السرة بقليل . ويجب ان يقطع الشقان المذكوران المجلد فقط ثم تسخ القطعة المثلثة الشكل الواقعة بينها نحو الاسفل والوحشية فتظهر اللفافة السطحية (انظر شكل ٢٦٢)


اللفافة السطحية في هذه الجهة مؤلفة من طبقتين تشاهد بينهما الاوعية والاعصاب السطحية . فالطبقة السطحية منها سمكة خلوية البناء تتضمن نسيجاً دهنيّاً في خلاياها يكثر او يقل بحسب الاشخاص . تسير الى الاسفل الى مقدم رباط پوپارت فتتصل بالطبقة الظاهرة للفاقة السطحية الفخذية . وتمتد على هيئة زائدة انبوية محيطية بالوجه الظاهر للجلد والخصية فتتغير عند ذلك صفتها لانها تصير رقيقة خالية من النسيج الدهني ويميل لونها الى الحمرة وتدخل في تكوين المنسج . وتُستقصى من الصفن الى الوراء فتشاهد انها متصلة باللفافة السطحية للعجان . ثم تُشق الطبقة المذكورة كالشقين السابقين وتُسلخ نحو الاسفل والوحشية فتظهر هذه الاوعية والاعصاب وهي الشريان الشراسيفي السطحي والحرقفي المنعكف والاستحيائي الظاهر السطحي والفروع الانتهاية للعصب الحرقفي الختلي والحرقفي الاربي والسلسلة العليا للغدد الليمفاوية الاربية

فالشريان الشراسيفي السطحي يقاطع رباط پوپارت ويصعد منحرفاً نحو السرة بين شوكة الحرقفي والعانة ويتوزع في الجلد متفماً بالشراسيفي الغائر . وهو فرع من الشريان الفخذي ويشقب اللفافة العريضة اسفل رباط پوپارت . واما وريدُه فيصب في الصافن الانسي

والشريان الاستحيائي الظاهر السطحي يسير عرضاً الى الانسية مقاطعاً للجلد المنوي ويتوزع في جلد القسم الختلي وجلد التضييب والصفن . ويُقطع هذا الوعاء عادة في الشق الاول من العمل

الباطن والاوردة تكون دائرة متفتمة حول قاعدة الحلمة سماها المعلم هلال الدائرة الوريدية. ومن الدائرة المذكورة يُجَمَل الدم بواسطة فروع كبيرة الى محيط الثدي تنتهي في الوريد الابطي والثدي الباطن. والاعوية الليمفاوية تسير على الحافة السفلى للعضلة الصدرية الكبيرة الى الغدد الابطية. والاعصاب ناشئة من الاعصاب الجلدية الصدرية المقدمة والجانبية

شكل ٢٤٨




واما افراز اللبن فيتم بواسطة الكريات المبطنه للحويصلات الغدّية التي اذا بلغت معظمها من النمو اندفعت نحو الخارج بواسطة طبقة كريات جديدة تتكوّن اسفلها. واذا صارت الكريات المذكورة الى القنوات اللبنية انفجرت فيجري السائل الذي كان في باطنها في القنوات وهو اللبن واما الجدار والنواة فيفقدان. واللبن مولف من سائل صاف وكريات ساجحة فيه هي الكريات اللبنية التي يتوقف عليها ظلام اللبن وبياضة وطعمه الى غير ذلك من الصفات الطبيعية. وعند بداية الارضاع يكون اللبن متضمنا كريات دهنية كبيرة تظهر عند بداية الارضاع

والحلمة ارتفاع مخروطي تنتصب قليلاً عند التهيج الميكانيكي. لونها وردي او مائل الى السمرة
وسطحها مجعد عليه حلمات صغيرة. وقمة الحلمة مثقوبة ثقوباً كثيرة هي فتحات القنوات اللبنية. وعند
قاعدة الحلمة وعلى سطح الهالة عدد كثيرة شحمية تعظم مدة الارضاع فتصير على هيئة درنات
صغيرة تحت الجلد. والغدد المذكورة تفرز مادة دهنية خاصة بها فائدتها انها تقي جلد الحلمة
عند الرضاعة. تاليف الحلمة من اوعية كثيرة يتكوّن منها نوع من النسيج الاتصالي وتخالطها
الياف عضلية غير مخططة

في بناء الثدي. الثدي مؤلف من نسيج غدّي ونسيج ليفي يوصل فصوص الغدة بعضها
ببعض ونسيج دهني شاغل للخلايا الواقعة بين الفصوص. فالنسيج

شكل ٢٤٧



الغدّي مؤلف من فصوص كثيرة منقسمة الى فصيصات
يتصل بعضها ببعض بواسطة نسيج خلوي ووعية دموية
وقنوات. تاليف الفصيص من مجموع حويصلات مستديرة
منفتحة الى الفروع الاولية للقنوات اللبنية فاذا اجتمعت الفريعات
المذكورة كوّنت قناة واحدة خاصة بقسم واحد من الاقسام
الكبرى للغدة بحيث يكون عدد القنوات الناقلة من خمس
عشرة الى عشرين ويقال لها القنوات اللبنية. وتجمع القنوات
المذكورة نحو الهالة ثم تنتفخ تحتها فتكوّن حواصل اللبن ثم تضيق
عند قاعدة الحلمة وتسير سيراً مستقيماً الى قمتها فتثقبها. ولكل
قناة ثقب خاص اضيق من قطرها. تاليفها من نسيج خلوي

والياف لدنة والياف عضلية وغشاءها المبطن متصل بالجلد عند قمة الحلمة وكرياتها السطحية من
النوع الرصيفي وهو القشري. والنسيج الليفي محيط بجميع سطح الثدي ويرسل حواجز بين فصوصه
وفصيصاته فيوصلها بعضها ببعض. والنسيج الدهني محيط بظاهر الغدة وشاغل للخلايا الكائنة بين
فصوصها وفصيصاتها وهو كثير الوجود عادة وعليه يتوقف شكل الثدي وحجمه. وهو مفقود تحت
الحلمة والهالة

شرايين الثدي ناشئة من الفروع الصدرية للابطي ومن الشرايين بين الاضلاع والثدي

وضع المبيضين في الجنين كوضع الخصيتين فيه اي في القسم القطني بقرب الكليتين. ثم يحدران شيئاً فشيئاً الى الحوض

ورباط المبيض حبل مستدير ممتد من الزاوية العليا للرحم الى الطرف الانسي للمبيض. تاليته من نسج ليفي وبعض الياف عضلية ناشئة من الرحم

واما الرباطان المستديران للرحم فحبلان مستديران طول الواحد منهما نحو اربعة او خمسة قراريط وضعة بين طبقتي الرباط العريض الى مقدم قناة فلوبيوس واسفلها. يبدأ عند الزاوية العليا للرحم ويسير الى المقدم والوحشية فينفذ من الحلقة البطنية الباطنة ومنها الى القناة الاربية ومنها الى الشفرين الكبيرين حيث يغيب. تاليته من نسج خلوي واوعية واعصاب وحزمة ليفية والياف عضلية ممتدة من الرحم وجميعها مغلف بشية من البريتون

شرايين المبيضين وقناتي فلوبيوس هما الشريانان المبيضان من الاورطي. يتفهمان اولاً بالشرايين الرحمية ثم يدخلان المبيض من حافته المقدمة الملتصقة. والاوردة تابعة لسير الشرايين وتكون ضفيرة بقرب المبيض. والاعصاب ناشئة من الضفيرة الميضية. وقناة فلوبيوس تقبل فرعاً من الاعصاب الرحمية


الغدتان الثدييتان

الثديان غدتان اضافيتان للمجموع التناسلي تفرزان اللبن ويوجدان في الذكور كالاناث الا انها اثر يان فيهم ما لم يتهيج نوما لاسباب غير اعنيادية. وها ارتفاعان عظيمان نصف كرويين موضوعان نحو الوجه الجانبي للقسم الصدري في الخلاء الواقع بين الضلع الثالث والسادس او السابع وممتدان من جانب القص الى الابط. ويختلف وزنها وجرمها بحسب السن والاشخاص فيكونان صغيرين قبل البلوغ ثم ينميان مع نمو اعضاء التناسل ويعطيان مدة الحمل والارضاع وينزلان مدة الشيخوخة. والثدي الايسر اكبر قليلاً في الغالب من الايمن. قاعدتهما حلقيه وقطرهما الطويل متجه نحو الاعلى والوحشية وتفصلها عن العضلتين الصدريتين الكبيرتين طبقة رقيقة من اللفافة السطحية. والوجه الظاهر للثدي محدب عليه اسفل المركز ارتفاع صغير مخروطي الشكل هو الحلمة. وسطح الحلمة داكن اللون محاط بها لثة لونها وردي لطيف في الابكار ونحو الشهر الثاني من الحمل تتسع ويصير لونها مسمرًا فاذا تقدم الحمل زاد الاسمرار الى انه قد يصير اسود. وعند انقطاع الارضاع يزول اللون المذكور الا انه يبقى منه اثر مدة الحيوة. وفي التغييرات المذكورة من جهة لون الهالة دليل معتبر على وجود الحمل

تحت البريتون . تاليف الحويصلة من طبقة ظاهرة ليفية وعائية وطبقة باطنة هي المحنظة البيضية وهذه المحنظة مبطنه بكرات نووية

والبيضة جسم صغير كروي معلق في سائل الحويصلة . وضعها في المركز اذا كانت الحويصلة دون البلوغ فاذا بلغت صارت بقرب المحنظة الى جهة ظاهر المبيض

شكل ٢٤٦



وتجتمع حول البيضة كمية عظيمة من الكريات النووية . قطر البيضة من $\frac{1}{120}$ الى $\frac{1}{240}$ من القيراط وتاليفها من غلاف شفاف هو المنطقة الشفافة او الغشاء المحي . وضمن الغلاف المذكور المح وضمن المح الحويصلة الجرثومية وضمن الحويصلة الجرثومية النقطة الجرثومية . فالمنطقة الشفافة

غليظة شفافة تظهر بالنظارة على هيئة حلقة لامعة يحدها من الظاهر والباطن خط مظلم وهي تقابل الحوربون في البيضة العالقة . والمح مولف من حبيبات غائصة في سائل لزج . والحويصلة الجرثومية مولفة من غشاء لطيف يتضمن سائلاً مائياً قطرها نحو $\frac{1}{72}$ من القيراط وضعها في مركز البيضة قبل البلوغ ثم نحو المحيط الى الجهة الظاهرة . والنقطة الجرثومية موضوعة عند محيط الحويصلة الجرثومية الى الجهة الظاهرة وهي مظلمة صفراء حبيبية البناء قطرها نحو $\frac{1}{3}$ من القيراط . غير ان نحو الحويصلات وبلوغ البيض الى درجة صالحة للعلوق امر خاص بمدة الخصب في حيوة الانثى

في خروج البيضة . اذا بلغت حويصلة كرافبوس اشدها من النمو صارت بقرب سطح المبيض ثم تنفجر فتخرج البيضة منها وتدخل الطرف المشرشر لقناة فلوبيوس الذي يكون حينئذ معانقاً للمبيض ثم تحمّل من القناة المذكورة الى التجويف الرحمي . ويتم بلوغ البيضة وخروجها من الحويصلة في البشر واكثر الحيوانات ذوات الثدي في اوقات دورية هي الحيول في انثى الحيوانات والحيض في انثى الانسان ولذلك اكثر العلوق يتم مدة الحيول وبقرب مدة الحيض اذا اجتمعت الانثى بالذكر


في الجسم الاصفر . هو اثر اصفر اللون يبقى بعد انفجار الحويصلة مدة ثم يجف فيصير وسماً ليفياً . وقد قسم الفيسيولوجيون هذا الجسم الى نوعين احدهما صحيح وهو ما تخلف عن بيضة عالقة والاخر كاذب وهو ما تخلف عن بيضة غير عالقة . ولم في تمييز النوعين علامات مذكورة في كتبهم

شكل ٢٤٦ حويصلة كرافبوس مكبرة نحو عشرة اضعاف a الطبقة الظاهرة للحويصلة b الطبقة الباطنة c طبقة الكريات d السائل الحويصلي e الارتفاع الجرثومي ك البيضة وبنهاه فيها المنطقة الشفافة والمح والحويصلة الجرثومية

في المحافة السائبة للرباط العريض تمتد كل واحدة منهما من الزاوية العليا للرحم الى جدار الحوض. طول القناة نحو اربعة قراريط وتجويفها دقيق جداً الى النصف الانسي ثم يتسع على هيئة بوق عند الطرف الوحشي ويستطرق الى التجويف البريتوني. وحواف الطرف الوحشي محاطة بزوائد مشرشرة فهو الطرف المشرشر. وتصل احدى الزوائد بالطرف الوحشي للمبيض. والطرف المذكور يعانق المبيض مدة التهيح الجنسي

بناء قناة فلوبايوس من ثلاث طبقات مصلية وعضلية ومخاطية. فالظاهرة مصلية ناشئة من البريتون. والمتوسطة عضلية مكونة من الياف طولية ظاهرة وحلقية باطنة وجميعها ممتدة من الرحم. والباطنة مخاطية متصلة بالغشاء المبطن للرحم من الطرف الواحد وبالبريتون من الطرف الاخر. وفيها الى الوحشية ثنيات طولية لاجل تمدد القناة وهي مغطاة بكرات عمودية هدية في المبيضين. هما بمنزلة الخصيلتين في الذكور ولذلك سماها جالينوس خصيتي الاناث.

شكل ٢٤٥




شكلها بيضي مسطح من الاعلى الى الاسفل ووضعها واحد الى كل من جانبي الرحم في مؤخر الرباط العريض الى الخلف والاسفل من قناتي فلوبايوس. والمبيض سائب من وجهه العلوي والسفلي وحافته الخلفية ويتصل من حافته المقدمة بالرباط العريض ومن طرفه الانسي بالرحم بواسطة رباط

خاص هو الرباط المبيضي ومن طرفه الوحشي بالطرف المشرشر لقناة فلوبايوس بواسطة احدى زوائده. لون المبيض مائل الى البياض وطوله نحو قيراط ونصف وعرضه ثلاثة ارباع القيراط وسماكته ثلث القيراط ووزنه من درهم الى درهمين

في بناء المبيض. الغلاف الظاهر للمبيض من البريتون والطبقة التي دونه خاصة بالمبيض يقال لها الطبقة البيضاء وهي كثيفة البناء شديدة القوام محيطة بشبكة ليفي رخو كثير الاوعية خلاياه مشغولة بجو بصلات شفاقة على درجات مختلفة من النمو هي جو بصلات كرافايوس كل واحدة منها تتضمن بيضة صغيرة. عدد الجوبصلات المذكورة من عشر الى عشرين في النساء اللواتي لم يحملن وقدر الواحدة منها من حبة الدخن الى الفولة ولها جدران رقيقة شفاقة تتضمن سائلاً صافياً لالون له البوميني التركيب. وهي صغيرة في اول امرها غائرة الوضع في جوهر المبيض فاذا كبرت قاربت السطح واذا بلغت اشدها من النمو كونت بروزاً على ظاهر المبيض

راس كل واحد منها محيط بفتحة قناة فلوبويوس وقاعدتاها مختلطتان في منتصف الجسم . واما في العنق فوضعها عرضي

شكل ٣٤٤



والطبقة المخاطية رقيقة ملساء ملتصقة التصاقاً شديداً بالطبقة العضلية متصلة بالبريتون من الطرف المشرشر لقناة فلوبويوس وبالعشاء المبطن للمهبل بواسطة فم الرحم . وهي في جسم الرحم ملساء مائلة الى الحمرة مغطاة بكرات عمودية هدية ويشاهد فيها بالظارة فوهات اجرية قنوية كثيرة عمودية الوضع نحو السطح . وفي العنق فيها اجرية وعداد مخاطية كثيرة وفي نصفه السفلي حلقات كثيرة دقيقة



شرايين الرحم الشريان الرحمي من المحرقفي الباطن والمبيضي من الاورطي وها كثيرا التعرج

والتنم في جوهر الرحم . والاوردة عظيمة الحجم مقابلة للشرايين ويقال لها مدة الحمل الجيوب الرحمية وتنتهي في الضفيرة الرحمية . والاوعية الليمفاوية تنتهي في الغدد الحوضية والقطنية . والاعصاب ناشئة من الضفيرة الختلية السفلي والضفيرة المبيضية ومن العصبين العجزيين الثالث والرابع

توابع الرحم

توابع الرحم قناتا فلوبويوس "والمبيضان ورباطها والرباطان المستديران . وجميع هذه الابنية مع اوعينها واعصابها وبض الياف عضلية مضمنة في ثنية من البريتون الى كل من الجانبيين هي الرباط العريض . واما وضعها النسبي فالرباط المستدير الى المقدم وقناة فلوبويوس شاغلة للحافة السائبة للرباط العريض والمبيض ورباطة خلف القناة واسفلها

في قناتي فلوبويوس . ها قناتان تحملان البيض من المبيض الى تجويف الرحم موضوعتان


شكل ٣٤٤ قطع عمودي لرحم كثير الحمل . وقد قطع منه بعض الجدار المقدم *m* و *m* العشاء المخاطي *p* و *p* جوهر الجدار الرحمي . وتناهد اسفل الشكل غدة من العشاء المخاطي *o* فم الغدة *e* طرفها المسدود

(١) ها بوقا فلوبويوس او الرحم في اصطلاح المدرسة المصرية

فتحة ضيقة مستطرفة الى تجويف العنق هي الفم الباطن للرحم. واما تجويف العنق فيقترب من الاسطواناني وهو مسطح من الامام الى الخلف مركزه اوسع من طرفيه ويستطرق الى المهبل من الاسفل. ويشاهد في كل من الجدارين قبل الولادة الاولى خط طولي تذهب منه خطوط منحرفة على هيئة فروع الشجرة فسموا ذلك الشجرة الرحمية. ولا يبقى هذا المنظر واضحا بعد الولادة في بناء الرحم. الرحم مؤلف من ثلاث طبقات ظاهرة ومصلية ومتوسطة عضلية وباطنة مخاطية

فالطبقة المصلية ناشئة من البريتون ومغلقة لقاع الرحم وجميع وجهه الخلفي والثلاثة الارباع العليا فقط لوجهه المقدم

والطبقة العضلية مكوّنة لمعظم جوهر الرحم. وهي في غير حالة الحمل سنجابية اللون كثافتها كالغضروف وغلظتها حذاء منتصف الجسم والقاع رقيقة عند فتحتي قناتي فلوبيوس. تاليها من حزم عضلية اليافا غير مخططة مرتبة على هيئة طبقات ويخالطها نسج خلوي واوعية دموية ولينفاوية واعصاب. وفي الحمل يكون النسج العضلي بحالة النمو العظيم مرتباً على هيئة ثلاث



شكل ٢٤٢



شكل ٢٤٣

طبقات ظاهرة ومتوسطة وباطنة. فالالياف الظاهرة رقيقة موضوعة اسفل البريتون بعضها عرضية الوضع مقاطعة للقاع بحيث تجتمع عند الزاويتين العلويتين ثم تمتد الى قناتي فلوبيوس والرباطين المستديرين ورباطي المبيض وبعضها يذهب من الجانبيين الى الرباطين العريضين وبعضها يذهب من العنق الى الرباطين المستقيمين الثانيين. والمتوسطة غير منتظمة الترتيب فبعضها طولي وبعضها عرضي وبعضها منحرف. والباطنة مولفة من الياف حلقيه على هيئة مخروطين اجوفين

شكل ٢٤٢ الطبقة الظاهرة للالياف العضلية الرحمية
شكل ٢٤٣ الطبقة الباطنة للالياف العضلية الرحمية

طول الرحم نحو ثلاثة قراريط وعرضه قيراطان عند قاعدته وسماكته قيراط ووزنه من اوقية الى اوقية ونصف

يقسم الرحم الى قاع وجسم وعنق

فالقاع هو الطرف العلوي العريض وهو عند مغطى بالبريتون موضوع اسفل مساحة


شفة الحوض

والجسم يضيق تدريجاً من القاع الى العنق . وجهه المقدم مسطح مغطى بالبريتون الى ثلاثة ارباعه العليا ومنفصل عن المثانة ببعض تلافيف المعادقيق واما الربع السفلي فمتصل بالمثانة . ووجهه الخلفي محدب وجميعه مغطى بالبريتون . وحافته الجانبيتان مقعرتان تتصل بهما قناة فلوبايوس والرباط المستدبر ورباط المبيض

والعنق هو الطرف السفلي مستدبر مخنق ويتصل بحيطه الجزء العلوي للمهبل الا انه يمتد الى الاعلى في الخلف اكثر منه في المقدم . وفي الطرف السفلي المذكور فتحة مستعرضة هي فم الرحم تحده شفتان احدها الى المقدم غليظة والثانية الى الخلف ضيقة طويلة

في اربطة الرحم . هي ستة اثنان مقدمان واثنان خلفيان واثنان جانبيان وجميعها مكوّنة من البريتون . فالمقدمان ويقال لهما المثانيان الرحبيان يمتدان بين عنق الرحم والوجه الخلفي للمثانة . والخلفيان ويقال لهما المستقيمان الرحبيان يمتدان بين جانبي الرحم والمستقيم . والجانبيان ويقال

شكل ٢٤١



لها العريضان يمتدان من جانبي الرحم الى الجدارين الجانبيين للحوض فيكوّنان حاجزاً مقاطعاً للحوض ويقسمان تجويفه الى قسمين مقدم يتضمن المثانة والمجرى والمهبل وخلفي يتضمن المستقيم

في تجويف الرحم . هذا التجويف صغير بالنسبة الى حجم الرحم . فما كان منه ضمن الجسم مثلث الشكل قاعدته نحو القاع الى الاعلى وهو مسطح من الامام الى الخلف بحيث تماس جدران الرحم . وعند كل زاوية عليا من زاويتي تجويف قعبي الشكل تشاهد في قاعه الفتحة الدقيقة لقناة فلوبايوس . وعند الزاوية السفلى للمثلث المذكور


شكل ٢٤١ قطع عمودي ارحم لم يحمل جنيناً a تجويف الجسم o الفم الباطن للرحم وهو زاوية التجويف السفلي نوني الراويتان العلويتان وفتحتا قناتي فلوبايوس . وتشاهد قشة ادخات من كل من القناتين الى التجويف s قاع الرحم c تجويف عنق الرحم m و m الشجرة الرحمية وبعضها يسمىها الثنيات الخفية

المستقيمة الثانية

بناء المهبل من ثلاث طبقات عضلية ظاهرة وانتصائية متوسطة ومخاطية باطنية. فالطبقة العضلية مكونة من الياف طويلة ممتدة من الالياف السطحية للرحم. والانتصائية مغلقة بين طبقتين من غشاء ليفي اكثر وجودها في الجزء السفلي للمهبل. والمخاطية ممتدة في الاعلى من الغشاء المبطن للرحم وفي الاسفل من الجلد المغطي للشفرين الكبيرين. على وجهها الباطن من المقدم والخلف خط بارز طولي يقال له عمود المهبل وتمتد من الخط المذكور خطوط كثيرة مستعرضة من الجانبين الى الوحشية. ويقال للخطوط المذكورة جعدات او ثنيات اكثر وجودها بقرب الفوهة المهبلية ولا سيما قبل الولادة وفائدتها انه بها يتمدد المهبل عند الولادة. والغشاء المخاطي مغطي بجملات دقيقة وباجربة وعداد مخاطية اكثر وجودها في الجزء العلوي للمهبل وحول عنق الرحم

الرحم

الرحم عضو الحمل فانه يقبل البيضة العالقة ويحمل الجنين مدة نموه وهو الفاعل الرئيسي في



شكل ٢٤٠

دفعه الى الخارج عند الولادة. وهو في غير مدة الحمل كُمَثْرِي الشكل مسطح من الامام الى الخلف. وضعه في التجويف الحوضي بين المثانة والمستقيم مثبت في مكانه بواسطة الرباط العريض والرباط المشددير من الجانبين وبارز الى الاسفل الى الطرف العلوي للمهبل. طرفه العلوي وهو القاعدة متجه الى الاعلى والمقدم وطرفه السفلي وهو الراس الى الاسفل والخلف تابعا لمحور المدخل الحوضي بحيث يكون زاوية مع المهبل اتجاهاها مقابل لمحور التجويف الحوضي ومخرجه.

شكل ٢٤٠ الرحم وتواضعه كما يشاهد من المقدم ١ جسم الرحم ٢ قاعه ٣ عنقه ٤ فيه ٥ المهبل والرحم موضوع على العمود الخلفي الذي تذهب منه الثنيات المستعرضة ٦ و٧ الرباط العريض الايسر للرحم ٨ تحذب الرباط المذكور المسبب عن المبيض ٩ و١٠ الرباطان المشديران للرحم ١١ قناتا فلوبيوس ١٢ طرفاها المشرشرات ١٣ المبيض ١٤ الرباط العريض ١٥ المبيض ١٦ شرشرة من قناتا فلوبيوس متصلة بالمبيض ١٧ البريتون الذي يغطي الوجه المقدم للرحم وهو منقطع في الجانب الايسر للشكل متصل بالرباط العريض في الايمن

في الاناث منها في الذكور وقطرها المستعرض عريض جداً
 ومجرى البول قناة ضيقة غشائية طولها نحو قيراط ونصف ممتدة من عنق المثانة الى الصماخ
 البولي. وضعه اسفل الارتفاق العاني غائص في الجدار المقدم للمهبل واتجاهه الى الاسفل والمقدم
 وفيه بعض انحناء بحيث يكون التقعير مشرفاً نحو الاعلى. قطره نحو ربع قيراط. ويشق الرباط
 المثلث كما في الذكور وتحيطه الياف العضلة العاصرة للمجرى
 بناؤه من ثلاث طبقات عضلية وانتصائية ومخاطية. فالطبقة العضلية ممتدة من الطبقة
 العضلية المثانة وهي غليظة واليافا حلقة محيطة بجميع طول القناة. والطبقة المخاطية ممتدة من
 الفرج من الظاهر ومن غشاء المثانة من الباطن. وفيها ثنيات طولية منها واحدة في ارض القناة
 شبيهة بالعرف الجبلي في الذكور وتحيط بفتحتها الظاهرة بعض اجربة مخاطية. والطبقة الانتصائية
 رقيقة متوسطة بين الطبقتين السابقتين. ولما كان مجرى البول في الاناث غير محاط بابنية
 كثيفة كما في الذكور امكن تمديده بسهولة لاجل استخراج الحصى وغيرها من المثانة

المستقيم

المستقيم في الاناث اكثر اتساعاً واقل انحناءً مما هو في الذكور. جزئه الاول ممتد من المفصل
 العجزي الحرقفي الايسر الى منتصف العجز. وجزئه الثاني ممتد الى راس العصعص يغطي البريتون
 الجزء العلوي من مقدمه وهو مجاور للجدار الخلفي للمهبل. وجزئه الثالث منحني الى الخلف من
 المهبل الى الاست والحلاء الذي بينه والمهبل يقابل العجان من الظاهر


المهبل

المهبل قناة غشائية ممتدة من الفرج الى الرحم. وضعه في التجويف الحوضي وراء المثانة والى مقدم
 المستقيم. اتجاهه منحني الى المقدم والاسفل تابع لمحور التجويف الحوضي اولاً ثم لمحور المخرج. شكله
 اسطوانى مسطح من المقدم الى الخلف وجدرانه متلاصقة عادة. طول جداره المقدم نحو اربعة
 قراريط والخلفي من خمسة الى ستة. وهو ضيق في مبداه متسع عند طرفه الرحمي ويحيط بالجزء
 المهبل لعنق الرحم وإنما اتصاله بالوجه الخلفي للرحم اعلى من اتصاله بالوجه المقدم
 مجاورته. وجهه المقدم متعر ومجاور لقاعدة المثانة والمجرى. وجهه الخلفي محدب متصل بالجدار
 المقدم للمستقيم الأربعة العلوي فانه ينفصل عنه بواسطة الثنية المستقيمة الرحمية للبريتون
 ويرتبط بجانبه من الاعلى الرباطان العريضان ومن الاسفل الرافعتان للاست واللفافة

وغدتا برثولين جسمان مستديران او مستطيلان وهما شبيهتان بغدتي كوبر موضوعتان على جانبي فتحة المهبل ولونهما اصفر مائل الى الحمرة . قدر الواحدة منها كالقولة ولها قناة واحدة طويلة منفتحة على الوجه الباطن للشفر الصغير الى الوحشية من غشاء البكارة . وتمتد من البظر على جانبي الدهليز وراء الشفرين الصغيرين كتلتان مستطيلتان مؤلفتان من ضفيرة وريدية طول الواحدة منها نحو قيراط وهي ضيقة من المقدم مستديرة من الخلف متصلة بساقي البظر والفرعين العائنين . وقد سماها المعلم كويات بصفتي الدهليز وقال انها شبيهتان ببصلة الجسم الاستنجي في الذكور . والى مقدمها ضفيرة وريدية صغيرة تنصل بها من الخلف وبالبظر من المقدم سماها المعلم المذكور الجزء المتوسط فهي شبيهة بما يتقدم البصلة من الجسم الاستنجي في الذكور

المثانة والمجرى البولي

وضع المثانة في مقدم الحوض ومجاورتها من المقدم للعانة ومن الخلف للرحم الا انه متوسط



شكل ٢٢٩

بينهما بعض تلافيف المعادقيق وقاعدتها ملامسة لعنق الرحم والجدار المقدم للمهبل . وهي اكبر

شكل ٢٢٩ منظر جانبي لاجزاء الحوض الانثوي ١ الارتفاق العاني ويشاهد ان وتر العضلة المستقيمة مرتبطة به ٢ الجدران البطنية ٣ اجتماع دهني يتكون منه جبل الزهرة ٤ المثانة ٥ مدخل الحالب الايسر ٦ المجرى ٧ الصباخ البولي ٨ البظر وقد وضعت فلتته في الخط المتوسط ٩ الشفر الصغير الايسر ١٠ الشفر الكبير الايسر ١١ فتحة المهبل التي تضيق بواسطة انقباض عاصرتها ١٢ و٢٢ قناة المهبل التي تشاهد فيها ثنياتها المستعرضة ١٣ جدار سميك حاجز بين قاعدة المثانة والمهبل ١٤ الجدار الناصل بين المهبل والمستقيم ١٥ العجان ١٦ فم الرحم ١٧ عنق الرحم ١٨ قعر الرحم . ويشاهد التبرؤف الرحمي في مركز هذا العضو ١٩ المستقيم ٢٠ الامت ٢١ القسم العلوي من المستقيم الذي يغطيه البريتون ٢٢ ثنية البريتون المستقيمة المثانية . واما الثنية المستقيمة الرحمية فتشاهد بين المستقيم والجدار الخلفي للمهبل ٢٤ انعكاس البريتون من قمة المثانة على الاوراكس ثم على الجدران البطنية ٢٥ الفتحة القطنية الاخيرة ٢٦ العجز ٢٧ العصص

الولادة الاولى. ويقال للخلاء الواقع بينها وبين المجمع الخلفي الحفرة الزورقية. الشفران الكبيران بمنزلة الصنف في الذكور

الشفران الصغيران ثنيتان صغيرتان من الغشاء المخاطي موضوعتان داخل الشفرين الكبيرين امتدان من البظر الى الاسفل والوحشية نحو قيراط ونصف الى كل من جانبي فتحة المهبل ثم يغيبان في جانبيه. وهذان الشفران متصلان بالشفرين الكبيرين من الوحشية وبالوجه الباطن للمهبل من الانسية. وعند اجتماعها نحو البظر في المقدم ينقسم كل منهما الى ثنيتين تحيطان بحشفة البظر فالثنيتان العلويتان ثنيدان وتكونان قلفة البظر والسفليتان ترتبطان بالحشفة فتكونان القيد. تاليفها من غشاء مخاطي مغطى بطبقة رقيقة من الالبيثليوم ويتضمنان في باطنهما ضفيرة وعائية وفيهما اجربة كثيرة تفرز مادة شمعية


والبظر بناء انتصابي شبيه بالجسمين الاجوفين للقضيب. وضعه اسفل المجمع المقدم وتغطي بعضه الحافتان المقدمتان للشفرين الصغيرين. وهو عضو مستطيل يتصل بفرعي العظمين العامين والوركين بواسطة ساقين. جسمه قصير مغطى بالشفرين الصغيرين. طرفه السائب على هيئة حلبة صغيرة مستديرة يقال لها الحشفة مولفة من نسيج اسفنجي انتصابي شديد الحس. تاليف البظر من جسمين اجوفين مكونين من نسيج انتصابي محاط بغلاف ليفي ويتصلان من الانسية بواسطة حاجز ليفي غير تام. وله كالقضيب رباط معلق وعضلتان صغيرتان هما الناصبتان لمبظر تندغان بساقي الجسمين الاجوفين

والدهليز خلاء مثلث امس واقع بين البظر ومدخل المهبل يحدّه من الجانبين الشفران الصغيران والصماخ البولي وهو فتحة مجرى البول واقع في مؤخر الدهليز اسفل البظر نحو قيراط وبقر حافة المهبل وهو محاط بارتفاع بارز من الغشاء المخاطي. واسفل الصماخ البولي فتحة المهبل وهي شق بيضي الشكل مسدود اكثر واقل في الابكار ثنيتان غشائية هي غشاء البكارة

وغشاء البكارة ثنية من الغشاء المخاطي رقيقة هلالية الشكل ممتدة عرضاً على الجزء السفلي لفتحة المهبل بحيث تكون حافتها المتعرة مشرفة الى الاعلى نحو العانة. وقد يكون الغشاء المذكور حاجزاً تاماً معارضاً لفتحة المهبل فيقال له حينئذ الغشاء البكاري الغير المثقوب. وقد يكون حاجزاً حلقياً مثقوباً في مركزه وقد يكون غربالي الشكل وقد يكون مفقوداً بالكلية ولذلك لا يكون عدم وجوده دليلاً قاطعاً على الابتكار او عدم البكورية. والغشاء المذكور يتمزق عند الجماع الاول فتنشأ مكانه ارتفاعات صغيرة مستديرة محيطة بفتحة المهبل هي الخيميات الآسية

في اعضاء التناسل في الاناث

تُقسَم اعضاء التناسل في الاناث الى ظاهرة وباطنة . فالظاهرة جبل الزهرة والشفران الكبيران والشفران الصغيران والبظر والصاخر البولي وفتحة المهبل ويقال لتجميع هذه الاعضاء الفرج . واما الاعضاء الباطنة فسياتي الكلام عليها وهي الرحم والمبيضان وتوابعهما



شكل ٢٢٨

جبل الزهرة ارتفاع مستدير واقع الى مقدم العانة مكون من اجتماع نسيج دهني تحت الجلد . وهو يعلو الفرج ويغطيه شعر عند البلوغ

والشفران الكبيران اثنتان جلد يتان طوليتان بارزتان ممتدتان الى الاسفل من جبل الزهرة الى الحد المقدم للعجان تحيطان بشق بيضي الشكل . كل منهما مؤلف في الظاهر من جلد مغطى بشعر وفي الباطن من غشاء مخاطي متصل بالغشاء المبطن للمسالك البولية التناسلية وبين الطبقتين المذكورتين كمية وافرة من نسيج خلوي ودهن ونسيج يشبه منسج الصفن واوعية واعصاب وغدد . والشفران اغلظ في المقدم منها في الخلف ويتصلان في الطرفين فيكونان المجمع المقدم والمجمع الخلفي . والخلاء الواقع بين المجمع الخلفي والاسف هو العجان طولة نحو قيراط . ونقاط المجمع الخلفي ثنية صغيرة مستعرضة يقال لها القيد الفرجي او الشوكة تنزق غالباً عند

شكل ٢٢٨ اعضاء التناسل الظاهرة في الاناث m جبل الزهرة p العجان او الشفران الكبيران i الشوكة وهي المجمع الخلفي n الشفران الصغيران c البظر u الصاخر البولي والحلاء الذي بين الصاخر والبظر هو الدهليز n الفتحة المهبلية


قصرت الالياف المرتبطة في قاع الصفن جذبتها الى باطنه. ومن الالياف الباقية تتكوّن العضلة
المعلّقة وهي الياف عضلية محيطة بالخصية والحبل المنوي ومكونة لاحدى الفئات الخصوية التي
سبق الكلام عليها. ويقال للحبل المذكور الدفة الخصوية لانها تهدي الخصية الى موقعها الطبيعي
كما تدبر الدفة السفينة

طرف مسطح بيضي الشكل هو الجسم وخيط طويل دقيق هو الذنب ولم يشاهد فيها شيء من التركيب الآلي فينسبون حركتها العجيبة الى بنائها الهدبي ويعدونها الان من نوع الكريات الهدبية. وهي عند الفيسيولوجيين العوامل الجوهرية في احداث العلوق او التلقح


في هبوط الخصيتين

وضع الخصية الى الشهر الخامس من الحيوة الجنينية في مؤخر التجويف البطني وراء البريتون والى مقدم الكلية. ثم بين الشهر الخامس والسادس تهبط الى الحفرة الحرقفية وفي الشهر السابع تدخل الحلقة الباطنة البطنية دافعةً امامها جزءاً من البريتون على هيئة كيس مدة سيرها في القناة الأربية. وعند نهاية الشهر الثامن تهبط الى الصفن دافعةً امامها كيساً برتونياً محيطاً بها ومستطرقاً من طرفه العلوي الى التجويف البريتوني البطني. وقبيل الولادة ينسد الطرف العلوي المذكور للكيس ويجف بحيث لا يبقى اتصال بينه وبين البريتون فتتكون منه الطبقة الغدية التي مرّ الكلام عليها

شكل ٢٢٧



شكل ٢٢٦




قبل ان سبب هبوط الخصية من وضعها الجنيني الى وضعها المعهود جبل عضلي البناء مرتبط من الاعلى بالطرف السفلي للبربخ ومن الاسفل بقاع الصفن الا ان بعض الياض مرتبطة برباط بويارت وبعضها بالعانة. فاذا قصرت الالياف المرتبطة برباط بويارت جذبت الخصية الى القناة الأربية واذا قصرت الالياف المرتبطة بالعانة جذبتها الى خارج الحلقة الظاهرة واذا

شكل ٢٢٦ في هذا الرسم قد هبطت الخصية الى اسفل الصفن وقصرت الدقة الى غاية ما يكون ٢ التجويف الغدي الممتد في اول الامر من التجويف البريتوني (٢) ثم يد الاستطراق الكائن بينهما عند الخط المستعرض

شكل ٢٢٧ هبوط الخصية ١ الخصية ٢ البربخ ٣ البريتون ٤ كيس يكوّن البريتون حول الخصية وهو تجويف الطبقة الغدية بعد هبوط الخصية ٥ القسم العاني من العضلة المعلقة الذي يرتبط باسفل الخصية ٦ قسم من العضلة المعلقة يرتبط برباط بويارت ٧ الدقة الخصوية المرتبطة بقاع الصفن ٨ تجويف الصفن

شكل ٢٢٥



والوحشية. والطرف المقدم مستدق متقارب نحو رقيقته عند قاعدة البروستنا ويتحد بالقناة الناقلة التي الى جانبه فيتكوّن من ذلك القناتان القاذفتان . والى الانسية من الحويصلة القناة الناقلة فيتكوّن منها الحد الجانبي لخلاء مثلث تحدّه من الورااء الثنية البريتونية المستقيمة الثانية

بناء الحويصلة من قناة واحدة ملتفة على نفسها مشنفة الجوانب على هيئة اكياس غير منتظمة . فاذا تمددت القناة المذكورة كان طولها من اربعة الى ستة قراريط طرفها الخلفي مسدود وطرفها المقدم ضيق يتحد بالقناة الناقلة

والقناتان القاذفتان موضوعتان واحدة الى كل جانب ومولفتان من اتحاد قناة الحويصلة المنوية بالقناة الناقلة . طول الواحدة منها نحو ثلاثة ارباع القيراط . تبدأ عند قاعدة البروستنا وتسير في جوفها نحو المقدم والاعلى وتنتهي بفتحة على هيئة شق في حافة الجيب الكاسي او ضمنه

بناء الحويصلتين من ثلاث طبقات الاولى ظاهرة وهي ليفية خلوية البناء ناشئة من اللفافة المستقيمة الثانية . والثانية متوسطة وهي ليفية البناء لدنة . والثالثة باطنة مخاطية مبطنة بكريات سطحية

شرايين الحويصلتين المنويتين ناشئة من الثاني السفلي والباسوري المتوسط . والاوردة والوعية الليمفاوية تابعة لسير الشرايين . والاعصاب ناشئة من الصغيرة الخنثوية

واما النبي فسائل غليظ ابيض له رائحة خاصة به . وهو مؤلف من سائل هو السائل المنوي ودقائق جامدة هي الحبيبات المنوية اجسام صغيرة هي الحيوانات المنوية . فالسائل شفاف لالون له البوميني التركيب . والحبيبات المنوية اجسام صغيرة مستديرة قطر الواحدة منها نحو ١/١٠٠٠ من القيراط . والحيوانات المنوية ويقال لها الخيوط ايضاً دقائق مستطيلة مؤلفة من

شكل ٢٢٥ الوجه الخلفي للمانة في الذكور وقد سلّمت الطبقة المصلية لاجل اظهار الطبقة العضلية ١ جسم المانة ٢ قمتها ٣ قاعدتها وهو قعرها ٤ الاوراكس ٥ وهه الخالبان ٦ و٧ القناتان الناقلتان ٨ والحويصلتان المنويتان ٩ والخلاء المثلث الذي تحده القناتان الناقلتان والحويصلتان المنويتان من الجانبين وخط منقط من الاعلى والرقم ٢ من الاسفل هو الخلاء الذي يتقابل المثلث الثاني في الباطن . وهذا الجزء من المانة يثقب في عمل ثقب المانة من المستقيم . والخط المنقط يدل على الحد الذي تصل اليه الثنية المستقيمة الثانية البريتونية


الفنيات وطولها فكان عددها على قول ٢٠٠ وعلى قول آخر ١٤٠ وطولها على قول ستة عشر قدماً وعلى قول آخر قدما وربع. ثم عند رؤوس الفصيصات تُحد الفنيات فتكوّن من عشرين الى ثلاثين قناة قطر الواحدة منها نحو $\frac{1}{8}$ من الفيراط وهي مستقيمة السير غير متلفنة ولذلك يقال لها الاوعية المستقيمة. وهذه الاوعية تدخل النسيج اللينى للمنصف وتصل الى الاعلى والخلف وتنفم مدة صعودها فتكوّن شبكة خشكة هي الشبكة الخصوية. فاذا صارت الى اعلى المنصف انتهت على هيئة قنوات عددها من اثني عشرة الى عشرين هي الاوعية الخارجة التي تثقب الطبقة البيضاء فتحمل المني من الخصية الى البرنج وهناك تتلف فتكوّن راس البرنج ثم تنتهي بقناة واحدة كثيرة التعرّيج يتكون منها جسم البرنج وذنبه. طول احد الاوعية الخارجة من ٦ الى ٨ قراريط وطول القناة البرنجية نحو عشرين قدماً. وقد توجد قناة متصلة باسفل القناة البرنجية او ببداءة القناة الناقلة صاعدة الى الحبل المنوي حيث تنتهي بطرف مسدود يقال لها القناة الحائرة

والقناة الناقلة امتداد القناة البرنجية. تبدأ عند الجزء السفلي لذنب البرنج وتصل الى حذاء الوجه الخلفي والانسي للخصية والبرنج فاذا صارت الى الحبل المنوي كوّنت جزءه الخلفي الى الحلقة الباطنة. ثم تنزل من الحلقة الى الحوض فتقاطع الشريان الحرقفي الظاهر وتنعكف حول الجانب الوحشي للشريان الشراسيفي الباطن. فاذا وصلت الى جانب المثانة انعكفت الى الخلف والاسفل حتى قاعدة المثانة فتكون بينها وبين المستقيم سائرة على الجانب الانسي للحويصلة المنوية. وعند ذلك تنتفخ ثم تضيق وتحد عند قاعدة البروستاتا بقناة الحويصلة المنوية فتكون من الاتحاد المذكور القناة الناقلة. طول القناة الناقلة نحو قدمين وقطرها نحو خط وربع. وجدراؤها مؤلفة من ثلاث طبقات ظاهرة خلوية ومتوسطة عضلية وباطنة مخاطية

الحويصلتان المنويتان

الحويصلتان المنويتان كيسان غشائيان موضوعان واحد الى كل من الجانبين بين قاعدة المثانة والمستقيم وفائدتهما انها حاصلان للمني ويفرزان سائلاً اخر يضاف اليه. شكل الكيس منها يقرب من المخروط طرفه العريض متجه الى الخلف وطرفه الضيق الى الامام نحو البروستاتا. طوله نحو قيراطين ونصف وعرضه نحو خمسة خطوط وسماكته نحو خطين او ثلاثة. الوجه العلوي ملاصق لقاعدة المثانة ويمتد من قرب منتهي الحالب الى قاعدة البروستاتا. والوجه السفلي مستقر على المستقيم منفصل عنه بواسطة الفافة المستقيمة المثانية. الطرف الخلفي منفرج عن رفيقه الى الخلف


شكل ٢٢٢



الياف بيض متصالبة . وجهها الظاهر مغطى بالطبقة الغدية الا عند حافتها الخلفية وعند اتصال البربخ بالخصية ولذلك كثيراً ما يعتبرونها ليفية مصلية كالام الجافية والتامور . وهذه الطبقة تغلف البناء الغدي للخصية ثم تنعكس عند حافتها الخلفية والعليا الى باطن الخصية فتكون حاجزاً غير كامل هو المنصف الخصوي . والمنصف المذكور ممتد من الحافة العليا الى قرب الحافة السفلى للخصية ويرسل من مقدمه وجانبه زوائد ليفية دقيقة تتصل بالوجه الباطن للطبقة البيضاء وتستقر بين الخلايا المكونة من الزوائد المذكورة فصيصات الخصية

والطبقة الوعائية وهي الام الحنونة للخصية غلاف وعائي مؤلف من اوعية دموية على هيئة صغيرة ممتدة على الوجه الباطن للطبقة البيضاء

شكل ٢٢٤



وترسل زوائد كثيرة بين الفصيصات تسدها الزوائد الليفية للمنصف الخصوي

في بناء الخصية . بناء الخصية من فصيصات كثيرة اكبرها اطولها ما كان في منتصف الغدة وقد عدّها بعض المشرحين فكانت ٢٥٠ وعدّها غيرهم فكانت ٤٠٠ . شكل الفصيص مخروطي قاعدته متجهة نحو محيط الغدة ورأسه نحو المنصف وهو واقع في خلية من الخلايا المكونة بين الزوائد الليفية والوعائية الممتدة بين المنصف والطبقة البيضاء ومؤلف من قناة واحدة او اكثر دقيقة متللفة هي القنوات المنوية . وقد اختلفوا على عدد

شكل ٢٢٢ تشرح الخصية ١ والطبقة البيضاء ٢ والمنصف الخصوي ٣ والفصيصات الخصوية ٤ والوعية المستقيمة ٥ والشبكة الخصوية ٦ والوعية الخارجة ٧ ووضع منها في الرسم الاسنة فقط ٨ رأس البربخ ٩ ذنبه ١٠ القناة الناقلة ١١ القناة الحائرة


شكل ٢٢٤ البناء الغدي للخصية كما يظهر بعد حقهق بالزيت " و" والفصيصات الخصوية المولفة من القنوات المنوية المتللفة ٦ الشبكة الخصوية ٧ والوعية الخارجة ٨ انعكاس الوعية المذكورة الى الاسفل فيتكون من ذلك رأس البربخ ٩ و١٠ تمددات في الوعية الخارجة / جسم البربخ ١١ ذنبه // القناة الحائرة / القسم المتللف للقناة الناقلة ١٢ قسمها المستقيم

منضبطة من الجانبين والمؤخر ومنحرفة الوضع في الصنف بحيث يكون طرفها العلوي مشرفاً الى المقدم وقليلاً الى الوحشية وطرفها السفلي الى الخلف وقليلاً الى الانسية وحافتها المقدمة المحدبة مشرفة الى المقدم والاسفل والحافة الخلفية المستقيمة التي يرتبط بها الحبل مشرفة الى الخلف والاعلى. وجهها المقدم والوجهان الجانبيان والطرفان محدبة سائبة ملساء مغلقة بالطبقة الغدية. حافتها الخلفية التي يرتبط بها الحبل لا يتغلف الا بعضها بالطبقة المذكورة. ويستقر على الشفة الوحشية للحافة الخلفية جسم طويل مسطح ضيق هو البربخ

البربخ مؤلف من جزء مركزي هو الجسم وطرف علوي منتفخ هو الراس وطرف سفلي مستدق هو الذنب. فالراس متصل بالطرف العلوي للخصية بواسطة قنواتها الخارجة منها والذنب متصل بالطرف السفلي بواسطة نسج خلوي وانعكاس من الطبقة الغدية. والوجه الوحشي والطرف العلوي والطرف السفلي للبربخ سائبة مغطاة بغشاء مصلي. والجسم مغطى بالغشاء المذكور الا عند حافته الخلفية ويتصل بمؤخر الخصية بواسطة ثنية منه

طول الخصية من قيراط ونصف الى قيراطين وعرضها قيراط وقطرها المقدم الخلفي قيراط وربع. ووزنها من ستة الى ثمانية دراهم. واليسرى منها اكبر قليلاً من اليمنى ثم ان الخصية مغلقة بثلاث طبقات هي الغدية والبيضاء والوعائية تُعد من الظاهر الى الباطن

شكل ٢٢٢



فالتبقة الغدية كيس مصلي ناشئ من البريتون عند هبوط الخصية في الجبين من البطن الى الصنف. ثم بعد الهبوط المذكور لا يبقى اثر لما توسط من الكيس بين الحلقة الباطنة والجزء العلوي للخصية. وانما ما بقي منه يكون على هيئة جراب مسدود يغلف ظاهر الخصية ثم ينعكس على الوجه الباطن للصنف ولذلك هو طبقتان حشوية وجدارية. فالحشوية تغلف الخصية والبربخ وتوصل البربخ بالخصية بواسطة ثنية خاصة ثم تنعكس من الحافة الخلفية للخصية على الوجه الباطن للصنف. والجدارية مبطن للصنف وهي ملساء سائبة مغطاة بكرات سطحية. ويقال للخلاء الواقع بين الطبقتين المذكورتين تجويف الطبقة الغدية

والطبقة البيضاء غلاف ليفي للخصية. وهي كثيفة لونها ابيض ميل الى الزرقة مكونة من

شكل ٢٢٢ قطع عرضي للخصية ١ تجويف الطبقة الغدية المؤلف من طبقة جدارية ظاهرة وطبقة حشوية باطنة ٢ الطبقة البيضاء ٣ المنصف الحشوي الذي يرسل زوائد ليفية الى الوجه الباطن للطبقة البيضاء ٤ الطبقة الوعائية وهي الام الحشوية للخصية ٥ احد الفصيصات المستقرة بين الزوائد الليفية للمنصف. ويشاهد ان جميعها مرافقة من التنبات المنوية المتلفة التي ينتهي كل منها بقناة واحدة هي الوعاء المستقيم ٦ قطع البربخ

وهي امتداد الى الاسفل من الزائدة القمعية للنافة المستعرضة يتم عند هبوط الخصيتين في الجبين والنافة الغمدية من اللفائف الخاصة بالخصية التي سيأتي الكلام عليها. وجميع هذه اللفائف سيعود ذكرها في الشريح الجراحي للفتق الأري

شرايين لفائف الخصيتين الشريان الاستحيائي الظاهر السطحي والاستحيائي الظاهر الغائروها من الفخذي والفرع العجاني السطحي من الاستحيائي الباطن والفرع المعلق من الشراسيفي. واوردها تابعة لسير الشرايين. والوعية الليمفاوية تنتهي في الغدد الأربية. والاعصاب الحرقفي الأري والحرقفي الخنثي وهما فرعان من الضفيرة القطنية وفرعان العجانيان السطحيان للاستحيائي الباطن والفرع التناسلي للعصب التناسلي الفخذي

الحبل المنوي

الحبل المنوي ممتد من الحلقة الباطنة البطنية حيث تجتمع الاجزاء التي يتالف منها الى مؤخر الخصية. تاليفه من شرايين واوردة ووعية ليمفاوية واعصاب والقناة الناقلة للخصية منضمة بعضها الى بعض بواسطة نسيج خلوي ومغلقة بلفائف مندفعة من الاعلى. سيره في الجدار البطني منحرف تبعاً لانحراف القناة الأربية التي يمر فيها فيكون وضعه اولاً اسفل العضلة المنخرقة الباطنة وعلى اللفافة المستعرضة فاذا قارب العانة استقر على رباط پوپارت بحيث يكون صفاق المنخرقة الظاهرة الى مقدمه والوتر المشترك الى خلفه ثم ينفذ من الحلقة الظاهرة ويتزل عمودياً الى الصفن. الحبل الايسر اطول قليلاً من الايمن ولذلك كانت الخصية اليسرى اكثر انخفاضاً قليلاً

من اليمين

شرايين الحبل اولاً الشريان المنوي من الاورطي الذي يتوزع في الخصية والبرنج والطبقة البيضاء. وثانياً شريان القناة الناقلة من المثاني العلوي الذي يصاحب القناة المذكورة ويتوزع في طبقاتها ويتفهم بالمنوي بقرب الخصية. وثالثاً الفرع المعلق من الشراسيفي الذي يتوزع في العضلة المعلقة وبقية لفائف الحبل. والاوردة المنوية تخرج من مؤخر الخصية وتقبل فروعاً من البرنج وتكون ضفيرة يتالف منها معظم الحبل. وتنتهي الضفيرة المذكورة بمجذع واحد يصب الايمن منها في الاجوف السفلي واليسر في الوريد الكلوي الايسر. والوعية الليمفاوية كبيرة الحجم مصاحبة لسير الوعية الدموية وتصب في الغدد القطنية. والاعصاب من الضفيرة المنوية للسيمباتوي

الخصيتان

الخصيتان غدتان صغيرتان معلقتان بالحبلين المنويين في الصفن. شكل الغدة منها بيضي

وانما في الادوار الاول للحيوة الجنينية تكون الخصيتان ضمن التجويف البطني وراء البريتون فاذا قارب الجنين الولادة هبطتا الى الفناة الأربية ثم تنفذان مع الحبل المنوي من الحلقة الظاهرة البطنية فتترلان الى باطن الصفن. وفي سيرها المذكور تتغلغان بلفائف كثيرة ناشئة من الطبقات المصلية والعضلية والليفية لجدران البطن ويضاف اليها الصفن وعلى ذلك تكون لفائف الخصيتين من الظاهر الى الباطن اولاً الصفن المولف من الجلد والمنسلخ ثانياً اللفافة المنوية الظاهرة ثالثاً اللفافة المعلقة رابعاً اللفافة المنوية الباطنة وهي الخاصة وخامساً اللفافة الغمدية

فالصفن جراب جلدي يتضمن الخصيتين وبعض الحبلين المنويين. ويقسمه الى شطرين جانبيين خط متوسط او قيد يمتد في المقدم على الوجه السفلي للقضيب وفي الخلف على الخط المتوسط للعجان حتى الامت. الشطر الايسر اطول من الايمن مقابلة لزيادة طول الحبل المنوي في الجانب المذكور. الوجه الظاهر للصفن مختلف المنظر فيكون مستطيلاً رخواً مدة الحر وفي الشيوخ والمنهوكين وقصيراً مجعداً معانقاً للخصيتين مدة البرد وفي الشباب والاقوياء. تاليفة من طبقتين هما الجلد والمنسلخ. فالجلد رقيق جداً اسمر اللون ويكون مجعداً في الغالب وفيه اجربة شمعية رائحة افرازها خاصة به وعليه شعر دقيق مجعد تشاهد جذوره من الجلد. والمنسلخ طبقة رقيقة من نسيج رخومائل الى الحمرة له خاصية الانقباض. وهو البطانة الخاصة بالصفن ويختلط عند قاعدته باللفافة السطحية للأربية والعجان ويرسل الى الباطن حاجزاً يفصل التجويف الصفني الى تجويفين واحد لكل خصية. وهذا الحاجز ممتد من القيد الصفني الى الوجه السفلي للقضيب حتى جذره. والمنسلخ شديد الالتصاق بالجلد ويتصل بما دونه من الاجزاء بواسطة نسيج لطيف خاوي بحيث تكون حركته عليها سهلة جداً. وهو كثير الاوعية مولف من نسيج خلوي رخوي يتضمن اليافاً عضلية غير مخططة

واللفافة المنوية الظاهرة ويقال لها بين القائمتين ايضاً غشاء رقيق ناشئ من حافتي القائمتين للحلقة البطنية الظاهرة فانها تندفع امام الخصية عند هبوطها في الجنين وتحيط بالوجه الظاهر للحبل المنوي والخصية. وهي منفصلة عن المنسلخ بواسطة نسيج رخوي ملتصقة بالطبقة التي دونها التصاقاً شديداً

واللفافة المعلقة مولفة من حزميات عضلية (هي العضلة المعلقة للخصية) ناشئة من الحافة السفلى للعضلة المنخرقة الباطنة عند هبوط الخصية في الجنين

واللفافة المنوية الباطنة وهي الخاصة طبقة غشائية رقيقة مغلقة لوجه الحبل المنوي تغليفاً رخوياً.

يدل على الانقسام المذكور من الظاهر خط قيدي ومن الباطن خط بارز هو حاجز ليفي رقيق في بناء الجسم الاسفنجي . تاليف الجسم الاسفنجي من غلاف ليفي متين محيط ببناء شبكي يتضمن في خلاياه نسيجاً انتصابياً . فالغلاف الليفي ارق واكثر لدونة من الغلاف الخاص بالجسمين الاجوفين وزوائده التي تكوّن بتقاطعها النسيج الشبكي الباطن لطيفة البناء والخلايا الواقعة في

شكل ٢٢١



النسيج المذكور صغيرة وقطرهما الطويل مواز في الغالب لطول القضيب . ويتكوّن بعض الطبقة الظاهرة للجسم الاسفنجي من الياف عضلية متصلة من الخلف بالياف المثانة

واما النسيج الانتصابي فمؤلف من ضفائر وريدية مشوشة التركيب موضوعة في الخلايا المكونة من تقاطع الزوائد الليفية . والاوردة المذكورة كثيرة العدد والاستطراق بعضها الى بعض رقيقة جداً . بعضها ينتهي في الوريد الظهري للقضيب وبعضها يسير عند جذر القضيب الى الضفيرة البروستاتية والاوردة الاستحيائية

شرايين القضيب ناشئة من الشريان الاستحيائي الباطن . فالتى تتوزع في الجسمين الاجوفين منها اثنان خاصان بهما من الاستحيائي الباطن ومنها ما ينشأ من الشريان الظهري للقضيب . والتي تتوزع في الجسم الاسفنجي تنشأ من الشريان البصلي وقال كوبلت ان له فروعاً ناشئة راساً من الاستحيائي الباطن . واوعيته الليمفاوية مجموعان احدهما سطحي ينتهي في الغدد الأربية والاخر غائر يسير اسفل القوس العاني ويتحد بالاوعية الليمفاوية الغائرة للحوض . واعصابه ناشئة من العصب الاستحيائي الباطن والضفيرة الختلية

الخصيتان ولفائفها

الخصيتان غدتان صغيرتان تفرزان المنى موضوعتان في الصفن ومعلّقتان بالحبلين المنويين .

شكل ٢٢١ قطعة من النسيج الانتصابي للجسم الاجوف . وهي مكبرة لاجل اظهار البناء الخلوي وتوزيع الشرايين " شريان صغير مسند على الزوائد الليفية c الضفائر الصغيرة الناعلة للخلايا المكونة من تقاطع الزوائد الليفية " البناء الخلوي المكون من الزوائد الليفية الدقيقة

القلفة اشبه بغشاء مخاطي ترتبط اولاً بالعنق ثم تنعكس على ظاهر الحشفة وتخلط عند الصماخ البولي بالغشاء المبطن لمجرى البول. والغشاء المخاطي المغطي للحشفة خالٍ من الغدد الشعمية وانما يبرز من وجهه الظاهر حلقات دقيقة شديدة الحس

تأليف القضيب من نسج انتصابي منقسم الى ثلاث اسطوانات كل واحدة منها محاطة بغلاف ليفي. اثنان منها موضوعان الواحدة بجانب الاخرى في الجزء العلوي للقضيب هما الجسمان الاجوفان. والثالثة موضوعة في الاسفل ومحيطة بالمجرى البولي هي الجسم الاسفنجي

فالجسمان الاجوفان مكوّنان لمعظم جسم القضيب ومولّفان من قناتين اسطوانيتين لينيتين موضوعتين الواحدة بجانب الاخرى ملتصقتين في الخط المتوسط الا في الربع الخلفي حيث تنفصلان فتكوّنان الساقين الذين يرتبط بهما القضيب بفرعي العظمين الامامين. وعلى وجهها العلوي في الخط المتوسط ميزاب يستقر فيه الوريد الظهري وعلى وجهها السفلي ميزاب مثل ذلك لقبول الجسم الاسفنجي

بناءهما. كلٌّ من الجسمين الاجوفين مولّف من غلاف ليفي متين محيط ببناء ليفي شبكي يتضمن نسجاً انتصابياً. فالغلاف الليفي كثيف جداً سميك كثير اللدونة وهو يحيط اولاً بالاسطوانتين ثم يرسل زوائد كثيرة من وجهه الباطن ومن الفاصل بين الاسطوانتين. والزوائد المذكورة تقاطع باطن الاسطوانة من كل جهة فيتكوّن من ذلك خلايا شبكية يشغلها النسج الانتصابي الذي هو عبارة عن تضفر وعائي. واما الفاصل الليفي فحاجز بين الجسمين الاجوفين غليظ تام في المؤخر غير تام في المقدم حيث يرسل زوائد عمودية على هيئة اسنان المشط ممتدة بين الوجه الظهري والوجه الجروي للجسمين الاجوفين. والجوهر الليفي المذكور مولّف من الياف بيض وصفرة وعضلية

والجسم الاسفنجي محيط بمجرى البول وموضوع في الميزاب الواقع في الوجه السفلي للجسمين الاجوفين. يبدأ من الخلف الى مقدم اللقافة العجانية الغائرة بين الساقين المنفرجين للجسمين الاجوفين فيكون هناك اتفاخاً مستديراً هو البصلة وينتهي في المقدم بانفتاح اخر هو الحشفة التي تغطي الطرف المقدم المستدير للجسمين الاجوفين

والبصلة المذكورة مختلفة الحجم في الاشخاص وتقبل غلافاً ليفياً من الطبقة المقدمة للقافة العجانية الغائرة وتحيط بها العضلة المعجمة للبول. واما مجرى البول فنفاذ من البصلة الى المقدم على خط اقرب للوجه العلوي من السفلي. وما كان اسفل المجرى من البصلة منقسم الى فصين غير كاملين

العضلي مرتب على هيئة حزم حلقيه حول المجرى مختلطة من الخلف بالالياف الحلقيه للعاصرة
 المثانية ومن المقدم بالالياف الحلقيه الخاصة بالمجرى وهي من النوع الغير المخطط
 واما الافراز البروستتي فوسائل لبني الشكل حامض الفعل. وقد تتعاطم البروستتا في الشيوخه
 فتمتلئ قنواتها بتجمعات صغيرة كثيرة مؤلفة من كربونات الكلس ومادة حيوانية
 سرايين البروستتا ناشئة من الاستحيائي الباطن والمثانية والباسورية. واوردها تكون صغيرة
 عند جانبي الغدة وقاعدتها وتصب في الوريد الحرقفي الباطن. واعصابها من الصغيرة الخلفية
 غدتا كوبر (شكل ٢٢٩)

ها جسمان صغيران مستدبران لونها مائل الى الصفرة قدر الواحدة منها كالقولة موضوعان
 اسفل الجزء الغشائي للمجرى عند مقدمه وبين طبقتي اللقافة العجانية الغائرة. وها واقعتان عند
 موخر البصلة وتحيطها العضلة العاصرة للمجرى. الغدة منها مؤلفة من فصيصات منضمة بعضها الى
 بعض بواسطة غلاف ليفي. طول قناتها الناقلة نحو قيراط تسير الى المقدم تحت الغشاء المخاطي
 وتصب بفتحة دقيقة في ارض الجزء البصلي للمجرى وهو بداية القسم الاسفنجي

القضيب (شكل ٢٣٩)

القضيب عضو الجماع ويتضمن الجزء الأكبر للمجرى البول. ينقسم الى جذر وجسم وطرف هو
 الحشفة

فالجذر عريض يرتبط بفرعي العظمين العانيين بواسطة زائدين ليفيتين هما الساقان ويرتبط
 ايضاً بمقدم الارتفاق والعاني بواسطة غشاء ليفي هو الرباط المعلق
 والطرف وهو الحشفة مخروطي الشكل مسطح من الاعلى الى الاسفل وعند قمته شق عمودي هو
 الصماخ البولي او فتحة المجرى. والى موخر الفتحة المذكورة ثنية من الغشاء المخاطي سائرة الى الخلف
 ومختلطة بالقلقة هي قيد القلقة. وتكون قاعدة الحشفة حافة بارزة مستديرة هي الاكليل الحشفي. والى
 الوراء من الاكليل اخنناق غائر هو العنق. وعلى الاكليل والعنق عدد شمعية تفرز مادة لها رائحة
 خاصة بها

وجسم القضيب هو الجزء المتوسط بين الجذر والطرف. شكله عند الارتخاء اسطواني وعند
 الانتصاب منشوريه مثلث زواياه مستديرة جانبه الاعرض الى الاعلى يقال له الظهر. والجلد
 المغطي له رقيق داكن اللون رخو الالتصاق بما دونه وخالٍ من المادة الدهنية وهو ممتد من
 جلد العانة والصفن من الخلف وينتهي على نفسه من المقدم فيكون القلقة. والطبقة الباطنة من

في اعضاء التناسل في الذكور

البروستتا (شكل ٢٣٩ و ٢٤٠)

البروستتا كلمة يونانية مأخوذة من معنى التقدم وهي غدة باهتة اللون شديدة التوام محيطة بعنق المثانة وبداية المجرى . وضعها في التجويف الحوضي وراء واسفل الارتفاق العاني خلف اللقافة العجانية الغائرة وعلى المستقيم بحيث تجس منه فيشعر بها واضحا . شكلها مخروطي قاعدتها متجهة الى الخلف نحو عنق المثانة ورأسها الى المقدم نحو اللقافة العجانية الغائرة بحيث يسها . وجهها السفلي امس مستقر على المستقيم ومتصل به بواسطة نسج خلوي ليفي كثيف ووجهها العلوي مسطح عليه تلم طولي وضعه اسفل الارتفاق العاني بنحو ثلاثة ارباع الفيراط . قطرها المستعرض عند القاعدة نحو قيراط ونصف وقطرها الطولي اي من المقدم الى المؤخر نحو قيراط وسماكتها نحو ثلاثة ارباع الفيراط ووزنها نحو ستة دراهم

وهي مؤلفة من ثلاثة فصوص فصين جانبيين وفص متوسط . فالفصان الجانبيان يفصلهما من الخلف شرم غائر ومن الاعلى والاسفل تلم خفيف . والفص المتوسط رباطة صغيرة مستعرضة وقد يكون على هيئة حذبة مستديرة او مثلثة وضعه بين الفصين الجانبيين في الجزء السفلي والخلفي للغدة فيكون واقعا اسفل عنق المثانة خلف بداية المجرى واعلى القناتين القاذفتين . وهذا الفص غير دائم الوجود بل هو نادر وقد يتعاطم في الشيخوخة الى ان يبرز الى باطن المثانة فيعارض افراغ البول

ويتقب البروستتا مجرى البول والقناتان القاذفتان المنويتان فيكون المجرى عادة اقرب الى الوجه العلوي من السفلي . واما القناتان المنويتان فيسيران الى المقدم في الجزء السفلي للبروستتا ثم يصبان في الجزء البروستتي للمجرى

بناؤها . البروستتا مغلقة بحفظة رقيقة ليفية متينة وغلاف اخر ناشئ من الطبقة الخلفية لللقافة العجانية الغائرة ومنفصلة عنها بواسطة ضفيرة وريدية . وهي مؤلفة من جوهر غددي ونسج عضلي . فالجوهر الغددي مؤلف من اجربة كثيرة تنتهي بقنيات اذا اتحدت كوَّنت قنوات عددها من اثني عشرة الى عشرين هي قنواتها الناقلة التي تصب في ارض الجزء البروستتي للمجرى . والنسج


الجانبين شفة صغيرة . ويشاهد في وجهه الباطن المخاطي فتحات غدد واجربة كثيرة مخاطية موضوعة في النسيج الذي دون الغشاء المخاطي هي غدد ليتري . ولما كانت الفتحات المذكورة متجهة الى المقدم فقد تعارض راس التناطير عند ادخاله الى المجري . اكبر هذه الفتحات واحدة واقعة في الوجه العلوي للحنجرة الزورقية على بعد نحو قيراط ونصف من الصاخر يقال لها الفتحة الكبيرة

في بناء المجري . مجرى البول مولف من ثلاث طبقات مخاطية وعضلية وانتصامية فالطبقة المخاطية جزء من الغشاء المخاطي المبطن للاعضاء التناسلية البولية فهي ممتدة من الغشاء المبطن للمثانة والحالبين والكليتين والى الظاهر من الجدار المغطي للحشفة وتدوم الى قنوات غدد كوبر والبروستا والى القناتين الناقلتين والحويصلتين المنويتين بواسطة القناتين القاذبتين . وهي على هيئة ثنيات طولية عند ارتخاء القضيب . معظم الكريات المبطنة لها من النوع العمودي والطبقة العضلية مكونة من طبقتين من الالياف العضلية الغير المخططة طبقة ظاهرة طولية وطبقة باطنة حلقيه . واكثر النسيج العضلي هو في القسم البروستي للمجري والطبقة الانتصامية رقيقة ممتدة من الجسم الاسفنجي محيطة بالقسم الغشائي والقسم البروستي للمجري حتى عنق المثانة

الوضع مكوّن من ارتفاع الغشاء المخاطي والنسيج الذي دونه يقال له العرف الجبلي . طوله نحو ثمانية خطوط وعلوه نحو خط ونصف قيل انه يدخل في تكوينه نسيج عضلي ونسيج انتصالي فاذا تمدد ربما منع تهبقر المني الى المثانة . والى كل من جانبي العرف المذكور انخفاض خفيف هو الجيب البروستتي تصب في ارضه القنوات البروستتية . والى مقدم العرف في الخط المتوسط انخفاض هو الجيب الكاسي تصب فيه فتحتا الثناتين القاذفتين طوله نحو ربع قيراط يتكوّن من جلاره العلوي بعض العرف

والقسم الغشائي لمجرى البول ممتد بين راس البروستتا وصلة الجسم الاسفنجي وهو اضيق اجزاء القناة المجرية الا الفتحة الظاهرة . طول وجهه العلوي ثلاثة

شكل ٢٢٠



ارباع القيراط وطول وجهه السفلي نصف قيراط وسبب هذا الاختلاف هو ان البصلة بارزة الى الخلف في الاسفل . وجهه العلوي متعر موضوع اسفل القوس العاني بنحو قيراط ومنفصل عنه بواسطة الاوعية والاعصاب الظهرية للفضيب وبعض الياف عضلية . ووجهه السفلي محدد منفصل عن المستقيم بواسطة خلاء مائل يتكوّن منه العجان . ثم ان القسم الغشائي يتنب للفاقة الغائرة العجانية وتحيط به العضلة العاصرة للمجرى فتكون طبقاته الغشاء المخاطي ونسيج ليفي لدن وطبقة رقيقة من النسيج الانتصالي والياف عضلية وزائدة ممتدة من اللفاقة العجانية الغائرة

والقسم الاسفنجي اطول اقسام المجرى واقع ضمن الجسم الاسفنجي .


طوله نحو ستة قيراط ويمتد من منتهى الجزء الغشائي الى الصماخ البولي وهو الفتحة الظاهرة . يبدأ اسفل الارتفاع العاني ثم يصعد قليلاً ثم ينحني الى الاسفل . وهو ضيق متساوي النطر في التضيب الذي يبلغ ربع قيراط ممتد في الخلف ضمن البصلة حيث يكون القسم البصلي وفي المقدم ايضاً ضمن الحشفة حيث يكون الحفرة الزورقية . قطره الطويل في التضيب عرضي وفي الحشفة عمودي والصماخ البولي اضيق اجزاء المجرى . وهو شق عمودي طوله نحو ثلاثة خطوط تحده من

شكل ٢٢٠ القسم البصلي والغشائي والبروستتي للمجرى مع بعض المثانة ١ بعض الوجه الباطن للمثانة ٢ المثلث المثاني ٣ فتحة الحالبين ٤ الغلصة المثانية ٥ العرف الجبلي ٦ الجيب الكاسي ٧ و٨ فتحة الثناتين القاذفتين ٨ و٩ فتحات القنوات البروستتية ١٠ و١١ الفصان الجانبيان للبروستتا ١٢ القسم الغشائي للمجرى ١٣ غرنا كوير ١٤ فتحة فتاتها ١٥ بداية القسم البصلي للمجرى ١٦ الوجه العلوي لبصلة الجسم الاسفنجي ١٧ و١٨ ساقا التضيب ١٩ القسم الاسفنجي للمجرى

تصاحب الاوعية الدموية وتنفذ من الغدد المحيطة بها . والاعصاب ناشئة من الضفيرة
الماسارية السفلى الخشبية والضمفيرة العجزية فتتوزع فروع الضفيرة الخشبية في الجزء العلوي وفروع
العجزية في القاعدة والعنق

مجرى البول في الذكور

مجرى البول ممتد من عنق المثانة الى الصاخر البولي . وهو منحني في سيره فيكون على هيئة
السين الا فرنجية عند ارتخاء القضيب وعلى هيئة قوس خفيف تعبيره الى الاعلى عند الانتصاب .
طوله من ثمانية الى تسعة قراريط ويقسم الى ثلاثة اقسام مختلفة البناء والمجاورات وهي البروستتي
والغشائي والاسفنجي



فالقسم البروستتي اوسعها واكثرها تمدداً يسير في البروستتا من قاعدتها الى راسها
وهو اقرب الى وجهها العلوي من السفلي . طوله نحو قيراط وربع وهو متسع عند المنتصف
اكثر من الطرفين وتحد من طرفه المقدم بالقسم الغشائي . وفي ارض القناة خط بارز ضيق طولي

شكل ٢٢٩ قطع طولي للمثانة والغدة البروستتا والقضيب لاجل اظهار المجرى ١ الاوراكس مرتبطة بقمة المثانة ٢ النبية المستقيمة
عند نقطة انعكاسها من قاعدة المثانة على الوجه المقدم للمستقيم ٣ فتحة الحالب الايمن ٤ خط بارز تكونه عضلة الحالب ممتد من
فتحة الحالب الى بداية المجرى . والخط المذكور هو الحد الجانبي للمثلك المثاني ٥ بداية المجرى . والارتفاع الذي اسفل الرتم هو
الفلسبة المثانية . والاختناق الذي هناك هو عنق المثانة ٦ القسم البروستتي للمجرى ٧ البروستتا ويشاهد ان قسمها العلوي
اصغر من السفلي ٨ برزخ البروستتا وهو فصها الثالث وتشاهد اسفله القناة القاذفة سائرة الى المقدم ٩ الحويصلة المثوية وقد
قطعت القناة النافلة بقرب اتصالها بالقناة القاذفة ١٠ القسم الغشائي للمجرى ١١ غدة كوبر البيني وقناتها ١٢ القسم البولي
للمجرى ١٣ الحفرة الزورقية ١٤ الجسم الاجوف للقضيب ١٥ الساق البيني للقضيب ١٦ الفاصل البيني بين الجسمين الاجوفين
والرتم موضوع بقرب منتهي الجسم الاجوف عند قاعدة الحشفة (١٧) ١٨ قطع الجزء السفلي للحشفة ١٩ الصاخر البولي ٢٠ الجسم
الاسفنجي ٢١ بصلة الجسم الاسفنجي

للمثانة وتضفر وتمتد الى الوجه الخلفي والقاعدة حتى العنق وتندغم بالبروستتا في الذكور وبالمهبل في الاناث. وبعض الالياف الطولية تنشأ في الذكور من جانبي البروستتا وتتصلب على جانبي المثانة. والالياف الحلقية قليلة الوجود في جسم المثانة كثيرة حول العنق وبداية مجرى البول حيث تكون طبقة غليظة حلقيه هي العاصرة للمثانة وتختلط بالالياف العضلية للبروستتا. ثم ما عدا الالياف المذكورة يوجد الياف منحرفة تنشأ مما يلي فتحتي الحالبين ثم تجتمع نحو مؤخر البروستتا وتدغم بنفسها المتوسط وقد سماها المعلم بل عضلاتي الحالبين وقال ان فائدتها انها تحافظان على الاتجاه المنحرف للحالبين مدة انقباض المثانة بحيث لا يتقهقر البول اليهما

والطبقة الخلوية نسيج خلوي يربط الطبقة العضلية بالمخاطية وهو شديد الالتصاق بالطبقة
المخاطية

والطبقة المخاطية رقيقة ملساء لونها وردي باهت مختلطة من الاعلى بالغشاء المبطن للقيبات البولية بواسطة الحالبين ومن الاسفل بجري البول. وهي ملتصقة بالطبقة العضلية بواسطة الطبقة الخلوية التصاقاً رخواً الا في مثلث المثانة حيث يكون شديداً. غددها المخاطية قليلة الا في العنق فهي هناك كثيرة ومبطنة بكرات عمودية

في باطن المثانة. يشاهد على الوجه الباطن لقاعدة المثانة وراء فتحة مجرى البول سطح مثلث امس رأسه متجه الى المقدم هو المثلث المثاني. لونه ابيض مما بقي من الغشاء المخاطي للمثانة وهو خالٍ من الطيات التي تشاهد في الغشاء المذكور ولو عند هبوط المثانة وذلك لشدة التصاقه بالانسجة المجاورة التي دونه. يحده من الجانبين خطان سائران الى الخلف والوحشية حتى فتحتي الحالبين هما عضلتا الحالبين. وتحدّه عند كل زاوية خلفية فتحة احد الحالبين الواقعة على بعد قيراطين من الفتحة الاخرى ونحو قيراط ونصف من فتحة مجرى البول. والمثلث المذكور الباطن يقابل الخلاء الواقع عند قاعدة المثانة الذي تحدّه البروستتا من المقدم والحويصلتان المنويتان والقناتان الناقلتان من الجانبين. ويبرز من الجزء السفلي والمقدم للمثانة الى فتحة مجرى البول ارتفاع خفيف من الغشاء المخاطي مسبب عن غلظ في البروستتا يقال له
الغليصة المثانية

شرايين المثانة المثاني العلوي والمتوسط والسفلي في الذكور ويضاف الى ذلك في الاناث فروع من الشريان الرحي. وجميعها ناشئة من الجذع المقدم للحرقفي الباطن. واوردها تكون ضفيرة حول عنق المثانة وجانبيها وقاعدتها وتنتهي في الوريد الحرقفي الباطن. والاعوية الليمفاوية

الثنية البريتونية معها وصارت المسافة بين انعكاسها والمستقيم نحو اربعة قراريط وتكون اقل من ذلك جداً اذا كانت المثانة فارغة متقبضة. واما في الاناث فتكون قاعدة المثانة ملامسة للجزء السفلي لعنق الرحم وملتصقة بالجدار المقدم للهبيل ومنفصلة عن الجزء العلوي لمقدم عنق الرحم بواسطة ثنية من البريتون

والعنق هو القسم الضيق من المثانة الذي يند منه مجرى البول. اتجاهه في الذكور عند انتصاب الجسد منحرف وهو محاط بالغدة البروستتية. وفي الاناث اتجاهه منحرف الى الاسفل والمقدم

في اربطة المثانة. هي خمسة صحيحة وخمسة كاذبة


فالصحيحة ممتدة من اللقافة الحوضية اثنان مقدمان واثنان جانبيان مكونة من اللقافة المستقيمة الثانية والخامس هو الاوراكوس. اما الرباطان المقدمان ويقال لها ايضاً العانيان البروستتيان فيمتدان من مؤخر العانة واحد من كل من جانبي الارتفاق العاني الى مقدم عنق المثانة والوجه العلوي للبروستتا. والرباطان الجانبيان مرتبطان بجانبي البروستتا وقاعدة المثانة. والاوراكوس وقد ذكره جبل ليفي عضلي ممتد بين قمة المثانة والسرة وهو عرض في الاسفل ضيق في الاعلى

واما الاربطة الكاذبة فاثنتان خلفيان واثنان جانبيان وواحد علوي وهي مكونة من ثنيات بريتونية. فالرباطان الخلفيان يسيران الى المقدم من جانبي المستقيم في الذكور ومن جانبي الرحم في الاناث الى الجهة الخلفية والجانبية للمثانة فيكونان الحدين الجانبيين للثنية المستقيمة المثانية البريتونية ويتضمنان الشريانين الخنثيين والحملين واوعية واعصاب. والرباطان الجانبيان انعكاسان من البريتون من الحفرتين الحرقفتيتين الى جانبي المثانة. والرباط العلوي ثنية من البريتون ممتدة من قمة المثانة الى السرة وتغطي الاوراكوس والحبلين الخنثيين

في بناء المثانة. المثانة مؤلفة من اربع طبقات مصلية وعضلية وخلوية ومخاطية

فالطبقة المصلية ناشئة من البريتون وغير كاملة فانها لا تغلف الا القسم الخلفي للمثانة اي من مدخل الحملين الى قمة المثانة ثم تنعكس من القمة والجانبيين على الجدران البطنية والحوضية والطبقة العضلية مؤلفة من طبقتين من الالياف العضلية الغير المخططة طبقة ظاهرة اليافها طولية وطبقة باطنة اليافها حلقيه. فالالياف الطولية تنشا من المقدم من الرباطين المقدمين ومن عنق المثانة وفي الذكور من الجزء المجاور لذلك من البروستتا ثم تنتشر على الوجه المقدم

القناة المذكورة مجوفة عند الولادة فيخرج البول من السرة . ويقال للحبل المذكور الاوراكس



شكل ٢٢٨

اي الحامل البول . واما الحبلان الجانبيان فبقايا الجزء الجاف من الشريانين الخثليين . ثم ان ما وراء الاوراكس من التمة مغطى بالبريتون وما كان الى المقدم عاري من الغشاء المذكور وملامس للجدار البطني

والجسم مقدمه عار من البريتون ومجاور للرباط المثلث لجرى البول والوجه الخلفي للارتفاق العاني والعضلتين السادتين الباطنتين والجدار البطني المقدم اذا كانت المثانة ممتدة . والوجه الخلفي للجسم مغطى مغطى بالبريتون ومشرف على المستقيم في الذكور والرحم في الاناث

والقاعدة ويقال لها القعر ايضاً متجهة الى الاسفل والخلف عريضة اذا كانت المثانة ممتلئة ضيقة اذا كانت فارغة . في الذكور تستقر على القسم الثاني للمستقيم وانما تنفصل عنه بواسطة انعكاس من اللفافة المستقيمة المثانية ويغطي جانباً صغيراً من جزءها الخلفي البريتون المنعكس منها على المستقيم بحيث تتكون من ذلك التنية المستقيمة المثانية . وهذا القسم الجاور المستقيم عبارة عن مثلث تحده من الخلف التنية المستقيمة المثانية ومن الجانبين الحويصلتان المنويتان والقناتان الناقلتان ومن المقدم البروستاتا . فاذا كانت المثانة كثيرة الامتلاء انتهضت

شكل ٢٢٨ منظر جانبي لاحشاء الحوض في الذكور . وقد قُطع الجانب الايمن من الحوض في العظم العاني بقرب ارتفاق من المقدم وقرب الخط المتوسط للجزء من المؤخر ١ الوجه المقطوع للعظم العاني ٢ الوجه المقطوع للجزء ٤ جسم المثانة ٤ قمتها ويشاهد الاوراكس صاعداً منها ٥ قاعدتها ٦ الحالب ٧ عنق المثانة ٨ واللفافة الحوضية ٩ الغدة البروستاتا ١٠ القسم الغشائي للجزء ١١ الرباط المثلث ١٢ احدى غدتي كوبر الموضوعتين اسفل القسم الغشائي للجزء ١٣ بقية الجسم الاسفلي ١٤ الجسم الاسفلي ١٥ الساق اليمنى للقصيب ١٦ القسم العلوي للمستقيم ١٧ التنية المستقيمة الثانية للبريتون ١٨ القسم الثاني للمستقيم ١٩ الحويصلة المنوية اليمنى ٢٠ القناة الناقلة ٢١ المستقيم مغطى بالطبقة النازلة لللفافة الحوضية عند انعكاسه الى الخلف وهن قسمه الثالث ٢٢ بعض العضلة الرافعة للاست محيطا بالقسم الثالث المستقيم ٢٣ العضلة العاصرة الظاهرة للاست ٢٤ خلافاً بين اللفافة العجانية السطحية والرباط المثلث ويشاهد انها متصلان اسفل الرحم

الحوض


التجويف الحوضي جزء من التجويف العام البطني واقع اسفل مساحة الخط المحرقفي المشطي والحافة المقدمة لقاعدة العجز. يحدّه من الخلف العجز والعصص والرباطان العجزيان الوريكيان العظييان. ومن المقدم والجانبين العظام العانيان والوريكيان. ومن الاعلى يستطرق الى التجويف البطني ومن الاسفل الرافعتان للاست والعصصيتان والطبقة الحشوية من اللفافة الحوضية المنعكسة من جدار الحوض. والتجويف المذكور يتضمن المثانة والطرف السفلي للمستقيم وبعض الاعضاء التناسلية الخاصة بكل من الجنسين

المثانة

المثانة حاصل يجمع فيه البول. وهي كيس عضلي غشائي موضوعة في الحوض وراء العانة والى مقدم المستقيم في الذكور واما في الاناث فيتوسط بينها وبين المستقيم الرحم والمهبل. ويختلف كثيراً شكلها وموقعها ومجاورتها بحسب السن والجنسية ودرجة امتلائها. فانها تكون مدة الطفولية مخروطية الشكل بارزة اعلى الحافة العليا للعانة الى القسم الختلي. وفي البالغ اذا كانت فارغة ومنقبضة تكون على هيئة كيس صغير مثلث الشكل موضوعة وضعاً غائراً في الحوض مسطحة من الامام الى الخلف ورأسها يصل الى الحافة العليا للارتفاق العاني. فاذا كانت ممتلئة امتلاء معتدلاً صارت مستديرة الشكل وملاّت بعض التجويف الحوضي. واذا كان امتلاءها زائداً عن العادة صار شكلها بيضياً وصعدت الى التجويف البطني وقد يبلغ رأسها السرة. قطرهما العمودي اطول من قطرها المستعرض ومحورها الطويل متجه اتجاهاً منحرفاً من الاعلى الى الاسفل والخلف على مسير خط ممتد من نقطة متوسطة بين العانة والسرة الى طرف العصص. واذا كانت المثانة ممتدة من الامتلاء انحنت قليلاً الى المقدم نحو الجدار المقدم للبطن بحيث يكون تحدبها الى الخلف اكثر من المقدم. وفي الاناث قطرها المستعرض اطول من العمودي. طولها اذا كانت ممتلئة امتلاء معتدلاً نحو خمسة قراريط وعرضها ثلاثة والمقدار الاعنيادي الذي تسعه من البول نحو عشرين اوقية. تقسم الى قمة وجسم وقاعدة وعنق

فالقمة او الراس مستديرة متجهة الى المقدم والاعلى ومرتبطة بالسرة بواسطة ثلاثة حبال ليفية احدها متوسط والاخران جانبيان. فالجبل المتوسط بقية قناة جنينية كانت مستطرفة بين التجويف المثاني وكيس غشائي موضوع خارج البطن مقابل السرة هو الالنتويس وقد تبقى احياناً

الحافة العليا رقيقة محذبة والحافة السفلى غليظة مقعرة مستقرة على الطرف العلوي للكلى. والحافة الانسية ملاصقة للاجوف السفلي في الجانب الايمن وللورطي في الايسر. واما ظاهرها فمحاط بنسيج خلوي كثير الدهن ومغلف بغشاء رقيق ليفي



شكل ٢٢٧


بناءها أولاً من جوهر قشري يتكوّن منه معظم المخفظة لونه اصفر وتاليه من كتل عمودية ضيقة وضعها عمودي بالنسبة الى السطح. وثانياً من جوهر لي رخو القوام لونه اسمر داكن او اسود. وقد اختلفوا من جهة البناء الميكروسكوبي للكتل العمودية الا انهم شاهدوا انها محاطة بشبكة شعرية متوازية الوضع لها. واما الجواهر اللي فمؤلف من نوى ومادة حبيبية منتشرة بين شبكة شعرية وريدية. وكثيراً ما يشاهد في مركز الجواهر المذكور خلايا مكوّن من تحليل المواد المؤلف هو منها الشرايين التي تموزع في المخفظتين كثيرة وكبيرة تنشأ من الاورطي و المحجبي و الكلوي ثم تنقسم الى فروع كثيرة قبل دخولها جوهر الغدة. والوريد اعلى الكلية يردّ الدم من الشبكة الوريدية الليية ويقبل جملة فروع من الجواهر القشري ثم يصب في الاجوف السفلي من اليمن وفي الوريد الكلوي من اليسار. والاوعية الليهفاوية تنهي في الغدد القطنية. والاعصاب كثيرة جداً ناشئة من الضفيرة الشمسية و الكلوية

شكل ٢٢٧ قطع عرضي للمخفضة اعلى الكلية يظهر فيه توزيع الاوعية الدموية " شريان b و b اوردة c و c جيب وريدية

مؤلفة من طبقتين من الياف طويلة تتوسط بينها طبقة الياف مستعرضة. وثالثاً طبقة مخاطية متصلة بالغشاء المخاطي للثانة من الاسفل وبالفتيات البولية من الاعلى ومبطنته بكرات مستديرة شرايين الحالب فروع من الكلوي والمنوي والحرقفي الباطن والمثاني السفلي واعصابه من الضفيرة الماساريقية السفلى والمنوية والمخيلية

المحفظتان اعلى الكلتيين

هما من الغدد اللاقنوات لها شكلها مسطح لونها مائل الى الصفرة ووضعهما الى مقدم الطرف العلوي لكل من الكلتيين وراء البريتون. اليسرى منها في الغالب اكبر واعلى من اليمنى. ويختلف حجمها جداً في الاشخاص فقد تكونان صغيرتين يصعب تحقيقتها وقد تكونان كبيرتين. طول الواحدة منهما من قيراط وربع الى نحو قيراطين ووزنها من درهم الى درهين مجاورتها. الوجه المقدم للمحفظة اليمنى اعلى الكاية مجاور للوجه السفلي للكبد واليسرى



شكل ٢٢٦

للبنكرياس والطحال. والوجه الخلفي مستقر على ساق الحجاب الحاجز حذاء الفقرة الظهرية العاشرة.

شكل ٢٢٦ قطع عرضي للمحفظة اعلى الكاية A الجوهر القشري B الجوهر اللي C و C جيوب وريدية

بكریات مستديرة

في الاوعية والاعصاب. الشريان الكلوي كبير الحجم ينقسم الى اربعة او خمسة فروع تدخل الفرجة وتقبل اغماداً من الغلاف الليفي للكلية ثم تدخل جوهر الكلية بين الحملات وتفرع في سيرها نحو قواعد الاهرام فاذا وصلت الى القواعد المذكورة تممت وكونت اقواساً تنشأ منها اوعية كثيرة تتوزع في الجوهر القشري فيدخل بعضها اجسام ملففيجوس وبعضها يكون شبكة شعرية حول القنيات الناقلة البولية. والاوردة تبدأ على ظاهر الكلية ثم تسير الى الباطن وتكون اقواساً عند قواعد الاهرام وعند ذلك تقبل فروع الضفيرة الوريدية المحيطة بالقنيات البولية ثم تصاحب الفروع الشريانية الى الفرجة فتجتمع وتكون وريداً واحداً يصب في الاجوف السفلي. والوعية الليمفاوية تصاحب الاوعية الدموية وتنتهي في الغدد القطنية. والاعصاب ناشئة من الضفيرة الكلوية المولفة من خيوط عصبية بعضها من الضفيرة الشمسية وبعضها من العصب الحشوي الاصغر وتصاحب سير الشرايين. ويذهب من الضفيرة الكلوية بعض خيوط الى الضفيرة المنوية والحالب

الحالبان

الحالب هو القناة الناقلة للكلية. شكله اسطواني طوله من ١٦ الى ١٨ قيراطاً وقطره كقطر قلم الكتابة ووضعه في مؤخر البطن وراء البريتون. يبدأ من الجزء السفلي لحوض الكلية ويسير الى الاسفل والانسية الى ان يدخل التجويف الحوضي فيسير الى الاسفل والمقدم والانسية الى قاعدة المثانة ثم يتقهما ويسير بين الطبقة العضلية والمخاطية مسافة قيراط ثم ينفذ من الطبقة المخاطية الى باطن المثانة

مجاورته. يستقر الحالب اولاً على العضلة الصليبية ويغطيه حينئذ البريتون وتقاطعها الى المقدم الاوعية المنوية واما الحالب الايمن فيكون قريباً للجانب الوحيثي من الاجوف السفلي. ثم يقاطع الشريان الحرقفي الاصيلي او الظاهر الى المقدم فيكون وضعه وراء الفئائي في الجانب الايمن ووراء التعرج السيني في الايسر. فاذا صار الى الحوض دخل الرباط الخلفي الكاذب للمثانة وسار بين القناة الناقلة والمثانة في الذكور وعلى جانب عنق الرحم والجزء العلوي للمهبل في الاناث. وعند قاعدة المثانة يكون وضعه على بعد قيراطين من رفيقه ووراء قاعدة البروستتا بنحو قيراط ونصف اي عند الزاوية الخلفية لمثلث المثانة


بناءه اولاً من طبقة ظاهرة ليفية ممتدة من غلاف الحوض الكلوي. وثانياً من طبقة عضلية

باهتة اللون مائلة الى الحمرة هي اهرام ملفيموس . عدد هذه الاهرام من ثمانية الى ثمانية عشر قواعدها متجهة نحو محيط الكلية ورووسها سائبة باعتبار الجوهر القشري تجتمع نحو الجيب وتنتهي بجلحات صغيرة . وقد يتحد هرمان فيكون لها حلبة واحدة . وعلى ذلك يكون تاليف الكلية من اهرام محاطة بالجوهر القشري الا عند رووسها . وهذه الاهرام فصيصات مستقلة في الجنين تتكون من انضمامها الكلية . ثم ان بناء الجوهر اللبي اكتف من القشري وادكن لونا ومنظره مخطط لسبب تاليفه من قنيات كثيرة دقيقة منفرجة هي القنيات الناقلة البولية . وهذه القنيات تبدأ عند رووس الاهرام بفتحات صغيرة قطرها نحو $\frac{1}{30}$ من القيراط . فاذا سارت في الجوهر اللبي نحو المحيط انقسمت على زوايا حادة جدا وانفرجت الى ان تصير الى الجوهر القشري فتتلف وتنفم بعضها ببعض بدون ان يتغير قطرها . وقد حسب المعلم هوشك عدد جميع الفتحات في حلبة واحدة فكانت نحو الالف . والقنيات المذكورة مكوّنة من غشاء شفاف مبطن بكرات مستديرة شاغلة لنحو ثلثي قطر القنية . وتفصل القنيات بعضها عن بعض في الاهرام اللبية اوعية شعرية تكون ضفائر طولية بين القنيات وجوهر خاص متوسط بينها مولف من كريات

واما اجسام ملفيموس فلا توجد الا في الجزء القشري وهي اجسام صغيرة مستديرة حمراء داكنة قطرها نحو $\frac{1}{12}$ من القيراط . كل جسم منها عبارة عن تمدد طرف احدي القنيات الناقلة البولية على هيئة مخفضة غشائية وضيقة وعائية يتضمنها التمدد المذكور . اما الضفيرة الوعائية فمكوّنة من شريان دقيق يتقبب المخفضة ويتفرع في باطنها على هيئة شبكة دقيقة ومن ويريد دقيق تبدأ فروعها الاولى من الشبكة المذكورة ثم يتقبب المخفضة ويخرج منها بقرب مدخل الشريان ثم يتحد بغيره من الاوردة فيكون ضفيرة ويريدية محيطة بتلافيف القنيات الناقلة المجاورة


في قنوات الكلية . عند مقارنة الحالب للمفرجة يتمدد على هيئة كيس غشائي قمعي الشكل هو الحوض ثم يدخل الجيب فينقسم عادة الى ثلاث زوائد يقال لها الاقماغ فيدخل واحد منها في الطرف العلوي وواحد في الطرف السفلي وواحد في الوسط . ثم ينقسم كل من الاقماغ المذكورة الى قنوات عددها من سبع الى ثلاث عشرة يقال لها الكؤوس تعانق كل واحدة منها قاعدة حلبة من حلقات الاهرام وقد تعانق حلبتين او اكثر . واما تاليف القنوات فمن ثلاث طبقات ليفية وعضلية ومخاطبية . فالطبقة الليفية اللدنة الى الظاهر وهي ممتدة من غلاف الكلية عند قواعد الحلقات . والطبقة العضلية متوسطة بين الليفية والمخاطبية ومكوّنة من الياف طولية الى الظاهر والياف حلقتية الى الباطن . والطبقة المخاطبية هي الباطنة مستطرفة الى فتحات الحلقات ومبطننة

شكل ٢٢٤



مخلفي البناء جوهر ظاهر او قشري وجوهر باطن اولي

شكل ٢٢٣



فالجوهر القشري يكون


نحو ثلاثة ارباع الكلية وشاغل
اظهارها على هيئة طبقة سمكها
نحو خطين تغطي الاهرام
وترسل زوائد كثيرة الى
البطن بين الاهرام نحو الجيب.
والجوهر المذكور لين مائل الى
الحمرة حيبي المنظر ويشتمل
اجساماً صغيرة كثيرة حمر
متشعبة فيه الا عند الحافة

السائبة هي اجسام ملفيجيوس.
تأليف الجوهر القشري من
قنوات ناقلة للبول متلففة
واوعية دموية ولينفاوية
واعصاب منضمة بعضها الى

بعض بواسطة جوهر متين شفاف يتضمن كريات حبيبية

والجوهر اللبي مؤلف من كتل مخروطية الشكل

شكل ٢٢٥



شكل ٢٢٣ قطع عبودي للكلى البيني ١ المحفظة اعلى الكلية ٢ القسم القشري وهو الوعائي للكلى ٣ القسم اللبي وهو المؤلف من اهرام قنوية البناء ٤ و٥ حلقتان بارزتان الى كاسين تقابلها ٥ وهو الاقماغ الثلاثة. والرقم المتوسط منها موضوع في احدى الكؤوس ٦ الحوض ٧ الحالب

شكل ٢٢٤ بناء الكلية *ك* قنية مستقيمة منقسمة الى فروع (*ل* و *ا*) وهي سائرة نحو المحيط *م* قنية متلففة *ن* تمدد القنية البولية على هيئة محفظة هي جسم ملفيجيوس او فرع شرياني *و* و *ز* فروع شريانية ترسل فريعات دقيقة لاجسام ملفيجيوس (*ب* و *ب*) صغيرة شريانية مكونة من الفريعات الخارجة من اجسام ملفيجيوس *ا* فريعات خارجة من اجسام ملفيجيوس وسائرة الى البناء القنوي الاهرام *ح* صغيرة شعرية في الهرم *ج* فروع شرياني مستقيم *د* فروع وريدي مستقيم

شكل ٢٢٥ الدورة الكلوية *ا* فرع من الشريان الكلوي يرسل فريعات الى اجسام ملفيجيوس *ب* فروع من الفريعات المذكورة داخل الى الصغيرة الشعرية في جسم ملفيجيوس (*م*) ويناهدان قنية بوابة ذاهبة من الجسم المذكور ذهاباً متلففاً الى *ت* و *ز* وريدان خارجان من اجسام ملفيجيوس *ن* و *ن* الصغيرة الشبكية التي تهيض بالقنوات البولية. وهذه الصغيرة تقبل الدم من الاوعية الخارجة من اجسام ملفيجيوس (*ز*) وتحمله الى فرع من الوريد الكلوي (*و*)

في اعضاء البول


الكليتان

الكليتان عضوان غديان لافراز البول . وضعهما في موخر التجويف البطني وراء البريتون واحدة في كل قسم قطني ممتدة من الضلع الحادي عشر الى قرب العرف الحرقفي . واليمنى منها منخفضة اكثر من اليسرى لسبب مجاورتها للكبد . وهما محاطتان غالباً بكمية وافرة من الدهن ومثبتتان في محلها بواسطة الاوعية التي تسير اليها او منها

مجاورتها . الوجه المقدم للكليّة محدّب يغطي بعضه البريتون ويجاور في الجانب الايمن مؤخر الفص الايمن للكبد والجزء الصاعد للقولون والجزء النازل للاثني عشري وفي الجانب الايسر الطرف العظيم للمعدة والطرف السفلي للطحال وذب البنكرياس والقولون النازل . والوجه الخلفي مسطح يستقر على ساق الحجاب الى مقدم الضلع الحادي عشر والثاني عشر وعلى الطبقة المقدمة لصفاق العضلة المستعرضة وعلى الصليبية الكبيرة . والطرف العلوي متجه الى الانسية غليظ مستدير تعانقه المحنظة اعلى الكليّة فيقابل الحافة العليا للضلع الحادي عشر في الجانب الايسر والحافة السفلى في الايمن . والطرف السفلي صغير مسطح يمتد حتى قرب العرف الحرقفي . والحافة الوحشية محدبة متجهة الى الوحشية نحو جدران البطن . والحافة الانسية مقعرة فيها شرم غائر هو فرجة الكليّة تدخلها او تخرج منها الاوعية والاعصاب والقناة الناقلة فتكون فروع الوريد الكلوي الى المقدم ثم الشريان وفروعه ثم القناة الناقلة وهي الحالب الى الخلف والاسفل . والفرجة المذكورة مستطرفة الى خلاء اجوف شاغل لباطن الكليّة يقال له الجيب

طول الكليّة نحو اربعة قراريط وعرضها قيراطان وسماكتها قيراط . اليسرى منها اطول قليلاً وارق من اليمنى . ووزنها في الذكر البالغ من اربع اواق ونصف الى ست اواق وفي الاناث نحو نصف اوقية اقل من ذلك . ونسبتها لجميع الجسد كنسبة ١ الى ٢٤٠ . وهي مغلقة بمحنظة ليفية رقيقة ملساء يمكن رفعها عن سطح الكليّة بسهولة تدوم الى الباطن من الفرجة فتبتطن جوانب الجيب وترسل انغاداً حول الاوعية الدموية وتفاربع القناة الناقلة . والجوهر الكلوي كثيف قصب احمر اذا قطعت الكليّة قطعاً عمودياً من الحافة المحدبة الى الحافة المقعرة ظهر انهما مؤلفة من جوهرين

شكل ٢٢٢




التيموسية من الثديي الباطن ومن الدرقيين العلوي والسفلي .
 وأوردتها تنتهي في الوريد الأيسر اللاسمله وفي الأوردة الدرقيه .
 والأوعية الليمفاوية كبيرة قيل انها تنتهي في الوريد الوداجي الباطن .
 وأعصابها دقيقة جداً ناشئة من الرئوي المعدي والسيباتوي . التركيب
 الكيماوي للسائل التيموسي من البومن وفبيرين وجلاتين ومواد اخر
 حيوانية ومن املاح الحامض الفسفوريك القلوية والترابية وكلوريد
 البوتاسيوم ونحو $\frac{1}{100}$ من الماء

شكل ٢٢٢ قناتا الغدة التيموسية . وهذا الرسم مأخوذ من العجل ١ الوريدان الودجيان الباطنان ٢ الوريد الاحجوف
 العلوي ٣ القناة الصدرية التي تشعب شعبتين ثم تقعدان قبل مصبها في جذر الوريد الوداجي الباطن الايسر ٤ قناتا الغدة
 التيموسية . فايسري منها تصب في القناة الصدرية واليمني في جذر الوريد الوداجي الايمن

تركيبها الكيماوي من البومن واثار من الجلاتين والستيرين والاولين واملاح هي كلوريد الصوديوم وكبريتات قلوي وفوسفات البوتاسا وكلس ومغنيسيا واثار من اوكسيد الحديد

الغدة التيموسية

هي من الغدد اللاقنوات لها وجودها زمني لانها تبلغ اشدها من النمو عندنهاية السنة الثانية ثم تاخذ في الصغر الى انها تكاد تغيب عند البلوغ. فاذا نُظِرَ اليها عند ما تكون آخذة في



شكل ٢٢١

النمو شوهد انها مؤلفة من فصين جانبيين متماسين عند الخط المتوسط ويكون بعضها موضوعاً في المنصف المقدم وبعضها في العنق ممتدة من الغضروف الضلعي الرابع الى الحافة السفلى للغدة الدرقية. يغطيها الى المقدم الفص في الصدر والقصبة اللامية والقصبة الدرقية في العنق وتستقر في الصدر على التامور وقوس الاورطي وفي العنق على القصبة. لونها سنجابي مائل الى الحمرة وطولها نحو قيراطين وعرضها نحو قيراط ونصف في الاسفل ووزنها عند الولادة نحو نصف اوقية في بنائها واوعيتها كل فص جانبي مؤلف من فصيصات كثيرة مرتبطة بواسطة نسيج خلوي لطيف يغلفها ايضاً. ويختلف قدر الفصيص من حبة الدخن الى الفولة الصغيرة. كل فصيص اجوف يتضمن فصيصات ثانوية وهي ايضاً مجوفة تستطرق تجاوبها الى تجويف الفصيص الواقعة ضمنه. وتستطرق تجاوب الفصيصات الاولى الى تجويف عام هو حاصل الغدة التيموسية الذي يخترق الفص الجانبي على جميع طولها ويتضمن سائلاً ابيض لبنياً شبيهاً بالكيلوس فيه كريات مسطحة مستديرة شبيهة بما يوجد في الكيلوس قطر الواحدة نحو ١.٠ من القيراط. شرايين الغدة

شكل ٢٢١ قطع الغدة التيموسية في الشهر الثامن للحياة الجنينية ١ القسم العنقي للغدة ويشاهد انها مؤلفة من فصين جانبيين ٢ خلايا مفرزة تشاهد على الوجه المقطوع للغدة ٣ و٢ فتحات مستطرفة من الخلايا المذكورة الى التجويف المركزي وهو الحاصل. ويشاهد ان حاصل القسم الصدري متصل بحاصل القسم العنقي

اعصاب الرئة من الضفيريّتين الرئويّتين المقدّمة والخلفية المولّفتين خاصّةً من فروع السيمبانوي والرئوي المعدي . وخيوط الضفيريّتين المذكورتين تصاحب الفئوات الشعبية وتضع فيها

الغدة الدرقية


الغدة الدرقية من الغدد اللااقنية لها كالأغدة الليموسية والغديّتين اعلى الكليتين والطحال وهي شبيهة البناء بها . وظيفتها غير معلومة ووضعها عند الجزء العلوي للقصبة . وهي مولّفة من فصين جانبيين واحد من كل جانب للقصبة يتصلان بواسطة قطعة ضيقة مستعرضة بينهما هي البرزخ . وقد يكون لها فص ثالث هرمي الشكل ناشئ من يسار البرزخ او من النصف الايسر وصاعد الى العظم اللامي

وجهاها المقدم محدد بتغطيه القصبة اللامية والقصبة الدرقية والكثيفة اللامية . والوجهان الجانبيان محددان ملامسان لغدد السباتي الاصيلي . ووجهها الخلفي مقعر معانق للقصبة والحجرة . والبرزخ يوصل الثلث السفلي للفصين الجانبيين عرضه نحو نصف قيراط وسماكته كذلك ويغطي غالباً الحلقة الثانية والثالثة للقصبة وقد يتغير وضعه وقد يكون مفقوداً رأساً لون الغدة الدرقية احمر مائل الى السمرة ووزنها من اوقية الى اوقيتين وهي اكبر في الاناث منها في الذكور ويزيد حجمها قليلاً مدة الحيض . وقد تتعاظم الى درجة عجيبة فتكوّن المرض المعروف بالكؤيتير . كل فص منها مخروطي الشكل طوله نحو قيراطين وعرضه نحو ثلاثة ارباع القيراط

في بناء الغدة الدرقية وواعيتها . اما بناؤها فمن حويصلات كثيرة دقيقة مسدودة محاطة بشبكة شعرية خشكة ومجموعة على هيئة فصوص بواسطة نسيج خلوي . والحويصلات المذكورة تتضمن سائلاً اصفر تطفو فيه حبيبات وكرات يتجمد بواسطة الحرارة او الاكول الآ انه يبقى شفافاً . وشرايينها الدرقيان العلوي والسفلي وقد يكون لها ايضاً فرع صاعد من اللام اسم له على مقدم القصبة . ولا يخفى ان هذه الشرايين عظيمة الحجم بالنسبة الى الغدة وكثيرة التفرع . والاوردة تكوّن ضفيرة الى مقدم الغدة والقصبة تنشا منها ثلاثة اوردة هي الدرق العلوي والمتوسط والسفلي فيصب العلوي والمتوسط في الوداجي الباطن والسفلي في اللام له . والاوردة الليمفاوية كثيرة وكبيرة الحجم تنتهي في القناة الصدرية والقناة الليمفاوية اليمنى . واعصابها من الرئوي المعدي ومن العقدتين العنقيتين المتوسطة والسفلى للسيمبانوي

القناة القصية وخلاياهُ الانتهائية الهوائية ومن تفرعات الاوعية الرئوية والشعبية والليمفاوية
والاعصاب منخمة بعضها الى بعض بواسطة نسج خلوي ليفي

شكل ٢٢٠



واما تفصيل البناء المذكور فهو اولاً ان الشعبة القصية اذا
دخلت جوهر الرئة تاخذ في الانقسام المتشوي الى ان تنتشر فريعاتها
في جميع الرئة ويدخل كل فريع فصيصاً. ثم ياخذ كل فريع من
الفريعات الداخلة الى باطن الفصيصات في الانقسام المتشوي
الى ان ينتهي اخيراً بخلايا هوائية ومسالك بينها. واذا بلغ هذا
التفرع الى ان يصير قطر الفريع نحو ربع خط غاب الجوهر

الغضروفي فلا تبقى الا الطبقة الليفية والالياف الطولية اللدنة وهذه تثبت الى اقصى التفرعات
الشعبية وهي من باب الالياف العضلية الغير المخططة. وعندما يغيب الجوهر الغضروفي تنقد
الفريعات شكلها الاسطواناني فتصير مسالك غير منتظمة تتفتح جوانبها واطرافها الانتهائية على
هيئة اكياس مستطرفة الى المسالك المذكورة. وهذه الاكياس هي الخلايا الهوائية. ثانياً الخلايا
الهوائية اكياس صغيرة كثيرة الجوانب منفصلة بعضها عن بعض بواسطة فواصل رقيقة ومستطرفة
الى المسالك التي بينها. تُشاهد جيداً عند سطح الرئة وقطرها من $\frac{1}{3}$ الى $\frac{1}{7}$ من القيراط
جدرانها مكونة من تصالب الحزم الطولية اللدنة للنسج اللبني من غير الياف عضلية. وهي مبطنة
بغشاء مخاطي مغطى بكريات سطحية. واما الكريات المبطنة للشعب فمن النوع الهدبي. ثالثاً
الشريان الرئوي الحامل دمًا ويريداً الى الرئتين ينقسم الى فروع تصاحب القنوات الشعبية
الى ان تنتهي فريعاته بصفيرة شبكية حشكية منتشرة على جدران الخلايا الهوائية والمسالك التي
بينها. ومن الشبكة المذكورة تنشأ الفريعات الابتدائية للاوردة الرئوية التي تجتمع فتكون فروعاً
مصاحبة للشرايين وراجعة بالدم الذي قد تطهر بمروره في الشبكة الشعرية الى الاذنين اليسرى
للقلب. رابعاً الشرايين الشعبية حاملة دمًا لتغذية الرئة وهي تنشأ من الاورطي الصدري وتصاحب
التنورات الشعبية فتتوزع فيها وفي الاوعية الرئوية وتنتهي بالاوردة الشعبية. والاوردة الشعبية تجتمع
عند جذر الرئة وتصب في الوريد الفرد على الجانب الايمن وفي الوريد بين الاضلاع العلوي
على الجانب الايسر. والاعوية الليمفاوية منها ما هو سطحي ومنها ما هو غائر وجميعها يصب عند
جذر الرئة في الغدد الشعبية

شكل ٢٢٠ تمدد الشعب الانتهائية على هيئة مسالك بين الخلايا الرئوية "و" شعبتان انتهائيتان من القصبة "ا" تمددها
على هيئة مسالك يشاهد في جدرانها استطراق الخلايا الهوائية الى باطنها "و" خلايا هوائية بقرب سطح الرئة


الكبد الى الاعلى ولها ثلاثة فصوص . والرئة اليسرى اصغر واضيق واطول من اليمنى وليس لها الاًفصان فقط

وجذر الرئة واقع على منتصف الوجه الانسي للرئة بقليل واقرب الى الحافة الخلفية من المقدمة . وترتبط الرئة بالقلب والنسبة بواسطة الجذر فهو مكوّن من الشعبة القصية والشريان الرئوي والاوردة الرئوية والشرايين والاوردة الشعبية والصفيرة العصبية الرئوية واوعية ليمفاوية ونسيج خلوي وجميعها مضمّن في انعكاس من البليورا . جذر الرئة اليمنى واقع وراء الاجوف العلوي والجزء العلوي للاذنين اليمنى واسفل الوريد الفرد . وجذر الرئة اليسرى سائر اسفل القوس الاورطي والى مقدم الاورطي النازل . والعصب الحجابي والصفيرة العصبية الرئوية المقدمة الى مقدم الجذرين والعصب الرئوي المعدي والصفيرة الرئوية الخلفية الى موخرها . واما الاجزاء التي يتألف منها الجذر فالاوردة الرئوية الى المقدم والشريان الرئوي في الوسط والشعبة الى الخلف . هذا من الامام الى الخلف واما من الاعلى الى الاسفل فعلي الجانب الايمن الشعبة ثم الشريان الرئوي ثم الاوردة الرئوية وعلى الايسر الشريان الرئوي ثم الشعبة ثم الاوردة الرئوية

وزن الرئتين معاً نحو اثنتين واربعين اوقية . الرئة اليمنى اثقل من اليسرى باوقيتين وهما اثقل في الذكور من الاناث بحيث تكون نسبتها لجميع الجسد في الذكور كنسبة ١ الى ٢٧ وفي الاناث كنسبة ١ الى ٤٢ . والثقل النوعي للنسيج الرئوي من ٣٤٥ الى ٧٤٦ ، اذا فرض الماء الفأ . ولون الرئتين عند الولادة ابيض يميل الى الحمرة وبعد البلوغ متبّع رصاصي قائم يستحيل الى السواد في الشيخوخة . واللون المذكور موقوف على وجود حبيبات في النسيج الخلوي بقرب السطح وهو اشد دكناً في مؤخر الرئة منه في مقدمها . وسطح الرئة املس لامع مقسّم الى خلايا كثيرة الجوانب هي فصيصات الرئة . وجوهر الرئة خفيف اسفنجي النسيج يطفو على الماء ويفرقع اذا لمس لسبب وجودها فيه ولذلك يهبط اذا رُفع من التجويف الصدري

في بناء الرئتين . تأليف الرئة من طبقة ظاهرة مصلية وطبقة خلوية دونها وجوهر خاص . فالطبقة المصلية ناشئة من البليورا وهي رقيقة شفافة مغلقة لجميع الرئة الى الجذر . والطبقة الخلوية دون سابقتهما وتضمن مقداراً عظيماً من الالياف اللدنة وهي مغلقة لجميع السطح الظاهر للرئة وتمتد الى الباطن بين الفصيصات . والجوهر الخاص مؤلف من فصيصات يتصل بعضها ببعض بواسطة النسيج الخلوي . فالفصيصات الواقعة على ظاهر الرئة كبيرة هرمية الشكل قواعدها متجهة نحو السطح والباطنة منها صغيرة مختلفة الاشكال . تأليف الفصيص من فريع من تفرعات

منه في المقدم . والوجه الانسي مقعر فيه فرجة غائرة اعلى منتصف الرئة بتليل واقرب الى



شكل ٢١٩

المؤخر من المقدم تدخلها الشعب والوعية الرئوية . والحافة الخلفية مستديرة عريضة داخلية في التعبير الغائر الذي الى جانب العمود وهي اطول جداً من الحافة المقدمة وتبرز الى الاسفل بين الاضلاع والحجاب الحاجز . والحافة المقدمة رقيقة حادة تتجاوز مقدم التامور فتتاس الحافتان مدة الشهيقي في الاعلى حتى الغضروف الضلعي الرابع وتبقيان متباعدين في الاسفل تُقسَم كل رئة الى فصين علوي وسفلي بواسطة فرجة طويلة غائرة ممتدة من الجزء العلوي للحافة الخلفية اسفل القمة بنحو ثلاثة قراريط الى الاسفل والمقدم حتى الجزء السفلي للحافة المقدمة . وينقسم الفص العلوي للرئة اليهني انقساماً غير كامل بواسطة فرجة ثانية قصيرة ممتدة من منتصف الفرجة السابقة الى المقدم والاعلى حتى الحافة المقدمة فيتكوّن من ذلك فص صغير مثلث الشكل هو الفص المتوسط . الرئة اليهني اكبر من اليسرى واعرض لسبب انحراف القلب نحو اليسار وهي اقصر منها بنحو قيراط لسبب صعود الحجاب الحاجز في اليهني حيث يدفعه

شكل ٢١٩ القلب والرئتان ١ البطنين اليمين . والوعية التي عن يمين الرقم ويساروه هي الوعية الاكليلة ٢ البطنين اليسر ٣ الاذنين اليهني ٤ الاذنين اليسرى ٥ الشريان الرئوي ٦ الشريان الرئوي اليمين ٧ الشريان الرئوي اليسر ٨ رباط ابقناة الشريانية ٩ قوس الاورطي ١٠ الاغروف العلوي ١١ الشريان اللا اسم له والى مقدمه الوريد اللا اسم له ١٢ الوريد تحت الترقوة اليمين والى الخلف منه الشريان الذي يقابله ١٣ الشريان السباتي الاصلي والوريد الوداجي الباطن اليمين ١٤ الوريد اللا اسم له اليسر ١٥ الشريان السباتي الاصلي والوريد الوداجي الباطن اليسر ١٦ الشريان والوريد تحت الترقوة اليسر ١٧ الفصبة ١٨ الشعبة اليهني ١٩ الشعبة اليسرى ٢٠ الوريد الرئوية ٢١ جذر الرئة اليهني ٢٢ و١٩ ٢٠ جذر الرئة اليسرى ٢١ الفص العلوي للرئة اليهني ٢٢ فضا المتوسط ٢٣ فضا السفلي ٢٤ الفص العلوي للرئة اليسرى ٢٥ فضا السفلي

الحجاب المنصف

الحجاب المنصف هو الخلاء الكائن بين البليورتين في الخط المتوسط للتجويف الصدري فيكون حدهُ المقدم القص وحدهُ الخلفي العمود ويتضمن جميع احشاء الصدر الأرتئين. ينقسم الى ثلاثة اقسام مقدم ومتوسط وخلفي

فالمنصف المقدم يحدهُ من المقدم القص ومن الجانبين البليورا ومن الخلف التامور. ولما كان وضع القلب منحرفاً نحو اليسار وافقه في ذلك الخلاء المذكور. وهو عرض في الاسفل ضيق في الاعلى مخنق حذاء القطعة الثانية للقص حيث تقارب البليورتان او قد تتحدان على مساحة صغيرة. وهذا القسم يتضمن منشأ العضلتين القصية اللامية والقصية الدرقية والعضلة القصية المثلثة والشريان الثديي الباطن الايسر وبقايا الغدة التيموسية ونسيجاً رخواً واوعية ليمفاوية والمنصف المتوسط اعرض الاقسام الثلاثة للخلاء الواقع بين البليورتين ويتضمن القلب وغلافه والاورطي الصاعد والاجوف العلوي وتشعب القصبة والشريانين الرئويين والاوردة الرئوية والعصين الحجابيين


والمنصف الخلفي خلافاً سائر سيراً موازياً للعمود. يحدهُ من المقدم التامور وجذرا الرئتين ومن الخلف العمود ومن الجانبين البليورتان. ويتضمن الاورطي النازل والوريدين الفردين الاكبر والاصغر والوريد العلوي بين الاضلاع والعصين الرئويين المعديين والاعصاب الحشوية السيمباتوية والمرئية والقناة الصدرية وغدد ليمفاوية

الرئتان

الرئتان هما العضوان الجوهريان للتنفس موضوعان في التجويف الصدري واحدة الى كل من الجانبين يفصلها الحجاب المنصف وما تضمنه كالقلب وغيره. الرئة منها مخروطية الشكل لها قمة وقاعدة وحافتان ووجهان

فالقمة مخروطية الشكل تصعد في اصل العنق الى مسافة قيراط او قيراط ونصف اعلى مساحة الضلع الاول. والقاعدة عريضة مقعرة مستقرة على الوجه المحدب وهو العلوي للحجاب الحاجز ومحيطها رقيق نازل في الخلاء الكائن بين الاضلاع السفلى ومدغم الحجاب الحاجز بها فيكون ممتداً الى الوحشية والخلف اكثر من المقدم. والوجه الوحشي وهو الصدري املس محدب متسع المساحة شكلاً يقابل شكل التجويف الصدري فيكون غائراً الى الاسفل في المؤخر اكثر

جذرها وتنعكس على جانب التامور الى الوجه الباطن للقص. من الاسفل تغطي الوجه العلوي للحجاب الحاجز. ومن الاعلى يبرز راسها على هيئة كيس مسدود من الفتحة العليا للصدر الى العنق فيتجاوز الحافة العليا للضلع الاول بنحو قيراط الى الاعلى وفي الكيس المذكور نُقبَل قمة الرئة



شكل ٢١٨

ثم ان الوجهين المتجاورين للبليورتين يتماسان قليلاً اعلى منتصف القص والحلاء الواقع بينهما اعلى النقطة المذكورة واسفلها هو المنتصف المقدم والوجه الباطن للبليورا امس لامع مندى بسائل نصلي والوجه الظاهر ملتصق التصاقاً شديداً بسطح الرئة والوعية الرئوية عند خروجها من التامور. وهي ملتصقة ايضاً التصاقاً شديداً بالوجه العلوي للحجاب الحاجز. وما بقي منها سميك يفصل عن الاجزاء المجاورة بسهولة شرايين البليورا من الشرايين بين الاضلاع والثدي الباطن والحجابي والدريقي السفلي والتموسية والتامورية والشعبية. واوردها تقابل الشرايين. واورعيتها الليمفاوية كثيرة. واعصابها من الحجابي والسيهباتوي


شكل ٢١٨ رسم قطع عرضي للصدر لاجل اظهار وضع البليورتين بالنسبة الى الصدر واحشائه ١ او ٢ او ٣ الجلد المغطي للصدر ٤ و٥ الدهن الذي تحت الجلد وعضلات ظاهر الصدر ٥ وه العضلات الواقعة في الميزابين الفريين ٦ الفقرة الظهرية الخامسة ٧ القناة الشوكية ٨ تنوها الشوكي ٩ و١٠ و١١ قطع الاضلاع والعضلات بين الاضلاع ١١ و١٢ الغضاريف الضلعية ١٢ اقص ١٣ تشعب الشريان الرئوي ١٤ الوجه الظاهر للرئتين ١٥ الحافة الخلفية للرئتين ١٦ حافتها المقدمة ١٧ الوجه الانسي لها ١٨ الوجه المقدم للقلب المغطي بالتامور ١٩ الشريان الرئوي ٢٠ و٢١ فرعاه اليمين واليسر ٢٢ جزء من الاذن اليمنى ٢٣ الاجوف العلوي مقطوعاً عند الاذن اليمنى ٢٤ قطع الشعبة القصية اليسرى ٢٥ قطع الشعبة اليمنى ٢٦ المريء ٢٧ الاورطي الصدري. واما الخلاء الذي بين ١٢ و١٨ وبين ١٦ و١٧ فهو المنتصف المقدم والحلاء الذي رقم فيه ٢٦ و٢٧ هو المنتصف الحجابي والمنتصف المتوسط واقع بينهما. والاخلية المذكورة مكوّنة من انعكاسات البليورتين

والغشاء المخاطي ممتد من الغشاء المبطن للحنجرة فيبطن جميع القصبة وشعبها وهو مغطى بكرات

شكل ٢١٧

هدبية. والغدد القصية اجسام صغيرة مسطحة بيضية الشكل موضوعة بين الطبقة الليفية والطبقة العضلية وقنواتها الناقلة تصب على الوجه الباطن للغشاء المخاطي. اكثر وجودها في الجزء الخلفي للقصبة وفائدة افرازها تنديده الوجه الباطن للقصبة

شرايين القصبة من الشريانين الدرقيين السفليين. واوردها تصب في الوريدية الدرقية الوريدية واعصابها من العصب الرئوي المعدي والشجري الراجع ومن الاسباتوي



البليورتان

الرئتان محاطتان من ظاهرهما بغشاء مصلي لطيف جداً هو البليورا فيغلفها حتى جذرها ثم ينعكس على الوجه الباطن للجدار الصدري فيبطنه ايضاً. ويقال للغشاء المغلف للرئة البليورا الرئوية وللغشاء المبطن للوجه الباطن للصدر البليورا الضلعية وللخلاء الواقع بينهما تجويف البليورا. فكل منهما اذا كس مسدود تشغل الواحدة منها النصف الايمن والاخرى النصف الايسر للتجويف الصدري بدون ان يكون اتصال بينهما اصلاً الا في نقطة واحدة الى المقدم. واما الخلاء المتوسط بينهما الذي يتضمن جميع الاحشاء الصدرية الا الرئتين فيقال له الحجاب المنصف

في انعكاسات البليورا. تبدأ البليورا من القص وتسير الى الوحشية فتغطي الغضاريف الضلعية والوجه الباطن للاضلاع والعضلات بين الاضلاع واذا صارت الى موخر التجويف الصدري غطت العقد السيمباتوية الصدرية وانعكست على جوانب اجسام الفقرات وهناك تنفصل عن البليورا المخالفة بخلاء ضيق هو الحجاب المنصف الخلفي. ثم تسير من العمود الفقري الى جانب التامور فتغطيه قليلاً ثم تغطي الجزء الخلفي لجذر الرئة وتترل من حافته السفلى ثنية مثلثة الشكل نزولاً عمودياً بجانب الحجاب المنصف الخلفي الى الحجاب الحمازي الرباط العريض للرئة الذي يثبت جزءها السفلي في مكانه. وتستقصى البليورا من الجذر الى الوجه المحدب للرئة وهو الوحشي والى قمتها وقاعدتها والى جوانب الفرجات التي بين فصوصها. ثم تغطي الوجه المقدم للرئة ومقدم

شكل ٢١٧ ايبثيلوم هدي من القصبة 'a' الطبقة الظاهرة المواتة من الباف طوية لينة / الطبقة المخاطية 'c' كريات هديرة
d كريات بيضية

والى جانبها في العنق مجاورتها للسباتيين الاصليين والقصين الجانبيين للغدة الدرقية والشريانيين الدرقين السفليين والعصيين المنحرجين بين الراجعين. وفي الصدر هي واقعة في الخلاء بين البلورتين والعصب الرئوي المعدي الى كل من جانبها

الشعبة اليمنى اوسع من اليسرى واقصر ووضعها الى الافة اكثر. طولها نحو قيراط وتدخل الرئة اليمنى حذاء الفقرة الرابعة الظهرية. الوريد الفرد يتقوس اعلاها من الخلف والشريان الرئوي الايمن يكون اولاً الى اسفلها ثم الى مقدمها

والشعبة اليسرى اصغر من اليمنى واطول ووضعها منحرف اكثر. طولها نحو قيراطين وتدخل جذر الرئة اليسرى حذاء الفقرة الخامسة الظهرية اسفل الشعبة اليمنى بقيراط. ونقاطع المريء والثناة الصدرية والاورطي النازل الى المقدم ثم تصير اسفل القوس الاورطي فيكون الشريان الرئوي الايسر اولاً الى اعلاها ثم الى مقدمها. وسياتي الكلام على تفاريع الشعبتين

تألف القصة من حلقات غضروفية غير كاملة وغشاء ليفي والياف عضلية والياف طولية صفراء لدنة وغشاء مخاطي وعدد. فالغضاريف من ستة عشر الى عشرين كل واحد منها يكون حلقة غير كاملة محيطة بالثلاثين المقدمين لاسطوانة القصة ويكمل ما نقص منها في الخلف الغشاء الليفي. وهي موضوعة افقياً الحلقة الواحدة فوق الاخرى منفصلة بعضها عن بعض بواسطة اخلية ضيقة غشائية. عرض الواحدة منها من الاعلى الى الاسفل نحو خطين وسماكتها نحو نصف خط. وهي مسطحة من الظاهر محدبة من الباطن من الاعلى الى الاسفل وتتصل من حوافها العليا والسفلى بواسطة غشاء ليفي لدن يغطي وجهها ويكون من الخلف طبقة خاصة لاجل تكميل الاسطوانة. الغضروف الاول منها عرض يتصل بالحافة السفلى للغضروف الخلفي من الاعلى بواسطة الغشاء الليفي وقد يكون مختلطاً به او بالغضروف الذي اسفله. الغضروف الاخير غليظ عرض في منتصفه ينتهي من الجانبين بحلقة غير كاملة محيطة ببداية كل من الشعبتين. وقد يختلط غضروف باخر وقد تكون اطرافها مفرضة وهي كثيرة اللدنة ويندرت عظمها في الشيوخة. عدد غضاريف الشعبة اليمنى من ستة الى ثمانية وغضاريف اليسرى من تسعة الى اثني عشر والالياف العضلية مرتبة على هيئة طبقتين احداها طولية ظاهرة تنشأ من اطراف الغضاريف القصبية ومن الغشاء الليفي والثانية مستعرضة باطنة ممتدة عرضاً بين اطراف الغضاريف في مؤخر القصة. وجميعها من النوع الغير المخطط. والالياف اللدنة موضوعة تحت الغشاء المخاطي ومحيطلة بجميع اسطوانة القصة واكثرها في الجزء الخلفي حيث تكون على هيئة حزم طولية

تضيقتان الفتحة العليا للنجرة وتعصران الكيس النجري

الغشاء المخاطي للنجرة. هذا الغشاء مختلط في الاعلى بالغشاء المبطن للفم والبلعوم ويدور في الاسفل الى القصبة والشعب. وهو مغطي لوجي الزمار ومكون للثنتين الطرجها ليتين المزماريتين المحيطتين بالفتحة العليا للنجرة. ويغطي جميع تجويف النجرة ويكون بانثناءه معظم الوتر الصوتي العلوي ثم يبطن البطين والكيس ثم ينعكس على الوتر الصحيح ويغطي الوجه الباطن للغشاء الحلقوي الدرقي والغضروف الحلقوي ثم يختلط بالغشاء المبطن للقصبة. وهو مغطي بكرات هدية اسفل الوتر العلوي وبها ايضا الى الاعلى منه في المقدم حتى منتصف لسان الزمار وبكرات سطحية في ما بقي. واما الغدد المخاطية للغشاء المذكور فكثيرة منتشرة على جميع سطحه ولا سيما على لسان الزمار والى مقدم الغضروفين الطرجها ليين وفي الكيس النجري. ولا شيء منها على الاوتار الصوتية

شرايين النجرة هي الفروع النجرية الناشئة من الدرقيين العلوي والسفلي. واوردها تصب في الاوردة الدرقية وهي العلوي والمتوسط والسفلي. والاعوية الليففاوية تصب في الغدد العنقية الغائرة. والاعصاب هي النجري العلوي والنجري الراجع من الرئوي المعدي وخبوط من السمباتوي. فالنجري العلوي يتوزع في الغشاء المخاطي للنجرة والعضلة الحلقية الدرقية والنجري السفلي وهو الراجع يتوزع في ما بقي من العضلات الاطرجها لية فان فروعها تاتي من العلوي والسفلي

القصبة

القصبة اسطوانية غضروفية وغشائية لاجل مسلك الهواء الى الرئتين. وهي مسطحة من الخلف ممتدة من الجزء السفلي للنجرة على مساحة الفقرة العنقية الخامسة الى ما يجازي الفقرة الظهرية الثالثة حيث تنقسم الى شعبتين واحدة لكل رئة. طولها نحو اربعة قراريط ونصف وقطرها المستعرض من ثلاثة ارباع القيراط الى قيراط وهي اكبر في الذكور منها في الاناث

مجاورتها. الوجه المقدم للقصبة محدب ويغطي في العنق من الاعلى الى الاسفل برزخ الغدة الدرقية والوريدان الدرقيان السفليان والعضلتان القصية اللامية والقصية الدرقية واللفافة العنقية بين العضلات المذكورة والى السطحية فروع متفهمة بين الوريدين الوداجيين المقدمين وفي الصدر يغطيها من الامام الى الخلف القطعة الاولى للقص وبقايا الغدة التيموسية وقوس الاورطي والشريان اللا اسم له والسباتي الايسر والضميرة القلبية الغائرة. وتستقر على المريء.

الدرقي وسير اليافها افقي الى الخلف والوحشية واندغامها في قاعدة الغضروف الطرجهالي ووجهه
المقدم. وهي مؤلفة من حزمتين حزمة سفلى غليظة موازية للوضع للوتر الصوتي الصحيح وقد تكون
ملتصقة به وحزمة عليا رقيقة موضوعة الى الوحشية من الكيس الحجيري

والطرجهالية عضلة مفردة شاغلة للوجه المقعر الخلفي للغضروفين الطرجهاليين. منشأها
من الوجه الخلفي والحافة الوحشية لاحد الغضروفين الطرجهاليين واندغامها في ما يقابل
ذلك من الغضروف المخالف. وهي مؤلفة من ثلاث طبقات طبقتين منحرفتين وطبقة مستعرضة.
فالالياف المنحرفة اقرب الى السطحية ويتكوّن منها حزمتان تذهب كل واحدة منهما من قاعدة
الغضروف الواحد الى راس الغضروف المخالف. والمستعرضة كثيرة غائرة تذهب عرضاً بين
الغضروفين

واما عضلات لسان المزمار فهي الدرقيه المزمارية والطرجهالية المزمارية العليا
والطرجهالية المزمارية السفلى


فالدرقيه المزمارية حزمة لطيفة تنشأ من الوجه الباطن للغضروف الدرقي الى الوحشية من
منشأ العضلة الدرقيه الطرجهالية وتنتشر على الوجه الظاهر للكيس الحجيري فيغيب بعض
اليافها في الثانية الطرجهالية المزمارية وبعضها يدوم الى المقدم ويندغم بحافة لسان المزمار فهي
خافضة له

والطرجهالية المزمارية العليا مؤلفة من حزيمات لطيفة تنشأ من راس الغضروف الطرجهالي
ثم تغيب في الثانية المخاطية الممتدة بين الغضروف الطرجهالي وجانب لسان المزمار وهي الثانية
الطرجهالية المزمارية


والطرجهالية المزمارية السفلى تنشأ من الغضروف الطرجهالي اعلى مندغم للوتر الصوتي
العلوي ثم تسير الى المقدم والاعلى وتنتشر على الجزء الباطن والعلوي للكيس الحجيري وتندغم في
حافة لسان المزمار. وهي عاصرة للكيس الحجيري

اعمال العضلات الحجيرية. تقسم هذه العضلات باعتبار عملها الى قسمين. الاول العضلات
التي تفتح وتطبق فتحة المزمار. فالتى تفتح المزمار الحلقيتان الطرجهاليتان الخلفيتان والتي تطبقه
الطرجهالية والحلقيتان الطرجهاليتان الجانبيتان. والثاني العضلات المستولية على درجة توتر
الوتار الصوتية. فالتى تشدها وتطوّلها الحلقيتان الدرقيتان والتي ترخيها وتقصرها الدرقيتان
الطرجهاليتان. واما الدرقيه المزمارية فتخفض لسان المزمار. والطرجهاليتان المزماريتان

وثلاث بلسان المزمار. فالعضلات الخمس الخاصة بالآوتار الصوتية وفتحة المزمار هي:
 الخلفية الدرقية - الخلفية الطرجهالية الخلفية - الخلفية الطرجهالية الجانبية - الطرجهالية - الدرقية
 الطرجهالية



شكل ٢١٦



شكل ٢١٥

فالعضلة الخلفية الدرقية مثلثة الشكل موضوعة في الجزء المقدم والجانب للعضروف الخلفي فتشأ من الجزء المذكور ثم تنفرج اليافها نحو الاعلى والوحشية وتندغم بالحافة السفلى للعضروف الدرقى فتمتد من الخط المتوسط الى الوراى حتى القرن السفلى. ويفصل العضلة اليمنى عن اليسرى عند الخط المتوسط خلاىء مثلث يشغله الغشاء الخلفى الدرقى
 والعضلة الخلفية الطرجهالية الخلفية تنشأ من انخفاض واقع في كل من النصفين الجانبيين للوجه الخلفى من العضروف الخلفى. تسير اليافها الى الاعلى والوحشية ثم تجتمع وتندغم بالزاوية الوحشية لقاعدة العضروف الطرجهالى

والخلفية الطرجهالية الجانبية تنشأ من الحافة العليا لجانب العضروف الخلفى وتسير منحرفة الى الاعلى والخلف وتندغم بالزاوية الوحشية لقاعدة العضروف الطرجهالى الى مقدم سابقها وهي اصغر منها وشكلها مستطيل

والدرقية الطرجهالية عضلة عريضة مسطحة وضعها مواز للجانب الوحشى للوتر الصوتى الصحيح. منشأها من المقدم من النصف السفلى لزاوية العضروف الدرقى ومن الغشاء الخلفى

شكل ٢١٥ الحنجرة كما تشاهد من الخلف ١ الجناح الايمن للعضروف الدرقى ٢ قرنة العلوي ٣ قرنة السفلى ٤ و٥ العضروف الخلفى ٥ وه العضروفان الطرجهالىان ٦ العضلة الطرجهالية المولفة من حزم منحرفة ومستعرضة ٧ العضلتان الخلفيتان الطرجهاليتان الخلفيتان ٨ لسان المزمار

شكل ٢١٦ الحنجرة كما تشاهد من الجانب وقد نزع احد جناحي العضروف الدرقى ١ الجناح الايسر للعضروف الدرقى ٢ العضروف الطرجهالى الايمن ٣ القرنين الخنجري ٤ العضروف الخلفى ٥ العضلة الخلفية الطرجهالية الخلفية ٦ العضلة الخلفية الطرجهالية الجانبية ٧ العضلة الدرقية الطرجهالية ٨ الغشاء الخلفى الدرقى ٩ نصف لسان المزمار ١٠ الجزء العلوي للفتحة

من ثلث الى نصف قيراط. واما في الاناث فطولها وعرضها اقل من ذلك بنحطين او ثلاثة. ويختلف شكل الفتحة فتكون شقاً ضيقاً في حالة السكون. وفي الشهيق تتسع ويصير شكلها مثلثاً فتكون قاعدة المثلث الى الخلف بين الغضروفين الطرجهاليين المنفرجين حينئذٍ. وفي الزفير تكون اضيق مما في الشهيق. وعند احداث الصوت تضيق الى اكثر من ذلك فان حافتي الغضروفين الطرجهاليين تتماسان حينئذٍ وتتقارب حافتا الوترين الصوتيين والوتران الصوتيان العلويان ويقال لهما الكاذبان لانهما لا يدخلان في احداث الصوت ثبتان من الغشاء المخاطي واحدة من كل جانب تغلف رباطة ليفية ضيقة لطيفة هي الرباط الدرقي الطرجهالي العلوي. والرباط المذكور مؤلف من نسج لدن ويرتبط من المقدم بزاوية الغضروف الدرقي اسفل لسان المزمار ومن الخلف بالوجه المقدم للغضروف الطرجهالي. حافته السفلى تكون الحد العلوي لبطين الحنجرة

والوتران السفليان ويقال لهما الصوتيان الصحيحان لانهما يدخلان في احداث الصوت رباطتان لينيتان قويتان هما الرباطان الدرقيان الطرجهاليان السفليان مغطيتان من الظاهر بطبقة رقيقة من الغشاء المخاطي. كل وتر منهما مؤلف من نسج اصفر مرن مرتبط من المقدم بزاوية الغضروف الدرقي ومن الخلف بالزاوية المقدمه لقاعدة الطرجهالي. حافته العليا تكون الحد السفلي لبطين الحنجرة وحافته السفلى مختلطة بالغشاء الحلقى الدرقي والى الوحشية منه العضلة الدرقيه الطرجهالية. وهو مغطى من الانسية بالغشاء المخاطي المتصلق به التصاقاً شديداً

وبطين الحنجرة حنرة مستطيلة واقعة بين الوتر العلوي والوتر السفلي. يحدّه من الاعلى الوتر العلوي ومن الاسفل الوتر السفلي ومن الوحشية العضلة الدرقيه الطرجهالية. والكيس الحنجري كيس غشائي موضوع بين الوتر العلوي والوجه الباطن للغضروف الدرقي ومستطرق الى بطين الحنجرة. وعلى وجه غشائه المخاطي فوهات غدد جرابية عددها من ستين الى سبعين وهي محاطة بمخضلة ليفية وجهه الانسي مغطى بالعضلة الطرجهالية المزمارية السفلى ووجهه الوحشي مغطى بالعضلة الدرقيه المزمارية. فاذا عصرت العضلتان المذكورتان الكيس خرج افراز الغدد الجرابية وندى الاوتار الصوتية

عضلات الحنجرة

العضلات الخاصة بالحنجرة دون غيرها ثمان خمس منها خاصة بالاوتار الصوتية وفتحة المزمار

والاربطة التي تربط الغضروف الدرقي بالحلقي ثلاثة ايضاً. الاول الغشاء الحلقي الدرقي وهو مثلث الشكل يربط من المقدم الحافتين المتجاورتين للغضروفين الدرقي والحلقي ومن الجانبين يمتد من الحافة العليا للغضروف الحلقي الى الحافة السفلى للوتر الصوتي الصحيح فيلتصق بمقدمه التصاقاً شديداً. والثاني والثالث الرباطان المحفظيان المحيطان بالاتصال المفصلي الكائن بين القرن السفلي للدرقي وجانب الحلقي

والاربطة التي تربط الغضروفين الطرجهائين بالحلقي رباطان محفظيان رقيقان يربطان السطوح المفصلية ومبطنان بغشاء زلالي


واربطة لسان المزمار اولاً اللامي المزماري الذي يمتد من الوجه المقدم للسان المزمار بقرب راسه الى الوجه الخلفي لجسم العظم اللامي. ثانياً الدرقي المزماري الذي يربط راس لسان المزمار بزاوية الغضروف الدرقي اسفل الشرم المتوسط واعلى ارتباط الاوتار الصوتية. ثالثاً ثلاث ثنيات من الغشاء المخاطي تربط لسان المزمار بجانب اللسان وقاعدته وهي الاربطة اللسانية المزمارية وقد سبق الكلام عليها

في باطن الخنجرة. الفتحة العليا للخنجرة مثلثة الشكل واسعة من المقدم ضيقة من الخلف وممتدة بانحراف الى الاسفل والخلف. يحدها من الامام لسان المزمار ومن الخلف راسا الغضروفين الطرجهائين والقرينان الخنجريان ومن الجانبين الثنيتان الطرجهائيتان المزماريتان الممتدتان بين جانبي لسان المزمار وراسي الغضروفين الطرجهائين. وتجويف الخنجرة ممتد من الفتحة التي تلي لسان المزمار الى الحافة السفلى للغضروف الحلقي وينقسم الى قسمين بواسطة بروز الاوتار الصوتية والعضلتين الدرقيتين الطرجهائيتين الى الانسية. فالفتحة الواقعة بين الوترين الصوتيين السفليين هي الزمار او فتحة المزمار والقسم العلوي من تجويف الخنجرة ما كان اعلاها وهو عريض مثلث الشكل واقع بين صفيحتي الغضروف الدرقي. والقسم السفلي ما كان اسفل المزمار وهو اهليلجي الشكل اولاً ثم يصير حلقيماً في الاسفل. ثم انه يوجد حبلان او وتران صوتيان كاذبان ممتدان من المقدم الى الخلف واحد من كل جانب واسفلها حبلان صحيحان. وبين الوتر الكاذب والوتر الصحيح من كل جانب جيب هو بطين الخنجرة يستطرق في الاعلى الى جراب هو الكيس الخنجري موضوع الى الوحشية من الوتر العلوي اي الكاذب

اما فتحة المزمار فشق ضيق واقع بين الوترين السفليين وها الوتران الصوتيان الصحيحان. طول الفتحة المذكورة في الذكور اقل من قيراط وعرضها اذا كانت ممتدة في جزءها المتسع

اللسان الى مقدم الفتحه العليا للحنجرة . غير انه مدة التنفس يكون اتجاهها عمودياً الى الاعلى بحيث تكون حافتها السائبة وهي العليا منحنية الى المقدم نحو قاعدة اللسان واما عند الازدراد اذ تجذب الحنجرة الى اسفل قاعدة اللسان فتحمل الى الاسفل والخلف فتسد فتحة الحنجرة سداً محكمًا . حافتها السائبة عريضة مستديرة و طرفها المتصل وهو السفلي طويل ضيق مرتبط بالزاوية المكوّنة من التقاء الصفيحيين الدرقيتين اسفل الشرم المتوسط وذلك بواسطة رباط طويل ضيق هو الرباط الدرقي المزماري . وترتبط ايضاً بالوجه الخلفي لجسم العظم اللامي بواسطة الرباط اللامي المزماري . الوجه المقدم للسان المزمار منحني الى المقدم نحو اللسان مغطى بغشاء مخاطي ينعكس على جانبي اللسان وقاعدته فيكون رباطاً متوسطاً ورباطين جانبيين هي الاربطة اللسانية المزمارية . والوجه الخلفي وهو الحنجري امس مقعر من الجانب الى الجانب محدب من الاعلى الى الاسفل مغطى بغشاء مخاطي ترتبط بجانبيه الثنيتان الطرجهائيتان المزماريتان

شكل ٢١٤



واما بناء لسان المزمار والغضروفين الاسفينيين والقربين الحنجريين فمن غضروف اصفر . وما بقي من غضاريف الحنجرة شبيه بغضاريف الاضلاع وشديد الميل للعظم في الشخوذة في اربطة الحنجرة . من هذه الاربطة ما يربط الغضروف الدرقي بالعظم اللامي ومنها ما يربط غضاريف الحنجرة ببعضها ببعض فالاولى ثلاثة . الاول الغشاء الدرقي اللامي وهو عريض يرتبط من الاسفل بالحافة العليا للغضروف الدرقي ومن الاعلى بالحافة العليا للعظم اللامي وينفذ منه العصب والوعية الحنجرية العليا . والثاني والثالث الرباطان الدرقيان اللاميان الجانبيان وهما حبلان مستديران ممتدان بين القرنين العلويين للغضروف الدرقي والقرنين العظيمين للعظم اللامي

شكل ٢١٤ قطع عمودي للحنجرة يظهر اربطتها ١ جسم العظم اللامي ٢ قرنة العظيم ٣ قرنة الصغير ٤ جناح الغضروف الدرقي ٥ قرنة العلوي ٦ قرنة السفلي ٧ فتحة ادم ٨ وهو الغشاء الدرقي اللامي . ويرى من الفتحة التي اعلى الرقبة الخلفي العصب والشریان الحنجريان العلويان ٩ الرباط الدرقي اللامي ١٠ لسان المزمار ١١ الرباط اللامي المزماري ١٢ الرباط الدرقي المزماري ١٣ الوجه الباطن للغضروف الطرجهائي ١٤ الزاوية الوحشية لقاعدته ١٥ القرن الحنجري ١٦ الغضروف الاسفني ١٧ الرباط الدرقي الطرجهائي العلوي ١٨ الرباط الدرقي الطرجهائي السفلي وهو الوتر الصوتي . والحلقة البيضى الواقع بين الرباطين الدرقيين الطرجهائيين هو بطين الحنجرة ١٩ الغضروف الحلقي ٢٠ القسم الجانبي للغشاء الحلقي الدرقي ٢١ قسمة المركزي ٢٢ الحلقة العليا للنضبة ٢٣ قطع برزخ الغدة الدرقية ٢٤ والرافعة للغدة الدرقية

ينتهيان بطرفين يرتبط بهما الرباط الدرقي اللامي. والسفليان قصيران غليظان متجهان نحو
المقدم والانسية وعلى وجهها الباطن حفرتان صغيرتان مفصليتان للاتصال بجانب الغضروف
الخلفي. وتندغم بكل من الحافتين الخلفيتين العضلة الابرية البلعومية والعضلة اللهوية البلعومية

والغضروف الخلفي شبيه الشكل بالحاتم وهو اصغر ولكنه اغلظ واغوى من الغضروف
الدرقي ويكون الجزء السفلي والخلفي لتجويف الحجيرة. نصفه المقدم ضيق محدد يرتبط بمقدمه
وجانبيه العضلتان الخلفيتان الدرقيتان والى الورا من ذلك بعض العاصرة السفلى. نصفه الخلفي
عريض من الجانب الى الجانب ومن الاعلى الى الاسفل فهو بمنزلة الفص لما بقي من الحاتم وعليه
في الخط المتوسط خط عمودي بارز يرتبط به الالياف الطولية للمريء والى كل من الجانبين
للخط المذكور حفرة لارتباط العضلة الخلفية الطرجهالية الخلفية. وعند اتصال النصفين المذكورين
اي المقدم والخلفي من الجانبين ارتفاع صغير مستدير يتصل اتصالاً مفصلياً بالقرن السفلي
للغضروف الدرقي. الحافة السفلى للغضروف الخلفي افقية متصلة بالحلقة العليا للقصبة بواسطة غشاء
ليفى. وحافته العليا متجهة الى الاعلى والخلف ويرتبط بمقدمها الغشاء الخلفي الدرقي وبجانبيها بعض
الغشاء المذكور والعضلة الخلفية الطرجهالية الجانبية. وعند مؤخر جزءها العلوي سطح املس
من كل جانب يتصل اتصالاً مفصلياً بالغضروف الطرجهالي. وبين السطحين المفصلين شرم
ترتبط به بعض العضلة الطرجهالية. والوجه الباطن للغضروف الخلفي املس مغطى بغشاء مخاطي
والغضروفان الطرجهاليان سميّا بذلك لانهما اذا تقاربا كانا على هيئة قمع ابريق. وهما
موضوعان على الحافة العليا للغضروف الخلفي عند مؤخر الحجيرة. كل واحد منهما هرمي الشكل
له ثلاثة وجوه وقاعدة ورأس. فالوجه الخلفي مثلث الشكل مقعر يستقر فيه بعض العضلة
الطرجهالية. والوجه المقدم خشن يرتبط به العضلة الدرقيه الطرجهالية والوتر الصوتي الكاذب.
والوجه الانسي ضيق مغطى بغشاء مخاطي يكاد يلامس رقيقه من الجانب الخالف. والقاعدة
عريضة تتصل اتصالاً مفصلياً بالغضروف الخلفي تندغم بزوايتها الوحشية العضلتان الخلفيتان
الطرجهاليتان الخلفية والجانبية وبالمقدمة الوتر الصوتي الصحيح. والرأس مخن الى الخلف والانسية
تعلوه عقدة صغيرة غضروفية هي القرين الحجيري وقد تكون متحدة بالرأس. والغضروفان
الاسفنيان جسمان غضروفيان صغيران مستطيلان موضوعان على الجانبين في ثنية مخاطية ممتدة
من رأس الغضروف الطرجهالي الى جانب لسان المزمار

ولسان المزمار صفيحة رقيقة غضروفية ليفية مائلة الى الصفرة شكلها كالورقة ووضعها وراء

في اعضاء الصوت والتنفس

الحنجرة

الحنجرة عضو الصوت وهي موضوعة في الجزء العلوي للقصبة بينها وبين قاعدة اللسان في الجزء العلوي والمقدم للعنق حيث تكوّن بروزاً ظاهراً في الخط المتوسط. تجاورها من الجانبين الاوعية الكبيرة العنقية ومن الخلف تكوّن بعض حدود البلعوم ويغطيها الغشاء المخاطي المبطن للتجويف البلعومي. وهي ضيقة اسطوانية من الاسفل جزءها العلوي عريض مسطح من الخلف والجانبين ويحدها من المقدم خط عمودي بارز. تاليها من غضاريف لها اربطة تربطها بعضها ببعض وعضلات تحركها وغشاء مخاطي يبطنها واوعية واعصاب

غضاريف الحنجرة تسعة ثلاثة مفردة وثلاثة مزدوجة وهي :

الدرقي - الحلقى - لسان المزمار - الطرجهاليان - القرنيان الحنجريان - الاسفنيان

فالغضروف الدرقي اكبر غضاريف الحنجرة وموّلّف من صفيحتين جانبيتين متحدتين على زاوية حادة في المقدم فيتكوّن من الاتحاد المذكور بروز عمودي في الخط المتوسط كثير الظهور في الاعلى يقال له فتاحة ادم. وهذا البروز اكثر ظهوراً في الذكور منه في الاناث ولا يغطيه الا الجلد وانما قد يكون منفصلاً عنه بواسطة كيس مخاطي. كل صفيحة منها مرعبة الجوانب. وجهها الظاهر عليه خط بارز منحرف يسير من حدة واقعة عند اصل القرن العلوي الى الاسفل والمقدم ترتبط بالخط المذكور العضلة القصية الدرقيه والدرقية اللامية وبالحلاء الواقع بينه وبين الحافة الخلفية بعض العاصرة السفلى. وجهها الباطن املس مقعر مغطى بغشاء مخاطي من الاعلى والخلف واما في المقدم عند اتحاد الصفيحتين فيرتبط به لسان المزمار والوتار الصوتية والعضلة الدرقيه الطرجهالية والدرقيه المزمارية. والحافة العليا للغضروف الدرقي عليها في الخط المتوسط شرم غائر اعلى فتاحة ادم ويرتبط بجميع طول الحافة المذكورة الغشاء الدرقي اللامي. والحافة السفلى متصلّة بالغضروف الحلقى بواسطة الغشاء الحلقى الدرقي في الخط المتوسط وبواسطة العضلة الخلفية الدرقيه من الجانبين. والحافتان الخائيتان غليظتان مستديرتان تنتميان من الاعلى في القرن العلوي ومن الاسفل بالقرن السفلي. فالقرنيان العلويان طويلان ضيقان متجهان نحو الخلف والاعلى والانسية

والحوض الآن معظمه يُحمل الى المشيمة بواسطة الشريانين السريين
فما تقدم من الدورة الجنينية برى :

أولاً ان المشيمة بمنزلة آلة لتنفس الجنين وتغذيته فانها تقبل الدم الوريدي من الجنين ثم
ترده اليه متأكسداً حاملاً مواد جديدة غذائية

ثانياً ان معظم الدم الاتي من الوريد السري يسير في الكبد قبل وصوله الى الاجوف السفلي
ولذلك كان الكبد كبيراً جداً في الجنين ولا سيما في ادواره الاول

ثالثاً ان في الاذنين اليمنى يتلاقى سيلان احدها من الاجوف السفلي بوجهه صام اوستاكيوس
الى الاذنين اليسرى والثاني من الاجوف العلوي ينزل الى البطن الايمن . ويظهر انه لا يحصل
اختلاط بين السيلين في الدور الاول للحياة الجنينية واما بعد ذلك اذ تاخذ الفتحة البيضية في
الانسداد وصمام اوستاكيوس في الصغر يحصل اختلاط جزئي بينهما

رابعاً ان الدم الذي يُحمل من المشيمة الى الجنين بواسطة الوريد السري يمتزج بالدم الصاعد
في الاجوف السفلي ثم يكاد يكون سيره رأساً الى قوس الاورطي فيذهب في فروعه الى الراس
والطرفين العلويين . ولذلك كانت هذه الاجزاء كبيرة الحجم في الجنين عند الولادة

خامساً ان الدم النازل في الاورطي الصدري معظمه من الدم الذي دار في الراس والاطراف
وبعضه من البطن الايسر فيتوزع في الطرفين السفليين ولذلك كان حجمها صغيراً عند الولادة

التغيرات التي تحدث في المجموع الوعائي عند الولادة


عند الولادة تبطل الدورة المشيمية ويقام التنفس في الرئتين عوضاً عنها لاجل تطهير الدم
ولذلك تزيد كمية الدم المندفعة الى الرئتين بواسطة الشريان الرئوي . فينسد الثقب البيضي
شيئاً فشيئاً الى اليوم العاشر بعد الولادة بواسطة ثنية صامية تنشأ من جانبه الايسر والاعلى
وتلتصق بمعظم محيط الفتحة الى ان تسدها . وقد تبقى فتحة صغيرة صامية بين الاذنين مدة الحياة

واما القناة الشريانية فتبتدأ تجف من ساعة الولادة وتنسد من اليوم الرابع الى العاشر وتصير
اخيراً حبلاً مسدوداً يوصل الشريان الرئوي الايسر بتقعر القوس الاورطي

والشريانان السريان وهما الخنثليان فالجزء الواقع بين منشأ كل منهما من الحرقفي الباطن
الى المثانة يدوم شرياناً فهو الشريان المثاني العلوي وما بقي منه الى السرة يجف بين اليوم الثاني
والخامس فيصير الرباط المقدم للمثانة

والوريد السري والقناة الوريدية يجفان بين اليوم الثاني والخامس فيصير الوريد السري الرباط
المستدبر للكبد وتصير القناة الوريدية حبلاً ليفياً تُستقصى في البالغ الى منتهى فرجة القناة الوريدية

شكل ٢١٢



الكبدية . والثانية ان بعضه يدخل الكبد رأساً ثم يصب في الاجوف بواسطة الاوردة الكبدية ايضاً . والثالثة ان الكمية الصغرى منه تذهب رأساً الى الاجوف بعد اتحاد القناة الوريدية بالوريد الكبدى الايسر

ثم اذا وصل الدم الى الاجوف بواسطة القناة الوريدية والاوردة الكبدية امتزج بالدم الراجع من الطرفين السفليين والاحشاء البطنية ودخل الاذنين اليمنى . ثم بوجه الى الثقب البيضي بواسطة صمام اوستاكيوس ومنه الى الاذنين اليسرى حيث يمتزج بكمية صغيرة من الدم الراجع من الرئتين بواسطة الاوردة الرئوية . ومن الاذنين اليسرى يندفع الى البطن الايسر ومنه الى الاورطي ومنه الى الراس والطرفين العلويين وربما ذهب بعضه في الاورطي النازل . واما الدم الراجع من الراس والطرفين العلويين فيصب في الاجوف العلوي ثم في الاذنين اليمنى حيث يمتزج بكمية قليلة من الدم الآتي من الاجوف السفلي . ومن الاذنين اليمنى ينزل الى البطن الايمن ومنه يندفع الى الشريان

الرئوي . ولما كانت الرئتان في الجنين مكنترتين لم يكن يذهب اليهما من الدم الا قليل بواسطة فرعي الشريان الرئوي ثم يعود الى الاذنين اليسرى بواسطة الاوردة الرئوية ولذلك يذهب معظمه في القناة الشريانية الى بداءة الاورطي النازل حيث يمتزج بكمية قليلة من الدم المندفع من البطن الايسر الى الاورطي ثم يسير الى الاسفل في الوعاء المذكور ويتوزع في احشاء البطن

شكل ٢١٢ الدورة الجينية ١ الحبل السرى المؤلف من الوريد السرى والشريانيين السريين الآتي من المشيمة ٢ المشيمة ٣ الوريد السرى الذي ينقسم الى فروع اثنان منها (٤) يتوزعان في الكبد وواحد (٥) هو القناة الوريدية التي تصب في الاجوف السفلي (٦) الوريد البالي الذي يحمل الدم من الامعاء ويستطرق الى الفرع الكبدى الايمن ٨ الاذنين اليمنى . والسهم يشير الى سير الدم منها الى الاذنين اليسرى (٩) ١٠ البطن الايسر والسهم يشير الى سير الدم منه الى قوس الاورطي (١١) الذي يحمله الى الراس والطرفين العلويين . والسهم ١٢ و١٣ و١٤ تشير الى رجوع الدم من الراس والطرفين العلويين بواسطة الوريدتين الوداجيين والوريدتين تحت الترقوة الى الاجوف العلوي (١٤) ثم الى الاذنين اليمنى ثم الى البطن الايمن (١٥) على مسير السهم ثم صعوده في الشريان الرئوي (١٦) ١٧ القناة الشريانية التي يظهر انها امتداد الشريان الرئوي . والفرعان المقطوعان الى كل من جانبي الرقبة هما الشريانان الرئويان الايمن والايسر . والسهم ١٨ و١٩ يشير الى الحرفيين الاصليين اللذين ينقسمان الى الحرفيين الباطنين وهما الشريانان المحتليان (٢٠) اللذان يحملان الدم في الحبل السرى الى المشيمة والحرفيين الظاهرين (٢٠) اللذين يحملان الدم الى الطرفين السفليين . والسهمان في الاسفل يدلان على رجوع الدم بواسطة الوريدتين الى الاجوف السفلي

الدورة الجنينية

فالصفات المميزة لقلب الجنين امران خاصة . الاول الثقب البيضي الذي يتحول الى الحفرة البيضية بعد الولادة. وضعه في الجزء السفلي والخلفي للفواصل بين الاذنين به تستطرق الاذنين الواحدة الى الاخرى. والثاني سهام اوستا كيموس وضعه بين الحافة المقدمة للوريد الاجوف السفلي والفتحة الاذنية البطنية وفائدته توجيه الدم الصاعد من الوريد المذكور الى الثقب البيضي ليبرمه الى الاذنين اليسرى

والصفات المميزة للمجموع الشرياني في الجنين استطراقان احدهما بين الشريان الرئوي والجزء النازل من قوس الاورطي وهو القناة الشريانية. والثاني بين الشريانيين الحرقفيين الباطنين والمشيمية وهو الشريانان السريان. فالقناة الشريانية مستطرفة بين الفرع الايسر للشريان الرئوي ومنتهى القوس الاورطي اسفل منشأ الشريان تحت الترقوة الايسر. طولها نحو نصف قيراط عند الولادة وغلظها كقلم الكتابة وفائدتها انها تحمل معظم الدم من البطين الايمن الى الاورطي النازل. والشريانان السريان وهما الختليان ينشآن من الحرقفيين الباطنين ويصعدان على جانبي المثانة حتى قمتها ثم يبرزان من السرة فيكونان الحبل السري مع الوريد الذي يلتفان عليه. فائدتها رد الدم من الدورة الجنينية الى المشيمة

والصفة المميزة للمجموع الوريدي في الجنين هو الوريد السري المستطرق بين المشيمة من الجهة الواحدة والكبد والوريد البائي من الجهة الاخرى. والوريد المذكور يستطرق ايضاً الى الاجوف السفلي بواسطة القناة الوريدية فهي فرعه الثاني الانتهائي. وفائدته حمل الدم الشرياني من المشيمة الى الجنين كما سياتي


الدورة الجنينية

الدم الشرياني الذي يذهب لتغذية الجنين يحمل اليه بواسطة الوريد السري. فالوريد المذكور يدخل البطن من السرة ويسير صاعداً بجانب الحافة السائبة للرباط المعلق للكبد حتى الوجه السفلي لهذا العضو وهناك يرسل فروعاً للفص الايسر والفص المربع وفص سيجموس. فاذا وصل الى الفرجة المستعرضة انقسم الى فرعين يتحد الوريد البائي باكبرها ثم يدخل الفص الايمن. واما الفرع الاصغر فيدوم سائراً الى المقدم فيكون اسمه حينئذ القناة الوريدية ثم يتحد بالوريد الكبدي الايسر ويصب الجذع المكوّن منها في الوريد الاجوف السفلي. وعلى ذلك يصل الدم الذي يسير في الوريد السري الى الاجوف السفلي بثلاث طرق مختلفة. الاولى ان معظمه يتخرج بالدم البائي ويدور في الكبد قبل وصوله الى الاجوف السفلي بواسطة الاوردة

غضروفية في الانسان عظمية في بعض الحيوانات الكبيرة كالثور والفيل. واما الحلقمان الشريانيان فيرتبط بهما الشريانان اي الاورطي والرئوي والصمامات الهلالية والياف البطينين. والالياف العضلية الداخلة في بناء القلب على نوعين الاول خاص بالاذنين والثاني بالبطينين. فالالياف الخاصة بالاذنين مصنوفة على هيئة طبقتين احدهما سطحية عامة للتجويفين والثانية غائرة خاصة بكل منهما. والالياف الخاصة بالبطينين مصنوفة على هيئة طبقات بعضها عام للتجويفين وبعضها خاص بكل منهما. فالالياف السطحية طويلة الوضع او وربية او لولبية مرتبة عند راس القلب على هيئة عروات ملتفة على نفسها. والالياف الغائرة حلقية الشكل. وجميع الالياف المذكورة تنغم بعضها ببعض وتتصلب وتتشبك على نوع مشوش جداً بحيث يقال في الجملة ان البناء العضلي للقلب لم يُعرف كما ينبغي الى الان



شكل ٢١٢



شكل ٢١١

الشرايين التي تغذي جوهر القلب الاكيليان المقدم والحلفي وهما الايمن والايسر وقد تقدم الكلام عليهما. واوردهُ مرافقة للشرايين وتصب في الاذنين اليمنى وهي الوريد القلبي العظيم والاوردة الصغيرة وهي المقدمة القلبية واوردة ثيبسيوس. واورعته الليفية تنتهي في القناة الصدرية والقناة الليفية اليمنى. واعصابه ناشئة من الضفيريّتين القلبيّتين المكوّنتين من المجموع الشوكي والمجموع السيمباتوي وتوزع في ظاهر القلب وباطنه. وعلى خيوطها عقد صغيرة


في الصفات المميزة للمجموع الوعائي في الجنين

الصفات المميزة للمجموع الوعائي في الجنين منها ما يتعلق بالقلب ومنها بالمجموع الشرياني ومنها بالمجموع الوريدي

شكل ٢١١ الالياف العضلية المنسجمة للقلب
شكل ٢١٢ الكريات السطحية (ايشيلوم) التي تغطي الغشاء المبطن للقلب وهو الاندوكرديوم. مكبرة ٢٥٠ قطراً اكرات
نورية مغزلية الشكل ٢ كريات نووية كثيرة البواب

فالفتحة الاذينية البطنية واقعة الى يسار الفتحة الاورطية اسفل الفتحة الاذينية البطنية اليمنى مقابل مركز النقص. وهي اصغر قليلاً من الفتحة اليمنى بيضية الشكل قطرها الطويل من الجانب الى الجانب محاطة بمحلاة ليفية والصمام التاجي حافظ لها والفتحة الاورطية ثقب صغير حلقي واقع الى مقدم الفتحة الاذينية البطنية والى اليمين منها ومنفصل عنها بواسطة احدى قطعتي الصمام التاجي. والصمامات الهلالية حافظة لها. وضعها حذاء المحافة السفلى للضروف الضلعي الثالث الايسر

شكل ٢١٠



والصمام التاجي مرتبط بمحيط الفتحة الاذينية البطنية ومولف من ثنية من الغشاء المبطن وطبقة من التسنج الليفي. وهو اكبر واغظ واقوى من الصمام الثلاثي الرؤوس ومكوّن من قطعتين غير متساويتين. مرتبطتين من حوافهما ووجههما السفليين بمجال وترية كارتباط الصمام الثلاثي الرؤوس

والصمامات الهلالية ثلاثة محيطة بفتحة الاورطية

وهي شبيهة من كل وجه بالصمامات الهلالية الخاصة بالشريان الرئوي الا انها اكبر واغظ واقوى منها وجيوب قلسلثا اكبر

والعمد اللحمية تنقسم كالعمد الواقعة في البطن الايمن الى ثلاثة اقسام وهي شبيهة بها


والاندوكرديوم وهو الغشاء المبطن لتجاويف القلب يمتد الى الاوعية الكبيرة الدموية فيبطنها ايضا ويتألف من ثنياته الصمامات. وهو غشاء املس رقيق لامع اغظ في الاذنين منه في البطنين

في بناء القلب

بناء القلب من حلقات ليفية والياف عضلية مرتبطة بها. فالحلقات الليفية محيطة بالفتحات الاذينية البطنية والشريانية وترتبط بالحلقتين الاذينيتين البطنيتين الالياف العضلية الخاصة بالاذنين والبطنين والصمامات الثلاثية والتاجية. وما بين الحلقة اليمنى واليسرى كتلة ليفية

شكل ٢١٠ قطع عرضي للاذنين والشريانين الاورطية والرئوي اعلى الصمامات ١ الاذنين اليسرى ٢ الاذنين اليمنى ٣ و ٤ قطع جدران الاذنين اليسرى ٤ الوجه العلوي وهو الاذيني للقطعتين اللتين يتألف منها الصمام التاجي ٥ قطع الوريد الاكليلي ٦ و ٧ قطع جدران الاذنين اليمنى ٧ الوجه العلوي وهو الاذيني للقطع الثلاث التي يتألف منها الصمام الثلاثي الرؤوس ٨ ثنية الوريد الاكليلي ٩ الجدار الفاصل بين الاذنين ١٠ قطع عرضي للاورطية لاجل اظهار صماماته الهلالية ١١ الشريان الرئوي وصماماته الهلالية

اليمنى وحافتها أكثر تسنناً. اتجاهها الى المقدم نحو اليمين وتجاوز اصل الشريان الرئوي اذا شُتت الاذنين اليسرى شوهد فيها فتحات الاوردة الرئوية الاربعة والفتحة الاذينية البطينية



شكل ٢٠٩

والعضلات المشطية

فالاوردة الرئوية اربعة اثنان يصبان في الجانب الايمن للاذنين واثنان في جانبها الايسر. والايسران كثيراً ما ينتهيان بفتحة واحدة. وهذه الاوردة خالية من الصمامات والفتحة الاذينية البطينية كالتى تقابلها في الجانب الايمن الا انها اصغر منها قليلاً والعضلات المشطية اقل عدداً واصغر من التي في الجانب الايمن. ووجودها مقصور على الوجه الانسي للزائدة

البطين الايسر

البطين الايسر اطول من الايمن واقرب الى الشكل المخروطي. ويكون جزءاً صغيراً من الجانب الايسر للوجه المقدم للقلب وجزءاً عظيماً من وجهه الخلفي. ويكون ايضاً راس القلب لانه اشد بروزاً الى الاسفل من البطين الايمن. جدرانه اغلظ كثيراً من جدران البطين الايمن فهي كنسبة الى ٢ الا انها ترقق عند القاعدة والراس اذا فُتِح شوهد فيه الفتحة الاذينية البطينية والفتحة الاورطية والصمام التاجي والصمامات الهلالية والحبال الوترية والعمد اللحمية

شكل ٢٠٩ تخرج الجانب الايسر للقلب ١ تجويف الاذنين اليسرى وقد وضع الرقم في ما يقابل مركز الحفرة البيضية ٢ تجويف الزائدة الاذينية التي تشاهد بقرب راسها العضلات المشطية ٣ فتحة الوريدين الرئويين الايمنين ٤ الجيب الذي يصب فيه الوريدان الرئويان الايسران ٥ الوريدان الرئويان الايسران ٦ الفتحة الاذينية البطينية ٧ الوريد الاكليلي الواقع في الميزاب الاذيني البطيني ٨ البطين الايسر ٩ وتجويفه وقد وضع الرقمان على الفاصل البطيني a الصمام التاجي وهو ذو الراسين اللذين يرتبطان بواسطة الحبال الوترية بالعمد اللحمية (b و b) و c و c عند لحمية d قوس الاورطي الذي يشاهد على اعلاه ثلاثة اجزاء شريانية تصعد الى الراس والطرفين العلويين e الشريان الرئوي f اثر التناثر الشريانية g الشريان الرئوي الايسر h البطين الايمن z راس الزائدة الاذينية اليمنى

عند انقباض البطين. واما حوافها السائبة ووجوهها البطينية وهي السفلى فتربط بها الحبال الوترية. اكبر القطع الثلاث موضوعة الى يسار الفتحة الاذينية البطينية اي بينها وبين الشريان الرئوي والثانية مرتبطة بالجدار المقدم للبطين والثالثة بالجدار الخلفي. واما ارتباط الحبال الوترية بها فعلى شكل ان بعضها يرتبط بقواعد القطع وبعضها بالجزء المركزي الغليظ واكثرها بالحواشي

والعمد اللحمية عمد عضلية مستديرة بارزة من الوجه الباطن للبطين. وهي على ثلاثة انواع الاول عمد مرتبطة من جوانبها على جميع طولها ومن طرفيها بالوجه الباطن للبطين فانما هي خطوط بارزة. والثاني عمد مرتبطة من طرفيها سائبة فيما بقي. والثالث عمد مرتبطة من الطرف الواحد بجدار القلب وتربط الحبال الوترية بطرفها الاخر

والصمامات الهلالية ثلاثة واقعة في فتحة الشريان الرئوي ومولفة من ثلاث ثنيات من الغشاء المبطن وطبقة من نسج ليفي. وهي مرتبطة من حوافيها المحدبة بجدار الشريان عند اتصاله بالبطين واما حوافيها المستقيمة فسائبة ومجهة الى الاعلى نحو سير الشريان فتضغط على جوانبه مدة جري الدم فيه. والحافة السائبة غليظة بالنسبة الى ما بقي من الصمام وذلك لدخول حزمة الياف وترية في بنائها وعند منتصفها عقدة ليفية غضروفية صغيرة بارزة هي جسم ارنيموس. وتشتع من العقدة المذكورة الياف وترية في جوهر الصمام الى حافته المرتبطة الاجزئين ضيقين هلاليين واحد الى كل من جانبي العقدة وراء الحافة السائبة مؤلفين من الغشاء المبطن فقط. فاذا تهرق الدم عند تمدد البطين انتشرت الصمامات ومنعت عوده من الشريان الى البطين وذلك بان وجوه الاجزاء الهلالية المتقابلة تماس فتسد الفتحة الاخلاء مثلما كان يبقى في المركز لولا العقد الثلاث التي تماس فتتلاهد. وبين الصمامات الهلالية وبداءة الشريان الرئوي ثلاثة تمددات واحد وراء كل صمام يقال لها الجيوب الرئوية وهي جيوب فلسقا. ويوجد مثل ذلك بين الصمامات الهلالية والاورطي

الاذنين اليسرى

الاذنين اليسرى اصغر قليلاً من اليمنى واغظ ومولفة مثلها من تجويف وزائدة اذينية. فالتجويف مكعب الشكل يغطي الى المقدم الشريان الرئوي والاورطي ومن الانسية يفصله عن الاذنين اليمنى الفاصل الاذيني ومن الخلف يقبل الوريد بين الرئويين من كل جانب وما بقي منه سائب. والزائدة الاذينية مخنقة عند اتصالها بالاذنين وهي اطول واضيق واكثر انحناء من الزائدة

الاجوف السفلي . والصمام الاكليلي ثنية هلالية واقعة عند فتحة الجيب الاكليلي فتمنع نتهقر الدم اليه عند انقباض الاذين
والحفرة البيضية شاغلة لموقع الثقب البيضي الذي يستطرق في الجنبين بين الاذنين . وضعها في الجزء السفلي للفاصل الاذيني اعلى فتحة الاجوف السفلي . والحلقة البيضية حافة بارزة حول الحفرة البيضية ولا سيما في الاعلى والجانبيين
والعضلات المشطية عمد عضلية صغيرة بارزة تقاطع الوجه الباطن للزائدة الاذينية والجزء المجاور من جدار التجويف

البطين الايمن


البطين الايمن مثلث الشكل ممتد من الاذين اليمنى الى قرب الراس . وجهه المقدم او العلوي مستدير مدب يتكون منه معظم مقدم القلب . وجهه الخلفي او السفلي مسطح مستقر على الحجاب ولا يكون الا جزءاً صغيراً من الوجه الخلفي للقلب . جداره الباطن مكون من الفاصل بين البطينين . اعلاه على هيئة قمع ينشأ منه الشريان الرئوي . جداره ارق جداً من جدران الايسر فالنسبة التي بينهما كنسبة ١ الى ٢ وهي ارق ما يكون عند الراس . تجويف البطين الايمن كتجويف الايسر يسع نحو اوقيتين . واما الاجزاء التي تشاهد في باطنه فهي :

فتحتان هما الفتحة الاذينية البطينية وفتحة الشريان الرئوي . وصمامان هما الصمام الثلاثي والصمام الهلالي . وجهاز عضلي ووترى يتعلق بالصمام الثلاثي وهو العمد اللحمية والحبال الوترية

فالفتحة الاذينية البطينية كبيرة بيضية الشكل مستطرفة بين الاذين اليمنى والبطين الايمن واقعة عند قاعدة البطين بقرب الحافة اليمنى للقلب وتقابل مركز الفص بين غضروف الضلعين الثالثين . قطرها نحو قيراط وهي بيضية الشكل من الجانب الى الجانب محاطة بحلقة ليفية مبطنة بالغشاء المبطن للقلب واكبر قليلاً من الفتحة التي تقابلها في الشطر الايسر . والصمام الثلاثي واقع في محيطها . وفتحة الشريان الرئوي مستديرة الشكل واقعة في راس القمع الممتد من تجويف البطين الى الاعلى بقرب الفاصل البطيني . وضعها الى يسار الفتحة الاذينية البطينية مقابل الحافة العليا للغضروف الضلعي الايسر بقرب الفص . والصمامات الهلالية واقعة في محيطها

والصمام الثلاثي الرووس مولف من ثلاث قطع مثلثة الشكل مكوّنة من انشاء الغشاء المبطن للقلب ومن طبقة ليفية . والقطع المذكورة مرتبطة من قواعدها بمحيط الفتحة الاذينية البطينية ومن جوانبها بعضها ببعض بحيث اذا تمددت كوّنت غشاءً حلقياً يمنع نتهقر الدم الى الاذين

العلوي نحو الفتحة الاذينية البطنية والسيل الآتي من الاجوف السفلي نحو الفاصل الاذيني .
 وحذبة لوبروس بروز صغير في الجدار الايمن للاذنين بين الاجوفين واضح في ذوات الاربع خفي
 في الانسان وذهب المعلم لوبروس ان فائدته توجيه السيل الآتي من الاجوف العلوي نحو الفتحة
 الاذينية البطنية . والحجيب الاكليلي يصب بين الاجوف السفلي والفتحة الاذينية البطنية وبرد الدم
 من جوهر القلب . وفتحة ثنية هلالية من الغشاء المبطن للاذنين هي الصمام الاكليلي . وثقوب ثيبسيوس
 فوهات دقيقة لاوردة ترد الدم من جوهر القلب وهي منتشرة على الوجه الباطن للاذنين . والفتحة
 الاذينية البطنية فتحة كبيرة بيضية الشكل مستطرفة بين الاذنين والبطين وسباني الكلام عليها



شكل ٢٠٨

في الصمامين . صمام اوستاكيوس موضوع بين الحافة المقدمة للاجوف السفلي والفتحة الاذينية
 البطنية . وهو هلالى الشكل حافته المحدبة مرتبطة بجدار الوريد المذكور وحافته المقعرة سائبة
 تنتهي بقرنين الايسر منها مرتبط بالحافة المقدمة للحلقة البيضية والايمن ضائع في جدار الاذنين .
 وهو كبير في الجنين حيث تكون فائدته توجيه الدم الآتي من الاجوف السفلي الى الثقب البيضي
 ومنه الى الاذنين اليسرى . ولذلك هو اثري في البالغ الا انه اذا وجد اعان في منع تقهر الدم الى

شكل ٢٠٨ تشرح الجانب الايمن للقلب ١ تجويف الاذنين اليمنى ٢ الزائدة الاذينية وشاهد في تجويفها العضلات المشطية
 ٣ الوريد الاجوف العلوي مستطرفاً الى الجزء العلوي للاذنين اليمنى ٤ الوريد الاجوف السفلي ٥ الحفرة البيضية وتحيط بها
 الحلقة البيضية ٦ صمام اوستاكيوس ٧ فتحة الوريد الاكليلي ٨ الصمام الاكليلي ٩ مدخل الفتحة الاذينية البطنية . ويشاهد بين
 اوجه فتحتان او ثلاث لاوردة لثيبسيوس ١٠ البطين الايمن ١١ تجويف البطين الايمن وشاهد على جدراته العمدة الشبيهة بالشريان
 الرئوي ١٢ القطعة المقدمة للصمام الثلاثي ١٣ قطعته اليمنى ١٤ عمود لحمي مرتبطة به الحبال التوترية (تواو) ١٥ صمام الشريان
 الرئوي وقد وضع الحرف على القطعة المثلالية السفلي ١٦ رأس الزائدة الاذينية اليسرى ١٧ البطين الايسر ١٨ القسم الصاعد للنفوس
 الارطبي ١٩ قسمة المستعرض الذي تشا منه ثلاثة شرايين ٢٠ قسمة النازل

بواسطة الاوردة الرئوية ومنها الى البطنين الايسر ومنه يندفع الى جميع الجسد بواسطة الاورطي وفروعه. وعلى ذلك يتم سير الدورة بعد الولادة. ثم انه يوجد على ظاهر القلب ميازيب تدل على انقسامه الى اربعة تجاويف. فيقال للميزاب العظيم المستعرض الفاصل بين الاذنين والبطينين الميزاب الاذيني البطني وهو غير ظاهر في المقدم نظراً الى مقاطعة اصل الشريان الرئوي له ويستقر فيه جذع الاوعية الغذائية للقلب. والقسم الاذيني شاغل لقاعدة القلب وينقسم الى تجويفين بواسطة فاصل متوسط بينهما. وينقسم ايضاً البطنان الى ايمن وايسر بواسطة ميزابين طوليين احدهما على الوجه المقدم والاخر على الوجه الخلفي للقلب يتدان من القاعدة الى الراس. فالمقدم منها اقرب الى المحافة اليسرى والخلفي اقرب الى المحافة اليمنى وعلى ذلك يكون البطنين الايمن معظم الوجه المتدم للقلب واليسر معظم الوجه الخلفي

الاذنين اليمنى

الاذنين اليمنى اكبر وجدرانها ارق قليلاً من اليسرى. ويسع تجويفها نحو اوقيتين. وهي مولدة من جزئين تجويف وزائدة اذينية
فالتجويف ويقال له الحبيب ايضاً مربع الزوايا وضعه بين الاجوفين وجدرانه رقيقة جداً ويتصل من الاسفل بالبطنين الايمن ومن الباطن بجدار الاذنين اليسرى وما بقي منه سائب والزائدة الاذينية سُميت بذلك لانها شبيهة باذن الكلب. وهي جراب صغير عضلي مخروطي الشكل. حوافها مسننة وهي بارزة من التجويف الى المقدم واليسار وتجاوز اصل الشريان الرئوي. واما الاجزاء التي تُشاهد في الاذنين اليمنى فهي على ما يأتي :
فتحات : الاجوف العلوي والاجوف السفلي والحبيب الاكليلي وثقوب ثيبسيوس والفتحة الاذينية البطينية

صمامات : صام اوستاكيوس والصمام الاكليلي


اثار جنينية : الحلقة البيضية والحفرة البيضية

العضلات المشطية

في الفتحات. الوريد الاجوف العلوي يردّ الدم من النصف العلوي للجسد ويصب في الجزء العلوي والمقدم للاذنين. اتجاه فتحته الى الاسفل والمقدم. والوريد الاجوف السفلي يردّ الدم من النصف السفلي للجسد وهو اكبر من العلوي ويصب في الجزء السفلي للاذنين بقرب الفاصل بين الاذنين. اتجاه فتحته الى الاعلى والباطن. وعلى ذلك يكون اتجاه سيل الدم الآتي من الاجوف

طويلة رقيقة حادة واليسرى قصيرة غليظة مستديرة

في حجم القلب. طوله في البالغ نحو خمسة قراريط وعرضه عند قاعدته ثلاثة ونصف وسماكته قيراطان ونصف. ووزنه في الذكور من عشر الى اثنتي عشرة اوقية وفي الاناث من ثمان اواق الى عشر. ونسبته الى جميع الجسد في الذكور كنسبة ١ الى ١٦٩ وفي الاناث كنسبة ١ الى ١٤٩. ويبقى القلب اخذاً في الزيادة الى الادوار الاخيرة من الحيوة ولا سيما في الذكور



شكل ٢٠٧

في اقسام القلب. يُقسَم القلب بواسطة فاصل طولي عضلي الى شطرين جانبيين ايمن وايسر ثم يُقسَم كل شطر منهما بواسطة اخنثاق عرضي الى تجويفين علوي وهو الاذنين وسفلي وهو البطين. فالشطرين الايمن هو الجانب الوريدي للقلب فان الدم الوريدي الداكن يصب الى الاذنين اليميني بواسطة الاجوفين والحجيب الاكليلي ومنها الى البطين الايمن ومنه يُندفع الى الرئتين بواسطة الشريان الرئوي. ثم اذا تاكسد في الرئتين رجع الى الشطر الايسر للقلب فيصب في الاذنين اليسرى

شكل ٢٠٧. تشرح القلب ١ الاذنين اليميني ٢ مدخل الوريد الاجوف العلوي ٣ مدخل الاجوف السفلي ٤ فتحة الوريد الاكليلي والصمام الاكليلي ٥ صمام اوستاكيوس ٦ الحفرة البيضية المحاطة بالخلقة البيضية ٧ حدة لوبروس الواقعة في الجدار الايمن للاذنين اليميني بين مدخل الاجوفين. وهي بروز ظاهر في ذوات الاربع اثري في الانسان ٨ العضلات المشطية للزائدة الاذينية ٩ الفتحة الاذينية البطينية ١٠ تجويف البطين الايمن ١١ الصمام الثلاثي الرووس الذي يرتبط بالعمد الخيمية (١٢) بواسطة الحبال الوترية ١٣ الشريان الرئوي وعند قاعدته ثلاثة صمامات هلالية ١٤ الشريان الرئوي الايمن سائراً اسفل القوس ووراء القسم المساعد من القوس الاورطي ١٥ الشريان الرئوي الايسر مقاطعاً للاورطي النازل * بقايا التناة الشريانية التي تكون بعد الولادة بمنزلة رباط بين الشريان الرئوي وقوس الاورطي. والسهام تدل على سير الدم الوريدي في الجانب الايمن للقلب فانه يدخل الاذنين اليميني من الاجوفين ومنها الى البطين الايمن ومنه الى الشريان الرئوي والرئتين ١٦ الاذنين اليسرى ١٧ فتحات الاوردة الاربعة الرئوية ١٨ الفتحة الاذينية البطينية ١٩ البطين الايسر ٢٠ الصمام الناجي المولف من قطعتين فقط ٢١ منشا الاورطي المساعد وسيره وراء الشريان الرئوي يدل عليه سهم. واما صماماته الهلالية الثلاثة فواقعة عند قاعدته ٢٢ قوس الاورطي. ويشاهد في الرسم ان جدران البطين الايسر اغلظ من الايمن. واما سير الدم في الجانب الايسر فتدل عليه السهام وهن انه يحمل من الرئتين بواسطة الاوردة الرئوية الاربعة الى الاذنين اليسرى ومنها الى البطين الايسر ثم الى الاورطي الذي يجمل الى جميع الجسد

قاعدة القلب. قاعدته متجهة الى اليسار اكثر من اليمين ومرتبطة بالوتر المركزي للحجاب. من المقدم تنصله عن القص بقايا الغدة التيموسية في الاعلى ونسيج خلوي في الاسفل وتغطيه حافتا الرئتين ولا سيما اليسرى. ومن الخلف يستقر على الشعب والمريء والاورطي النازل. ومن الجانبين تغطيه البليورتان الا ان العصب الحجابي ينزل بين البليورا والتامور من كل جانب والتامور غشاء ليفي مصلي مؤلف من طبقتين ظاهرة ليفية وباطنة مصلية فالطبقة الليفية غشاء ليفي متين. من الاعلى تحيط بالاوعية العظيمة الناشئة من قاعدة القلب وترسل زوائد انبوية على الاوعية المذكورة تدوم عليها الى ان تغيب في طبقاتها الظاهرة. ومن الاسفل ترتبط بالوتر المركزي للحجاب والى اليسار بالياض العضلية والاوعية التي تقبل زوائد من الغشاء المذكور في الاورطي والاجوف العلوي والشريان الرئوي والاوردة الرئوية والطبقة المصلية تغلف القلب ثم تنعكس على الوجه الباطن للتامور وعلى ذلك يكون تالفها من طبقتين احدهما حشوية تغلف القلب وبداية الاوعية الكبيرة والثانية جدارية منعكسة منها في الاعلى على الوجه الباطن للطبقة الليفية فتبطنه وتبطن الوجه العلوي للوتر المركزي. وهذه الطبقة المصلية تغلف الاورطي والشريان الرئوي بغلاف واحد ولا تغطي الا جزءا من الاجوفين والاوردة الرئوية. وجهها الباطن امس لامع يفرز سائلا رقيقا منفعتة تسهيل حركة القلب شرايين التامور من التديين الباطنين والشرايين الشعبية والمرئية والحجابيين

القلب

القلب عضو عضلي مجوف مخروطي الشكل موضوع ضمن تجويف التامور بين الرئتين وضعه في الصدر منحرف الى اليسار. قاعدته وهي طرفه المرتبط متجهة الى الاعلى والخلف نحو اليمين وشاغلة للمسافة الواقعة بين الفقرة الرابعة والثامنة الظهريتين. ورأسه متجه الى المقدم واليسار يقابل الخلاء الواقع بين غضروفي الضلع الخامس والسادس اسفل حلة الثديي بقيراطين وعلى بعد قيراط من ذلك نحو الانسية. والقلب موضوع وراء الثلثين السفليين للقص ويبرز من الخط المتوسط الى مسافة ثلاثة قراريط في التجويف الايسر للصدر والى مسافة قيراط ونصف في التجويف اليمين. حافته العليا تقابل خطا وهميا مقاطعا للقص على مساحة الحافة العليا لغضروفي الضلعين الثالثين وحافته السفلى تقابل خطا مقاطعا للطرف السفلي لجسم القص من المفصل الضلعي الخنجري الى ما يقابل رأس القلب. وجهه المقدم محدب متجه الى الاعلى والمقدم ومكون من البطين اليمين وبعض الايسر. وجهه الخلفي مسطح مستقر على الحجاب. حافته اليمنى

في الصدر

الصدر تجويف مخروطي الشكل محاط بجدران عظيمة ترتبط بالقسم المتوسط وهو الظهري للعمود الفقري. وهو ضيق في الأعلى عريض في الأسفل مسطح من الأمام والخلف حدوده: من المقدم القص والغضاريف الضلعية الستة العليا والأضلاع والعضلات بين الأضلاع. ومن الجانبين الأضلاع والعضلات بين الأضلاع. ومن الخلف الأضلاع وعضلاتها والقسم الظهري للعمود. فتحة العليا يحدها من الجانبين الضلع الأول ومن المقدم الحافة العليا للقص ومن الخلف الفقرات الأولى الظهرية. وهي اعرض من الجانب إلى الجانب مما هي من الأمام إلى الخلف. فتحة السفلى وهي قاعدة المخروط يحدها من الأمام الغضروف الخنجري ومن الخلف الفقرات الظهرية الأخيرة وإلى كل من الجانبين الضلع الأخير ويشغل الخلاء الواقع بينها الحجاب الحاجز. اتجاهها منحرف إلى الأسفل وعلى ذلك يكون التجويف الصدري أكثر غوراً في الجدار الخلفي مما هو في الجدار المقدم. قطرها المستعرض أطول من قطرها الأمامي الخلفي وأما الأجزاء التي تمر من الفتحة العليا للصدر فهي من المقدم إلى المؤخر العضلة القصية اللامية والقصية الدرقية وبقايا الغدة التيموسية والقصبة المريء والقناة الصدرية والعضلتان العنقيتان الطويلتان. ومن الجانبين الشريان اللاسمة والسباتي الأيسر وتحت الترقوة الأيسر والثديان الباطنان والعلويان بين الأضلاع والوريدان اللاسمة لها الأيمن والأيسر والشريانان الدرقبان السفليان والعصبان الرئويان المعدبان والسيهباتويان والحجابيان والأعصاب القلبية والخنجري الراجع الأيسر. ويبرز أيضاً من الفتحة المذكورة رأس كل من الرئتين مغطى بالبليورا أعلى حافة الضلع الأول بقليل. والاحشاء الواقعة ضمن الصدر أولاً العضو العظيم المركزي للدورة أي القلب محاطاً بالتامور وثانياً عضو التنفس وهو الرئتان اللتان تغلفهما البليورتان

التامور


التامور كيس غشائي مخروطي الشكل محيط بالقلب وبداية الأوعية العظيمة. وضعه وراء القص وغضاريف الضلع الرابع والخامس والسادس والسابع في الخلاء الواقع بين البليورتين اليمنى واليسرى. رأسه متجه إلى الأعلى ومحيط بالأوعية العظيمة إلى مسافة قيراطين من منشأها من

تاليها من محفظة غشائية ممتدة من الشرايين التي تتعلق بها الاجسام ويحيط بالمحفظة المذكورة صغيرة شعرية دقيقة تنتهي بها الشرايين وتبدأ منها الاوردة الطحالية. ويظهر ان الحويصلات المذكورة تفرز من الدم الشرياني مادة البومينية تحملها الاوردة الى المجرى الدوري فتكون كبيرة بعد انتهاء الهضم في الحيوانات التي تنال مقداراً كبيراً من الطعام ولا سيما اذا كان الطعام البومينياً وغير موجودة في الحيوانات المهزولة من قلة الطعام. وهي اصغر في الانسان منها في اكثر الحيوانات ذوات الثدي. واكثر ظهورها في الانسان مدة الادوار الأولى للحياة


والشريان الطحالي كبير جداً بالنسبة الى حجم الطحال كثير التعرج في سيره وينقسم الى فروع من اربعة الى ستة تدخل الفرجة وتفرع في جوهره مغلقة باغداد ناشئة من انعكاس الطبقة الليفية الى الباطن وتحيط بالاعصاب والاوردة ايضاً. والفروع المذكورة تدخل الفرجة وتسير عرضاً نحو ظاهر الطحال فتُرسل فروعاً بعضها الى جزئه المقدم وبعضها الى المؤخر وتنتهي بالاوعية الشعرية الملامسة للمادة اللبية وقلماً تنقسم الفروع بعضها ببعض. والشبكة الشعرية تتحرق المادة اللبية من كل جهة وتنتهي رأساً في الاوردة او في خلايا تنشأ منها الاوردة. والاوردة كبيرة جداً بالنسبة الى حجم الطحال وهي اكبر واكثر عدداً من الشرايين. وتنشأ امان الشبكة الشعرية او من خلايا مستطرفة بعضها الى بعض او من اجربة مستقلة ثم تتحد فتكون من اربعة الى ستة فروع تخرج من الفرجة فاذا اتحدت كوَّنت الوريد الطحالي وهو اعظم فروع الوريد الباني. والاوعية الليمفاوية تسير الى الغدد الليمفاوية التي في الفرجة وتنتهي في القناة الصدرية. والاعصاب ناشئة من فروع العقدتين الهلالتين ومن العصب الرئوي المعدي

وتذهب من الاعتماد المذكورة ومن الوجه الباطن للغلاف الليفي زوائد تتحد وتكون النسيج الخلوي الخاص بالطحال وجميع ما ذكر من الابنية الخاصة بالغلاف الليفي مكونة من الياف بعضها ابيض واكثرها اصفر يتوقف على لدونها تعاضل هذا العضو وعوده الى حجمه الاصلي تبعاً للظروف التي سبق الكلام عليها. واما الجواهر الخاص بالطحال فيشغل الخلايا الواقعة في النسيج الخلوي وهو كتلة رخوة القوام لينة لونها اسمر يميل الى الحمرة الداكنة مؤلفة من مواد بعضها ملون وبعضها غير ملون. فالمواد الملونة مؤلفة من كريات دموية حمراء سائبة او محاطة بجدار خاص بها وقد تكون الكريات المذكورة على شكل الكريات الدموية المعهودة وقد تكون متغيرة الشكل واللون. ويوجد ما عداها بلورات مختلفة اللون شبيهة التركيب بالهيماتين الدموي. والمواد الغير الملونة مؤلفة من جوهر حي ونوى وحوصلات نووية وهي كثيرة الوجود في الحيوانات السمينة قليلة او مفقودة في المهزولة من الجوع وتركيبها الكيماوي شبيه بالتركيب البروتينية وهي الالبومينية واما اجسام مليفيموس ويقال لها الاجسام الطحالية ايضاً فصغيرة هلامية القوام نصف مظلمة

شكل ٢٠٥



شكل ٢٠٦



منتشرة في جوهر الطحال. وهي كروية او بيضية الشكل منضمة الى اغداد الشرايين الصغيرة وقرورها.

شكل ٢٠٥ فريعات من الشريان الطحالي وكيفية اتصال اجسام مليفيموس بها. والرسم مأخوذ من طحال كلب
شكل ٢٠٦ جسم من اجسام مليفيموس الطحالية والرسم مأخوذ من طحال نور " الغلاف الظاهر لليسم وهو يحفظها الغشائية
b المادة المحببة التي يتضمنها c قطعة شريان صغير d غمد الشريان الممتد من الغلاف الليفي للطحال. ويشاهد ان الجسم
الطحالي متصل بالغمد المذكور اتصالاً شديداً

الطحال (شكل ١٧٥)

الطحال من الغدد اللااقنية لها كالدرقية واعلى الكلية والتمهوسية لان ليس له قناة ناقلة . وهو مستطيل الشكل مسطح قصبم جداً كثير الاوعية لونه احمر اكن يميل الى الزرقة . وضعه في المراق الايسر معانق للطرف القلي للمعدة . وهو مغلف بالبريتون ومرتبط بالمعدة بواسطة الثرب المعدي الطحالي

وجهه الوحشي محدب املس مجاور للوجه السفلي للحجاب الذي يفصله عن الضلع التاسع والعاشر والحادي عشر من اليسار . وجهه الانسي مقعر قليلاً تقسمه فرجة عمودية الى قسمين مقدم وهو الاكبر وموخر وهو الاصغر والفرجة المذكورة مثقوبة بمهملة ثقوب لمرور الاوعية والاعصاب وتنعكس من حافتيها طبقتا البريتون على الطرف القلي للمعدة فيتكوّن من ذلك الثرب المعدي الطحالي الذي يتضمن الاوعية والاعصاب الطحالية والاوعية القصيرة وهي المعديّة . وهذا الوجه مجاور من المقدم للطرف العظيم للمعدة ومن الاسفل لذنب البنكرياس ومن الخلف للساق اليسرى للحجاب والمحفظة اعلى الكلية . طرفه العلوي غليظ مستدير مجاور للحجاب ومرتبط به بواسطة ثنية من البريتون هي الرباط المعلق . طرفه السفلي مستدق مجاور للطرف الايسر للقولون المستعرض . حافته المقدمه سائبة مستديرة وكثيراً ما تكون مشرومة ولا سيما من الاسفل . حافته الخلفية مستديرة مجاورة للكلية اليسرى وترتبط بها بواسطة نسج خلوي رخو . وللطحال رباطان من البريتون احدهما الثرب المعدي الطحالي الذي يربطه بالمعدة والاخر الرباط المعلق الذي يربطه بالوجه السفلي للحجاب واما حجم الطحال ووزنه فيختلفان كثيراً بحسب اختلاف السن والاشخاص واختلاف الظروف في الشخص الواحد . فانه يبلغ اشده في البالغين فيكون طوله حينئذ نحو خمسة قراريط وعرضه من ثلاثة الى اربعة وغلظه من قيراط الى قيراط ونصف ووزنه نحو سبع اواق . ونسبته لجميع الجسد عند الولادة كنسبته في البالغ فهو كواحد الى ٢٥٠ . واما في الشيخوخة فيصغر حجمه جداً بحيث تصير نسبته الى جميع الجسد كنسبة واحد الى ٧٠٠ ويعظم حجمه مدة الهضم وبعده ويتعاطم جداً في الحميات المنقطعة وغيرها الى انه قد يبلغ وزنه عشرين رطلاً

في بناء الطحال . للطحال غلافان احدهما ظاهر مصلي ناشيء من البريتون ملتصق بالتصاقاً شديداً بالطبقة الليفيه التي دونه وهو محيط بجميع الطحال تقريباً وينعكس منه عند الفرجة على الطرف العظيم للمعدة وعند طرفه العلوي على الحجاب . والثاني الغلاف الليفي اللدن الذي يحيط اولاً بجميع ظاهر الطحال ثم ينعكس عند الفرجة الى الباطن على الاوعية فيكوّن اغماداً لها .

ست اواق

طرفه الايمن وهو الرأس منحني على نفسه من الاعلى الى الاسفل يعانقه نقيع الاثني عشري وتنزل ما بينهما القناة الصفراوية المشتركة الى الخلف والشريان البنكرياسي الاثنا عشري الى المقدم. على وجهه الخلفي قسم من الغدة يسير عرضاً الى اليسار وراء الاوعية الماسارية العليا وقد يكون منفصلاً عن الغدة فيقال له البنكرياس الصغير. وطفه الايسر وهو الاصغر ويقال له الذنب ضيق ممتد الى الطحال موضوع اعلى الكلية اليسرى ومحفظتها. والجسم محدب في المقدم تغطيه الطبقة الصاعدة للرباط القولوني المستعرض والوجه الخلفي للمعدة. وجهه الخلفي مقعر وما بينه وبين الفقرة الاولى القطنية الشريان والوريد الماساريقيان العلويان وبداية الوريد الباطني والاجوف والاورطي والكليية اليسرى ومحفظتها واوعيتها. حافته العليا غليظة يستقر عليها بقرب مركزها المحور البطني وفيها ميزاب او قناة يستقر فيها الشريان والوريد الطحاليان. حافته السفلى رقيقة يفصلها عن الجزء المستعرض للاثني عشري الشريان والوريد الماساريقيان العلويان

والقناة البنكرياسية ممتدة عرضاً من اليسار الى اليمين في جوهر البنكرياس وهي اقرب الى الحافة السفلى من العليا والى الوجه المقدم من الخلفي. ولاجل اظهارها ينبغي قطع الجزء السطحي للغدة. تبدأ بفتحة مشتركة بينها وبين القناة الصفراوية المشتركة على قمة حلقة مرتفعة واقعة في الجانب الانسي للجزء النازل للاثني عشري اسفل منتصفه بقليل وتمر بانحراف مع القناة المذكورة بين الطبقة المخاطية والطبقة العضلية ثم تنفصل عنها وتبعد قليلاً وتسير من اليمين الى اليسار في جوهر البنكرياس. وتستطرق اليها مدة سيرها قنيات كثيرة آتية من فصيصات الغدة. وقد تصب القناتان اي الصفراوية والبنكرياسية الى المعما بفتحين لا بفتحة مشتركة. واما قناة البنكرياس الصغير فتصب في القناة البنكرياسية بقرب الاثني عشري وقد تصب اليه راساً. ثم ان القناة البنكرياسية قدرها عند مصيها كقلم الكتابة وهي رقيقة مؤلفة من طبقة ليفية ظاهرة وطبقة مخاطية باطنة. وقد تكون مزدوجة الى مدخلها الى الاثني عشري

بناء البنكرياس شبيه جداً ببناء الغدد اللعابية وافرازه كافرازها في الماهية والتركيب والعمل شرايينه ناشئة من الطحالي والفرع البنكرياسي الاثني عشري للكبد والماساريقي العلوي. واورده تصب في الطحالي والماساريقي العلوي. واوعيته الليمفاوية تنتهي في الغدد القطنية واعصابه خيوط من الضفيرة الطحالية

والقنوات الصفراوية ثلاث الكبدية والحوصلية والمشاركة
 فالقناة الكبدية مكوّنة من جذعين خارجين من الكبد احدهما من الفص الايمن والاخر من
 الايسر يتحدان في الفرجة المستعرضة ثم تسير القناة المكوّنة من اتحادهما الى الاسفل واليمين
 مسافة قيراط ونصف وتحد بالقناة الحوصلية على زاوية حادة فتكوّن معها القناة المشتركة
 والقناة الحوصلية اصغر القنوات الثلاث طولها نحو قيراط . تبدأ من عنق الحوصلة وتسير
 منحرفة الى الاسفل واليسار وتحد بالقناة الكبدية . وهي واقعة ضمن الثرب المعدي الكبدي الى
 مقدم الوريد الباي والشريان الحوصلي الى جانبها الايسر . والغشاء المخاطي المبطن لها مجمّد على
 هيئة ثنيات هلالية عددها من خمس الى عشرين كأنها صمام لولبي فاذا تمددت القناة تمددت
 الاخلية الواقعة بين الثنيات وصارت معقّدة الشكل من الظاهر كمنظر القولون
 والقناة المشتركة الصفراوية اكبر القنوات الثلاث وهي القناة الناقلة للصفرا من الكبد والحوصلة .
 طولها نحو ثلاثة قيراط وقطرها كقطر قلم الكتابة ومكوّنة من اتحاد القناة الكبدية بالقناة
 الحوصلية . تسير بجانب الحافة اليمنى للثرب الصغير وراء الجزء الاول للاثني عشري الى مقدم
 الوريد الباي والى يمين الشريان الكبدي ثم تمرّ بين البنكرياس والجزء النازل للاثني عشري
 وتصاحب القناة البنكرياسية من اليمين مسافة قصيرة . ثم تثقبان الاثني عشري وتسيران قليلاً
 بين طبقتيه العضلية والمخاطية وتنفذان الى باطنه بفتحة واحدة واقعة في جانبه الانسي اسفل
 منتصف جزئه النازل بقليل . واما بناء القنوات الصفراوية فمن طبقة ظاهرة ليفية وطبقة باطنة
 مخاطية ممتدة من الغشاء المخاطي المبطن للقنوات الكبدية والحوصلة والاثني عشري وفيها غدد
 كثيرة

البنكرياس (شكر ١٥٧)

اذا قُصِدَ اظهر البنكرياس في التشریح العملي لاجل الوقوف على وضعه ومجاوراته يُرْفَع الكبد
 وتُخْفَضُ المعدة ثم يُهزَّق الثرب المعدي الكبدي فيظهر . وهو غدة مؤلفة من فصيصات شبيهة
 البناء بالغدد اللعابية . شكله مستطيل عرضي الوضع مسطح من الامام الى الخلف وفيه بعض
 مشابهة للمطرقة فان طرفه الايمن عريض منحني الى الاسفل يقال له الراس . طرفه الايسر
 مستدق يقال له الذنب . والجزء المتوسط بينهما هو الجسم . وضعة مقاطع للجدار الخلفي للبطن
 خلف القسم الشراسيفي والمراقين . طوله من ستة الى ثمانية قيراط وعرضه نحو قيراط ونصف
 وسماكته من نصف قيراط الى قيراط . وزنه من اوقيتين الى ثلاث اواق ونصف وقد يبلغ

الفصيصات واليها. ويذهب غيرها الى جدران الوريد الباي والقناة الكبدية والاوردة الكبدية تبدأ في باطن الفصيصات على هيئة ضفائر دقيقة تجتمع فتكوّن الوريد المركزي. وهذا الوريد يمتد في مركز الفصيص وينفذ من قاعدته فاذا اتحد بمثلها تكونت اخيراً منها اوردة عظيمة تصب في الوريد الاجوف السفلي ويظهر ان فائدة الدم الشرياني لاجل تغذية جدران الاوعية الكبيرة والقنوات والغلافات المحيطة بالكبد. وفائدة الدم الباي لاجل افراز الصفرا منه بواسطة الكريات الفصيصية. وفائدة الاوردة الكبدية ان تعود بالدم الى الاجوف

الحوصلة المرارية


الحوصلة المرارية حاصل للصفرا. وهي كيس مخروطي الشكل مستقر في حفرة على الوجه السفلي للفص الايمن الكبدية ويمتد من قرب الطرف الايمن للفرجة المستعرضة الى الحافة المقدمية السائبة للكبد. طولها نحو اربعة قراريط وعرضها عند قاعدتها نحو قيراط وتسع من ثمانية الى عشرة دراهم. تقسم الى قاع وجسم وعنق. فالقاع هو الطرف المتسع يتجه الى الاسفل والمقدم واليمين وقد يتجاوز الحافة المقدمية للكبد. والجسم والعنق متجهان الى الاعلى والخلف واليسار. وتثبتت الحوصلة في مكانها بواسطة ثنية من البريتون وترتبط بالكبد ايضاً. مجاورة الجسم من وجهه العلوي للكبد ويرتبط به بواسطة نسج خلوي واوعية ومن وجهه السفلي للجزء الصاعد من الاثني عشري. والقاع محاط بالبريتون ويجاور من المقدم الجدران البطنية اسفل الغضروف العاشر الضلعي ومن الخلف القولون المستعرض. والعنق ضيق مخنن على نفسه ومخنن عند اتصاله بالجسم والقناة الحوصلية

بناء الحوصلة من ثلاث طبقات مصلية وليفية عضلية ومخاطية. فالطبقة المصلية ناشئة من البريتون ومحيطه بجميع القاع ولكنها لا تغطي من الجسم والعنق الا الوجه السفلي. والليفية العضلية طبقة ليفية رقيقة متينة مكونة من الياف متصالية الوضع تخالطها الياف عضلية غير مخططة بعضها طولي الوضع وبعضها عرضي. والمخاطية وهي الباطنة ملتصقة بالطبقة الليفية التصاقاً رخوياً وتبرز الى الباطن عند عنق الحوصلة فتكوّن ثنية صمامية كبيرة. وهي مبطنه بكريات عمودية تفرز مخاطاً لزجاً وتخلط بالغشاء المخاطي المبطن للقنوات الكبدية بواسطة القناة الكبدية وبالغشاء المخاطي المبطن للقناة الغذائية بواسطة القناة الصفراوية المشتركة

بعضها على بعض. قطر الواحدة منها من $\frac{1}{10}$ الى $\frac{1}{20}$ جزء من الفيراط ولها نوى في باطنها وتضمن الدقائق الملونة للصفراء ودقائق زيتية. ويظن ان هذه الكريات هي العامل الرئيسي في افراز الصفراء. والفنيات الصفراوية لم يُعلم الى الآن كيف تنشأ وإنما الذي عُلِمَ هو انها تكوّن اولاً ضفائر حول الفصيصات تنشأ منها فنيات ثم تسير الفنيات في جوهر الكبد وتجد بعضها ببعض الى ان تخرج من الفرجة المستعرضة على هيئة جذعين عظيمين ايمن وايسر اذا اتحدا تكوّنت منهما القناة الكبدية

والوريد الباي عند دخوله الكبد من الفرجة المستعرضة ينقسم الى فروع اولية تسير في القنوات البابية مصاحبة لفروع الشريان الكبدي والقناة الكبدية والاعصاب والوعية الليمفاوية. والوعية المذكورة تنفصل عن جدران القنوات بواسطة نسج خلوي هو محفظة كليسون. وترسل الفروع البابية فروعاً تكوّن اولاً ضفائر في محفظة كليسون ثم ضفائر ثانوية تحيط بمجموع ظاهر الفصيصات الاقواعدها ثم ضفائر ثالثة في باطن الفصيصات مستطرفة الى الوريد المركزي الذي هو فرع اولي من الاوردة الكبدية والشريان الكبدي يدخل الكبد من الفرجة المستعرضة مع الوريد الباي والقناة الكبدية

شكل ٢٠٣




شكل ٢٠٤

ويتفرع معها في القنوات البابية ثم تذهب منه فروعاً تتوزع اولاً في محفظة كليسون ثم بين


شكل ٢٠٣ فروع الوريد الباي والاوردة الكبدية وهي داخل الفصيصات وخارجها ٢ و٢ فروع من الوريد الباي بين الفصيصات تكوّن منها ضفائر داخل الفصيصات مستطرفة بين الفروع البابية (٢ و٢) والوريد المركزي لكل فصيص وهو الفرع الابتدائي للاوردة الكبدية.

شكل ٢٠٤ قطع عرضي لفصيصين سطحيين يظهر ضفائر القنوات الصفراوية التي داخل الفصيصات او اوريدان مركزيان داخل الفصيصات ٢ و٢ اجزاء قنوات صفراوية ٢ نسج بين الفصيصات ٤ و٤ بارنكيما الفصيصات اي النسج الخاص بها.

فريع يخرج من مركز الفصيص. تاليف الفصيص من كريات وظيفية من القنيات الصفراوية وظيفية وريدية مكونة من فريعات الوريد البالي وفريع من وريد كبدي وشرابين دقيقة وربما اعصاب واوعية لمفاوية. فالكريات الكبدية تكون معظم الجوهر الفصيصي وهي واقعة بين تفاريع الوريد الشبكية. وفريعات الوريد البالي تسير بين الفصوص فتكون حولها ضفائر وترسل منها فروعا الى باطن الفصيصات. وتنفم فريعات الوريد البالي بفريعات الوريد الكبدية المشاغلة لمركز الفصيص التي يتكون منها وريد يخرج من قاعدة الفصيص ويصب في الوريد الكبدي. فالوريد البالي يحمل الدم الى الكبد فتفرز منه الصفرا بواسطة الكريات الكبدية.



والوريد الكبدي يحمل من الكبد ما بقي من الدم بعد الافراز. والقناة الصفراوية تحمل الصفرا المفرزة بواسطة الكريات الكبدية الى القناة الكبدية. والكريات المذكورة هي الجزء الجوهري



من الفصيص وتغارب الشكل الكروي الا انها قد تكون مسطحة او كثيرة الجوانب من ضغط


شکل ٢٠١ كريات كبدية " كريات اعنادية b كريات فيها دقائق ملونة c كريات فيها دقائق زيتية
شکل ٢٠٢ وضع الكريات الكبدية علي هيئة شبكة ومنشا القنات الصفراوية " و a فانان كبدينان مكونتان من كريات
لاغشاء اساسي لها b و b كريات كبدية c و c خلايا مشغولة بصفائر وعائية

الكبد ونسيرا الى الشرم الغائر الواقع في حافته الخلفية وتنتهي بفرعين كبيرين وفروع كثيرة صغيرة صابة في الوريد الاجوف السفلي . وليس للاوردة المذكورة غلاف خلوي وانما تلتصق جدرانها بجدران القنوات التي تسير فيها فتتميز عن فروع الوريد البايي بانه اذا قُطع الكبد بقيت مفتوحة خلافا للفروع البايية فانها تنهبط ويشاهد انها اي الفروع البايية مصحوبة بشريان وقناة . والوعية الليمفاوية كبيرة وكثيرة وقد مرَّ الكلام عليها . واما اعصاب الكبد فنشئة من الضفيرة الكبدية للسيمباتوي ومن العصيين الرئويين المعديين ولا سيما الايسر ومن العصب


المحجبي اليمين

في بناء الكبد . جوهر الكبد مؤلف من فصيصات متضمة بعضها الى بعض بواسطة نسيج خلوي في غاية ما يكون من الرقة ومن تفرعات الوريد البايي والقناة الكبدية والشريان الكبدي والاوردة الكبدية والوعية الليمفاوية والاعصاب . وتحيط بجميع ذلك طبقتان غلافتان احدهما ليفية والآخرى مصلية . فالطبقة المصلية ناشئة من البريتون ومحيطة بجميع سطح الكبد الا عند اندغام الاربطة وارض الفرجات . وهي ملتصقة التصاقاً شديداً بالطبقة اللينية . والطبقة اللينية واقعة تحت الغلاف المصلي وتغطي جميع سطح الكبد . وهي ممتدة من مخنطة كليسون في الفرجة المستعرضة ومن النسيج الخلوي الفاصل بين الفصيصات في سطح الكبد . وهي عسرة الاظهار الا في الاجزاء العارية من الغلاف المصلي واما الفصيصات فمنها يتكون معظم الجوهر الكبدي وتشاهد اما على ظاهر الكبد او في باطنه

شكل ٢٠٠




شكل ٢٩٩



اذا قُطع . وهي اجسام صغيرة قدر الواحد منها كحبة الدخن وقطره من نصف خط الى خط . وقواعد الفصيصات المذكورة مجتمعة حول الفروع الانتهائية للاوردة الكبدية وملتصقة بها بواسطة

شكل ٢٩٩ فصيصات الكبد كما تشاهد على سطح الكبد او اذا قطعت عرضاً ١ الوريد الذي يشغل مركز الفصيص ٢ فرجة بين فصيصين ٣ خلايا بين الفصيصات
شكل ٢٠٠ قطع طولي لفصيصين ١ فصيص سطحي متد كما انه منقطع ٢ فصيص غائر ويشاهد شكله الوري ٣ الوريد المركزي ٤ السطح المنحني للفصيص

يتمد الى الحافة العليا للطحال .وجهه العلوي محدب ووجهه السفلي مقعر مستقر على مقدم المعدة .



شكل ٢٩٨

حافته الخلفية مجاورة للفتحة القلبية للمعدة

والفص المربع واقع على الوجه السفلي للفص الايمن تحدهُ من المقدم الحافة السائبة للكبد ومن الخلف الفرجة المستعرضة ومن اليمين فرجة الحوصلة ومن اليسار الفرجة السرية وفص سيجيوليوس بارز من موخر الوجه السفلي للفص الايمن .تحدهُ من المقدم الفرجة المستعرضة ومن اليمين فرجة الاجوف ومن اليسار فرجة القناة الوريدية والفص الذني ارتفاع صغير من الجوه الكبدى ممتد بانحراف الى الوحشية من قاعدة فص سيجيوليوس الى الوجه السفلي للفص الايمن .وهو فاصل بين الطرف الايمن للفرجة المستعرضة وبداية فرجة الاجوف

في اوعية الكبد .الوعية التي تتعلق بالكبد خمسة ايضاً وهي الشريان الكبدى والوريد الباي والوريد الكبدى والقناة الكبدية والوعية الليمفاوية . فالشريان الكبدى والوريد الباي والقناة الكبدية مصحوبة باوعية ليمفاوية واعصاب وتصدع الى الفرجة المستعرضة بين طبقتي الثرب المعدي الكبدى فتكون القناة الكبدية الى اليمين والشريان الكبدى الى اليسار والوريد الباي خلفها وهي محاطة بنسيج خلوي رخو هو محفظة كليسون . والاوردة الكبدية تبدأ عند محيط

شكل ٢٩٨ الوجه السفلي للكبد ١ الفص الايمن ٢ الفص الايسر ٣ الفص المربع ٤ فص سيجيوليوس ٥ الفص الذني ٦ الفرجة الطولية والرقم موضوع على المحل المستدير وهو بقية الوريد السري ٧ الجسر الكبدى وهو عبارة عن استطراق بين الفص الايسر والفص المربع ٨ فرجة القناة الوريدية يشاهد فيها جبل ليني هو اثر القناة المذكورة في الجنين متمماً الى الوراثة ليرتبط بجدران الاجوف السفلي (٩) ١٠ الحوصلة المرارية المستقرة في فرجتها ١١ الفرجة المستعرضة التي تتضمن من الامام الى الخلف القناة الكبدية والشريان الكبدى والوريد الباي ١٢ الاجوف السفلي ١٣ انخفاض لقبول التعرج الكبدى لتقولون ١٤ انخفاض لقبول الكلية اليمنى والحفظة التي اعلاها ١٥ سطح خشن على الحافة الخلفية للكبد لا يغطيه البريتون . وما يحيط بالخلاص المذكور بعض الرباط الاكليلي ١٦ شرم في الحافة المقدمة يفصل بين الفصين ١٧ شرم في الحافة الخلفية يجاور العمود الفقري

فالفرجة الطولية ميزاب غائر متمد من الشرم الواقع في الحافة المقدمة للكبد الى حافته الخلفية وفاصل بين الفص الايمن والفص الايسر. وتحدد به الفرجة المستعرضة على زاوية قائمة فتقسمه الى قسمين. فالنصف المقدم ويقال له الفرجة السرية اكثر غوراً من القسم الخلفي يستقر فيه الوريد السري في الجنين وحبله اللين وهو الرباط المستدير بعد الولادة. وفرجة القناة الوريدية هي الجزء الخلفي للفرجة الطولية تستقر فيها القناة الوريدية في الجنين وحبله اللين دقيقتي بعد الولادة هو اثر الوعاء المذكور

والفرجة المستعرضة ويقال لها البابية ايضاً فرجة قصيرة غائرة طولها نحو قيراطين ممتدة عرضاً مقاطعة للوجه السفلي للفص الايمن وتحدد بالفرجة الطولية على زاوية تقرب من القائمة. وكان المشرحون القدماء يعتبرون هذه الفرجة باباً للكبد ولذلك سمو الوريد العظيم الذي يدخل الكبد منها الوريد البابي. وما عدا هذا الوريد يمر من الفرجة المذكورة الشريان الكبدي والاعصاب الكبدية والقناة الكبدية والاعوية الليمفاوية وذلك على شكل ان القناة الكبدية الى المقدم والوريد البابي الى الخلف والشريان الكبدي بينهما

وفرجة الحوصلة المرارية حفرة قليلة الغور موضوعة على الوجه السفلي للفص الايمن على خط مواز للفرجة الطولية ممتدة من الحافة المقدمة السائبة للكبد الى قرب الطرف الايمن للفرجة المستعرضة

وفرجة الاجوف قصيرة غائرة وقد تكون قناة ممتدة الى الاعلى بانحراف من وراء الطرف الايمن للفرجة المستعرضة الى الحافة الخلفية للكبد حيث تتحد بفرجة القناة الوريدية. وهذه الفرجة منفصلة عن الفرجة المستعرضة بالفص الذنبي وعن الطولية بفص سيجيليموس

في فصوص الكبد. فصوص الكبد كعدد الارباطة والفرجات فهي خمسة الفص الايمن والفص الايسر والفص المربع وفص سيجيليموس والفص الذنبي

فالفص الايمن اكبر جداً من الايسر ونسبته اليه كنسبة ستة الى واحد. يشغل المراق الايمن وينفصل عن الفص الايسر على وجهه العلوي بالرباط الطولي وعلى وجهه السفلي بالفرجة الطولية والى المقدم بشرم غائر. شكله مربع الجوانب وعلى وجهه السفلي ثلاث فرجات وهي الفرجة المستعرضة وفرجة الحوصلة المرارية وفرجة الاجوف السفلي وانخفاضان احدهما الى المقدم لاجل التعرّيج الكبدي للفولون والثاني الى الخلف للكليّة اليمنى والمخنطة التي اعلاها

والفص الايسر اصغر من الايمن واكثر تسطحاً وضعة في القسم الشراسيفي والمراق الايسر وقد

رقيق مسطح

ولما كانت معرفة حجم الكبد لازمة للطبيب وجب عليه ان يعرف الظروف التي تؤثر في وضعه الطبيعي. فانه في حالتها الانتصاب والجلوس يُشعر بحافته السفلى وهي المقدمة اسفل الاضلاع وفي حالة الاستلقاء تنهقر الى ما وراء الاضلاع. وفي مدة الشهيق الطويل يتجاوز الاضلاع الى الاسفل ومدة الزفير يعود الى وضعه الاصلي. واذا كانت المعدة والامعاء ممتدة اندفع الى الاعلى واذا كانت فارغة انحدر الى الاسفل

في اربطة الكبد. اربطة الكبد خمسة اربعة منها مكوّنة من ثنيات بريتونية والخامس وهو الرباط المستدير حبل مستدير ليفي حاصل من جفاف الوريد السري. والاربطة المذكورة هي الطولي والجانبين والاكليبي والمستدير

فالرباط الطولي ويقال له العريض والمعلق ايضاً ثنية بريتونية عريضة رقيقة شكلها كالمخجل قاعدتها الى المقدم ورأسها الى الخلف ومتصلة من حافتها الواحدة بالوجه السفلي للحجاب والوجه الخلفي لغمد العضلة المستقيمة اليمنى حتى السرة من الاسفل. واما حافتها الكبدية فتمتد من الشرم الذي على الحافة المقدمة للكبد الى حافته الخلفية. وحافتها المقدمة السائبة تتضمن بين طبقتيها الرباط المستدير

والرباطان الجانبان ايمن وايسر. كل واحد منهما مثلث الشكل مؤلف من طبقتين ملتصقتين من البريتون ويمتد من جانب الحجاب الى الحافة الخلفية للكبد المجاورة له. الايسر اطولها موضوع الى مقدم الفتحة المرئية التي في الحجاب. والايمن موضوع الى مقدم الاجوف السفلي والرباط الاكليبي يربط الحافة الخلفية للكبد بالحجاب وهو انعكاس من البريتون المغطي للحجاب على الحافة الخلفية للكبد على شكل طبقتين مختلطتين من الجانبين بالرباطين الجانبين ومن المقدم بالرباط الطولي. وبين الطبقتين خلاء يبضي الشكل غير مشغول بالبريتون يقسمه عند طرفه الايسر شرم غائر يستقر فيه الاجوف السفلي حيث نصب فيه الاوردة الكبدية

والرباط المستدير حبل ليفي ناشئ من جفاف الوريد السري يصعد من السرة في الحافة المقدمة السائبة للرباط الطولي الى الشرم الواقع في الحافة المقدمة للكبد ويسير في الفرجة الطولية على الوجه السفلي للكبد حتى الاجوف

في فرجات الكبد. يشاهد على الوجه السفلي للكبد خمس فرجات تقسمه الى خمسة فصوص وهي الفرجة الطولية وفرجة الثناة الوريدية والفرجة المستعرضة وفرجة الحوصلة المرارية وفرجة الاجوف


الوجه السائب للكريات الكروية . والاهداب المذكورة دائمة العمل بحيث يتسبب عن ذلك حركة موجية الشكل تقذف الافرازات من القناة التي توجد فيها الى الخارج . وهي موجودة في الانف وكهف هيبور والقناة الانفية وقناة ارسناكيوس والقسم العلوي من البلعوم والحجرة والقصبة والشعب والرحم وقناة فلوبيوس والاعشبة المصلية لبطينات الدماغ

وبناء على ما تقدم تكون الكريات قشرية في الفم والقسم السفلي من البلعوم والمريء وعمودية في المعدة والامعاء والغدد المخاطية . وهي عمودية وهديية في القسم العلوي للبلعوم الذي يتعلق بالجهاز التنفسي ورقيفة في الفم حيث تتصل بالبشرة عند الحافة الظاهرة للشفتين وغليظة في المريء حيث تنتهي بحافة مسننة عند الفتحة القلبية المعدة ثم يصير الابطيليوم اسفل الحافة المذكورة رقيقاً شفافاً

الكبد

الكبد غدة عظيمة الحجم معظم فائدتها افراز الصفراء ولها فوائد اخرى في تغيير بعض الاجزاء الدموية التي تمر منها . وضعه في المراق الايمن ويمتد الى الايسر مقاطعاً للقسم الشراسيفي . وهو اعظم غدة في الجسد ووزنه من ثلاثة الى اربعة ارطال . طول قطره المستعرض من عشرة قراريط الى اثني عشر وقطره الامامي الخلفي من ستة الى سبعة قراريط وسهاكة الجزء الخلفي للفص الايمن نحو

شكل ٢٩٧



ثلاثة قراريط وهو اسمها . وجهه العلوي

محدب متجه الى الاعلى والمقدم مغطى

بالبريتون ومجاور للحجاب الاجزاء السفلي

منه فانه يجاوز الجدران البطنية . والوجه

المذكور منقسم الى فصين غير متساويين

ايمن وايسر بواسطة ثنية من البريتون هي

الرباط المعلق او العريض . وجهه السفلي

مقعرجة الى الاسفل والخلف ومجاور المعدة والاثني عشري والتعريج الكبدي للقولون والكليية اليمنى ومخلفتها . وهذا الوجه تقسمه فرجة الى فص ايمن وفص ايسر . حافته الخلفية مستديرة ومتصلة بالحجاب بواسطة الرباط الاكليلي وهي مجاورة للاورطي الاجوف وساقى الحجاب . وحافته المقدمة رقيقة عليها شرم غائر حذاء ارتباط الرباط العريض والحافة المذكورة مقابلة لحافة الاضلاع في الذكور البالغين وتجاوزها في الاناث والاطفال غالباً . طرفه الايمن غليظ مستدير وطرفه الايسر

شكل ٢٩٧ الوجه العلوي للكبد ١ الفص الايمن ٢ الفص الايسر ٣ حافة المقدمة الرقيقة . ويشاهد الى يمين الرقم مجاوزة فعرا الحوصلة المرارية للحافة المذكورة ٤ الحافة الخلفية المستديرة ٥ الرباط العريض وهو المعلق ٦ الرباط المستدير ٧ و٧ الرابطان الجانبيان ٨ الخلاء الذي لا يغطيه البريتون ويحيط به الرباط الاكليلي ٩ الوريد الاجوف السفلي ١٠ طرف فص سيبيلوس .

بعض على ادوارها المتناعبة من جهة تكويتها ونموها وجفافها وسقوطها
وتختلف كريات الايثيريوم في الشكل والوضع وذلك قسموها الى اربعة انواع وهي الفشري والعمودي
والكروي والهدبي

فالكريات الفشرية سميت بذلك لان السطحية منها تجف فتتقلص الى فلوس رقيقة مسطحة كثيرة الجوانب
وهي موضوعة في الغشاء المخاطي والمجلد على هيئة طبقات كثيرة بعضها فوق

شكل ٢٩١



بعض وفي الاغشية المضوية على هيئة طبقة واحدة . وتوجد في المنغم والحفرة الانفية
بقرب المختر والفم والحلق والنصف السفلي للبلعوم والمريء والمهبل وعنق الرحم
والصماخ البولي . اكبرها يشاهد في الفم والحلق فيكون قطرها من $\frac{1}{3}$ من القيراط
الى $\frac{1}{2}$ وقطر نواتها $\frac{1}{3}$

والكريات العمودية مستطيلة او مخروطية الشكل قواعدها منبجعة نحو السطح السائب وروءوسها نحو الخوريون
وهي موضوعة بعضها بجانب بعض كالعمد . ولكل كرية منها نواة وفي كل نواة نوية او اكثر ولما كان جدار الكرية
شفافاً شوهدت النواة من قاعدتها . وجود هذه الكريات في المعدة والامعاء والحوصلة المرارية وقنوات الغدد غير
غيران ظهور النوى في كريات الحوصلة المرارية اقل منه في غيرها



شكل ٢٩٤



شكل ٢٩٣




شكل ٢٩٢

والكريات الكروية مستديرة الشكل الا انها من انضغاطها بعضها على بعض تكتسب شكلاً كثيراً الجوانب
وهي شبيهة في ما بني بالكريات الاخر . وجودها في الحال التي تجاور فيها الكريات الفشرية العمودية ولذلك سماها
المعلم هنلي الكريات الانتقالية . وتوجد ايضا في المسالك المبرزة للكليتين والمثانة وقنوات الغدد المستطرفة الى
الغشاء المخاطي والمجلد



شكل ٢٩٦



شكل ٢٩٥

والكريات الهدبية تمتاز بان لها خيوطاً دقيقة هدية منغرسه في الاطراف العريضة للكريات العمودية او على

شكل ٢٩١ كريات فشرية من الفم فالكرية الكبيرة التي الى يسار الشكل منها مكبرة ٢١٠ اضعاف . ويشاهد انها مؤلفة من
نواة وضمتها نوية ومن جسم مكون من كريات ثانوية نوية . والكريات الاخر التي الى يمين الشكل مكبرة ١٥٥ ضعفاً . ويشاهد
فيها جلياً البؤرة والنوية واما الكريات الثانوية فلا يشاهد منها الا حبيبات متفرقة على وجه القشرة
شكل ٢٩٢ كريات عمودية من المعاد الدقيق . وتشاهد فيها نواها ونوياتها
شكل ٢٩٣ منظر سطح الايثيريوم النائي عن مجاورة قواعد الكريات العمودية وروءة النوى من القواعد . واما الاخيلية
الكائنة بين العمد فهشغولة بمادة شفافة هلامية


شكل ٢٩٤ كريات كروية من جدار شعرة . مكبرة ١٥٥ ضعفاً

شكل ٢٩٥ كريات عمودية هدية من الانف . مكبرة ٢١٠ اضعاف

شكل ٢٩٦ منظر سطح الايثيريوم النائي عن مجاورة قواعد الكريات العمودية الهدبية

واما الغشاء المخاطي في الاعور والقولون فلونه سنجابي او اصفر باهت. وهو املس خالٍ من

شكل ٢٨٩



المخل مرتفع على هيئة ثنيات هلالية تقابل الاخلية الواقعة بين الاكياس. وفي المستقيم هو اسنك مما سبق ولونه اشدّ دكناً واوعيته اكثر والتصاقه بالطبقة العضلية رخوكما في المريء وفيه ثلاث ثنيات وقد تكون اربعاً وقد تكون ثنتين فقط. احداها موضوعة بقرب بداية المستقيم الى اليمين والثانية في اليسار حذاء منتصف العجز والثالثة اكبرها تبرز الى الخلف من مقدم المستقيم حذاء

قاعدة المثانة واذا وجدت الرابعة فتكون موضوعة اعلى الاست نحو قيراط في موخر المستقيم. والثنيات المذكورة عرضها نحو نصف قيراط تتضمن بعض الالياف الحلقية ويتراكب بعضها فوق

شكل ٢٩٠



بعض اذا كان المستقيم فارغاً بحيث يصعب دخول الميل اللدن اليه. ويظهر ان فائدتها حمل المواد الثقلية ومنع وصولها الى الاست قبل الزمن الواجب لابرازها

ثم ان الغشاء المخاطي للمعا الغليظ له كريات سطحية واجربة بسيطة وغدد وحيدة. فالكريات السطحية من النوع العمودي. والاجربة البسيطة انعكاسات قنوية دقيقة من الغشاء المخاطي شاغلة لجميع سطح المعاء ومنفتحة اليه بواسطة ثقب دقيقة وهي اكثر عدداً وتقارباً منها في المعاء الدقيق. والغدد الوحيدة كثيرة في الاعور والزائدة الدودية قليلة في ما بقي. وهي اجسام دقيقة بارزة بيضاء اللون مثقوبة في جزءها المركزي نحو باطن المعاء

في الايثيليوم

الايثيليوم في الامعاء منزلة البشرة في الجلد فهو طبقة مبطنه للاغشية المخاطية والمصلية والزلاية ايضاً وواقية لها. وبنواذه كبناء البشرة من كريات دقيقة تولد على سطح الخورجون من الوعية الشعرية ولذلك قد سميناها في ما مضى الكريات السطحية. ولا كان التولد المذكور للكريات دائماً غير منقطع على جميع سطح الجسد كاست الكريات المحدثه تدفع القديمة بحيث تسقط وتبرز الى الخارج. ولذلك اذا قطع الايثيليوم شوعدت فيه الكريات مرتبة بعضها فوق

شكل ٢٨٩ قطعة من الغشاء المخاطي المعاء الغليظ مكبرة ٧٥ ضعفاً. وقيست الاستاخ فكانت $\frac{1}{30}$ من القيراط طولاً و $\frac{1}{20}$ عرضاً. والاستاخ اقل غوراً من استاخ الغشاء المخاطي المعدة وشكلها الهندسي اقل ضبطاً وفي قاع كل واحد منها غدة انثنتان

شكل ٢٩٠ كيفية الدورة في الغشاء المخاطي المعاء *a* شريان *d* شبكة من الشريان مميطة بالاجربة البسيطة *b* شبكة شعرية سطحية مميطة بنوهات الاجربة *c* وريد مكوّن من اتحاد الوعية الشعرية

العجز والعصعص وجزءه السفلي منحني الى الورا. وهو اسطواناني الشكل ضيق عند اتصاله بالتعرج السيني ويتسع في سيره الى الاسفل الى ان ينتهي بتدد اعلى الاست يقبل الانساع الى درجة عظيمة. اقسام المستقيم ثلاثة علوي ومتوسط وسفلي. فالجزء العلوي نحو نصف طول المستقيم يمتد منحرفاً من الارتفاع العجزي الحرقفي الايسر الى مركز القطعة الثالثة من العجز وهو محاط بالبريتون ومرتبطة بواسطته بالعجز مجاورته من الخلف للعضلة الهرمية والضميرة العجزية العصبية وفروع الشريان الحرقفي الباطن الايسر. ومن المقدم تفصله بعض تلافيف من المعا الدقيق عن الوجه الخلفي للمثانة في الذكور والوجه الخلفي للرحم وتوابعه في الاناث. والجزء المتوسط للمستقيم طوله نحو ثلاثة قراريط ويمتد الى راس العصعص. وهو مرتبط بتغير العجز ولا يغطي البريتون الا الجزء العلوي من وجهه المقدم. مجاورته من المقدم للقسم المثلث لفقاعة المثانة والحويصلتين المنويتين والثنايتين الناقلتين والوجه السفلي للبروستاتا واما في الاناث فملتصق بالجدار الخلفي للمهبل. والجزء السفلي طوله نحو قيراط ينحني الى الخلف عند مقدم البروستاتا وينتهي في الاست. وهو خال من الغلاف البريتوني محاط بالعضلة العاصرة الباطنة وتسنده الرافعتان للاست وتحيط به عند منتهى العاصرة الظاهرة. وينفصل في الذكور عن القسم الغشاء الجري البول وبصلته بواسطة خلاء مثلث وفي الاناث عن المهبل بمثل ذلك وقاعدة الخلاء المذكور هي العجان في بناء المعا الغليظ. المعا الغليظ مؤلف من اربع طبقات مصابية وعضلية وخلوية ومخاطبية فالطبقة المصلية ناشئة من البريتون ومحيطه بجانب عظيم من المعا الغليظ وقد سبق الكلام مفصلاً على ذلك من جهة كل جزء على حدته

والطبقة العضلية منقسمة الى طبقتين من الالياف احدها طولية ظاهرة والثانية حلقة باطنة. فالطولية تكوّن طبقة متساوية السماكة في جميع مساحة المعا الغليظ نحو الظاهر وذلك على هيئة ثلاث حزم طولية مسطحة عرض الواحدة منها نحو نصف قيراط. وتبدأ الحزم المذكورة عند اتصال الزائدة الدودية بالاعور ولما كانت اقصر جداً مما بقي من ابنية المعا جذبته فصار معقداً او كيسي الشكل وهو خاص بالاعور والقولون خلافاً للتعرج السيني والمستقيم حيث تنتشر الالياف انتشاراً متساوياً. والالياف الحلقية تكوّن طبقة رقيقة على ظاهر الاعور والقولون واكثر اجتماعها في الاخلية التي بين الاكياس. واما في المستقيم فتكوّن طبقة سمكة ولا سيما في طرفه السفلي حيث تتكوّن منها العضلة العاصرة الباطنة. والطبقة الخلوية توصل الطبقة العضلية بالطبقة المخاطبية

وهو مرتبط بالجدار الخلفي للبطن بواسطة البريتون الذي يغطي وجهه المقدم وجانبيه واما وجهه الخلفي فيرتبط بالقطنية المربعة والكليية اليمنى بواسطة نسج خلوي. وقد يحيط البريتون بمجمعه فيكون رباطاً خاصاً به. مجاورته من المقدم لتلافيف الفائفي والجدران البطنية ومن الخلف يستقر على القطنية المربعة والكليية اليمنى

والقولون المستعرض اطول اقسام المعالغليط ويسير عرضاً من اليمين الى اليسار مقاطعاً للبطن مقابل حذاء ملتقى المنطقة الشراسيفية بالمنطقة السرية فاذا صار الى المراق الايسر انعكف الى الاسفل تحت الطرف السفلي للطحال مكوناً للتعرج الطحالي. وفي سيره المذكور يكون قوساً تقعيه مشرف الى الورا نحو العمود الفقري فيقال له القوس المستعرض للقولون وهو مرتبط بالعمود بواسطة ثنية عريضة من البريتون هي الرباط القولوني المستعرض. مجاورته من وجهه العلوي للكبد والحوصلة المرارية والقوس الكبير للمعدة والطرف السفلي للطحال ومن وجهه السفلي للمعال دقيقي ومن وجهه المقدم للطبقتين المقدمتين للثرب الكبير ومن وجهه الخلفي لرباطه المستعرض


والقولون النازل يكاد يكون سيره عمودياً الى الاسفل في المراق الايسر والقسم القطني فاذا صار الى الحفرة الحرقفية اليسرى انتهى في التعرج السيني. وهو مرتبط من وجهه المقدم وجانبيه بواسطة البريتون ومن مؤخره بالساق اليسرى للجاب والكليية اليسرى والقطنية المربعة بواسطة نسج خلوي. قطره اصغر ووضعه اكثر غوراً من القولون الصاعد

والتعرج السيني اضيق اقسام القولون. وضعه في الحفرة الحرقفية اليسرى متوسط بين منتهى القولون النازل عند العرف الحرقفي وبداية المستقيم حذاء الارتفاق العجزي الحرقفي الايسر. ينعكف اولاً الى الاعلى واليمين ثم عمودياً الى الاسفل واليسار وله رباط خاص به من البريتون. مجاورته من المقدم للمعال دقيقي والجدران البطنية ومن الخلف للحفرة الحرقفية

والمستقيم هو القسم الانتهائي للمعال الغليظ ممتد من التعرج السيني الى الاست. طوله من ستة الى ثمانية قراريط وسمي بالمستقيم لان سيره اقل تعرجاً مما سواه من الامعا. يبدأ حذاء الارتفاق العجزي الحرقفي الايسر ثم يسير منحرفاً الى الاسفل من اليسار الى اليمين حتى منتصف العجز ثم ينزل الى مقدم العجز والعصعص فاذا صار الى طرف العظم الاخير انحني الى الخلف وانتهى في الاست. وبناء على ذلك لا يكون المستقيم مستقيم السير في ذاته وانما هو كذلك بالنسبة الى ما اعلاه من الامعا فان جزءه العلوي منحرف من اليسار الى الخط المتوسط وجزءه المتوسط تابع لانحناء تعبير

شكل ٢٨٨

الى ثلاثة اقسام وهي الاعور والقولون والمستقيم



فالاعور جراب يمتد الى الاسفل من مبدأ المعاء الغليظ وهو احد اجزاء هذا المعاء اتساعاً فان قطره المستعرض نحو قيراطين ونصف وكذلك طوله. وضعه في الحفرة الحرقفية اليمنى وراء الجدار المقدم للطن ومثبت في مكانه بواسطة ثنية من البريتون. وتصل بجزئه السفلي والمؤخر قناة ضيقة طويلة دودية الشكل يقال لها الزائدة الدودية وهي اثرية في الانسان وعبرة عن امتداد الاعور في الحيوانات ذوات الثدي. طولها من ثلاثة الى ستة قراريط وقطرها كقطر قلم الكتابة ملتفة على نفسها وتنتهي بطرف مستدق مسدود. واما تجويفها فضيق مستطرق الى الاعور بواسطة فتحة قد يكون لها صمام غير كامل وجدرانها غليظة

والصمام اللفائفي الاعوري ثنيتان من الغشاء المخاطي بارزتان الى باطن المعاء الغليظ منفصلتان بواسطة فتحة طويلة ضيقة وذلك عند منتهى اللفائفي في الجزء الانسي والمؤخر للمعاء الغليظ عند اتصال الاعور بالقولون. شكل الثنية منها هلالية تتصل العليا من حافتها المحدبة بخط اتصال اللفائفي بالقولون والسفلي بخط اتصال اللفائفي بالاعور. وحافتها المقعرتان سائبتان بارزتان الى باطن المعاء. والفتحة الواقعة بينهما اشبه بشرم موضوع عرضاً للمعاء. ثم ان كلاً من الثنيتين المذكورتين مولفة من الغشاء المخاطي والالياف العضلية الحلقية التي سبق ذكرها في الكلام على بناء الامعاء. ووجه الصمام المشرف نحو اللفائفي مغطي بالحمل الخاصة بالمعاء الدقيق ووجه المشرف نحو المعاء الغليظ خالٍ منها وإنما يشاهد فيها فتحات القنيات الخاصة بغشاء المعاء الغليظ. فائدة الصمام المذكور انه اذا كان الاعور ممثلاً تقاربت حافتا الفتحة ومنعت نفاذ ما يتضمنه الى اللفائفي ولا يمنع السيل المخالف

والقولون ينقسم الى اربعة اقسام صاعد ومستعرض ونازل وتعرج سيني

فالقولون الصاعد اضيق من الاعور. يسير الى الاعلى من الحفرة الحرقفية اليمنى الى الوجه السفلي للكبد فاذا بلغ الى يمين الحوصلة المرارية انعكف فجأة نحو اليسار مكوناً التعرج الكبدي.

شكل ٢٨٨ الاعور والصمام اللفائفي الاعوري مع منتهى اللفائفي وبداية القولون ١ الاعور ٢ بداية القولون ٣ اللفائفي ٤ ثقب مدخل اللفائفي الى المعاء الغليظ ٥ وه الصمام اللفائفي الاعوري ٦ ثقب الزائدة الدودية ٧ الزائدة الدودية ٨ و ٩ اقباس القولون منفصلة بواسطة حواجز صامية ٩ قيد الزائدة الدودية

زقبات مستديرة بيضاء اللون مغطاة بغشاء مخاطي. وكل زقيق مولف من محفظة ظاهرة



شكل ٢٨٧



شكل ٢٨٦

لا قناة لها تتضمن افرازاً ابيض مظلماً محاطاً بمنطقة من الاجربة البسيطة تشغل الخلايا الواقعة بينها خَمَل. فائدتها غير معلومة الا ان اوضح ظهورها يكون مدة الهضم فيظن ان لها دخلاً في الامتصاص

المعا الغليظ

المعا الغليظ ممتد من منتهى اللفائفي الى الاست طولها نحو خمسة اقدام فهو خمس القناة المعوية. وهو متسع عند بدايته في الاعور ثم يضيق تدريجاً في سيره ثم يعود يتسع عند منتهاه في الاست ويختلف عن المعاء الدقيق بغلاظته وثبته وضعه وشكله المعقد. ويكون في سيره قوساً محيطاً بتلافيف المعاء الدقيق فانه يبدأ في الحفرة المحرقية اليمنى و يصعد في القسم القطبي الايمن والمراق الايمن الى الوجه السفلي للكبد ثم يمرّ عرضاً مقاطعاً للبطن عند ملتقى القسم الشراسيفي بالقسم اليسري الى المراق الايسر ثم ينزل في القسم القطبي الى الحفرة المحرقية اليسرى فيتلف هناك مكوّناً للتعريج السيني ثم يدخل الحوض ويسير على جداره الموخرا الى الاست. ويُقسّم المعاء الغليظ



شكل ٢٨٦ قطعة من احدى غدّد باير مكبرة ١٩ ضعفاً. ويشاهد ان الاسناخ غائرة وقد قيس عرضها فكان $\frac{1}{50}$ من التبراط وطولها $\frac{1}{6}$ والنواصل التي بينها من $\frac{1}{13}$ الى $\frac{1}{7}$ من التبراط. ويشاهد في فرع الاسناخ شبكة شعرية وعائية وفوهات اجربة بسنطة كثيرة

شكل ٢٨٧ قطعة من الجزء السفلي للصائم مأخوذة من عجل ومقطوعة في سباكة المعاء لاجل اظهار غدة من غدّد باير الى طرفيها ١ خمل ٢ اجربة لبركين وهي الاجربة البسيطة ٣ الطبقة العضلية للغشاء المخاطي ٤ اكياس صغيرة لغدة باير ٥ القسم الغائر من الطبقة الحلوية ٦ الياف حلوية للطبقة العضلية اليافها الطولية ٨ الطبقة المسلية

عمودياً نحو السطح ومنفتحة اليه بواسطة ثقب صغير مستديرة. وتُشاهد الثقب المذكور بواسطة الميكروسكوب على شكل نقط دقيقة متفرقة بين الخمل . وجدران الاجربة رقيقة مؤلفة من غشاء اساسي مبطن بكرات اسطوانية ومخاطة من الظاهر باوعية شعرية . فائدة الاجربة افراز العصارة المعوية

وغدد برورن وهي عدد الاثني عشري محصورة في الاثني عشري وبداية الصائم . وهي اجسام صغيرة مسطحة غائصة في النسيج الخلاوي لها قنيدات دقيقة تصب على الوجه الباطن للغشاء المخاطي . اكثر وجودها بقرب البواب . وهي شبيهة البنا والوظيفة بالفصيصات الاولى للغدد المعوية والغدد الوحيدة متفرقة على جميع مساحة الغشاء المخاطي للمعا الدقيق الا ان اكثر وجودها في الجزء السفلي للفائتي . وهي اجسام صغيرة مستديرة بيضاء قطر الواحدة منها من نصف خط الى

شكل ٢٨٥



شكل ٢٨٤

خط ومؤلفة من نجويف كبسي مسدود لا قناة له ولكنه يتضمّن افرازاً ابيض مظلم . فائدتها غير معلومة وغدد پاير وهي الغدد المجمعة عبارة عن اجتماع غدد وحيدة بحيث تتكوّن منها بقع مستديرة او بيضية يختلف قطرها من نصف قيراط الى اربعة قيراط ولذلك يقال لها احياناً بقع پاير عددها من عشرين الى ثلاثين . واكبر هذه البقع واكثرها وجوداً في الجزء السفلي للفائتي واما في الصائم فتكون قليلة العدد مستديرة الشكل وصغيرة وقد تُشاهد احياناً في الاثني عشري . وضعها في المعاطولي وابتعد ما يكون عن ارتباط الماساريقا به . كل بقعة مؤلفة من مجتمع


شكل ٢٨٤ غدة وحيدة من قولون طفل وقد قطع جدار المعال لاجل اظهار الغدة في سماكتها *a* اجربة بسيطة *f* امتناض على سطح المعال يقابل البروز المركزي الغدة *g* الغدة *b* الطبقة العضلية للغشاء المخاطي *c* الطبقة التي تحت الغشاء المخاطي *d* الطبقة العضلية للمعا *e* الطبقة المصلية

شكل ٢٨٥ بروز في الغشاء المخاطي للمعا الغليظ ناتج عن غدة وحيدة مكبرة ١٩ ضعفاً . ويشاهد ان الانساخ غائرة وكبيرة

الجزء النازل من الاثني عشري اسفل مدخل القناة الصفراوية وكبيرة ايضاً في الجزء المستعرض للاثني عشري وفي النصف العلوي للصائم ثم تاخذ في الصغر الى انها تكاد تغيب بالكلية عند منتهى اللثاني . فائدة الصمامات المذكورة انها تجعل سير الطعام في المعاء بطيئاً وتزيد السطح المعوي لاجل الامتصاص

والخمل وينال لها الزغب ايضاً زوائد دقيقة كثيرة الالوعية بارزة من الغشاء المخاطي على جميع مساحته بحيث يكون وجهه الباطن مخملي المظهر والممس . وهي مثلثة الشكل وبعضها مخروطي ينتهي بخيوط دقيقة . وهي اكبر واكثر عدداً في الاثني عشري والصائم منها في اللثاني . وقد حسب المعلم كروزان عددها في الجزء العلوي للمعا الدقيق من خمسين الى تسعين في الخط المربع وفي الجزء السفلي من اربعين الى سبعين وان عددها في جميع المعاء يبلغ الى اربعة ملايين .

شكل ٢٨٢



شكل ٢٨٢



واما بناء الخملة منها فن شبكة شعرية ولبنية تتخمن بين خلايا فربعاتها كريات نووية ودهنية . والشبكة المذكورة محاطة بغشاء اساسي عليه صف واحد من الكريات العمودية موضوعة وضعاً عمودياً نحو السطح . ولم يُعلم الى الان كيف تنشأ الالوعية للبنية ضمن الخمل . فائدة الخمل امتصاص الكيلوس

والاجربة البسيطة وتنسب الى المعلم ليبركن كثيرة العدد منتشرة على جميع مساحة الغشاء المخاطي للمعا الدقيق . وهي عبارة عن انخفاضات انبوبية دقيقة من الغشاء المخاطي موضوعة وضعاً

شكل ٢٨٢ قطعة من الغشاء المخاطي للمعا الدقيق مكبرة ١٩ ضعفاً لاجل اظهار الخمل . وتناهد في الانخفاضات التي بين الخمل ثوب الاجربة البسيطة كما عند $\frac{1}{7}$. ويتناهد عند $\frac{1}{10}$ منطقة اجربة محيطية بغدة منفردة . طول الخملة $\frac{1}{7}$ من القيراط

وعرضها عند القاعدة $\frac{1}{7}$ وعند القمة $\frac{1}{142}$

٢٨٢ قطعة من الغشاء المخاطي للصائم واقعة بين الصمامات الكاذبة ومكبرة ١٩ ضعفاً . وتظهر فيها الخمل على هيئة صفائح متلففة


واللفائف سمي بذلك لكثرة تلافيفه. طوله نحو ثلاثة اخماس المعا الدقيق. يشغل التسم السري والمخني والحرقني اليمين وينتهي في الحفرة الحرقنية اليمنى في الجانب الانسي لبداءة المعا الغليظ. وهو اضيق وارق واوعيته اقل من الصائم

واما بناء المعا الدقيق فمن اربع طبقات مصاية وعضائية وخلوية ومخاطية فالطبقة المصاية منعكسة من البريتون ولكنها لا تغطي جميع المعا الدقيق على نوع واحد. فانها محيطة بالجزء الاول وهو الصاعد للثاني عشري وتغطي جزءه الثاني وهو النازل من المتدم فقط وكذلك الجزء الثالث وهو المستعرض الواقع خلف الطبقة النازلة للرباط القولوني المستعرض. وما بقي من المعا الدقيق محاط بالبريتون الا عند اتصال الماساريقا به حيث يوجد خلاء بين طبقتها لمرور الاوعية والاعصاب الى المعا

والطبقة العضائية مؤلفة من طبقتين من الالياف ظاهرة طويلة وباطنة حلوية. فالالياف الطولية منتشرة انتشاراً خفيفاً على ظاهر المعا واكثر ظهورها عند حافته السائبة. والحلوية طبقة سمكية الا ان دوائرها غير كاملة

والطبقة الحلوية توصل الطبقة المخاطية بالعضائية وهي نسيج خلوي رخو تجتمع فيها الاوعية الدموية قبل توزعها في الغشاء المخاطي

والطبقة المخاطية سمكية كثيرة الاوعية في الجزء العلوي من المعا رقيقة قليلة الاوعية في الاسفل. يدخل في تاليفها جملة اشيا وهي الكريات السطحية والصامات المنطبة والحمل والاجربة البسيطة والغدد الاثنا عشرية والغدد الوحيدة والغدد المجمععة وهي غدد باير فالكريات السطحية او القرشية تغطي الغشاء المخاطي وهي من النوع العمودي



شكل ٢٨١

والصامات المنطبة ويتال لها الكاذبة ايضاً ثنيات من الغشاء المخاطي والنسيج الخلوي خالية من الالياف العضائية ممتدة عرضاً نحو المحور المعوي الى ثلاثة ارباع او اربعة اخماس محيطه. طول الثنيات الكبيرة منها نحو قيراطين وعرضها عند قاعدتها نحو ثلثي القيراط. والكبيرة والصغيرة متعاقبة الوضع ولا تبدأ ان تظهر الا بعد البواب بقيراط او قيراطين وهي كبيرة ومتقاربة في

شكل ٢٨١ قطعة من الكريات السطحية (ايبثايوم) العمودية من احدى الحمل ويشاهد في باطنها النوى

فالاثنا عشري سُمِّي بذلك لان طولهُ يقرب ان يكون عرض اثني عشر اصبعاً وذلك يساوي نحو ثمانية او عشرة قراريط. وهو اقصر اقسام المعا الدقيق واوسعها واكثرها ثباتاً. وليس له رباط بريتوني وانما البريتون يغطي بعضه فقط. سيره هلاكي الشكل بحيث يكون تحديده الى اليمين وتعييره الى اليسار معانناً لرأس البنكرياس. فانه يبدأ عند البواب ويصعد منحرفاً الى الاعلى والخلف فاذا صار الى الوجه السفلي للكبد نزل الى مقدم الكلية اليمنى وقاطع مقدم العمود وانتهى في الصائم على الجانب الايسر للفقرة الثانية القطنية. ولذلك قسموه الى ثلاثة اقسام صاعد ونازل ومستعرض

فالجزء الاول وهو الصاعد طولهُ نحو قيراطين وهو سائب متحرك ويقرب ان يكون جميعه مغلناً بالبريتون. مجاورته من الاعلى والمقدم للكبد وعنق الحوصلة المرارية ومن الخلف للحافة اليمنى للثرب الصغير والشريان الكبدي والقناة الكبدية والوريد البايي والجزء الثاني وهو النازل طولهُ نحو ثلاثة قراريط مثبت بالبريتون والبنكرياس يسير عمودياً الى الاسفل من عنق الحوصلة الى مقدم الكلية اليمنى حتى الفقرة الثالثة القطنية. ولا يغطي البريتون الا على وجهه المقدم فقط. مجاورته من المذدم للنفوس الامين للقولون والرباط القولوني ومن الخلف لمذدم الكلية اليمنى ومن جانبه الانسي لرأس البنكرياس والقناة المشتركة الصفراوية. والقناة المذكورة والقناة البنكرياسية تثقبانه من جانبه الانسي ثقباً منحرفاً اسفل منتصفه بقليل والجزء الثالث وهو المستعرض اطول اجزاء الاثني عشري واضيقها. يناطح مقدم العمود ويصعد من الفقرة الثالثة القطنية الى الثانية وينتهي في الصائم الى يسار الفقرة. من الامام يناطعه الاوعية الماسارية العليا. ومن الخلف يستقر على الاورطي والاجوف وساتي الحجاب. ومن الاعلى الحافة السفلى للبنكرياس

الشرايين التي تتوزع في الاثني عشري البويي والبنكرياسي الاثنا عشري وها فرعان من الكبدي والفرع البنكرياسي الاثنا عشري السفلي من الماساريقي العلوي. واورده تصب في المعدي الاثني عشري والماساريقي العلوي. واعصابه ناشئة من الضفيرة الشمسية

والصائم سُمِّي بهذا الاسم لانه يوجد غالباً فارغاً بعد الموت طولهُ نحو خمسي ما بقي من المعا الدقيق. يبدأ من منتهى الاثني عشري الى يسار الفقرة الثانية القطنية وينتهي في اللفائفي. واكثر تلافينه محصورة في القسم السري والقسم المحرقفي الايسر. والصائم اوسع من اللفائفي وجدراثة اغلظ واوثقته اكثر الا انه لا توجد علامة ظاهرة للدلالة على منتهاه وبداية اللفائفي

الاعوية الدموية قبل توزعها في الغشاء المخاطي ولذلك يقال لها أحياناً الطبقة الوعائية والطبقة المخاطية وهي الغشاء المخاطي للمعدة سميكة ملساء كالمخمل لونها في الطفولية وحالاً بعد الموت يميل الى الوردية وفي الكهولة والشيوخوخة اصفر باهت او سنجابي. وهي رقيقة في الطرف القلبي غليظة في البوابي. ومدة انتباض المعدة تجعد تجعداً طويلاً فاذا تمددت زال التجعد المذكور في البناء المكرسكوي للغشاء المخاطي. اذا نُظِرَ الى الوجه الباطن للغشاء المخاطي بالنظارة المعظمة كان منظره كمنظر شهد العسل اي انه مرصع بجفرا واسناخ صغيرة قليلة الغور كثيرة الجوانب او مسدسة الشكل يختلف قطرها من $\frac{1}{10}$ الى $\frac{1}{30}$ جزءاً من القيراط منفصلة بعضها عن بعض بخطوط مرتفعة. ويشاهد في قاع كل سخ من الاسناخ المذكورة فتحات مستطرفة الى قنيات دقيقة يقال لها الاجرحة المعدة موضوعة وضعاً عمودياً في جوهر الغشاء. وهذه القنيات قصيرة انبوية مستقيمة عند الطرف الايسر للمعدة وطويلة خشكة ملففة منتهية باطراف مددة او متشعبة في الطرف الايمن. والاجرحة المذكورة مبطنه بكرات عمودية في الطرف البوابي ويقال لها الغدد المخاطية لانه يُظن انها تفرز مخاطاً معدياً ونووية في ما بقي ويقال لها الغدد الببتونية لانه يُظن انها تفرز العصارة المعدية.

في اوعية المعدة واعصابها. الشرايين التي توزع في المعدة هي المعدية والبوابي والمعدية الثري الايمن وهما فرعان من الكبدي والمعدية الثري الايسر والاعوية الدقيقة وهي من الطحالي. وهذه الشرايين توزع اولاً في الطبقة العضلية ثم في الخلوية ثم في المخاطية. واورديها مصاحبة لسير الشرايين وتنصب في الوريد الطحالي والبالي. واورعيتها الليمفاوية كثيرة تمر في العقد الليمفاوية الكائنة على مسير النفوسين. واعصابها الفروع الانتهازية العصبيين الرئويين المعديين فالايمن منها يتوزع في الوجه الخلفي والايسر في الوجه المقدم. وتأتيها ايضاً فروع من السيمباتوي

المعا الدقيق

المعا الدقيق جزء من القناة الغذائية فيه يمتزج الكيموس بالصفراء وعصارة البنكرياس وافراز الغدد المعوية وتُتصل المواد الغذائية اي الكيلوس عن المواد الثقلية. وهو قناة متلففة طولها نحو عشرين قدماً يصغر قطرها تدريجياً من بدايتها الى منتهائها واقعة في مركز واسفل التجويف البطني والتجويف المحوضي محاطة من الاعلى والجانبين بالمعا الغليظ ومحجورة من المقدم للثرب الكبير والجدران البطنية ومتصلة بالعمود الفقري بواسطة ثنية من البريتون هي الماساريقا. ويُسمّ المعَا الدقيق الى ثلاثة اقسام وهي الاثنا عشري والصائم واللفائفي


بناء المعدة من اربع طبقات مصالية وعضلية وخالوية ومخاطية
 فالطبقة المصالية ناشئة من البريتون وتغطي جميع سطح المعدة الا النفوس الكبير والصغير عند
 اتصال طبقتي اثر بين حيث يترك خلاء مثلث تمر فيه الاوعية الغذائية والاعصاب
 والطبقة العضلية موضوعة تحت الطبقة المصالية ومكوّنة من الياف طولية وحلالية ومنخرقة .
 فالالياف الطولية موضوعة الى الجهة السطحية ممتدة من الالياف الطولية للمريء ومشععة على
 نوع نجني من الفتحة القلبية. وهي كثيرة الوجود في النفوس قليلة في الوجيين وتخلط عند الطرف
 البوابي بالالياف الطولية للمعا الدقيق. والالياف الحلالية طبقة تغطي جميع مساحة المعدة موضوعة
 تحت الالياف الطولية واكثر وجودها عند البواب حيث تجمع على هيئة حلقة مستديرة بارزة
 نحو التجويف فتكوّن مع الغشاء المخاطي المغطي لسطحها الباطن الصمام البوابي. والالياف المنخرقة
 اكثر وجودها في الطرف القلبي للمعدة موضوعة على هيئة طبقة تغطي الوجيين المقدم والخلفي
 حول الفتحة القلبية

شكل ٢٨٠



شكل ٢٧٩

شكل ٢٧٨



والطبقة الخالوية مولّنة من نسيج رخو خلوي يوصل الطبقة المخاطية بالطبقة العضلية وهي تتضمن

شكل ٢٧٨ قطعة من الغشاء المخاطي للمعدة الكبيرة ٧٥ قطراً تشاهد فيها الحفر او الاستاخ المذكورة في المتن واما الاقسام
 الثلاثية او الرباعية التي في فركل حفرة منها ففروع شريانية تشاهد بينها فوهات الاجرية المعدية وعددها من اثنين الى
 اربع في كل حفرة

شكل ٢٧٩ قطع عمودي لجدار المعدة عند طرفها البوابي بحيث تظهر طبقاتها وشدها . وهي مأخوذة من معدة خنزير
 a الغدد المعدية b الطبقة العضلية الغشاء المخاطي c الطبقة الخالوية وقد قطع فيها وتالا دموي d الالياف الحلالية للطبقة
 العضلية e الالياف الطولية للطبقة العضلية f الطبقة المصالية

شكل ٢٨٠ جراب او غدة من غدد المعدة ١ كريات عمودية شاذة الثلث العلوي ٢ قسمها الغائر المتعرج المشغول
 بكريات نووية ٣ احدى الكريات النووية

والطرف الايمن ويقال له البوابي ايضاً اصغر جداً من سابقه. وهو ملاصق لجدار البطن والوجه السفلي للكبد وعنق الحوصلة المرارية. الفتحة المرئية ويقال لها القلبية ايضاً مستطرفة الى المريء وهي الجزء الاعلى من المعدة وشكلها قمي. والفتحة البوابية مستطرفة الى الاثني عشري ولها صمام

القوس الصغير هو الحافة العليا يمتد بين الفتحة المرئية والفتحة البوابية ويتصل بالوجه السفلي للكبد بواسطة الثرب الصغير. والقوس الكبير هو الحافة السفلي يمتد بين التتمين المذكورين ويتصل به الثرب الكبير. وهاتان الحافتان تشدان وجهي المعدة. ووجهها المقدم متجه الى الاعلى والمقدم ومجاور للحجاب الحاجز والوجه السفلي للفص الايسر للكبد وللبدار البطني. ووجهها الخلفي متجه الى الاسفل والخلف ومجاور للبكر باس والوعية الكبيرة للبطن وسائر الحجاب والصفيرة الشمسية


وتثبت المعدة في مكانها بواسطة الثرب الصغير الذي يمتد من الفرجة المستعرضة للكبد الى قوسها الصغير وبواسطة ثنية بريتونية تسير من الحجاب الى الطرف الايسر للمعدة يقال لها الرباط المعدي الحجابي. ومن الرباطين المذكورين يتأني ان المعدة اذا كانت متمددة كثيراً اتجه قوسها الكبير نحو المقدم ووجهها المقدم الى الاعلى ووجهها الخلفي الى الاسفل ويتغير وضع المعدة كثيراً بحسب الاسباب التي تفعل بها. وهي انه عند الشهيق تدفع الى الاسفل بواسطة نزول الحجاب وتدفع الى الاعلى عند الزفير بواسطة ضغط العضلات البطنية. واذا كانت فارغة اشغلت جزءاً صغيراً من المراق الايسر فيكون المحال الى الخلف منها والفص الايسر للكبد الى مقدمها والتلب الى الاعلى والمقدم منفصلاً عنها بواسطة الفص الايسر للكبد والتامور. واذا كانت ممتلئة دُفع الحجاب الى الاعلى وضاق التجويف الصدري وتعسر التنفس اكثر واقل بحسب درجة امتلائها. وشدة المنطقه يدفعها الى الاسفل والاستسقاء البطني الى الاعلى والصدري الى الاسفل الى غير ذلك من الضغط الميكانيكي

اذا نظر الى باطن الطرف البوابي للمعدة شوهد ان الغشاء الخاطي بارز الى الباطن على هيئة ثنية حلقيية في مركزها ثقب مستدير قطره نحو نصف قيراط مستطرق من المعدة الى الاثني عشري. ويقال للثنية المذكورة البواب وهي تتضمن اليافاً عضلية مجتمعة على هيئة حلقة غليظة. واما الالياف الطولية للمعدة فتمتد الى ظاهر البواب مغطاة بالغشاء المصلي ولا دخل لها في تكوين البواب. وقد تكون الفتحة بيضية الشكل وقد تكون عوض الثنية الحلقيية ثنيتان هلايتان احدها موضوعة الى اعلى الفتحة البوابية والثانية الى اسفلها. وقد لا يكون الاثني واحدة

وانزوائد المعوية اجربة صغيرة من البريتون تتضمن مادة شمعية مصاحبة لمسير القولون والجزء العلوي للستيم ولا سيما القولون المستعرض

المعدة

المعدة هي العضو الرئيسي للمضم. وهي الجزء المتمد من القناة الغذائية الذي يتم فيه تحليل الطعام وتحويله الى الكيموس. وضعها في المراق الايمن والنسب الشراسيفي وبعض المراق الايسر. شكلها مخروطي غير منتظم منحني على نفسه ولها قاعة مستديرة متجهة نحو اليسار. وضعها خلف الجدار المقدم للبطن اعلى القولون المستعرض واسفل الكبد وانجاب الحاجز. ويختلف حجمها كثيراً في الاشخاص وتبعاً لحالة الامتلاء. وانما في الغالب اذا كانت معتدلة الامتلاء يكون قطرها المستعرض نحو اثني عشر قيراطاً وقطرها العمودي نحو اربعة. وزنها نحو اربع اواق ونصف. لها طرفان وفتحتان وحافتان ووجهان



فالطرف الايسر وهو جزءها الاعظم يمتد الى قيراطين او ثلاثة نحو اليسار من مدخل المريء. ويقال للامتداد المذكور القعر او الطرف الطحالي. وضعه اسفل الاضلاع ملامساً للطحال ومتصلاً به بواسطة الثرب المعدي الطحالي

شكل ٢٧٧ قطع عمودي وطولي للمعدة والاثنى عشرى ويحمل فتحة المعدة ١ الطرف الاثني عشرى ٢ الفتحة القلبية ٣ الطرف الكبير للمعدة وهو الطحالي ٤ الطرف الصغير للمعدة وهو البوابي ٥ القوس الصغير ٦ القوس الكبير ٧ استفاخ عند الطرف الصغير للمعدة يقال له كهف البواب وقد يعد اثار معدة ثانية ٨ تجعدات طوية في الغشاء الحاطي ٩ البواب ١٠ القسم الصاعد او المنصرف الاثنى عشرى ١١ قسمه النازل ١٢ القناة البكرياسية والقناة الصفراوية المشتركة عند مصبها في القسم النازل للاثنى عشرى ١٣ الحمة التي تنفذ منها القناتان البكرياسية والصفراوية ١٤ القسم المستعرض للاثنى عشرى ١٥ بناء الصائم. وتنادى في باطن الاثنى عشرى الصائم الصامات المنطوقة او الكاذبة وهي عبارة عن ثنيات من الغشاء الحاطي بارزة نحو باطن المعاء فتكون صامات غير كاملة

اثنان منها تنزلان من المعدة الواحدة من وجهها المقدم والثانية من وجهها المؤخر وتحدان عند حافتها السفلى ثم تنزلان الى مقدم المعاء الدقيق حتى الحوض ثم تصعدان الى القولون المستعرض فتتصلان وتغلغانه. ويصعب فصل الطبقات المذكورة بعضها عن بعض في البالغ خلافاً للصغير. ثم ان الثرب المذكور رقيق غالباً غرباً الى المنظر يتضمن مادة شمعية كثيرة في السمان قليلة في غيرهم. ويظهر ان فائدته وقاية الامعاء من البرد وتسهيل حركتها بعضها على بعض مدة عملها

الدودي

والثرب المعدي الطحالي ثنية توصل الوجه المتعرج للطحال بالطرف العريض للمعدة. وهو مختلط من حافته السفلى بالثرب العظيم ويتضمن الاوعية الطحالية والاعوية الدقيقة والمساريقا ثنية عريضة من البريتون متصلة بمنتصف الاسطوانة المعوية تربط تلافيف الصائم والفائقي بالجدار الخلفي للبطن. جذرها ما اتصل منها بالعمود الفقري وهو ضيق طوله نحو ستة قراريط متجه بانحراف من الجانب الايسر للفقرة القطنية الثانية الى الارتفاق الايمن العجزي المحرقفي. حافتها المعوية طويلة تنفصل طبقتاها بحيث تحيطان بالمعاء فتكونان طبقة البريتونية. عرضها بين حافتها الفقرية وحافتها المعوية نحو اربعة قراريط. حافتها العليا مختلطة بالوجه السفلي للرباط القولوني المستعرض. وحافتها السفلى مختلطة بالبريتون الذي يغطي الاعور والقولون الصاعد. فائدة المساريقا انها تربط المعاء الدقيق في مكانه وتتضمن بين طبقتيها الاوعية والاعصاب المساريقية والاعوية اللبنية والغدد المساريقية ورباط الاعور اذا وجد تربط مؤخر الاعور بالحفرة المحرقفية اليمنى. وفي الغالب يسير البريتون الى مقدمه فقط

والرباط القولوني الصاعد ثنية تربط مؤخر القولون الصاعد بالجدار الخلفي للبطن والرباط القولوني النازل يربط القولون النازل بالجدار الخلفي للبطن. وفي الغالب هذان الرباطان لا يوجدان وإنما يغطي البريتون الوجه المقدم والجانبين للقولون الصاعد والنازل والرباط القولوني المستعرض ثنية عريضة تربط القولون المستعرض بالجدار الخلفي للبطن. وهو مؤلف من الطبقتين الصاعدتين للثرب الكبير اللتين تنفصلان اولاً فتحيطان بالقولون المستعرض ثم تتحدان خلفه وتسيران الى العمود الاثني عشرية تنفصلان عند مقدم الاثني عشرية كما سبق. وضمن الثنية المذكورة اوعية القولون المستعرض

والرباط السيني ثنية تربط التعرج السيني بالحفرة المحرقفية اليسرى والرباط المستقيمي يربط الجزء العلوي للمستقيم بمقدم العجز ويتضمن الاوعية الباسورية

السفلى لرباطه الاكليلي . ومن الوجه السفلي للكبد تُستَقَصى الى الفرجة المستعرضة حيث تخلط
بالطبقة الخلفية للثرب الصغير وهي النقطة التي بدانا نتبعها

ثم ان الخلا الواقع بين انعكاسات هذه الطبقة الخلفية للبريتون يقال له التجويف الصغير
للبريتون او تجويف الثرب الكبير . يحدهُ من المقدم الثرب الصغير والمعدة والجزء النازل للثرب
الكبير . ومن الخلف الجزء الصاعد للثرب الكبير والقولون المستعرض والرباط القولوني المستعرض
وطبقته الصاعدة . ومن الاعلى الكبد . ومن الاسفل اثناء الثرب الكبير . وهذا الخلا يستطرق
الى التجويف العام البريتوني بواسطة ثقب ونسلو

وثقب ونسلو موضوع خلف الحافة اليمنى السائبة للثرب الصغير وهو اخنناق التجويف
البريتوني العام مسبب عن مرور الشريان الكبدي والشريان المعدي من المحور البطني الى
الكبد والمعدة . يحدهُ من المقدم الثرب الصغير ومن الخلف الاجوف السفلي . ومن الاعلى فص
سببيلوس . ومن الاسفل الشريان الكبدي


فالاحشاء التي يكاد يغلف البريتون جميعها هي الكبد والمعدة والطحال والجزء الاول من
الاثني عشري والصائم والفائفي والقولون المستعرض والتعرج السيني والجزء العلوي للمستقيم
والرحم والمبيضان . والاحشاء التي يغلف بعضها فقط هي الجزء النازل والجزء المستعرض للاثني
عشري والاعور والقولون الصاعد والنازل والجزء المتوسط للمستقيم والجزء العلوي للهبيل والجدار
الخلفي للمثانة . واما الكليتان ومحفظتاها والبنكرياس فيغطيها البريتون بدون ان يرسل لها غلافاً
خصوصياً . واما الجزء السفلي للمستقيم وعنق المثانة وقاعدتها ووجهها المقدم والجزء السفلي للهبيل
فالبريتون لا يغطيها ولا يغلفها

والبريتون ثنيات كثيرة ممتدة بين الاعضاء المحشوية بعضها يربط الاحشاء في مكانها ويتضمن
الاوعية والاعصاب التي تتعلق بها ويقال لها اربطة سياني ذكرها في الكلام على الاحشاء التي
تتعلق بها . وبعضها يربط الامعاء بجدران البطن وهي ايضاً من نوع الاربطة . وبعضها يمتد من حشاء
واحد الى اخر يقال لها ثروب وهي ثلاثة الثرب الصغير والثرب الكبير والثرب المعدي الطحالي
فالثرب الصغير وهو المعدي الكبدي ثنية ممتدة بين الفرجة المستعرضة للكبد والقوس الصغير
للمعدة . وهو رقيق جداً مؤلف من طبقتين تتضمنان بينهما الشريان الكبدي والقناة الصفراوية
المشتركة والوريد الباي واوعية ليفاوية والصفيرة الكبدية العصبية وجميعها محاط بنسيج رخو
خلوي هو محفظة كيسون

والثرب الكبير وهو المعدي القولوني اعظم الثنيات البريتونية مؤلف من اربع طبقات

للمسار يفا. ثم تنزل على مقدم العمود الى الحوض فتحيط بالجزء العلوي للمستقيم وتربطه في مكانه بواسطة ثنية خاصة به يقال لها رباط المستقيم. ثم

شكل ٢٧٦



يختلف سيرها في الذكور والاناث. ففي الذكور تكون ثنية بين المستقيم والمثانة هي الثنية المستقيمة المثانية وتضعد على الوجه الخلفي للمثانة حتى قمتها. وفي الاناث تنزل الى الحوض الى مقدم المستقيم وتغطي جزءاً صغيراً من الجدار الخلفي للمهبل ثم تنعكس على الرحم فتغطي قعره وجسمه. ومن جانبي الرحم تنعكس الى جدار الحوض فتكون الرباطين العريضين. ومن وجهه المقدم تضعد على الوجه الخلفي للمثانة الى قمتها. ومن هناك يصير سيرها في الذكور والاناث واحداً فانها تسير على الجدار البطني ثم على الوجه السفلي للحجاب ثم تنعكس على الكبد فتكون بعض اربطته ثم تغطي الكبد على وجهه العلوي والسفلي. وعند الفرجة المستعرضة تخلط بالطبقة المقدمة للثرب الصغير من حيث بدأنا

والطبقة الخلفية للثرب الصغير تنزل الى القوس الصغير للعدة فتغطي وجهها الخلفي حتى قوسها الكبير. ثم تنزل مسافة الى مقدم المعاء الدقيق وتنثني على نفسها فتضعد الى القولون المستعرض مكونة للطبقة الباطنة للثرب الكبير وتغطي الوجه العلوي للقولون المستعرض ثم تسير الى الخلف حتى العمود فتكون الطبقة العليا للرباط القولوني المستعرض. ثم تضعد الى مقدم البنكرياس وساقى الحجاب فتبطن الوجه السفلي للحجاب ثم تنعكس منه على الحافة الخلفية للكبد فتكون الطبقة

شكل ٢٧٦ انعكاسات البريتون D الحجاب الحاجز L الكبد S المعدة C القولون المستعرض D القسم المستعرض الاثني عشري P البنكرياس I المعاء الدقيق R المستقيم B المثانة ١ الطبقة المقدمة للبريتون المبطن للوجه السفلي من الحجاب ٢ الطبقة الخلفية ٣ الرباط الاكليلي المكون من سير هاتين الطبقتين الى الحافة الخلفية للكبد ٤ الثرب الصغير وهو عبارة عن سير الطبقتين من الوجه السفلي للكبد الى القوس الصغير للمعدة ٥ ملتقى الطبقتين في القوس الكبير للمعدة من حيث يتزلزل ثم يرتدان الى الاعلى فيكونان الثرب الكبير (٦) ٧ الرباط المستعرض للقولون ٨ الطبقة الخلفية التي تستقصى الى الاعلى الى مقدم الاثني عشري المستعرض (D) والبنكرياس لتخلط بالطبقة الخلفية في الاعلى (٢) ٩ ثقب ونسول. والحط الذي يجد هذا الثقب من الاسفل يشير الى سير الشريان الكبدى نحو المقدم ليدخل بين طبقتي الثرب الصغير ١٠ المسار يفا المحيطة بالمعاء الدقيق ١١ الثنية المستقيمة المثانية المكونة من الطبقة المقدمة النازلة ١٢ الطبقة المقدمة التي تستقصى الى الاعلى على الوجه الباطن للجدران البطنية حتى الطبقة (١) التي يولى منها سير البريتون

في القسم السري : القولون المستعرض وبعض الترب الكبير والمساريقا والجزء المستعرض
للإثني عشري وبعض تلافيف الصائم والفائفي
في القطبي الأيمن : القولون الصاعد والجزء السفلي للكليّة اليمنى وبعض تلافيف المعاد الدقيق
في القطبي الأيسر : القولون النازل والجزء السفلي للكليّة اليسرى وبعض تلافيف المعاد الدقيق
في القسم الختلي : تلافيف المعاد الدقيق والمثانة في الأولاد وفي البالغين أيضاً إذا كانت ممتدة
والرحم مدة الحمل

في القسم الأري الأيمن : الأعور وزائدته والحالب والأوعية المنوية
في القسم الأري الأيسر : التعريج السيني للقولون والحالب والأوعية المنوية

البريتون

البريتون كلمة يونانية معناها الاحاطة بالشيء وهو غشاء مصلي على هيئة كيس مسدود كباتي
الأغشية المصلية الأفي الأناث فان قناتي فلوبويوس تستطرقان الى تجويفه بحيث يختلط غشاؤها
المخاطي بالغشاء البريتوني المصلي


والبريتون يغلف الاحشاء البطنية والحوضية بغلاف غير كامل هو طبقتة المحشوية ثم ينعكس
على الوجه الباطن لجدران البطن والحوض فتتكوّن من ذلك طبقتة الجدارية . وجهه السائب
مندى مغطى بكرات رقيقة سطحية . ووجهه المتصلق خشن ملتصق بالاحشاء والجدران البطنية
بواسطة نسج خلوي

لاجل استقصاء انعكاسات البريتون يُفخّ البطن ثم يُرفَع الكبد ويُسند وتُخفَض المعدة فتُشاهد
طبقة رقيقة غشائية سائرة من الفرجة المستعرضة للكبد الى الحافة العليا للمعدة هي الترب الصغير
او الترب المعدي الكبدية . والترب المذكور مولف من طبقتين لطيفتين من البريتون احلاها
مقدمة والآخرى خلفية بينهما الأوعية والأعصاب الكبدية . ويجب تتبع الطبقة المقدمة أولاً ثم الخلفية
في استقصاء البريتون


اما الطبقة المقدمة فتنزل الى القوس الصغير للمعدة وتغطي وجهها المقدم الى القوس الكبير
ثم تنزل الى مقدم المعاد الدقيق فتنتهي على نفسها وتصل الى القولون المستعرض فتكوّن الطبقة
الظاهرة للترب العظيم . ثم تغطي الوجه السفلي للقولون المستعرض وتسير الى مؤخر التجويف
البطني فتكوّن الطبقة السفلى للرباط المستعرض للقولون . ثم تنزل الى مقدم الإثني عشري والأورطي
والاجوف حتى الشريان المساريقي العلوي فتغلف المعاد الدقيق وتعود الى العمود الفقري مكونة

المتوسط للمنطقة السفلى الختلي والنسبان الجانبيين الاري الايمن والاري الايسر او الحرقفيان واما

شكل ٢٧٥



شكل ٢٧٤



الاجشاء الواقعة في الاقسام المذكورة فعلى ما ياتي :

في القسم الشراسيفي : منتصف المعدة وطرفها البوادي والنص الايسر للكبد وفص سيبيليوس
والوعية الكبدية والمحور البطني والعقدتان الهلايتان والبنكرياس وبعض الاورطي والاجوف
والوريد الفرد والقناة الصدرية

في المراق الايمن : الفص الايمن للكبد والحوصلة المرارية والاثنا عشري والتعرج الكبدى للقوان
والجزء العلوي للكليتين اليمنى والمحفظة اليمنى اعلى الكلية

في المراق الايسر : الطرف الطحالي للمعدة والطحال وطرف البنكرياس والتعرج الطحالي
للقولون والنصف العلوي للكليتين اليسرى والمحفظة اليسرى اعلى الكلية

شكل ٢٧٤ اقسام البطن ١ المراق الايسر ٢ القسم الشراسيفي ٣ المراق الايمن ٤ القطني الايسر ٥ السري ٦ القطني
الايمن ٧ الحرقفي او الاري الايسر ٨ الختلي ٩ الحرقفي او الاري الايمن

شكل ٢٧٥ اجشاء البطن على وضعها الطبيعي او اوها والجدران البطنية مبسوطة ومقلوبة الى الوراء ١ الفص الايسر
للكبد ٢ فص الايمن ٣ قعر الحوصلة المرارية ٤ الرباط الممدد للكبد نافذاً من شق الفرجة الطولية وسائراً على جدران البطن
الى السرة ٥ بعض الرباط العريض للكبد ٦ المعدة ٧ طرفها البوادي ٨ دة الاثني عشري ٩ الطحال ١٠ والذرب الكبير
١١ المعال الدقيق ١٢ الاعور ١٣ الزائدة الدودية ١٤ القوان الصاعد ١٥ القوان المنعرج ١٦ القوان النازل ١٧ التعرج
اليسرى للقوان ١٨ زوائد من البريتون متصلة بالتعرج السيني ١٩ ثلاثة خطوط بارزة تشير الى الاوراكس والشرانيات
الختلين الصاعدة الى السرة ٢٠ الحجاب الحاجز

بالمخاطية. والطبقة المخاطية سمكة حمراء في الاعلى باهتة في الاسفل ومرصعة بجلمات دقيقة ومغطاة بطبقة سمكة من الكريات السطحية. والغدد المرئية كثيرة ولا سيما حول الفتحة القلبية وهي مستقرة في النسج الذي دون الغشاء المخاطي ومنفتحة اليه باقنية طويلة

البطن

البطن اعظم تجاوير الجذع ينفصل في الاعلى عن التجويف الصدري بواسطة الحجاب الحاجز وفي الاسفل عن التجويف الحوضي بواسطة شفة الحوض. شكله بيضي وقطره الطويل من الاعلى الى الاسفل وهو اعرض في الاعلى منه في الاسفل حدوده من المقدم والجانبين الاضلاع السفلى والجزء المحرقفي من العظم المحرقفي والعضلات البطنية. ومن الخلف العمود الفقري والعضلتان الصليبتان والمربعتان الفطنتيتان. ومن الاعلى الحجاب الحاجز. ومن الاسفل شفة الحوض. والوجه الباطن للعضلات التي تكوّن حدود هذا التجويف مبطن بلغافة تختلف تسميتها بحسب القسم الذي تتعلق به. وضمن التجويف المذكور معظم القناة الهضمية وبعض الاعضاء الاضافية لوظيفة الهضم وهي الكبد والبنكرياس والطحال والكليتان ومحفظتاها. ويغطي جدار البطن واكثر الابنية المذكورة غشاء مصلي يقال له البريتون. واما الفتحات المستطرفة الى جدران البطن او منها فهي الفتحة السرية لاجل مرور الاوعية السرية في الجبين. وثلاث فتحات في الحجاب الحاجز وهي الفتحة الاجوفية لمرور الوريد الاجوف السفلي والفتحة الاورطية لمرور الاورطي والوريد الفرد والقناة الصدرية والفتحة المرئية لمرور المريء والعصبين الرئويين المعديين. وفتحتان في الاسفل من كل جانب احدها لمرور الاوعية الفخذية والثانية لمرور الحبل المنوي في الذكور والرباط المستدبر في الاناث

اقسام البطن. قد اصطلح المشرحون على تقسيم البطن الى جهات معلومة لاجل تسهيل وصف الاحشاء باعتبار وضعها في حالتها الصحية والمرض. وذلك على شكل انه انه اذا رُسم خطان حلقيان حول الجسد احدهما مواز لغضروفي الضلعين التاسعين والاخر لاعلى العرفين المحرقفيين انقسم التجويف البطني الى ثلاث مناطق عليا ومتوسطة وسفلى. ثم اذا رُسم خطان متوازيان من طرف غضروفي الضلعين الثامنين الى الاسفل بحيث يمسّان مركز رباط بويرات انقسمت كل منطقة من المناطق الثلاث المذكورة الى ثلاثة اقسام احدها متوسط والاخران جانبيان. فيقال للقسم المتوسط للمنطقة العليا القسم الشراسيفي وللقسمين الجانبيين المراق الايمن والمراق الايسر. والقسم المتوسط للمنطقة المتوسطة السري والقسمان الجانبيان القطني الايمن والقطني الايسر. والقسم

والفم والحنجرة. والعضلية مولفة من العضلات البلعومية التي مرّ الكلام عليها
والعدد البلعومية كثيرة العدد منتشرة في سماكة الغشاء المخاطي ومنفتحة على وجهه الظاهر.
والغشاء المخاطي مغطى بكريات عمودية هديبة في الأعلى سطحية في الأسفل

المريء

المريء قناة غشائية طولها نحو تسعة قراريط ممتدة من البلعوم الى المعدة. يبدأ عند الحافة
السفلى للغضروف الخلفي حذاء الفقرة الخامسة العنقية وينزل على مقدم العمود الشوكي ماراً في
المنصف الخلفي ثم ينفذ من الحجاب الحاجز فاذا دخل التجويف البطني انتهى في الفتحة القلبية
للمعدة حذاء الفقرة التاسعة الظهرية. اتجاه المريء عمودي الا انه ينحرف قليلاً في سيره فيكون
وضعه اولاً في الخط المتوسط ثم يميل قليلاً الى اليسار عند اصل العنق ثم يعود الى الخط المتوسط
ثم اذا سار الى المقدم ليدخل الفتحة الحجابية انحرف الى اليسار. وما عدا ذلك له انحناء تابع لسير
العمود فيكون محدباً في الجهة العنقية ومقعراً في الجهة الظهرية. وهو اصبغ اجزاء القناة الهضمية
ومخنق عند بدائنه وعند مروره من الفتحة الحجابية


مجاورته في العنق. من المقدم للقصبة وفي اسفل العنق حيث يميل الى اليسار للغدة الدرقية
والقناة الصدرية. ومن الخلف يستقر على العمود وعلى العضلة العنقية الطويلة. ومن الجانبيين
للسباتي الاصيلي وبعض الغدة الدرقية. واما العصبان الحنجريان الراجعان فيصعدان بينه وبين
القصبة. ومجاورته في الصدرانه يقاطع الجانب الايسر للجزء المستعرض من القوس الاورطي ثم يسير
في المنصف الخلفي الى الجانب الايمن من الاورطي فاذا وصل الى قرب الحجاب سار الى المقدم
وقليلاً الى اليسار من الاورطي قبل دخوله التجويف البطني. فهو مجاور من المقدم للقصبة وقوس
الاورطي والشعبة اليسرى والوجه الخلفي للتامور. ومن الخلف يستقر على العمود والعنقية الطويلة
والاوعية بين الاضلاع. ومن الاسفل بقرب الحجاب يستقر على مقدم الاورطي. ومن الجانبيين تغطيه
البليورنان فيكون الوريد الفرد الاكبر الى اليمين منه والاورطي النازل الى اليسار. واما العصبان
الرئويان المعديان فالايمن منها يسير الى الخلف منه واليسر الى المقدم

بناء المريء من ثلاث طبقات ظاهرة عضلية ومتوسطة خلوية وباطنة مخاطية. فالطبقة العضلية
مولفة من طبقتين ليفيتين احدها ظاهرة طويلة والثانية باطنة حلقيه. والاياف المذكورة ممتدة
من العاصرة السفلى الاحزمة طويلة تنشأ من الخط العمودي الذي على الوجه الخلفي للغضروف
الخلفي وهي مخططة في الأعلى وغير مخططة في الأسفل. والغشاء الخلوي يوصل الطبقة العضلية

نسيج خلوي. كل فصيص منها مؤلف من خلايا كثيرة مبطنه بكرات تصب الى قناة مشتركة

البلعوم

البلعوم جزء من القناة الهضمية موضوع خلف الانف والفم والحنجرة. وهو كيس عضلي غشائي مسدود في الاعلى منفتح في الاسفل اوسع في الاعلى منه في الاسفل ممتد من الوجه السفلي لقاعدة الحنجرة الى محاذة الغضروف الحلقى من المقدم والفقرة الخامسة



العنقية من الخلف. طوله نحو اربعة قراريط ونصف قطره المستعرض اطول من قطره الامامي الخلفي ولا سيما حذاء قرني العظم اللامي وجزءه الاضيق عند منتهاه في المريء. من الاعلى يحده التواء القاعدي للعظم الموخري. ومن الاسفل يختلط بالمريء. ومن الخلف يتصل بواسطة نسيج رخو خلوي بالعمود الفقري. ومن المقدم غير كامل تنصل حوافه بالصفحة الجناحية الانسية ثم بالرباط الجناحي الفكي ثم بالفك السفلي واللسان والعظم اللامي والحنجرة. ومن الجانبين يتصل بالتونين الاكبرين وعضلاتهما ويجاور السباتي الاصيلي والسباتي الباطن والوداجي الباطن والعصب الثامن والتاسع والسيمبانوي

وله سبع فتحات مستطرفة اليه وهي الفتحان الانفيان الخلفيتان وقناتا اوستاكيوس والفم والحنجرة والمريء. فالفتحان الانفيان الخلفيتان كبيرتان موضوعتان في الجزء العلوي والمقدم للبلعوم. وفتحتا قناتي اوستاكيوس واحدة من كل جانب في الجزء العلوي للبلعوم الى الورا من الصاخر الانفي السفلي. والى الاسفل من الحفرتين الانفيتين الوجه الخلفي للهاء والغلصمة وفتحة الفم وقاعدة اللسان ولسان المزمار والفتحة القلبية الشكل للحنجرة. والفتحة المرئية هي الجزء السفلي الضيق للبلعوم

بناء البلعوم من ثلاث طبقات مخاطية وعضلية وليفية. فالطبقة الليفية موضوعة بين المخاطية والعضلية ويقال لها الصفاق البلعومي. وهي سميكة في الاعلى متصلة بالتواء القاعدي والعظم الحجري وترق ثم تفتيح في الاسفل. والمخاطية ممتدة من الغشاء المبطن لقناتي اوستاكيوس والحفرتين الانفيتين

شكل ٢٧٢ البلعوم وقد فتح من المورخ ١ قطع عرضي لقاعدة الحنجرة ٢ و٣ جدران البلعوم مغذبة الى الجانبين ٤ و٥ الفتحان الانفيان الجانبيان منفصلتان بواسطة الميكعة ٦ الفتحة السفلى لقناة اوستاكيوس ٧ الفتحة الخلفية للهاء ٨ الفتحة المقدمة للهاء واللوزة بينهما ٩ اصل اللسان وتنجب بعضه في الخط المتوسط الغلصمة ١٠ لسان المزمار الذي يعلو الفتحة القلبية للمزمار (١٠) ١١ مؤخر الحنجرة ١٢ فتحة المريء ١٣ المريء ١٤ القصة

مخاطية مغطاة بكريات عمودية

شرايين الغدة النكفية ناشئة من السباتي الظاهر وفروعه التي تنفذ من جوهرها . واوردها تتبع سير الشرايين . واورعيتها الليمفاوية تنتهي في الغدد العنقية . واعصابها ناشئة من الضفيرة السباتية للسيمباتوي ومن الوجهي والصدغي السطحي والاذني العظيم

والغدة تحت الفك واقعة اسفل الفك في مقدم المثلث تحت الفك للعنق . شكلها غير منتظم ووزنها نحو درهين . ويغطيها الجلد والعضلة الجلدية واللفافة العنقية الغائرة وجسم الفك السفلي المنخفض في وجهه الباطن لاجلها وتستقر على الضرسية الالامية واللامية اللسانية والابرية اللسانية . الى مقدمها البطن الامامي لذات البطنين . والى الخلف يفصلها عن الغدة النكفية الرباط الابري الفكي والى المقدم تفصلها العضلة الضرسية الالامية عن الغدة تحت اللسان . والشريان الوجهي مستقر في ميزاب في حافتها الخلفية والعليا

وقناة الغدة تحت الفك وهي قناة هوارتن طولها نحو قيراطين رقيقة الجدار . تبدأ بفتحة ضيقة على رأس حلة صغيرة بجانب قيد اللسان وتسير بين الغدة تحت اللسان والعضلة الذقنية الالامية اللسانية ثم الى الخلف والظاهر بين الضرسية الالامية واللامية اللسانية والذقنية الالامية اللسانية اسفل العصب الذوقي فاذا وصلت الى الغدة انقسمت الى فروع كثيرة

شرايين الغدة تحت الفك فروع من الوجهي واللساني . واوردها تتبع سير الشرايين . واعصابها من العقدة تحت الفك ومن الفرع الضرسى الالامى للسني السفلي ومن السيمباتوي

والغدة تحت اللسان اصغر الغدد اللعابية . وضعها تحت الغشاء المخاطي لارض الفم بجانب قيد اللسان ومجاورة للوجه الباطن للفك السفلي بقرب الارتفاق الذقني . شكلها لوزي ووزنها نحو درهم . مجاورتها من الاعلى للغشاء المخاطي ومن الاسفل للضرسية الالامية ومن المقدم للانخفاض العظمي الى جانب الارتفاق ومن الورااء للغدة تحت الفك ومن الباطن للذقنية الالامية اللسانية منفصلة عنها بواسطة العصب اللساني وقناة هوارتن . قنواتها من ثمان الى عشرين تصب على عرف بارز من الغشاء المخاطي مكوّن من بروز الغدة بجانب القيد اللساني . ومنها واحدة تصب في قناة هوارتن يقال لها قناة برثولين

شرايين الغدة تحت اللسان من الشريان تحت اللسان والشريان تحت الذقن . واعصابها من الذوقي

بناء الغدد اللعابية من فصوص كثيرة مؤلفة من فصيصات يتصل بعضها ببعض بواسطة

الغدد اللعابية

الغدد اللعابية الرئيسة ثلاث النكفية والغدة تحت الفك والغدة تحت اللسان. وهي مستطرفة الى تجويف الفم وتصب افرازها اليه

فالغدة النكفية اعظمها ويختلف وزنها من نصف اوقية الى اوقية. وضعها على جانب الوجه اسفل الاذن الظاهرة والى مقدمها. يجدها من الاعلى القوس الزوجي ومن الاسفل زاوية الفك وخط وهي ممتد من الزاوية المذكورة الى العضلة القصية الحليمية ومن المقدم تمتد على العضلة المضغية ومن الخلف يجدها التو الحلمي. وجهها المقدم محفور لاجل قبول الحافة الخلفية لفرع الفك السفلي ويمتد الى المقدم وراء الفرع بين العضلتين الجناحيتين. وجهها الظاهر تستقر عليه غدة ليمفاوية او ثنتان ويغطيه الجلد واللفافة. وجهها الباطن يمتد الى العنق ويغور فيه بواسطة زائدين احدهما نفوس تحت التو الحلمي والاخرى موضوعة الى مقدم التو الابري وتسير الى مؤخر الحفرة العنابية وراء المفصل الفك. والشريان السباتي الظاهر غائص في جوهرها وصاعد وراء فرع الفك. والشريان الاذني الخلفي ينفذ منها الى الورا والشريان الصدغي الى الاعلى والوجهي المستعرض الى المقدم. والشريان الفك الباطن ينعكف فيها نحو الباطن خلف عنق الفك. والى الجهة السطحية من السباتي الظاهر جذع مكوّن من اتحاد الوريد الصدغي بالوريد الفك الباطن يصب في الوريد الوداجي الباطن الذي يخترق الغدة. ويخترقها ايضا من الخلف الى الامام العصب الوجهي وفروعه فينفذ من حافتها المقدمة. وكذلك العصب الاذني العظيم الذي يتحد بالوجهي. والشريان السباتي الباطن والوريد الوداجي الباطن واقعان بقرب وجهها الباطن

وقناة الغدة النكفية ويقال لها قناة ستينو طولها نحو قيراطين ونصف تبدأ على الوجه الباطن للحد بفتحة صغيرة واقعة مقابل الضرس الكبير الثاني للفك العلوي وتسير اولاً مسافة قصيرة تحت الغشاء المخاطي ثم تنقب العضلة المبوقة وتقاطع العضلة المضغية الى الحافة المقدمة للغدة فاذا دخلت الى جوهرها تفرعت الى فروع كثيرة. واتجاه القناة المذكورة يقابل خطأً وهماً مقاطعاً للوجه اسفل القوس الزوجي بنحو عرض الاصبع ممتداً من الجزء السفلي للصدفة الى نقطة متوسطة بين الحافة السائبة للشفة العليا وجناح الانف. وبينما تقاطع العضلة المضغية تصب فيها قناة خاصة بجزء منفصل من الغدة النكفية واقع اسفل القوس الزوجي يقال له الرفيقة النكفية. والقناة المذكورة سمكة الجدار وقطرها نحو الريشة الصغيرة وهي مولفة من طبقة ظاهرة ليفية وطبقة باطنة

سقف الفم وعليه في الخط المتوسط حرف بارز. وجهها الخلفي محذب ممتد من الغشاء المخاطي الذي يغطي ارض الحفرتين الانفيتين الخلفيتين. حافتها العليا متصلة بالحافة الخلفية للحنك الصلب وحافتها السفلى سائبة وجانباها مختلطان بالبلعوم

والغليصة زائدة لحمية مخروطية الشكل مدلاة من منتصف الحافة السفلى للهاة. والى كل من جانبي الغليصة قوسان مؤلفان من ثنية من الغشاء المخاطي تتضمن اليافاً عضلية. والقوسان احدهما مقدم والاخر خلفي يقال لهما القائمتان. فالقائمة المقدمة سائرة الى الاسفل والمقدم الى جانب قاعدة اللسان ومكوّنة من بروز العضلة اللهوية اللسانية التي يغطيها الغشاء المخاطي. والقائمتان الخلفيتان اكبر واكثر تقارباً من المقدمتين. سير القائمة منها الى الاسفل والخلف الى جانب البلعوم وهي مكوّنة من بروز العضلة اللهوية البلعومية. ويفصل القائمة المقدمة عن الخلفية خلافاً مثلث تستقر فيه اللوزة. وبرزخ الحلقوم هو الخلاء الواقع بين القوائم تحده من الاعلى الحافة السائبة للهاة ومن الاسفل اللسان ومن كل من الجانبين القائمتان اللويتان اي المقدمة والخلفية واللوزة. والغشاء المخاطي للهاة رقيق ومغطى على وجهيه بكريات قشرية الا عند فتحة قناة اوستاكيوس فانها هناك عمودية هديبة. وفيه غدد كثيرة لهوية. والصفاق اللهوي طبقة رقيقة ليفية متصلة من الاعلى بالحنك الصلب ومختلطة بوتر الشادة للهاة. والعضلات اللهوية خمس من كل جانب وهي الرافعة للهاة والشادة لها واللهوية اللسانية واللهوية البلعومية والغليصية وقد سبق الكلام عليها في باب العضلات


واللوزتان غدتان موضوعتان الى جانبي الحلقوم بين القائمة المقدمة والخلفية للهاة. شكل اللوزة مستدير ويختلف حجمها بحسب اختلاف الأشخاص. وجهها الوحشي مجاور للوجه الانسي للعاصرة العليا وللشريان السباتي الباطن والبلعومي الصاعد ووضعها مقابل زاوية الفك السفلي. وجهها الانسي عليه من اثني عشرة فتحة الى خمس عشرة مستطرفة الى خلايا صغيرة تتصل بها اجربة كثيرة متفرعة في جوهر الغدة. والاجربة المذكورة مبطنة بامتداد من الغشاء المخاطي البلعومي ومغطاة بكريات سطحية تفرز سائلاً لزجاً سنجابياً. والشرايين التي تنوزع في اللوزة فروع من اللساني الظهري اللساني واللهوي الصاعد واللوزي من الوجي والبلعومي الصاعد من السباتي الظاهر واللهوي النازل من الفكي الباطن. واوردها تنصب في الضفيرة اللوزية الموضوعية في الجانب الوحشي للوزة. واعصابها ناشئة من الخامس واللساني البلعومي

الْحَنَكُ

الحنك عبارة عن سقف الفم وهو مؤلف من جزئين الحنك الصلب الى المقدم والحنك الرخو وهو اللهاة الى الوراء

فالحنك الصلب مجده من المقدم والجانبين القوس السنخي واللثة ومن الورا مخنلط باللهاة . وهو مغطى ببناء كثيف مكون من التصاق السمحاق بالغشاء المخاطي . وعليه في الخط المتوسط قيد بارز ينتهي في المقدم بحلمة صغيرة واقعة عند الفتح السفلى للقناة الحنكية المقدمة . والحلمة المذكورة تقبل خيوطاً من العصب الانفي الحنكي والعصب الحنكي المقدم . والغشاء المخاطي سيك باهت اللون مجمد في المقدم ورقيق املس احمر في الورا . وهو مغطى بكربات قشرية وفيه غدد كثيرة صغيرة هي الغدد الحنكية الواقعة بين الغشاء المخاطي والعظم

واللهاة وهي الحنك الرخو شفة متحركة مدلاة من الحافة الخلفية للحنك الصلب ومكونة حازراً غير كامل بين الفم والبلعوم . تاليها من ثنية من الغشاء المخاطي تتضمن اليافاً عضلية وصفاقاً



واوعية واعصاباً وغدداً مخاطية . وهي مدلاة في حالتها الطبيعية ووجهها المقدم مقعر ممتد من

شكل ٢٧٢ قطع عمودي في الخط المتوسط للانف والفم والبلعوم والخجيرة « الفاصل الانفي واسفله قطع الحنك الصلب « اللسان
c قطع الشفة المدلاة للهاة « d والشفان « العنصبة « القائمة المقدمة للهاة « القائمة الخلفية للهاة « اللوزة الموضوعة بين
القائمتين المذكورتين « البلعوم « العظم اللامي « العضروف الدرقي « العضروف الخلفي « لسان الزمار « الزمار
٢ برزخ الحلقوم الموضوع الى مقدم الرق « الفخمة العليا للخجيرة « مسلك البلعوم الى المريء « ٦ منتهي قناة اوستاكيوس

الآنما تبقى مخفية في جراب خاص بها الى زمن بروزها. ثم تاخذ الاكياس السنية والحلمات في النمو والتحول شيئاً فشيئاً الى ان تصير الاكياس جوهرًا عظمياً والحلمات جوهرًا لبياً. واول ما يتكون من ابنية السن العظمي العاج ثم تعقبه المينا ثم القشرة
 واما بروز الاسنان من اللثة فلا يتم الا عند التعظم الكافي فيها لاحتمال الضغط الذي يحدث عليها بعد خروجها. وطريقة ذلك ان نمو الجذر في الاسفل يدفع التاج الى الاعلى فتضغط اللثة وتخلل الى ان يبرز السن. ويبدأ بروز الاسنان اللبنية نحو الشهر السابع بعد الولادة ويتم نحو نهاية السنة الثانية. واسنان الفك السفلي تسبق الاسنان العليا
 واما الازمنة التي تبرز فيها الاسنان اللبنية فهي:

في الشهر السابع: القواطع المركزية	من الشهر الرابع عشر الى العشرين: الانياب
من الشهر السابع الى العاشر: القواطع الجانبية	من الشهر الثامن عشر الى السادس والثلاثين:
من الشهر الثاني عشر الى الرابع عشر: الاضراس الخلفية	
الاضراس المقدمة	

ويبدأ تعظم الاسنان الدائمة قبل الولادة بقليل وفي الفك العلوي قبل السفلي شكل ٢٧١
 ولا يتكامل تعظمها الا عند بروزها من اللثة. وكيفية ذلك ان الحواجز العظمية التي تفصل اكياسها عن الاسنان الزمنية تمتص ثم تخلل جذور الاسنان الزمنية وتدفع الاسنان الدائمة الى الخلاء الذي كانت تشغله الجذور المذكورة فتصير اسفل التيجان السائبة. ثم تنفصل التيجان المذكورة ويبرز مكانها تيجان الاسنان الدائمة
 واما بروز الاسنان الدائمة من اللثة فالسفل منها تسبق العليا بقليل. وهذه ازمته بروزها:


في السنة السادسة ونصف الاضراس الاولى الكبيرة	من الحادية عشرة الى الثانية عشرة: الانياب
في السابعة: القواطع المركزية	من الثانية عشرة الى الثالثة عشرة: الاضراس الكبيرة الثانية
في الثامنة: القواطع الجانبية	من السابعة عشرة الى الحادية والعشرين:
في التاسعة: الاضراس الاولى الصغيرة	اضراس العقل
في العاشرة: الاضراس الصغيرة الثانية	



والقشرة طبقة رقيقة موضوعة على ظاهر الجذر من منتهى المينا الى راس الجذر حيث نصير سميكة غالباً. وهي شبيهة في البناء والتركيب الكيماوي بالعظم. والطبقة المذكورة تسك مع تقدم السن فتنشأ منها الزوائد العظمية التي تشاهد في اسنان الشيوخ ويصاحب ذلك تجهد اللب واستمالاته الى جوهر متوسط الكيفية بين العاج والعظم

تولد الاسنان ونموها

بحسب مشاهدات المعلم ارنولد والمعلم كودسر نتولد الاسنان من الغشاء المخاطي الذي يغطي حافة القوسين الفكين. ففي الاسبوع السادس من الحيوة الجنينية يظهر في النشاء المذكور للفك العلوي ميزاب هلالي الشكل نتولد من ارضه الاصول النامية للاب الاسنان اللبنة على هيئة حلقات مخروطية بارزة من الغشاء المخاطي ويتبع ذلك هلال اخر للفك السفلي. هذا هو الدور



الاول لتولد الاسنان ويقال له الحلي. ثم يتحول الميزاب الهلالي الى اجربة لقبول الحملات فتصير الاجربة المذكورة اسنخاً يبرز من قعر كل واحد منها تنمو من الغشاء المخاطي هو الاصل النامي للسن العظمي. ويتم ذلك نحو الاسبوع الرابع عشر ويقال له الدور الجراي. ثم نحو الاسبوع الثالث عشر تنمو الاجربة وتحيط بالحملات فتتحول الاجربة الى اكياس سنية والحملات الى لب سني. ويتم ذلك عند منتهى الاسبوع الخامس عشر وهو الدور الثالث من تولد الاسنان ويقال له الكيسي. ثم يتكون في جزء اخر من الميزاب الاصول النامية للاسنان العشرة المقدمة الائمة

شكل ٢٧٠ تكوين السن من زمن تولده الى صيرورتها سنًا زمنيًا ثم دائماً من *a* الى *d* الدور الحلي. ومن *c* الى *g* الدور الجراي. ومن *h* الى *m* الدور الكيسي. ومن *n* الى *o* دور البروز. ومن *p* الى *t* دور التبديل وهو سقوط الاسنان الزمنية وصعود الدائمة مكانها


الكلام عليها من جهة زمن ظهورها وسقوطها

بناء الاسنان

إذا قُطِع سن قطعاً عمودياً شوهد في باطنه تجويف واقع عند قاعدة التاج ومختلط بقناة تخترق الجذر ولها فتحة دقيقة عند طرفها السفلي. والتجويف المذكور فيه بعض مشابهة لشكل السن الواقع هو فيه ويتضمن مادة رخوة كثيرة الاوعية حساسة هي اللب السني. والوعية والاعصاب تدخل التجويف من ثقب في راس الجذر

واما الجزء الصلب من السن فهو مؤلف من ثلاثة ابنية. الابل العاج الذي يتكوّن منه معظم السن. والثاني المينا التي تغطي التاج البارز اعلى اللثة. والثالث القشرة وهي طبقة رقيقة تغطي وجه الجذر

فالعاج يكوّن معظم الكتلة السنية وفي مركزه التجويف المحيط باللب. وهو نوع من النسيج العظمي الا انه يختلف عنه في البناء والتركيب الكيماوي. بناؤه المكربسكوي من قنيات دقيقة جداً قطر الواحدة منها نحو $\frac{1}{400}$ من الفيراط مختلفة الوضع فالعليا منها عمودية والتي تحاذي العنق وريية والتي في اسفل الجذر منحرفة نحو الاسفل وتخلل القنيات المذكورة مادة نصف شفافة حبية متضمنة معظم الجزء الترابي للعاج. التركيب الكيماوي للعاج على ما حلّله برزيلوس ويبرا مؤلف من ٢٨ جزءاً من المادة الحيوانية و٧٢ جزءاً من المادة الترابية. فالمادة الحيوانية مؤلفة من جلاتين والترابية من فوسفات الكلس و كربوناته وفوسفات المغنيسيا وغيرها والمينا اشد اجزاء السن صلابة وكثافة وتكوّن طبقة رقيقة مغشّية




للموجه الظاهري المكشوف من التاج الى بداية الجذر. وهي سميكة في الوجه العلوي للتاج الى انما تنفي بواسطة السني. بناؤها المكربسكوي من عصي دقيقة مسدسة الجوانب متوازية الوضع على شكل ان طرفها الواحد مستقر على العاج وطرفها الاخر يكوّن الوجه السائب للتاج. قطر الواحدة منها نحو $\frac{1}{400}$. تركيبها الكيماوي بحسب تحليل المعلم يبرا من ٩٦٢٥ مادة ترابية و٢٤٥ مادة حيوانية

شكل ٢٦٩ قطع عمودي للضرس بحيث تظهر الابنية المولف هو منها ١ المينا ٢ و٣ القشرة المغشية لظاهر الجذر ٤ العاج واتشاهد قنياته الدقيقة ٤ ثقب القناة النافذة من اصل الجذر الى التجويف السني ٥ التجويف السني ٦ بعض كريات عظمية موضوعة في العاج اسفل المينا

لكل فك ثلاثة منها وراء كل من الاضراس الصغيرة الخلفية. تاجها يقرب من المكعب وجهه الجانبيان مستديران وهو مسطح من الامام الى الخلف. وجهه العلوي تعلقه اربع او خمس حدبات منفصلة بواسطة تقعر صليبي وهو في غاية ما يكون من الموافقة نظراً الى اتساع سطحه لسحق وطحن الطعام. عنقها كبير مستدير واضح. وجذرها منقسم الى شعب من اثنتين الى خمس في راس كل شعبة ثقب. الضرس الاول اكبرها واوسعها جميعاً وتواجه في الغالب خمس حدبات ثلاث الى الظاهر واثنان الى الباطن. وجذره في الفك العلوي مؤلف من ثلاث شعبات متباعدة ثتان منها الى الظاهر والثالثة الى الباطن وهي اكبرها واطولها وقد تكون مفروضة. وجذره في الفك السفلي مؤلف من شعبتين احدها الى المتدم والثانية الى الخلف. والضرس الثاني اصغر قليلاً من الاول وتواجه اربع حدبات في الفك العلوي وخمس في السفلي. ولجذره ثلاث شعبات في العلوي وثنان في السفلي. والضرس الثالث يسمى ضرس العقل لتاخر ظهوره من اللثة وهو اصغر من السابقين ومثوره متجه الى الباطن. تاجه مستدير صغير له ثلاث حدبات. جذره مفرد في الغالب قصير منحني قليلاً وعليه اثر انقسام الى ثلاث شعب في العلوي ومنها وشعبتين في السفلي

الاسنان الزمنية


الاسنان الزمنية ويقال لها اللبنة ايضاً اصغر من الدائمة ولكنها شبيهة الشكل بها. الضرس



الاخير منها اكبرها. الضرس الكبير الاول العلوي له ثلاث حدبات فقط والثاني العلوي له اربع. والضرس الكبير الاول السفلي له اربع حدبات والثاني السفلي له خمس. وجذور الاضراس الكبيرة الزمنية اصغر واكثر تباعداً من جذور الاضراس الدائمة وهي شبيهة بها فيما بقي. وسياتي

شكل ٢٦٨ الاسنان الزمنية لجانب الابر من الاعلى والاسفل a الفاطح المركزي b الفاطح الجانبي c اللثاب d الضرس الاول الكبير e الضرس الثاني الكبير. وتختلف هذه الاضراس الكبيرة عند سقوطها اضراس صغيرة لكل منها حدبتان فقط

المركزيان منها أكبر من الناطعين الجانبيين وحوافهما السائبة حادة كالإزميل . وقواطع الفك السفلي اصغر من العليا والمركزيان اصغر من الجانبيين



شكل ٢٦٧

والانياب اربعة اثنان للفك العلوي واثنان للسفلي واحد لكل جانب موضوع وراء الناطع الجانبي . وهي أكبر واقوى من القواطع ولا سيما جذرها فانه يغور في الفك ويكون بروزاً ظاهراً على وجهه . تاجها كبير مخروطي الشكل كثير التحذب في المقدم محفور قليلاً في الخلف له راس مستدق يرتفع على مساحة بقية الاسنان . والجذر مفرد اطول واغظ من جذر القواطع مخروطي الشكل منضغط الجانبيين . النابان العلويان أكبر واطول من السفليين وموضوعان الى الخلف منها قليلاً والسفليان موضوعان الى مقدم العلويين بحيث يكون راس الواحد منهما مقابل الخلاء الواقع بين الناب العلوي والقاطع المجاور له

والاضراس الصغيرة ويقال لها ذوات الحدبتين ثمانية اربعة لكل فك اثنان خلف كل ناب . وهي اصغر واقصر من الانياب . تاجها منضغط من الظاهر الى الباطن تعلوه حدبتان هرميتان يفصلهما ميزاب ولذلك تُسمى هذه الاضراس احياناً ذوات الحدبتين . عنقها بيضي وجذرها في الغالب مفرد ومفروض الراس . الاضراس العليا منها أكبر من السفلي وجذرها اشد ميلاً لانقسامه الى شعبتين

والاضراس الكبيرة ويقال لها ايضاً كثيرة الحدبات أكبر الاسنان الدائمة . وهي اثنا عشر ستة

شكل ٢٦٧ الاسنان الدائمة للجانبي الايسر من الاعلى والسفلي ١ الناطع المركزي ٢ الناطع الجانبي ٣ الناب ٤ الضرس الاول ذوات الحدبتين ٥ الضرس الثاني ذوات الحدبتين ٦ الضرس الاول الكبير ٧ الضرس الثاني الكبير ٨ الضرس الثالث الكبير وهو ضرس العقل او الحكمة

المبطن للخد مختلط بالغشاء المبطن للشفيتين المنعكس من الجلد الى المقدم وبالغشاء المبطن للهاة من الوراثة. وفيه حلقة مقابل الضرس الثاني الثلاثي الحدبات للفك العلوي على قمتها فتحة دقيقة مستطرفة الى قناة الغدة النكفية. والعضلة الرئيسة الداخلة في تكوين الخد المبوقه وما عداها الزوجيتان والمضغية والجلدية. والغدد الفهية موضوعة بين الغشاء المخاطي والعضلة المبوقه وهي شبيهة البناء بالغدد الشفوية الا انها اصغر. منها اثنتان او ثلاث كبيرة موضوعة بين العضلة المضغية والمبوقه تنفتح قنواتها الى الفم مقابل الضرس الاخير يقال لها الغدد الضرسية والثنتان مولفتان من نسج ليفي كثيف ملتصق التصاقاً شديداً بسحق التو السنخي ومحيط باعناق الاسنان. والنسج المذكور مغطى بغشاء املس وعائي مناطي قليل الحس. وحول اعناق الاسنان يشاهد في هذا الغشاء حلقات كثيرة دقيقة. ومن هناك ينعكس الى الاسناخ حيث يختلط بالسحق المبطن لها

الاسنان

الاسنان في الانسان على نوعين الاول الاسنان الزمنية او اللبئية التي تظهر مدة الطفولية ثم تسقط وعددها عشرون اربعة قواطع ونابان واربعة اضراس لكل فك. والثاني الاسنان الدائمة التي تظهر عند سقوط الاسنان الزمنية وتدوم الى الشيخوخة وعددها اثنتان وثلاثون. لكل فك اربعة قواطع منها اثنتان مركزيان واثنتان جانبيان ونابان واربعة اضراس صغيرة وستة اضراس كبيرة

والصفات العامة لها ان لكل منها ثلاثة اجزاء اولها التاج ويقال له الجسم ايضاً وهو ما كان بارزاً اعلى اللثة. الثاني الجذر وهو الجزء الواقع ضمن السنخ. والثالث العنق وهو الجزء المختلق الواقع بينها. واما الاسناخ فحفر مبطنه بسحق ينعكس على الجذر ويغطيه الى العنق. وعند الحافة السائبة للسنخ يختلط بالسحق بالبناء الليفي الذي للثة

الاسنان الدائمة

اما القواطع منها فثمانية وهي الاسنان الاربعة المقدمة لكل فك. تاجها متجه اتجاهاً عمودياً وهو اسنيني الشكل وجهه الخلفي محفور بحيث ينتهي بمنافه افقية حادة قاطعة لاجل قطع الطعام قبل سحقه. وهو محدد باملس لامع من المقدم محفور قليلاً من الخلف. عنقها جزء ضيق واقع بين التاج والجذر. وجذرها طويل مفرد مخروطي الشكل مسطح عرضاً ومحفور قليلاً من كل جانب طولاً. ثم ان قواطع الفك العلوي اكبر واقوى من القواطع السفلى ومتجهة الى الاسفل والمقدم. والناطعان


الاعضاء الاضافية لها

الأسنان	} الغدة النكفية } الغدة تحت الفك } الغدة تحت اللسان	الأكبد
العدد اللعابية		البنكرياس
		الطحال

الفم

وضع الفم في بداية القناة الهضمية وهو تحويف يقرب من الشكل البيضي يتم فيه مضغ الطعام. تحدّه من الامام الشفتان. ومن الجانبين الخدان والتوات السنخية للفكين العلوي والسفلي. ومن الاعلى الحنك الصلب واسنان الفك العلوي. ومن الاسفل اللسان والغشاء المخاطي الممتد بين وجهه السفلي والوجه الباطن للفك السفلي واسنان الفك السفلي. ومن الخلف المهارة وهي الحنك الرخو والحلقوم الشفتان ثنيتان لحميتان محيطتان بفتحة الفم مولفتان في الظاهر من الجلد وفي الباطن من غشاء مخاطي وبينهما العضلة المحيطة الشفوية والشريانات الاكيليان واعصاب ودهن وغدد كثيرة صغيرة شفوية. ويرتبط الوجه الباطن للشفة عند الخط المتوسط بالثة بواسطة ثنية من الغشاء المخاطي فيتكوّن من ذلك القيدان الشفويان العلوي

شكل ٢٦٦



والسفلي. والغدد الشفوية المذكورة موضوعة بين الغشاء المخاطي والعضلة المحيطة الشفوية حول فتحة الفم اكبرها لا يتجاوز نصف الفولة. وهي شبيهة البناء بالعدد اللعابية وتصب قنواتها على الوجه الظاهر للغشاء المخاطي

والخدان يكوّنان جانبي الوجه ويختلطان بالشفتين الى المقدم. تاليهما من الظاهر من الجلد ومن الباطن من الغشاء المخاطي وبين الطبقتين طبقة عضلية ما عدا كمية وافرة من المواد الدهنية ونسيج خلوي واوعية واعصاب، وغدد فمية. والغشاء المخاطي

شكل ٢٦٦ غدة مخاطية من ارض الفم *a* غدها المكوّن من نسيج خلوي *b* قناتها النافذة *c* و *c* خلاياها الغدية *d* فتاة من القنوات الخاصة بانصبصات التي تتألف منها الغدة. وهذا الرسم مكبّر. ه. قطراً

الفصل التاسع

في الاحشاء

الاحشاء اعضاء تتعلق بوظائفها حيوة الحيوان ودوام النوع وهي موضوعة غالباً في تجاويف عظمية وقد تكون خارجة عنها. وتنقسم الى جملة مجاميع تبعاً لوظائفها. والاقسام المذكورة هي اعضاء الهضم وتوابعها والعضو الرئيسي للدورة الدموية واعضاء الصوت والتنفس واعضاء الافراز البولي واعضاء التناسل في الذكور والاناث. فلنشرح في الكلام عليها بالتفصيل

اعضاء الهضم وتوابعها

الجهاز الهضمي مؤلف من القناة الهضمية واعضاء اخرى اضافية لها. فالقناة الهضمية قناة عضلية غشائية طولها نحو ثلاثين قدماً ممتدة من الفم الى الاست ومبطنة بغشاء مخاطي. وتنقسم مدة سيرها الى اقسام مختلفة لكل قسم منها وظيفة خاصة به تتعلق بالعمل الهضمي. ففي الفم يَضَع الطعام اي انه يُجَزَّى ويمزج بالافراز اللعابي بحيث يصير صالحاً للازدرداد. والبلعوم والمريء اللتان للازدرداد وايصال الطعام الى المعدة. والمعدة محل الهضم الاول والامعاء الدقيقة محل الهضم الثاني وامتصاص الكيلوس والامعاء الغليظة تفتن المواد الثقيلة التي تُبرَز الى الخارج من الاست


القناة الهضمية

الاثنا عشري	}	المعا الدقيق	الفم
الصائم			
اللفائفي	}	المعا الغليظ	البلعوم
الاعور			المريء
القولون	}	المعا الغليظ	المعدة
المستقيم			

جوهر التيه الغشائي. وأوردة الدهليز والقنوات الهلالية تقبل أوردة القوقعة عند قاعدة العمود
وتصب في الجيب الحجري العلوي

والعصب السهعي خاص بحاسة السمع ينقسم عند قعر القناة السمعية الباطنة الى فرعين
الدهليزي والقوقي. فالدهليزي ينقسم الى ثلاثة فروع علوي ومتوسط وسفلي. فالعلوي يدخل
الدهليز ويتوزع في الجراب وفي انتفاخ القناتين الهلالتين الظاهرة والعليا. والمتوسط يتوزع في
الكيس. والسفلي يتوزع في انتفاخ القناة الهلالية الخلفية. والقوقي ينقسم الى خيوط كثيرة عند
قاعدة العمود تصعد من قنياته الخاصة به ثم تنعكف على زوايا حادة وتربين ورقتي الصفيحة
اللولبية فتكون هناك صغيرة. وتنشأ من الصغيرة المذكورة فروع تتوزع في المنطقة الغشائية على
هيئة حزم صغيرة مخروطية الشكل متوازية الوضع. واما الخيوط التي تتوزع في راس الصفيحة
اللولبية فيتصل اليه بواسطة القناة المركزية للعمود

والقنوات الهلالية الغشائية كالعظمية في الشكل والعدد الا ان قطرها نحو ثلث قطر القنوات



شكل ٢٦٥

العظمية . وهي مجوفة مستطرفة الى الجراب بخمس فتحات ولها انتفاخات كالقنوات العظمية .
ويثبتّ التيه الغشائي في موقعه بواسطة المحيوط الكثيرة العصبية التي تنفذ الى الدهليز بواسطة
الثقوب الدقيقة الكائنة في جداره الباطن وتوزع في الجراب والكيس والانتفاخات
بناؤه . جدار التيه الغشائي نصف شفاف ومؤلّف من ثلاث طبقات . فالظاهرة نسيج رخو يتضمن
اوعية دموية وكرّيات ملوّنة . والمتوسطة اغلظ من سابقتها واكثر شفافية وهي شبيهة بالغشاء
المهيايني . والباطنة مؤلّفة من كريات سطحية نووية كثيرة الجوانب تفرز الليمفا الباطنة ه
والليمفا الباطنة سائل مصلي صافٍ مالىء للتيه الغشائي شبيه التركيب بالليمفا الظاهرة
والجدران الاذنيان جسمان صغيران مستديران مؤلفان من كربونات الكلس المتبلور وواقعان
في جدار الجراب والكيس مقابل توزع الاعصاب

شرايين التيه الاذني الباطن من القاعدي او المخيني العلوي والابري الحلي من الاذني الخلفي
واحياناً بعض فروع من المؤخري . اما الشريان الاذني الباطن فينتسم عند قعر القناة السمعية
الباطنة الى فرعين هما القوعي والدهليزي . فالقوعي يتفرع الى فروع تسير في قنيات العمود
وتتوزع في جوهر الصفيحة اللولبية . والفروع الدهليزية تتشعب على هيئة شبكة شعرية تتوزع في

شكل ٢٦٥ تيه الاذن اليسرى بحيث تظهر تجاوبه والتيه الغشائي ١ تجويف الدهليز ٢ انتفاخ القناة الهلالية العليا وفيه
فتحة من العصب الدهليزي (٣) ٤ القناة الهلالية العليا وفيها القناة الغشائية ٥ انتفاخ القناة الظاهرة الهلالية وفيه فتحة من
العصب الدهليزي ٦ منتهي القناة الغشائية الظاهرة في الجراب الدهليزي ٧ انتفاخ القناة الخلفية وفيه فتحة من العصب الدهليزي
٨ القناة الخلفية الهلالية ٩ القناة المشتركة بين القناتين الهلالتين العليا والخلفية ١٠ القناة الغشائية المشتركة منتهي في الجراب
دهليزي ١١ الجراب الاذني الواقع في الجراب ١٢ الكيس الدهليزي . ويشاهد جدره الاذني وان لكل من الجرابين فرعاً عصبياً
من العصب الدهليزي ١٣ الدور الاول للقوقعة . والرقم يشير الى السلم الطبلي ١٤ طرف السلم الطبلي وهو الكوة المستديرة
١٥ الصفيحة اللولبية وقد وضع الرقم في السلم الدهليزي ١٦ فتحة السلم الدهليزي المستطرفة الى الدهليز ١٧ الدور الثاني للقوقعة
وقد وضع الرقم على الصفيحة اللولبية ١٨ نصف الدور الاخير للقوقعة وقد وضع الرقم في السلم الطبلي ١٩ منتهي الصفيحة اللولبية
٢٠ النمع

فتحتها الظاهرة على الوجه السفلي للعظم الحجري يمر منها ويريد صغير
ثم ان باطن القناة اللولبية منقسم الى مسلكين يقال لها السلمان بواسطة صفيحة رقيقة بعضها
عظمي وبعضها غشائي تدور حول العمود. والصفيحة المذكورة هي الجزء الجوهري من القوقعة لان
الخيوط العصبية متوزعة عليها ويقال لها الصفيحة اللولبية. فالجزء العظمي منها يمتد الى نحو نصف
قطر القناة اللولبية ويقال له المنطقة العظمية يبدأ من الدهليز وينتهي بتوكلاي عند انبساط
القمع. والصفيحة المذكورة مؤلفة من ورقتين عظمتين رقيقتين تربط بينهما خيوط عصبية. وتدوم
المنطقة العظمية الى الجانب المقابل من القناة بواسطة طبقة غشائية هي المنطقة الغشائية فيتم
بذلك فصل القناة اللولبية الى مسلكين يقال لها السلمان. احدهما السلم الطبلي المسدود في
الاسفل بواسطة غشاء الكوة المستديرة والثاني السلم الدهليزي المستطرق الى الدهليز بواسطة
فتحة بيضية الشكل. ويستطرق السلم الواحد الى الاخر بواسطة فتحة مشتركة بينهما عند راس
القوقعة. بناء المنطقة الغشائية من صفيحة زجاجية شفافة يشاهد في مركزها خطوط مستعرضة
مشععة نحو الظاهر. والوجه الدهليزي للمنطقة العظمية مغطى بطبقة رقيقة غضروفية مسننة تمتد
الى نحو خمس مساحته الى الظاهر
والوجه الباطن للتيه العظمي مبطن بغشاء رقيق جداً هو بمنزلة السمحاق باعتبار التصاقه بالوجه
الباطن المذكور وبمنزلة غشاء مصلي من وجهه الاخر السائب لانه يفرز سائلاً رقيقاً صافياً يقال
له الليهنا الظاهرة

التيه الغشائي


التيه الغشائي زق غشائي مسدود يتضمن سائلاً هو الليهنا الباطنة. وتوزع على جدار الزق
المذكور الفروع الانتهازية للعصب السمعي. ولما كان وضعه في الدهليز والفنوات الهلالية كان
شكله العام تابعاً لها ولكنه اصغر حجماً ومنفصل عنها بواسطة الليهنا الظاهرة
جزؤه الدهليزي مؤلف من زقين يقال لاحدهما الجراب والاخر الكيس. فالجراب اكبرهما
مستطيل الشكل شاغل للجزء العلوي والمؤخر من الدهليز فيلاص الحفرة البيضية النصف.
وتوزع على جداره خيوط كثيرة من العصب السمعي. وتجويفه الباطني مستطرق الى الفنوات
الهلالية بواسطة خمس فتحات. والكيس اصغر من الجراب كروي الشكل مستقر في الحفرة الكروية
النصف بقرب فتحة السلم الدهليزي للقوقعة. تاتي خيوط كثيرة عصبية من الحفرة المذكورة.
ويظهر ان تجويفه متميز عن تجويف الجراب

متجهة نحو المُوخِر الى الوجه الخلفي للعظم الحجري. وهي اطول القنوات الثلاث. طرفها المنتفخ يبدأ عند الجزء السفلي والخلفي للدهليز وطرفها الاخر له فتحة مشتركة بينه وبين القناة الخلفية. والقناة الظاهرة افقية الوضع واقصرها. قوسها تنحى الى الظاهري الوحشية والخلف. طرفها المنتفخ موضوع اعلى الكوة البيضية وطرفها الاخر مستطرق الى الجزء العلوي والخلفي من الدهليز بفتحة خاصة به

والقوقعة شبيهة بالحلزون الاعنبيادي ويتكوّن منها الجزء المقدم للتيه. شكلها مخروطي افقية الوضع الى مقدم الدهليز. راسها تنحى الى المقدم والظاهر نحو الجزء العلوي والمقدم للجدار الباطن للطبلة. وقاعدتها مثقوبة بثقوب كثيرة لمرور الفرع الفوقي الناشئ من العصب السمعي. طولها نحو ربع قيراط وعرضها كذلك عند القاعدة. وهي مؤلفة من محور مركزي يقال له العمود وقناة تدور حول العمود على هيئة لولب دورين ونصف من القاعدة الى الراس وصفحة رقيقة مقسمة في القناة تدور معها وتقسّمها الى قسمين

فالعمود مخروطي الشكل ممتد من قاعدة القوقعة الى راسها. قاعدته واسعة يدور حولها الدور

شكل ٢٦٤



الاول للقوقعة وفيها ثقوب كثيرة تمر منها خيوط الفرع الفوقي للعصب السمعي ثم يضيق في الدور الثاني وينتهي في الدور النصفي الاخير بصفحة رقيقة منفرجة يقال لها القمع. الوجه الظاهر للعمود مكوّن من جدار القناة اللولبية وباطنه محفور بقنيات تمرّ منها خيوط عصبية الى القناة الفوقية والصفحية اللولبية ويمرّ من القنية المركزية التي تخترق العمود من قاعدته الى قمته عصب وشريان


والقناة اللولبية تدور حول العمود دورين ونصف. طولها نحو قيراط ونصف من جدارها الظاهر ثم تضيق في دورها من القاعدة الى القمة حيث تنتهي بقبة مسدودة هي راس القوقعة. وفيها ثلاث فتحات الاولى الكوة المستديرة المستطرفة الى الطبلة الا انها مسدودة بغشاء. والثانية الكوة البيضية المستطرفة الى الدهليز. والثالثة فتحة القناة القوقعية المستطرفة الى قناة قمعية الشكل

شكل ٢٦٤ قطع القوقعة قطعاً موازاً بالمحور كما في مركز العمود ١ العمود ٢ القمع الذي ينتهي فيه العمود ٢ و٢ و٢ العصب الفوقي الذي يرسل خيوطه في مركز العمود ٤ و٤ الدور الاول للسلم الطبلي ٥ و٥ الدور الاول للسلم الدهليزي. والفاصل بين ٤ و٥ هو الصفحة اللولبية. ويلاحظ ان خيطاً من العصب الفوقي ذاهب بين طبقتيها ليتوزع في غشائها ٨ عروات مكوّنة من خيوط العصب الفوقي على الصفحة اللولبية ٩ و٩ الدور الثاني للسلم الطبلي ١٠ و١٠ الدور الثاني للسلم الدهليزي ١١ نصف الدور الاخير للسلم الدهليزي ١٤ الفتحة المشتركة بين السلم الدهليزي والسلم الطبلي عند راس القوقعة

الى الطبله بواسطة الكوة البيضية والكوة المستديرة والى الباطن الى القناة السمعية الباطنة التي
تضمن العصب السمعي. وضمن التيه العظمي المذكور التيه الغشائي الذي يتوزع عليه الفروع
الانتهائية للعصب السمعي

فالدهليز تجويف مركزي استطراقي بين القنوات الهلالية والقوقعة. وضعه الى الجهة الباطنة
من التجويف الطبلي خلف القوقعة وامام القنوات الهلالية. شكله بيضي من الامام الى الخلف
منضغط الجانبين طوله نحو خمس قيراط من الامام الى الخلف. على جداره الوحشي وهو الطبلي
الكوة البيضية المسدودة بقاعدة الركابي ورباطه الخلفي. وعلى جداره الباطن الى المقدم انخفاض
صغير مستدير يقال له الحفرة الكروية النصف مثقوبة بثقوب دقيقة تمرّ منها خيوط من
العصب السمعي والى الورا من خلفها خط بارز عمودي. وفي الجزء الخلفي للجدار المذكور فتحة قناة
الدهليز وهي قناة ممتدة الى الوجه السفلي للعظم الحجري يمرّ منها وريد صغير. وعلى الجدار العلوي
وهو سقف الدهليز انخفاض يقال له الحفرة البيضية النصف منفصلة عن الحفرة الكروية النصف
بواسطة الخط العمودي البارز الذي مرّ ذكره. والى الخلف من الدهليز القنوات الهلالية
مستطرفة اليه بخمس فتحات. والى مقدمه فتحة كبيرة بيضية الشكل مستطرفة الى سلم الدهليز
الواقع في القوقعة

والقنوات الهلالية ثلاث عظمية موضوعة اعلى الدهليز وخلفه. وهي غير متساوية الطول
منضغطة الجانبين وتكون اكثر من نصف دائرة. قطرها نحو $\frac{1}{3}$ قيراط وكل منها متفتح عند
طرفه الواحد. وهذه القنوات مستطرفة الى الدهليز من اطرافها
بخمس فتحات احداها مشتركة بين طرفي قناتين. فالقناة العليا
منها عمودية الوضع بحيث يكون قوسها بروزاً مستديراً على
الوجه المقدم للعظم الحجري. طرفها الظاهر وهو المنتفخ يبدأ بفتحة
مستطرفة الى الجزء العلوي من الدهليز وطرفها الاخر غير متفتح
له فتحة مشتركة بينه وبين الجزء المقابل له من القناة الخلفية
مستطرفة الى مؤخر الدهليز. والقناة الخلفية عمودية الوضع ايضاً



شكل ٢٦٣ التيه العظمي للاذن اليسرى ١ الدهليز ٢ الكوة البيضية ٣ القناة الهلالية العليا ٤ انتفاخها ٥ اتصالها بالقناة
الخلفية ٦ القناة الهلالية الخلفية ٧ انتفاخها ٨ القناة الظاهرة او الوحشية ٩ انتفاخها ١٠ القوقعة الموضوعة الى الانسية من
الدهليز ومقدمه ١١ الكوة المستديرة وهي المدخل الى السلم الطبلي ١٢ قناة القوقعة المستطرفة من الكوة المستديرة لتدور
دورها الاول ١٣ طرف القناة وهو قمة القوقعة

اوستاكيوس ومن الفناة العظمية الواقعة هي فيها ثم تسير الى الخلف وتنتهي بوتر دقيق يندغم في يد المطرقي عند اصله

والراخية للطلبة تنشأ من التتو الشوكي للعظم الوتدي ومن الجزء الغضروفي لفناة اوستاكيوس ثم تمر الى الخلف من فرجة كلاسيروس وتندغم في عنق المطرقي

والركابية تنشأ من التجويف الذي في باطن الهرم وينفذ وترها من قمتها ثم يسير الى المقدم ويندغم في عنق الركابي. وبعضهم يقول بعضلة رابعة يقال لها الراخية الصغرى للطلبة وغيرهم يعدها رباطاً

واما اعمال العضلات المذكورة فالشادة للطلبة تجذب الغشاء الطلي الى الباطن فتشدّه. والراخية للطلبة تجذب المطرقي الى الظاهر فتدخي الغشاء الطلي. والركابية تخفض مؤخر قاعدة الركابي فتدفع مقدمة وربما ضنطت بذلك الدهليز

والغشاء المخاطي مبطن للتجويف الطلي تمتد على عظامه وعضلاته واعصابه والاخية الحليمية ساد للكوة المستديرة مخنطاً بالغشاء المبطن للباوم بواسطة قناة اوستاكيوس وهو رقيق وعائي والشرايين التي تتوزع في الطلبة خمسة وهي الفرع الطلي للفكي الباطن الذي يتوزع في الغشاء الطلي. والفرع الابري الحلمي للاذني الخلفي الذي يتوزع في مؤخر الطلبة والاخية الحليمية. والفرع الحجري للسحائي المتوسط وفرعان صغيران من البلعومي الصاعد والسباتي الباطن. واوردة الطلبة تنتهي في السحائي المتوسط والبلعومي اللذين يصبان في الوداجي الباطن

واما الاعصاب فلشادة للطلبة فرع من العقدة الاذنية وللراخية للطلبة والركابية خيط من العصب الوجي. واعصاب الغشاء المبطن ناشئة من الضفيرة الطلية. واما الفرع الطلي للساني البلعومي وهو عصب يعقوب فانه يدخل الطلبة من ثقب في ارضها ويرسل خيوطا الى الغشاء المبطن ثم ينقسم الى ثلاثة فروع تستقر في ميازيب على ظاهر الراس وهي استطراقية الى اعصاب اخر تتكون من مجموعها الضفيرة الطلية. والحبل الطلي يفارق الوجي بقرب الثقب الابري الحلمي ويدخل الطلبة عند قاعدة الهرم

الاذن الباطنة

الاذن الباطنة هي الجزء الجوهري من العضو السمي لان فيها تتوزع الفروع الانتهائية للعصب السمي. ويقال لها التيه نظراً الى تشوش استطراقاتها. وهي مؤلفة من ثلاثة اجزاء الدهليز والفنوات الهلالية والتوقعة ومكونة من تجاويف محفورة في العظم الحجري تستطرق الى الظاهر

عظيات الطبلية

نطاق التجويف الطبلي سلسلة عظام متحركة . والعظام المذكورة ثلاثة المطرقي والسندانى والركابى . فيرتبط المطرقي بالغشاء الطبلي والركابى بالكوة البيضية . واما السندانى فتوسط بينهما ويتصل بهما اتصالاً مفصلياً . وفائدة السلسلة المذكورة حمل التموجات الهوائية من الغشاء الطبلي الى الاذن الباطنة

فالمطرقي له راس وعنق ويد وتودقيق وتوقصير . فالراس هو الطرف العظيم العلوي للعظم بيضي الشكل يتصل من الخلف اتصالاً مفصلياً بالسندانى سائب في ما بقى . والعنق جزء مخنق واقع اسفل الراس . والى الاسفل منه بروز يتعلق به النتوان . واليد قطعة عمودية تتصل من حافتها الوحشية بالغشاء الطبلي وهي منحنية قليلاً نحو المقدم ومسطحة . والنتو الدقيق نتو طويل دقيق جداً يمتد من البروز الذي اسفل العنق الى المقدم والوحشية فيدخل فرجة كلاسير بوس ويرتبط بها . وتندغم به الراحية للطبلية . والنتو القصير بروز دقيق مخروطي الشكل ناتئ من اصل اليد وملامس للغشاء الطبلي وتندغم بقمته الشادة للطبلية

والسندانى شبيه بسندان الحداد ويشبه ايضاً ضرباً ذا حدين وجذرين متباعدين . وهو مؤلف من جسم وتوين . فالجسم مربع الجوانب منضغط قمته مقعرة تتصل اتصالاً مفصلياً بالمطرقي . والنتو القصير يبرز افقياً الى الخلف ويتصل بحافة الفتحة المستطرفة الى الاخلية الحليمية . والنتو الطويل اطول وادق من سابقه ينزل عمودياً وراء يد المطرقي ثم ينعكف الى الانسية وينتهي براس كروي يتصل اتصالاً مفصلياً براس الركابى . والراس الكروي المذكور يسمى بالعظم العدسي عند بعض المشرحين

والركابى شبيه بالركاب الا فرنجي ومؤلف من راس وعنق وفرعين وقاعدة . فالراس عليه تقعر يتصل اتصالاً مفصلياً براس النتو الطويل للسندانى وهو العدسي . والعنق جزء مخنق دون الراس تندغم به العضلة الركابية . والفرعان ينفرجان من العنق ويتصلان عند طرفيهما بصفيحة مسطحة بيضية الشكل هي القاعدة التي ترتبط بحافة الكوة البيضية . ولكل من العظيات الثلاث رباط دقيق يربطها بالجزء المجاور لها

وعضلات الطبلية ثلاث وهي الشادة للطبلية والراحية لها والركابية فالشادة للطبلية اعظمها واقعة في قناة عظمية اعلى الجزء العظمي لقناة اوستاكبوس ومنفصلة عنها بواسطة النتو القوسي . تنشأ من الوجه السفلي للعظم الحجري ومن الجزء الغضروفي لقناة


موضوع خلف الكوة البيضية وهو اجوف يتضمن العضلة الركابية التي وترها ينفذ من راس الهرم. وتجويف الهرم مستطرق الى قناة فلوبيوس بواسطة قنية دقيقة. والبروز المستد برلقناة فلوبيوس واقع بين الكوة البيضية وستف الطلبة ويتضمن جزءاً من الام الجافية والجدار الخلفي للطلبة يشاهد فيه ثقب واحد كبير وجملة ثقب صغيرة مستطرقه الى تجاويف واسعة غير منتظمة واقعة في باطن التتو الحلمي للعظم الصدغي يقال لها الخلايا الحلمية وهي مبطنة بامتداد من الغشاء المخاطي الذي يبطن التجويف الطبلي والجدار المقدم للطلبة واقع الى الورا من القناة السباتية ومنفصل عنها بصفيحة رقيقة عظمية ويشاهد فيه اولاً قناة الشادة للطلبة وثانياً فتحة قناة اوستاكيوس وثالثاً التتو التوقعي. اما قناة الشادة للطلبة فاعلى واصغر من قناة اوستاكيوس وواقعة اسفل الوجه العلوي للعظم الحجري. طرفها الطبلي على هيئة بروز ممتد الى تجويف الطلبة مشروطي الشكل مثقوب عند راسه بثقب يمر منه وتر العضلة المذكورة الواقعة ضمن القناة. وقناة اوستاكيوس هي الاستطراق الكائن بين التجويف الطبلي والبلعوم. طولها من قيراط ونصف الى قيراطين واتجاهها الى الاسفل والمقدم والباطن. بعضها مكوّن من عظم وبعضها من نسيج غضروفي. فالجزء العظمي طوله نحو نصف قيراط يبدأ عند الجزء السفلي للجدار المقدم للطلبة وينتهي بفتحة بيضية الشكل عند زاوية ملتقى العظم الحجري بالقسري يرتبط بها الجزء الغضروفي. والجزء الغضروفي طوله نحو قيراط ومولف من صفيحة غضروفية منعكفة على نفسها الى الاعلى ويشغل الخلاء الواقع في الاسفل غشاء ليفي تكمل به جدران القناة. والقناة المذكورة ضيقة في المؤخر متسعة في المقدم وتنتهي بفتحة بيضية في الجزء العلوي والجانب للبلعوم وراء الجزء الخلفي للصماخ الانفي السفلي. وبواسطة هذه القناة يختلط الغشاء المبطن للتجويف الطبلي بالغشاء المبطن للبلعوم

والغشاء الطبلي فاصل بين التجويف الطبلي وقعر الصماخ السمعي الظاهر. وهو رقيق نصف شفاف بيضي الشكل منحرف الوضع نحو الاسفل والباطن. محيطه واقع في ميزاب محفور في الطرف الباطن للصماخ الآ من الاعلى. وتترل يد المطرقي نزولاً عمودياً بين طبقيه الباطنة والمتوسطة حتى المركز فتربط هناك جاذبة الغشاء الى الباطن بحيث يكون وجهه الظاهر مقعراً والباطن محدباً. واما بناء الغشاء الطبلي فمن ثلاث طبقات. فالطبقة الظاهرة جلدية منعكسة من الغشاء المبطن للصماخ. والمتوسطة ليفية بعض اليافا مشععة وبعضها حلقيه. والباطنة مخاطية منعكسة من الغشاء المبطن للتجويف الطبلي

اوستاكيوس المنفتحة الى البلعوم. وتقاطعها سلسلة عظام متحركة توصل الغشاء الطبلي بالتيه فتنتقل
التموجات الواصلة الى الغشاء الطبلي منه الى التيه

والتجويف الطبلي يحده من الظاهر الغشاء الطبلي ومن الباطن الوجه الظاهر للتيه ومن
الخلف الاخية الحلمية ومن المقدم قناة اوستاكيوس

شكل ٢٦٢



وقناة الشادة للطفلة. طوله من الامام الى الخلف نحو
خمسة خطوط ومن الاعلى الى الاسفل نحو ثلاثة. وسفقه
وارضه مكوّنان من صفيحة رقيقة عظمية توصل الجزء
القشري بالجزء الحجري للعظم الصدغي. فالسقف
عريض مسطح مكوّن من صفيحة رقيقة تنصل التجويف
الحجبي عن التجويف الطبلي. والارض ضيقة تعلق
الحفرة الوداجية. والجدار الظاهر مكوّن من الغشاء
الطبلي وجزء صغير من العظم وتشاهد فيه ثلاث
فتحات صغيرة. الاولى يدخل منها الحبل الطبلي
الناشئ من العصب الوجهي والثانية هي شق

كلاسيربوس الذي يمر منه التو الطويل للطريقي والعضلة الراحية للطفلة وبعض اوعية
طبلية. والثالثة يخرج منها الحبل الطبلي بعد دخوله الى التجويف الطبلي

والجدار الانسي للطفلة عمودي الوضع مشرف الى الوحشية تشاهد فيه جملة اشياء وهي: الكوة
البيضية المستطرفة من التجويف الطبلي الى الدهليز قطرها الطويل هو الافقي وهي مسدودة
بغشاء وتشغلها قاعدة الركابي. وضعها مقابل الغشاء الطبلي وتصل به بواسطة العظام الاذنية.

والكوة المستديرة التي تستطرق الى الفوقية. وضعها اسفل سابقتها وتنصل عنها بواسطة بروز
مستدير هو الراس وهي مسدودة بغشاء مقعر نحو التجويف الطبلي محدد نحو الفوقية. والرأس
ارتفاع مستدير اجوف مكوّن من بروز الدور الاول للفوقية الى الظاهر وهو موضوع بين
الكوتين وعليه ثلوم تستقر فيها بعض فروع الضفيرة الطبلية. والمهم ارتفاع مخروطي الشكل

شكل ٢٦٢ رسم الاذن ١ الصيوان ٢ الطبلية ٣ التيه ٤ المليكس ٥ الاثنيهاكس ٦ التراكوس ٧ الاثنيهاكوس ٨ النصبص
٩ حنرة المليكس ١٠ القناة السعوية الظاهرة ١١ الغشاء الطبلي مقطوعاً ١٢ العظيماث الثلاث التي تناطع التجويف
الطبلي وهي الطريقي والسندانى والركابي. وقاعدة الركابي سادة للكوة البيضية الواقعة في الجدار الانسي للتجويف الطبلي ١٣ الراس
الذي يفصل الكوة البيضية عن الكوة المستديرة ١٤ الكوة المستديرة. واما النخلة المظلمة التي اعلى العظيماث فمستطرفة الى الخلالا
الحلمية ١٥ قناة اوستاكيوس. والقناة التي اعلاها تتضمن العضلة الشادة للطفلة ١٦ الدهليز ١٧ القنوات الملالية الثلاث
١٨ اتفاحات القنوات المذكورة ١٩ الفوقية ٢٠ انخفاض بين السلم الطبلي والسلم الدهليزي

الى الارتفاع الذي يقابل ميزاب الهيلكس. والسادسة المنخرقة تمتد من الجزء الخلفي للصدفة الى
التدب الذي اعلاها

شرايين الصيوان الاذني الخلفي من السباتي الظاهر والاذني المقدم من الصدغي وفرع اذني
من المؤخري. واوردته مرافقة للشرايين المذكورة. واعصابه الاذني العظيم من الضفيرة العنقية
والاذني الخلفي من الوجهي والفرع الاذني من الرئوي المعدي والفرع الاذني الصدغي من
الفكي السفلي

واما القناة السمعية ويقال لها ايضاً الصماخ السمعي الظاهر فتمتد من قعر الصدفة الى
الغشاء الطبلي. طولها نحو قيراط وربع واتجاهها منحرف الى المقدم والباطن وهي منحنية قليلاً على
نفسها بحيث يكون منتصفها اعلى من طرفيها واضيق منها. ولما كانت ارض القناة اطول من سقتها
والجدار المقدم اطول من الخلفي عند منتهاهما كان اتجاه الغشاء الطبلي منحرفاً. ثم ان بعض القناة
السمعية مكوّن من غضروف وبعضه من عظم. فالجزء الغضروفي وهو الظاهر طوله نحو نصف
قيراط ومولف من غضروف الصدفة والتراكوس ويرتبط الى الانسية بحميط التنو السمعي.
وهذا الجزء من القناة خالٍ من الجوهر الغضروفي في الاعلى والخلف فيقوم مقامه غشاء ليفي
وهو سهل الحركة لوجود شقين او ثلاثة عمودية في الغضروف. والجزء العظمي وهو الباطن طوله
نحو ثلاثة ارباع القيراط فهو اطول من الجزء الغضروفي واضيق. اتجاهه الى الباطن وقليلاً الى
المقدم. وله عند طرفه الباطن ميزاب في ارضه دون سفته يُقبَل فيه الغشاء الطبلي
والجلد المبطن للصماخ ممتد من الجلد الذي يغطي الصيوان وهو رقيق ملتصق التصاقاً
شديداً بالجزء الغضروفي والعظمي للقناة ويغطي الغشاء الطبلي فيكون طبقتها الظاهرة. وللجلد
المذكور بقرب الفتحة شعر وعدد شمعية. وفي النسيج الذي تحت الجلد للجزء الغضروفي عدد تفرز
مادة شمعية خاصة بالاذن


شرايين الصماخ فروع من الاذني الخلفي والفكي الباطن والصدغي. واعصابه من الصدغي
الاذني للفكي السفلي

الاذن المتوسطة وهي الطبلة


الطبلة تجويف غير منتظم منضغط من الظاهر الى الباطن موضوع ضمن الجزء الحجري للعظم
الصدغي. وهي واقعة اعلى الحفرة الوداجية فتكون القناة السباتية الى مقدمها والاخلية الحلمية الى
الوراء والصماخ السمعي الى الظاهر والتهيه الى الباطن. ويشغلها الهواء المستطرق اليها بواسطة قناة

والخلفي يمتد من الوجه الخلفي للصدفة الى الوجه الظاهر للتو الحلي. والاربطة التي تربط اجزاء الغضروف بعضها ببعض اثنان ايضاً احدهما يمتد من التراكوس الى بداءة الهيلاكس فيكون بعض الجدار المقدم للقناة السمعية والاخر يمتد بين الصدفة والطرف السفلي للاتيهيلكس وعضلات الصيوان تُقسَم الى قسمين ايضاً. فالاولى توصل الصيوان بجانب الراس وتحركه وهي الاذنيات الثلاث المقدمة والخلفية والعليا التي مرَّ الكلام عليها في عضلات الراس. والثانية تمتد من بعض الصيوان الى بعضه الاخر. وهي ست عضلات صغيرة اثرية. الاولى العضلة الكبيرة

شكل ٢٦١



شكل ٢٦٠



للهيلكس تنشأ من الطرف المقدم للهيلكس وتندغم بالحافة المقدمة له. والثانية العضلة الصغيرة للهيلكس تنشأ من الصدفة وتندغم ببداية الهيلاكس. والثالثة عضلة التراكوس موضوعة على وجهه الظاهر. والرابعة عضلة الانتيتراكوس تنشأ من الجزء الوحشي للتراكوس وتندغم بالطرف الخلفي للهيلكس. والخامسة المستعرضة موضوعة على الوجه الجحبي للصيوان وتمتد من الصدفة

شكل ٢٦٠ الصيوان وعضلاته من المقدم ١ او الهيلكس ٢ ساق الهيلكس ٢ شوكة الهيلكس ٤ زائده الذنبية ٥ الانتيهيلكس ٦ و ٧ ساق الانتيهيلكس وما شعباه ٧ حفرة الهيلكس ٨ حفرة الانتيهيلكس ٩ الصدفة ١٠ التراكوس ١١ الانتيتراكوس ١٢ الشرم الواقع بين التراكوس والانتيتراكوس ١٣ العضلة الاذنية المقدمة ١٤ الاذنية العليا ١٥ الاذنية الخلفية ١٦ العضلة الكبيرة للهيلكس ١٧ العضلة الصغيرة له ١٨ عضلة التراكوس ١٩ عضلة الانتيتراكوس
شكل ٢٦١ الصيوان وعضلاته من المؤخر ١ حافة الهيلكس ٢ شوكة ٣ تحديب يقابل حفرة الهيلكس ٤ و ٤ تحديب الصدفة ٥ جسر الصدفة ٦ و ٦ غضروف الصاخ ٧ فتحة ٨ الاذنية المقدمة ٩ الاذنية العليا ١٠ و ١٠ الاذنية الخلفية ١١ المستعرضة الاذنية ١٢ الشفرة الاذنية

الاذن الظاهرة

الاذن الظاهرة مؤلفة من جزءٍ منتشر يقال له الصيوان ومن قناة سمعية يقال لها الصماخ. فائدة الصيوان انه يجمع التموجات الهوائية التي يتكوّن منها الصوت وفائدة القناة السمعية ايصال التموجات المذكورة الى الطبلة

فالصيوان مؤلف من طبقة غضروفية مغطاة بالجلد ومتصلة ببداية القناة السمعية . شكله بيضي غير متساوي الوجه وطرفه الاعظم مشرف الى الاعلى .

شكل ٢٥٩



وجهه الظاهر مقعر تعبيراً غير منتظم ومتجه قليلاً الى المقدم وعليه ارتفاعات وانخفاضات كثيرة ناشئة عن انثناء الطبقة الغضروفية لها اسماء خاصة بها . فيقال للشفة البارزة التي عند محيط الصيوان الهيلكس (اي الدرج الملتف) وللبروز الذي الى مقدمها الانتيهيلكس وللانخفاض الفاصل بينهما حفرة الهيلكس او الحفرة الزورقية ويتفرع الانتيهيلكس في الاعلى الى فرعين يحيطان انخفاضاً مثلث الشكل هو حفرة الانتيهيلكس ويحيط الانتيهيلكس بجوف غائر يقال له الصدفة . والى مقدم الصدفة بروز صغير مستدق متجه الى الخلف يقال له

التراكوس سمي بذلك لان وجهه الباطن مغطى بشعر يشبه لحية التيس . وبازاء التراكوس حذبة يقال لها الانتيتراكوس منفصلة عنه بشرم غائر . واسفل الحذبة المذكورة الفصيص وهو

جسم خالٍ من الجوهر الغضروفي ومؤلف من نسيج خلوي دهني


بناء الصيوان من صفيحة رقيقة غضروفية صفراء مغطاة بجلد ومتصلة بالاجزاء المجاورة بواسطة اربطة وبعض الياف عضلية . فالجلد رقيق ملتصق بالغضروف وفيه عدد شحمية كثيرة . وغضروف الصيوان مؤلف من قطعة واحدة تتوقف على انثناء الارتفاعات والانخفاضات التي مرّ ذكرها الا انه لا يدخل في تاليفها جميعها وهو مرن لدن اصفر اللون . واربطة الصيوان على نوعين منها ما يربط الصيوان بجانب الراس ومنها ما يربط اجزاء الغضروف بعضها ببعض . فالاولى اثنان مقدم وخلفي . فالرباط المقدم يمتد من الهيلكس الى اصل القوس الزوجي .

شكل ٢٥٩ صيوان الاذن الظاهرة ١ بداية الهيلكس ٢ منتهاه ٣ الانتيهيلكس ٤ الانتيتراكوس ٥ التراكوس ٦ الفصيص ٧ حفرة الانتيهيلكس الراقعة بين شعبتيه في الاعلى ٨ الصدفة ٩ القناة السمعية الظاهرة . واما حفرة الهيلكس فواقعة بين الهيلكس والانتيهيلكس من الاعلى ٣ الى الاسفل كما ترى في الرسم

سفلى تجه اولاً الى الاسفل ثم تنعكف وتسير سيراً افقياً الى الانسية فنصب في الكيس الدمعي والكيس الدمعي هو الطرف العلوي المتمد للقناة الانفية مستقر في ميزاب غائر مكون من العظم الدمعي والتو الانفي للفك العلوي. وهو يبضي الشكل مسدود في الاعلى ومتمد في الاسفل الى القناة الانفية. وتصب اليه من الجهة الوحشية وقليلاً الى المقدم القناتان الدمعيتان وتغطيه العضلة الشادة للجفنين وانسباط ليفي من الوتر العيني يرتبط بالخط البارز للعظم الدمعي. تاليته من طبقة ليفية لدنة مبطنة بغشاء مخاطي هو امتداد الملتحم من الاعلى بواسطة القناتين الدمعيتين والغشاء المخاطي من الاسفل بواسطة

شكل ٢٥٨

القناة الانفية



والقناة الانفية قناة غشائية طولها نحو ثلاثة ارباع الفيراط تمتد من الجزء السفلي للكيس الدمعي الى الصماخ السفلي للانف حيث تنتهي بفتحة ممتدة لها صامر غير كامل مكون من الغشاء المخاطي. والقناة المذكورة موضوعة في قناة عظمية مكونة من الفك العلوي والدمعي والقربني السفلي. وهي ضيقة في المنتصف متسعة الطرفين وسيرها الى

الاسفل والخلف وقليلاً الى الوحشية. ويبطنها غشاء مخاطي متمد من الغشاء المخاطي المبطن للانف. ثم ان القناتين الدمعيتين مبطنتان بكرات قشرية والكيس الدمعي والقناة الانفية بكرات هدية ككرات الانف

الاذن

الاذن عضو السمع. وهي مولفة من ثلاثة اقسام الاذن الظاهرة والاذن المتوسطة وهي الطبلة والاذن الباطنة وهي التيه

شكل ٢٥٨ الجهاز الدمعي والقناة الانفية للعين اليمنى "و" الغدة الدمعية "د" القناتان الدمعيتان "ع" القناتان الدمعيتان "ح" القناة الانفية "س" وتر العضلة الخرفة العليا مقلوباً الى الاعلى "ل" الثقب فوق الجحاج وقد قطع الزريان والوريد والعصب المارة منه "ز" باطن القناة الانفية عند منتهاهما في الصماخ السفلي


الجهاز الدمعي

بأنه ارق خالٍ من الحليبات شفاف وقليل الاوعية الدموية في الصحة. والملتحم الذي يغطي القرنية رقيق جداً ملتصقاً بها التصاقاً شديداً وخالٍ من الاوعية الدموية في الصحة واللحمة الدمعية جسم صغير احمر مخروطي الشكل واقع في الزاوية الانسية للعين شاغل للخلاء المثلث الذي في هذه الجهة وهو الحاصل الدمعي. وهي مؤلفة من مجموع اجزى شبيهة البناء بغدد ميوبوميوس افرازها ابيض يشاهد مجتمعاً في الزاوية الانسية للعين ويشاهد على سطحها بعض شعرات دقيقة. والى الوحشية منها الثنية الهلالية التي نعيمها مشرف نحو القرنية. وهي مؤلفة من طبقتين متوسط بينهما صفيحة رقيقة غضروفية. ويظهر انهما اثر الجفن ثالث يوجد في الطيور

الجهاز الدمعي

هذا الجهاز مؤلف من الغدة الدمعية التي تفرز الدموع وقنواتها التي تنقل هذا السائل الى سطح العين. ويحمل السائل المذكور بواسطة القناتين الدمعيتين الى الكيس الدمعي ومنه الى تجويف الانف بواسطة القناة الانفية

اما الغدة الدمعية فستقر في انخفاض واقع في الزاوية الوحشية للحجاج الى الانسية من التوائحجاجي الوحشي للعظم الجبهي . شكلها بيضي وقدرها كاللوزة . وجهها العلوي محدب ملامس لسحاق الحجاج . وجهها السفلي مقعر مستقر على المقلة وعلى العضلتين المستقيمتين العليا والوحشية . وهي مغطاة على وجهها الباطن بانعكاس من الملتمم وشبيهة البناء والمنظر بالغدد العابية . قنواتها نحو سبع تسير مخرفة تحت الغشاء المخاطي ثم تتباعد وتنتهي بفوهات دقيقة في النصف العلوي والوحشي للملتحم بقرب انعكاسه على المقلة . والفوهات المذكورة مصفوفة صفاً واحداً بحيث ينتشر الافراز الدمعي على سطح الملتمم



شكل ٢٥٧

والقناتان الدمعيتان تبتدان عند التقطبتين الدمعيتين اللتين تشاهدان على حافة الجفنين عند الطرف الوحشي للحاصل الدمعي . احدهما عليا وهي اضيق واطول من السفلى نتيجة اولاً الى الاعلى ثم تنعكف على زاوية حادة وتسير الى الانسية والاسفل فتصب في الكيس الدمعي . والثانية

شكل ٢٥٧ الجهاز الدمعي للعين ١ الغضروف الجفني العلوي ٢ حافة السفلى التي تشاهد عليها فتحات غدد ميوبوميوس ٣ الغضروف الجفني السفلي ويشاهد على حافته العليا فتحات غدد ميوبوميوس ٤ الغدة الدمعية من وجهها العلوي وهو الحجاجي ٥ قناتها السفلى وهو الجفني ٦ القنات الدمعية ٧ الثنية الهلالية ٨ اللثة الدمعية ٩ القناتان الدمعيتان للقناتين الدمعيتين ١٠ القناة الدمعية العليا ١١ القناة الدمعية السفلى ١٢ الكيس الدمعي ١٣ تمدد القناة الانفية عند مصها في الصباخ السفلي للانف ١٤ القناة الانفية

الغضروفين الجفنيين في موقعها

وغدد ميوبوميوس موضوعة في الوجه الباطن للجفنين بين الغضروفين الجفنيين والملتحم.

شكل ٢٥٦



فاذا قلب الجفنان ظهرت ظهوراً واضحاً على هيئة خطوط متوازية بيض معقّدة. عددها نحو ثلاثين في الجفن العلوي واقل من ذلك في السفلي. وهي غائصة في ميازيب محفورة في الوجه الباطن للغضروفين فيكون طولها تاربعاً ل عرض الغضروف اي انها تكون اطول في الغضروف العلوي منها في السفلي. واما قنوات الغدد المذكورة فتنتهي عند الحافة السائبة للجفنين بثقوب دقيقة عددها

كعدد القنوات. وبناء هذه الغدد كبناء الغدد الشحمية الجلدية فان الواحدة منها مؤلفة من قناة مستقيمة او جراب مسدودة الطرف تصب اليها اجربة صغيرة ثانوية. تاليف القناة من غشاء مبطن بكرات قشرية حاملة الافراز الشحمي الذي فائدته ان يمنع التصاق الجفنين عند انطباقها والاهداب شعر غليظ قصير منحني منحرس في الحافة السائبة للجفن مصفوف صفيين او ثلاثة. الاهداب العليا اكثر عدداً واطول من السفلى ونحني الى الاعلى. والاهداب السفلى منحنية الى الاسفل بحيث لا تتصفر بالعليا عند انطباق الجفنين

والملتحم هو الغشاء المخاطي للعين الذي يبطن الوجه الباطن للجفنين ثم ينعكس على مقدم الصلبة والقرنية ولكل من جزئيه المذكورين اي الجفني والمقلي صفات خاصة من جهة بنائه فالجزء السفلي للملتحم غليظ مظلم كثير الاوعية مغطى بحمليات كثيرة اذا تعاطت احد ثلث المرض المعروف بالاجفان الحبيبية. وهو متصل اتصال الامتداد بالغشاء المبطن لقنوات غدد ميوبوميوس وبالغشاء المبطن للكيس الدمعي والقناة الانفية بواسطة القناتين الدمعيتين. ويستقصى عند الزاوية الوحشية للجفن العلوي الى القنوات الدمعية ثم الى الغدة الدمعية. وعند الزاوية الانسية يكون ثنية يقال لها الثنية الهلالية. وينعكس الملتحم من الجفنين الى المقلة على هيئة ثنيتين عاليا وسفلى. ثم ان الملتحم الذي يغطي الصلبة ملتصق بالكرة التصاقاً رخواً ويختلف عن الملتحم الجفني

شكل ٢٥٦ غدد ميوبوميوس كما تشاهد من الوجه الباطن اي العيني للجفنين. وذلك في العين اليسرى مع غدها الدمعية و a و a الغشاء الملتحم الجفني ١ الغدة الدمعية ٢ فتحات القنوات الدمعية الغدة المذكورة ٣ النقطتان الدمعيتان ٦ و ٦ غدد ميوبوميوس. ويشاهد ان قناتها تكون صفاً على الحافة السائبة لكل من الجفنين

والموخرية الجبهية التي اذا فعلت على الحاجب استولت الى درجة ما على كمية النور الداخلة الى العين والجفنان ثنتان من الجلد رقيقتان موضوعان الى مقدم العين اذا انطبقا حفظاها من الاذى. والجفن العلوي اكبر واكثر مجالا للحركة من السفلي وله عضلة رافعة خاصة به. اذا كان الجفنان مفتوحين تكون خلاء بين حافتيهما بيضي الشكل له زاويتان مكورتان من ملتقى الجفن العلوي بالسفلي احدها انسية يقال لها موق العين والثانية وحشية. والوحشية حادة اكثر من الانسية وملاصقة للكفة خلافاً للانسية فانها تستطيل نحو الانف بحيث ينفصل الجفنان بخلاء مثلث الشكل يُقال له الحاصل الدمعي. وفي حافة كل من الجفنين عند بداة الحاصل الدمعي ارتفاع مخروطي يقال له الحلمة الدمعية مثقوبة عند رأسها بفتحة صغيرة هي النقطة الدمعية التي تكون منشأ القناة الدمعية

تأليف الجفن من ابنية هي من الظاهر الى الباطن الجلد والنسيج الخلوي والبياف العضلة المحيطة الجفنية والغضروف الجفني والغشاء الليفي وعدد ميبوميوس والملتهم. وللجفن العلوي زيادة على ما ذكر صفاق الرافعة الخاصة به وهي العضلة الرافعة للجفن العلوي فالجلد رقيق جداً وعند حافة الجفن يتصل بالملتهم اتصال الامتداد والنسيج الخلوي الذي تحت الجلد رخو لطيف يندران يتضمن شيئاً من المادة الدهنية وهو كثير التعرض للانسكاب المصلي

والغضروف الجفني صفيحة رقيقة لينة غضروفية طولها نحو قيراط موضوعة في الجفن فتسندُه وعليها يتوقف شكله الخاص به. فالعلوي منها اكبر من السفلي ملالي الشكل عرضه عند المركز نحو ثلث قيراط ضيق الطرفين ويندغم في وجهه المقدم صفاق العضلة الرافعة للجفن العلوي. والغضروف الجفني السفلي اصغر وارق من العلوي بيضي الشكل. والحافة السائبة للغضروفين المذكورين ويقال لها الهدية ايضاً غليظة ومستقيمة السير. والحافة الحجاجية متصلة بمحيط الحجاج بواسطة الغشاء الليفي. وتتصل الزاوية الوحشية لكل من الغضروفين الجفنيين بالعظم الوجني بواسطة الرباط الجفني الوحشي وتنتهي الزاويتان الانسيبتان للغضروفين عند بداة الحاصل الدمعي مرتبطين بحافة الحجاج بواسطة الوتر العيني

والغشاء الليفي للجفنين ويقال له الرباط الجفني ايضاً موضوع تحت المحيطة الجفنية ومرتبطة من الباطن بالحافة الحجاجية للغضروفين الجفنيين ومن الظاهر بحافة الحجاج. وهو غليظ كثيف عند محيط الحجاج رقيق عند تقاربه الى الغضروفين. فائدة هذا الغشاء ان يسند الجفنين ويحفظ

وتمتد الى المقدم حتى اطرافها المقدمة السائبة. والطبقة الباطنة تمتد الى المقدم حتى الوجه المقدم للمحفظة العدسية بقرب محيطها. وما توسط من الغشاء المذكورين الزوائد الهدية والمحفظة العدسية يكون بعض الحدود للخرانة الخلفية للعين. والوجه الخلفي لهذه الطبقة مشرف نحو الغشاء الهيايني الا انه منفصل عنه عند محيط العدسة بخلاء يقال له قناة بيت. والقناة المذكورة عرضها نحو عشر قيراط ومجدها من المقدم الرباط المعلق ومن المؤخر الغشاء الهيايني وقاعدتها مكونة من المحفظة العدسية


وشرايين الكرة العينية الشرايين الهدية القصيرة والطويلة والمقدمة والشريان المركزي الشبكي. فالشرايين الهدية القصيرة تنقب مؤخر الصلبة حول مدخل العصب البصري وتنقسم الى فروع تسير سيراً موازياً لمحور الكرة وتوزع في الطبقة المتوسطة المشيمية وفي الزوائد الهدية. والطويلة اثنان ينتبان مؤخر الصلبة ويسيران الى المقدم بينها وبين المشيمية الى العضلة الهدية حيث ينقسم كل منهما الى فرعين علوي وسفلي فيتمهان ويكونان دائرة وعائية حول المحيط الوحشي للقرنية. وتتشامن الدائرة المذكورة فريعات تتحد بقرب حافة الحدقة فتكون دائرة وعائية ثانية صغرى. والمقدمة خمسة اوستة ناشئة من الفروع العضلية والدمعية للشريان العيني تنقب الجزء المقدم للصلبة عند حافة القرنية وتوزع في الزوائد الهدية وبعضها يذهب الى الدائرة الوعائية الكبرى للقرنية. واما الشريان المركزي الشبكي فقد تقدم الكلام عليه. والاوردة اربعة غالباً تنقب للصلبة عند منتصفها بين حافة القرنية والعصب البصري وتنتهي في الوريد العيني. واعصاب العين البصري والهدية الطويلة الناشئة من العصب الانفي للعين والهدية القصيرة الناشئة من العقدة العينية للسمياتوي

الاجزاء الاضافية للعين

الاجزاء الاضافية للعين هي :

الحاجبان - الجفنان - المتحم - الجهاز الدمعي


فالحاجبان ارتفاعان جلديان على هيئة قوسين يعلوان محيط الحجاج ويبرز منها شعرتان قصيرتان غليظتان منحرف الوضع. وهما مؤلفان من جلد سميك متصل بما دونه من العضلات وهي المحيطة الجفنية والمجعدة للحاجب




شكل ٢٥٥

شكل ٢٥٥ مقدم العين البصري وهي مفتوحة تماماً معتدلاً ١ الحاجب ٢ اهداب الجفنين ٣ الجفن السفلي ٤ الزاوية الانسية وهو موق او ماق العين ٥ الزاوية الوحشية ٦ اللحمة الدمعية ٧ التنية الهلالية ٨ القلعة ٩ الحدقة

بواسطة طبقة مولفة من كريات شفافة كثيرة الجوانب نووية تُشرب رطوبةً من سوائل العين بعد الموت ثم يتمزق فيقال للسائل الخارج منها سائل مركاني والعدسة جسم شفاف محدب الوجهين الا ان التحدب اعظم في الوجه الخلفي منه في الوجه الامامي. طول قطرها المستعرض نحو ثلث قيراط وقطرها الامامي الخلفي نحو ربع قيراط. وهي مؤلفة من طبقات الواحدة منها محيطة بالاخري فالظاهرة منها رخوة اذا كانت حديثة العهد



شكل ٢٥٤



شكل ٢٥٢

والباطنة اصلب وتكون نواة مركزية. والطبقات المذكورة سهلة الفصل ولا سيما بعد الغلي بالماء او النقع في الالكول وبهاتين الواسطتين يظهر ان العدسة مؤلفة من ثلاث قطع مثلثة اضلاعها الحادة متجهة نحو المركز وقواعدهما الى المحيط. واما تاليف الطبقات فمن الياف دقيقة متوازية الوضع

ثم ان التغييرات التي تحدث في العدسة بواسطة السن هي ان في الجنين يقرب شكلها من الكروي ويميل لونها قليلاً الى الحمرة وشفافتها غير تامة وهي رخوة التوام. وفي الكهولة يكون تحدب وجهها الخلفي اكثر من الامامي لالون لها شفافة وشديدة التوام. وفي الشيخوخة يتسطح وجهها وتزيد كثافتها ويظلم لونها فيصير كهر بائياً

والرباط المعلق للعدسة بناءً غشائي رقيق شفاف موضوع بين الجسم الزجاجي والزوائد الهدبية المشيمية وظيفته ان يوصل الحافة المقدمة للشبكية بالوجه المقدم للعدسة بقرب محيطها فيعين في حفظ العدسة في موقعها. على وجهه الظاهر ثنيات كثيرة تقبل بينها الثنيات التي تقابلها من الزوائد الهدبية. والثنيات المذكورة موضوعة حول محيط العدسة على شكل مشعّ وملطوخة بالمادة الملونة التي للزوائد الهدبية. ثم ان الرباط المعلق مؤلف من طبقتين تتشآن في المؤخر عند الحافة المسننة الشبكية. فالطبقة الظاهرة منها تغطي الوجه الباطن للزوائد الهدبية

شكل ٢٥٢ العدسة البلورية وقد تجمدت اولاً بالاكول ثم قطعت بعض طبقاتها. وهي مكبرة ثلاثة اقطار ونصف

شكل ٢٥٤ قطع مثلث للعدسة ويشاهد اتجاه اليافا وانها مؤلفة من ثلاث قطع مثلثة

رطوبات العين

رطوبات العين ثلاث المائبة الى المقدم والزجاجية الى الخلف والبلورية متوسطة بينهما فالرطوبة المائبة مائة للخرانتين المقدمة والخلفية . وهي قليلة الكمية لا يتجاوز وزنها اربع او خمس قسيمات عملها قلوي وتركيبها من الماء الصرف ونحوه $\frac{1}{10}$ من مواد جامدة معظمها كلورور الصوديوم

والخزانة المقدمة خلاء تحده من المقدم القرنية ومن الخلف الوجه الامامي للقرنية والرباط الهدبي والخزانة الخلفية اصغر من المقدمة تحدها من الامام القرنية ومن الورا محفظة البلورية ورباطها المعلى والزوائد الهدبية . والخزانتان المذكورتان مستطرتان الواحدة الى الاخرى من الحدقة في البالغ خلافاً للجنين قبل الشهر السابع اذ تكون الحدقة مسدودة بواسطة غشاء خاص تقدم ذكره . وقد اختلفوا على الجهاز الذي يفرز الرطوبة المائبة غير ان المرجح عندهم انها تفرز من الوجه الخلفي للقرنية ووجبي القرنية والزوائد الهدبية

والرطوبة الزجاجية ويقال لها الجسم الزجاجي ايضاً مكونة لاربعة اخماس جميع الكرة ومالئة لتغير الشبكية ومحفورة في المقدم لقبول البلورية ومخفظها . وهي على درجة تامة من الشفافة هلامية القوام ومولفة من سائل البوميني محاط بغشاء لطيف شفاف يقال له الغشاء الهيايني . والغشاء المذكور محيط بالوجه الظاهر للجسم الزجاجي وملتصق التصاقاً شديداً بالرباط المعلى للبلورية الى المقدم ويمتد الى مؤخر المحفظة البلورية . والسائل التي تتالف منه الرطوبة الزجاجية يشبه الماء الصرف الا انه يتضمن بعض املاح وقليلاً من الالبومن . واما في الجنين فتمر في مركز الجسم الزجاجي من المؤخر الى المقدم قناة دقيقة يشغلها شريان واصل الى المحفظة البلورية . ولما كانت لا توجد في جوهره اوعية دموية في البالغ لزم ان تكون تغذيته بواسطة اوعية الشبكية والزوائد الهدبية الواقعة على ظاهره

والعدسة البلورية مغلقة بمخفظتها وموضوعة خلف الحدقة الى مقدم الجسم الزجاجي وتحيطها الزوائد الهدبية التي تتجاوز حافتها قليلاً اما المحفظة البلورية فغشاء شفاف لدن جداً قسّم محيط بالبلورية وملاصق لها . وهي مستقرة الى المؤخر في انخفاض واقع الى مقدم الجسم الزجاجي وتكون الى المقدم بعض الخزانة الخلفية للعين ومحفوظة في موقعها بواسطة الرباط المعلى للعدسة . وهي اسنك جداً في المقدم منها في المؤخر واذا تمزقت التفت حوافي الجزء المنزق الى الباطن . وتتصل العدسة بالوجه الباطن للمخفظة

شكل ٢٥٢



في الوراثة وتنقص سماكتها من الخلف الى الامام وتنتهي في
المقدم بشفافة مسننة بقرب الرباط الهدي . وهي رخوة التوام
ونصف شفافة اذا كانت حديثة العهد ثم تظلم وتميل الى
الحمرة . ويوجد في مركز الشبكية الى الموخر عند النقطة التي
تقابل محور العين اثر مستدير مرتفع مائل الى الصفرة يقال
له بقعة سويزين وهو اول من اكتشفها . وفي مركز الاثر المذكور
انخفاض يقال له الحفرة المركزية وليس لهذا الاثر فائدة
معلومة . والى الانسية منه بنحو عشر قيراط مدخل العصب

البصري والشريان الشبكي المركزي نافذ منه الى الباطن . والمدخل المذكور هو الجزء الوحيد
من الشبكية الفاقد قوة البصر

بناء الشبكية من ثلاث طبقات ظاهرة او عمودية ويقال لها ايضا غشاء يعقوب ومتوسطة او
حبيبية وباطنة او عصبية . واما الوعية الدموية فلان تكون طبقة قائمة بنفسها ولكنها تتوزع في
جوهر الطبقة الباطنة . فالطبقة الظاهرة وهي غشاء يعقوب رقيقة جداً واسمك في الخلف منها في المقدم
ومولفة من عصي عمودية موضوعة وضعا عمودياً نحو السطح ودقائق بصلية تخللها . والمتوسطة وهي
الحبيبية تكون نحو ثلث سماكة الشبكية ومولفة من طبقتين الظاهرة مكونة من دقائق كروية والباطنة
مكونة من دقائق مسطحة . والباطنة وهي العصبية غشاء رقيق نصف شفاف مكون من انبساط الالياف
الانتهائية للعصب البصري والكريات العصبية . فالالياف العصبية مجمعة على هيئة حزم تشع
من منتهى العصب البصري ثم تتصالب فتكون شبكة دقيقة . ولا يوجد في الالياف المذكورة
الاجزاء المركزي او المحور من الالياف الانبوية

والشريان المركزي الشبكي يتقبب العصب البصري ويدخل باطن الكرة العينية فينقسم
حالا الى اربعة او خمسة فروع تسير اولاً بين الطبقة العصبية والغشاء الهيايني (وهو الغشاء
المحيط بالرطوبة الزجاجية) ثم تنفذ الى جوهر الطبقة العصبية وتكون هناك شبكة شعرية خشكة
وتنتهي عند الحافة المسننة للشبكية بوعاء واحد يحدها حافتها الانتهائية . والشريان المركزي الشبكي
مصحوب بوريد

شكل ٢٥٢ قطع عرضي لواخر العين بحيث يشاهد من الباطن ١ قطع الطبقات الثلاث والغشاء الذي يبطن الوجه الباطن
هو الشبكية ٢ مدخل العصب البصري . ويشاهد ان الشريان المركزي الشبكي ثاقب لمركزه ٣ فرع الشريان المركزي الشبكي
٤ بقعة سويزين ويقال لها احياناً ثقب سويزين وهي واقعة في مركز محور العين ٥ ثنية من الشبكية تحجب غالباً بقعة سويزين
بعد فتح العين لاجل التشرح

بالمشيمية والى الخارج من ذلك الرباط الهدبي الذي يوصلها بالصلبة والقرنية وتكون من حافتها السائبة المركزية الحدقة . وجهها المقدم مختلف اللون بحسب الأشخاص وعليه خطوط تجتمع نحو الحدقة . والوجه الخلفي يقال له العنبي لانه مغطى بمادة ملوثة تكسبه لوناً أرجوانياً داكناً نازواًها . الفزحية مكوّنة من نسيج ليفي ونسيج عضلي وكريات ملوثة . فالنسيج الليفي مؤلف من حزم لطيفة بعضها حلقي عند المحيط ومعظمها مشع نحو الحدقة تُخللها الكريات الملونة والاعصاب . والنسيج العضلي من النوع الغير المخطط ومكوّن من الياف حلقيه والياف مشعة فالالياف الحلقيه هي العاصرة للحدقة محيطة بحافة الحدقة وموضوعة على الوجه الخلفي للفزحية على هيئة عصابة ضيقة . والالياف المشعة هي الممددة للحدقة تجتمع من المحيط نحو المركز وتخلط بالالياف الحلقيه بقرب حافة الحدقة . والكريات الملونة تُخلل النسيج الليفي ومنها طبقة ايضاً الى مقدم الفزحية يتوقف عليها اللون الخاص بالشخص وطبقات جملة على الوجه الخلفي للفزحية وهو العنبي الذي تقدم الكلام عليه

شرايين الفزحية ناشئة من الشرايين الهدبية الطويلة والمقدمة ومن اوعية الزوائد الهدبية واما الغشاء الحدقي فخاص بالجنين وهو غشاء لطيف شفاف وعائي ساد للحدقة يفصل الخلاء الواقعة فيه الفزحية الى مخدعين متميزين . والغشاء المذكور ياخذ في الانحلال من مركزه بين الشهر السابع والثامن بحيث لا يبقى منه عند الولادة الا اثر ضعيف وقد يدوم فيحدث منه العمى والرباط الهدبي حلقة بيضاء ليفية تربط الطبقة الظاهرة بالطبقة المتوسطة للعين . وهو موضوع حول محيط الفزحية عند اتصالها بالطبقة الظاهرة للمشيمية وبالصلبة والقرنية . وعند اتصاله بالصلبة قناة دقيقة واقعة بينهما يقال لها الجيب الحلقي للفزحية


والعضلة الهدبية مؤلفة من الياف غير منخططة وهي على هيئة عصابة حلقيه سنجابية نصف شفافة عرضها نحو ثمن قيراط موضوعة على الوجه الظاهر لمقدم المشيمية . اليافها رخوة بيضاء مائلة الى الصفرة طولية الوضع ناشئة من ملتقى القرنية بالصلبة ثم تمر الى الخلف وترتبط بالمشيمية الى مقدم الشبكية . قيل ان فائدة هذه العضلة انها تضغط الجسم الزجاجي فتقدم البلورية لاجل توقيح البصر للاجسام القريبة

الطبقة الثالثة وهي الباطنة من طبقات العين الشبكية تظهر عند رفع المشيمية عن وجهها الظاهر . وهي غشاء عصبي لطيف تُرسم على وجهها الباطن صور الاجسام الخارجة . وجهها الظاهر ملاس للطبقة الملونة للمشيمية ووجهها الباطن للجسم الزجاجي . وهي ممتدة من العصب البصري

فالمشيمية غشاء رقيق لونه اسمر داكن مغلف لحمسة اسداس الكرة من الجهة الخلفية. يتقربها من الورا العصب البصري وتنتهي في المقدم عند الرباط الهدبي حيث تخني الى الباطن وتكون ثنيات كثيرة هي الزوائد الهدبية. وهي اغلظ في الخلف منها في الامام وتتصل من وجهها الظاهر بالوجه الباطن المصلبة بواسطة غشاء عنكبوتي دقيق. وجهها الباطن امس ملامس للشبكية. تاليها من ثلاث طبقات ظاهرة ومتوسطة وباطنة. فالظاهرة مؤلفة من الفروع الكبيرة الناشئة من الشرايين القصيرة الهدبية ولاسيما من اوردة منخية تجتمع في اربعة او خمسة اجذاع. والاجذاع المذكورة تنفذ من الصلبة عند منتصفها بين حافة القرنية ومدخل العصب البصري. وتغلغل الاوعية كريات داكنة نجمية الشكل داخلها مادة ملونة اذا اتصلت اذناها بعضها ببعض كوّنت شبكة دقيقة. والطبقة المتوسطة مؤلفة من صغيرة شعرية دقيقة جداً ناشئة من الاوعية الهدبية القصيرة. والباطنة وهي الملوّنة غشاء لطيف مؤلف من طبقة كريات مسدسة الجوانب نووية موضوعة بعضها الى جانب البعض كصيف الدار متضمنة حبيبات ملونة. واما في الجهر فالمادة الملوّنة مفقودة

والزوائد الهدبية مؤلفة من طي الطبقة المتوسطة والباطنة للمشيمية نحو الباطن عند حافتها المقدمة. وتقبل الطيات المذكورة بين طيات نقابها من الرباط المعلق للبلورية. وهي موضوعة على شكل دائرة وراء القرحة وحول حافة البلورية الواحدة بجانب الاخرى الا ان الصغيرة منها واقعة بين الكبيرة وعددها من ستين الى ثمانين. ويبلغ طول الزوائد الكبيرة نحو عشر قيراط

شكل ٢٥١



وشكلها نصف كروي طرفها الواحد متصل بالرباط المعلق وممتد من المشيمية وطرفها الاخر سائب ومستقر على محيط البلورية. وجهها المقدم مشرف الى مؤخر القرحة ومخلط بحيطها ووجهها الخلفي متصل بالرباط المعلق. بناؤها كبناء المشيمية

والقرحية سميت بذلك نسبة لفوس قزح لاختلاف لونها في الاشخاص. وهي شفة رقيقة حلقيه الشكل قابلة للانقباض معلقة في الرطوبة المائية خلف القرنية وامام البلورية مثقوبة


عند مركزها وقليلًا الى الانسية بثقب مستدير لاجل مرور النور هو الحدقة. ويخلط محيطها

شكل ٢٥١ قطع عرضي لمقدم العين بحيث يشاهد من الباطن ١ قطع الطبقات الثلاث وهي الصلبة والمشيمية والشبكية الحدقة ٢ القرحة والوجه الذي يشاهد منها هو الخلفي اي العيني ٤ الزوائد الهدبية ٥ الحافة المنتمة للشبكية وهي منتهاها بقرب الرباط الهدبي


اللذتان المقدمة والخلفية اللتان تغطيان الجزء المركزي للقرنية متشابهتان في البناء مؤلفتان من غشاء صلب لدن في غاية ما يكون من الشفافة والرقّة. قيل ان فائدتهما تثبت القرنية الحقيقية على الدرجة الواجبة من الانحناء نظراً الى صلابتها ورخاوة الجزء المركزي. والقشرة الملتحمة التي تغطي مقدم الوريقة اللدنة الامامية مؤلفة من كريات نووية شفافة مرتبة على هيئة طبقتين او ثلاث. والقشرة المطبنة للخزانة المائية تغطي الوجه الخلفي للوريقة اللدنة الخلفية. تاليها مثل سابقتها الا انها مؤلفة من طبقة واحدة من الكريات وتلك من طبقتين او ثلاث القرنية بناء غير وعائي فان الاوعية الشعرية تنتهي عند محيطها ولم يُحَقِّق لها اوعية ليمفاوية. واعصابها كثيرة ناشئة من الاعصاب الهدبية ومتوزعة في جودها على هيئة شبكة دقيقة

الطبقة الثانية. هذه الطبقة مؤلفة من المشيمية الى الخلف والقرنية والزوائد الهدبية الى المقدم والرباط الهدبي والعضلة الهدبية عند نقطة اتصال الصلبة بالقرنية. فالمشيمية هي الطبقة الوعائية الملونة للعين وهي غلاف لحمسة اسداس الكرة من الجهة الخلفية وتمتد الى المقدم حتى القرنية. والزوائد الهدبية متولدة من وجهها الباطن الى المقدم. والقرنية فاصل

شكل ٢٥٠



شكل ٢٤٩




عضلي حلقي الشكل معلق عمودياً وراء القرنية وفي مركزه فتحة كبيرة مستديرة هي الحدقة. والرباط الهدبي والعضلة الهدبية يكونان حلقة بيضاء تُشاهد عند نقطة اتصال المشيمية بالقرنية وانصاهما بالصلبة والقرنية

شكل ٢٤٩ الاعصاب الهدبية الواقعة بين الصلبة والمشيمية a الصلبة b الاوردة الخنية والوجه الظاهر للمشيمية c و جذعان من الاوردة الخنية عند خروجها من المشيمية d و الاعصاب الهدبية e الرباط الهدبي f القرنية g الحدقة
شكل ٢٥٠ المشيمية وكيفية توزيع الاوردة الخنية ١ بعض الطبقة الصلبة ٢ العصب البصري ٣ الطبقة المشيمية ٤ الرباط الهدبي ٥ القرنية ٦ و ٧ الاوردة الخنية ٧ و ٨ جذعان من الاوردة الخنية عند ثقبها للصلبة ٨ و ٩ الاوردة الهدبية القصيرة التي يرافق الشرايين الهدبية القصيرة نائبة الصلبة عند رقم ٩. ١٠ احد الاعصاب الهدبية الطويلة مصحوباً بوريد هدي طويل

الثقوب الثقب المركزي الذي يمر منه الشريان المركزي الشبكي الى باطن المقلة. وحول الوريقة
الغريالية ثقوب كثيرة اصغر من السابقة
تمر منها الاوعية والاعصاب الهدية .

شكل ٢٤٨



والصلبة مخنطة بالقرنية على شكل ان
نسيج الواحدة منها امتداد نسيج الاخرى
غير ان الصلبة تتجاوز القرنية وتغطيها
قليلاً عند حافتها ظاهراً وباطناً . بناء
الصلبة من نسيج ليفي ابيض تخاططه الياف
لدنة وكريات مغزلية نووية . والاياف

المذكورة مجموعة على هيئة حزم ومصنوفة في الغالب صفاً طويلاً . اوعيتها الشعرية قليلة ومتباعدة
ولم يُحَقَّق لها اعصاب

والقرنية في الجزء البارز الشفاف للطبقة الظاهرة وتكون السدس المقدم من الكرة العينية .
شكلها مستدير الآن قطرها المستعرض اطول قليلاً من قطرها العمودي . وفي محدبة من
الظاهر مقعرة من الباطن بارزة من الصلبة كبروز زجاجة الساعة . وتختلف درجة انحنائها تبعاً
للاشخاص والسن فانها اكثر تحدباً في الشباب منها في الشيخوخة . وعلى الدرجة المذكورة من
الانحناء تتوقف قوتها الكاسرة للاشعة فيكون البصر قصيراً او طويلاً بحسب تحدبها على جانب
عظيم . وهي كثيفة متساوية السماكة مؤلفة من خمس طبقات اولاً بناء مركزي ليفي سميك هو
الجزء المعتبر من القرنية ثانياً وريقة لدنة موضوعة الى مقدم الطبقة السابقة يغطيها الملتحم وثالثاً
وريقة لدنة موضوعة الى الخلف من الطبقة المركزية يغطيها الغشاء المبطن للخزانة المقدمة

فالجزء الجوهري للقرنية وهو المركزي ليفي متين في غاية ما يكون من الشفافة ممتد من الصلبة
وبناؤه كبنائها من كريات مغزلية متفهمة موضوعة على شكل صفائح متراكبة يبلغ عددها الى
اكثر من ستين . واما الخلايا الواقعة بين الصفائح فمشغولة غالباً بسائل شفاف . والوريقتان

شكل ٢٤٨ قطع طولي لمقلة العين ١ الطبقة الصلبة وهي اعظم في المخرم منها في المقدم ٢ القرنية الداخلة الحافة المقدمة
للصلبة ٣ المشيمية التي تتصل من المقدم بالرباط الهدبي والزوائد الهدبية ٤ الرباط الهدبي ٥ الزوائد الهدبية ٦ القرنية
٧ الحدقة ٨ الطبقة الثالثة للعين وهي الشبكية التي تنتهي في المقدم بحافة مسننة عند بداية الزوائد الهدبية ٩ قناة بتيت المحيطة
بالبلورية ١٠ الخزانة المقدمة التي تتضمن الرطوبة المائية . وقد وضع في الرسم الغشاء المبطن للخزانة الذي يفرز الرطوبة
المذكورة ١١ الخزانة الخلفية ١٢ البلورية مغلفة بحفظتها الخاصة . ويشاهد انها محدبة في المخرا اكثر من المقدم ١٣ الرطوبة
الزجاجية المغلفة بالغشاء الهيالييني . وهي مسومة بواسطة الغشاء المذكور الى خلايا ١٤ عمداً انبوي من الغشاء الهيالييني لمرور شريان
الحفظلة البلورية ١٥ نوربيلما العصب البصري اي عهده ١٦ الشريان المركزي الشبكي غائصاً في مركز العصب البصري

العلوي والمقدم للحاجز وفي الجدار الوحشي للحفرتين. ثم بعض خيوط من الفرع السني المقدم للفكي العلوي تتوزع في الصاخ السفلي والقربني السفلي. ثم عصب فديان الذي يتوزع في الجزء العلوي والمقدم للحاجز والقربني العلوي ومثل ذلك في التوزع فروع من العقدة الوتدية الحنكية. والعصب الانفي الحنكي يتوزع في منتصف الحاجز. والعصب الحنكي المقدم في العظمين الاسفنجيين المتوسط والسفلي

العين

العين آلة البصر وهي موضوعة في التجويف المحجاجي وقاية لها من الافات وعلى كيفية تكتمها من مجال واسع في البصر. ولها عضلات كثيرة تحركها الى جميع الجهات واوعية واعصاب واجزاء اضافية لاجل زيادة وقايتها كالحجاب والمجنين وغيرها. وهي كروية الشكل الا ان قطرها الامامي الخلفي اطول من قطرها المستعرض بنحو خط وذلك لسبب بروز القرنية التي يتكوّن منها نحو سدس الكرة. ومحور العين الواحدة منها يقرب ان يكون موازياً لمحور الاخرى ولكنه غير مواز لمحور الحجاج الذي يتجه الى الوحشية وانما اتجاه العصب البصري تابع لاتجاه المحور المحجاجي لانه يدخل المقلة الى الجهة الانسية او الانفية قليلاً

المقلة مؤلفة من طبقات غلافية واطواس كاسرة لاشعة النور يقال لها رطوبات فالطبقات ثلاث: ١ الصلبة والقرنية ٢ المشيمية والقزحية والزوائد الهدبية ٣ الشبكية والاطواس الكاسرة او الرطوبات ثلاثة ايضاً: ١ المائية ٢ البلورية والحفظة ٣ الزجاجية الطبقة الاولى وهي الظاهرة مؤلفة من الصلبة والقرنية. بناؤها الجوهري من النسيج الليفي. الصلبة مظلمة تكوّن خمسة اسداس الكرة والقرنية شفافة تكوّن السدس الباقي المقدم الطبقة الصلبة غشاء ليفي صلب كثيف يتوقف عليه الشكل الكروي للعين. وهي اغلظ جداً في الخلف منها في المقدم. وجهها الظاهر ابيض املس الا عند اندغام العضلات فيها ويغطي بعضها الغشاء الملتحم. وجهها الباطن ملطوخ بمادة سمراء من المشيمية وعليه ثلوم تستقر فيها الاعصاب الهدبية ويتصل بالوجه الظاهر للمشيمية بواسطة نسيج خلوي دقيق جداً. وينتهي من وراء العصب البصري منحرفاً نحو جانبيها الانسي او الانفي قليلاً وهي ممتدة من غده الليفي الناشئ من الام الجافية. ثم ان الطبقة المذكورة عند نقطة مرور العصب البصري منها تكوّن ورقة رقيقة غربالية تمر من ثقبها الدقيقة الخيوط العصبية التي يتالف منها العصب البصري. واكبر هذه

الحفرتان للانف. واما حدود الحفرتين المذكورتين والفتحات المتصلة بهما فقد مرّ الكلام عليها في فصل العظام (وجه ٧٢)

ويقال للغشاء المخاطي المبطن لها الغشاء النخامي باعتبار الافراز النخامي الذي يرشح منه. وينسب احياناً الى المعلم شنيدر الذي اظهر اولاً ان المادة النخامية تُفرز من الغشاء المخاطي لا من الدماغ كما كان يُظنّ قبل زمانه. وهو ملتصق التصاقاً شديداً بالسحاق الواقع تحته وممتد من الجلد بواسطة المنخرين ومخاطب بالغشاء المخاطي المبطن للبلعوم بواسطة الفتحين الخلفيتين. وقد يستقضى اتصاله الى ملتحم العين بواسطة القناة الانفية والقناتين الدمعيتين وبالغشاء المبطن للطلبة والخلايا الحليمية بواسطة قناة اوستاكيوس وبالجيوب الجبهية والمصفوية والوتدية والكهف بواسطة فتحات واصلة اليها من الاصمحة. وهو غليظ على العظام القرينية والحاجز ورقيق فيما بقي ومغطى بكرات منها سطحية ومنها هديية. وفيه طبقة من الغدد المخاطية نصب قنواتها على سطحه. والغشاء المذكور نظراً الى سماكته يحدث منه ان الفتحات التي توجد في الهيكل العظمي تضيق او تُسد بالكلية

واما الفتحات الواصلة الى الحفرتين الانفيتين في الصماخ العلوي الفتحه للخلايا المصفوية الخلفية وقد صغر قطرهما جداً والثقب الوتدي الحنكي وقد انسد بالكلية بواسطة الغشاء المخاطي. وفي الصماخ المتوسط فتحه القمع وتحتها ثنية من الغشاء المخاطي وفتح الكهف وقد صارت ثقباً ضيقاً مستديراً. وفي الصماخ السفلي فتحه القناة الانفية بعضها مخفي بواسطة ثنية مخاطية وفتحه القناة الحنكية المتقدمة مسدودة في الغالب. وفي السقف الفتحه للجبب الوتدي ضيقة وفتحات الصفيحة الغربالية مسدودة



وشرايين الحفرتين الانفيتين المصفوي المقدم والحلفي من العيني اللذان يتوزعان في الاخية المصفوية والجبين الجبهيين وسقف الانف. والوتدي الحنكي وهو الانفي من الفك الباطن الذي يتوزع في الغشاء المخاطي المغطي للعظام الاسفنجية والاصمحة والحاجز والفرع السخي للفكي الباطن الذي يتوزع في الغشاء المبطن للكهف. والفروع المذكورة تتواصل وتكون شبكة واقعة في جوهر الغشاء المخاطي وتحته. واوردها تكوّن شبكة خشكة تحت الغشاء المخاطي فيصب بعضها في الوريدين المرافقين للشريان الانفي المار من الثقب الوتدي الحنكي وبعضها في الوجهي وبعضها في العيني وبعضها في الاوردة التي في باطن الجمجمة بواسطة الثقوب الغربالية

واعصابها اولاً العصب الشهي الخاص بحاسة الشم الذي يتوزع على الثلث العلوي للحاجز وعلى سطح العظمين الاسفنجيين العلوي والمتوسط. ثم الفرع الانفي للعيني الذي يتوزع في الجزء

يكنهما من الحركة السهلة

شكل ٢٤٧

شكل ٢٤٦



وأما عضلات الأنف فموضوعة تحت الجلد وهي إلى كلٍّ من الجانبيين الهرمية الأنفية والرافعة للشفة العليا وجناح الأنف والمددتان للأنف والضاعطتان للأنف والخافضة لجناح الأنف. والجلد الذي يغطي ظهر الأنف وجانبيه رقيق متصل بما دونه من الأجزاء اتصالاً رخواً الأعد راس وجناحي الأنف فإنه سميك شديد الالتصاق. وفيه اجربة كثيرة شمعية فوهاتهما واضحة غالباً. والغشاء المخاطي المبطن لباطن الأنف ممتد من الجلد الذي على الظاهر. وشرايين الأنف الشريان الأنفي الجانبي من الوجهي والأنفي المحاجزي من الأكيلى العلوي الذي يتوزع في الجناحين والمحاجز والفرع الأنفي للعيني وتحت الحجاج اللذان يتوزعان في ظهر الأنف وجانبيه. وأوردة الأنف تصب في الوريد الوجهي والوريد العيني. وأعصاب الأنف فروع من الوجهي وتحت الحجاج وتحت البكرة وخيط من الفرع الأنفي للعيني


في الحفرتين الانفيتين

الحفرتان الانفيتان تجوفان غير منتظمين موضوعان في منتصف الوجه ممتدان من الأمام إلى الخلف. ولهما فتحتان من المقدم هما المنخران وفتحتان من الخلف تنهيان في البلعوم هما الفتحتان


شكل ٢٤٦ الفاصل العظمي والعضوري بين الحفرتين الانفيتين كما يشاهد من اليسار " العظم الأنفي b الفك العلوي c الجيب الوتدي d الصفيحة العمودية للعظم المصفوي e المبيكة f * النسم الانسي للعضروف الجانبي السفلي الايمن ٤ العضروف الفاصل

شكل ٢٤٧ الجدار الوحشي للحفرة الأنفية اليسرى مغطى بالغشاء التامى ١ العظم الجبهى ٢ العظم الأنفى ٣ الفك العلوي ٤ الوتدي ٥ الترنبي العلوي ٦ الترنبي المتوسط ٧ الترنبي السفلي ٨ فتحة قناة أوستاكيوس ٩ الفتحة السفلى للفتاة الأنفية وهي الدمعية. وأما الأصحة الثلاثة فتشاهد بين العظام الترنبية الثلاثة

الظاهر والاخر الى الباطن نحو التجويف الانفي . والغضروفان الجانبيان السفليان صفيحتان



شكل ٢٤٥



شكل ٢٤٤

رقيقتان لدنتان موضوعتان اسفل الغضروفين السابقين منحنيتان بحيث يتكوّن منها الجدار الوحشي والجدار الانسي لفتحة المنخر . فالجزء الذي يكوّن الجدار الانسي اغلظ من الجزء الاخر ومتصل برقيقه من الجانب المخالف انصلاً رخواً ومنه يتكوّن جزء صغير من الفاصل الانفي . والطرف الوحشي للجزء المذكور سائب مستدير بارز يدخل في تكوين فص الانف . واما الجزء الذي يكوّن الجدار الوحشي فنحن على ما يشاهد من انحناء جناح الانف وهو بيضي الشكل مسطح ضيق من الخلف حيث يتصل بالتوالي للفتك العلوي بواسطة غشاء متين ليفي يتضمن ثلاث او اربع صفايح غضروفية صغيرة يقال لها الغضاريف السمسمانية . من الاعلى يتصل بالغضروف الجانبي العلوي وبمقدم غضروف الفاصل . ومن الاسفل ينفصل عن حافة المنخر بواسطة نسيج خلوي كثيف . ومن المقدم يكوّن مع رقيقه بروز راس الانف . وغضروف الفاصل يقرب شكله من المثلث وهو فاصل بين الحفرتين الانفيتين الى المقدم ويدوم الفصل الى الخلف بواسطة الصفيحة العمودية للمصفوي والميكعة . تتصل حافته المقدمة من الاعلى الى الاسفل بالعظمين الانبيين والجزء المقدم للغضروفين الجانبيين العلويين والجزء الانسي للغضروفين الجانبيين السفليين . وتتصل حافته الخلفية بالصفيحة العمودية للمصفوي وحافته السفلى بالميكعة والتتوين الحنكيين للفتكين العلويين . وجميع هذه الغضاريف متصلة بعضها ببعض بواسطة غشاء ليفي

شكل ٢٤٤ الغضاريف اللينة للانف ١ احد العظمين الانبيين ٢ غضروف الفاصل ٣ الغضروف الجانبي العلوي ٤ الغضروف الجانبي السفلي ويقال له الجناحي ٥ جزءه المركزي ٦ الغضاريف السمسانية ٧ المنخر
شكل ٢٤٥ غضاريف الانف وعظامه كما تشاهد من الجانب a العظم الانفي b التتوالي للفتك العلوي ١ الغضروف الجانبي العلوي ٢ الغضروف الجانبي السفلي وهو الجناحي ٣ جزءه الانسي ٤ الغضاريف السمسانية

الانف

العضلة اللسانية التي مر ذكرها في باب العضلات. والالياف المستعرضة موضوعة بين الطبقتين السابقتين وتخالطها كمية وافرة من المادة الدهنية ومنها يتكون معظم جواهر اللسان واما شرايين اللسان فمن اللساني والوحي والبلعومي الصاعد. واعصابه ثلاثة لكل شطروهي اولاً الفرع الذوقي من الخماس الذي يتوزع في حلويات مقدم وجانبي اللسان. ثانياً الفرع اللساني من البلعومي اللساني الذي يتوزع في الغشاء المخاطي عند قاعدة وجانبي اللسان وفي الحلويات المخندقة. وثالثاً العصب تحت اللسان الذي يتوزع في الجواهر العضلي. فالعصبان الاولان للحس العام والخاص والثالث للحركة

الانف

الانف هو العضو الخاص بحاسة الشم الذي بقي الرئتين من استنشاق الغازات المضرة ويعين عضو الذوق في تمييز خصائص الطعام. ويقسم عضو الشم الى قسمين احدهما ظاهر هو الانف والاخر باطن هو الحفرتان الانفيتان

فالانف مثلث الشكل متجه الى الاسفل اتجاهاً عمودياً بارز من مركز الوجه اعلى الشفة العليا. قمته ويقال لها الجذر ايضاً متصلة بالجبهة رأساً وقاعدته وهي طرفه السفلي فيها فتحتان اهليلجيتان هما المنخران يفصلهما فاصل من الامام الى الخلف هو الحاجز الانفي. وقد تجهزت المنخران المذكورتان بشعر منتصب فائدته توقيف المواد الغريبة الطائرة في الهواء عن العبور الى المسالك الهوائية. ويتكون من اتحاد الوجهين الجانبيين الظهر الذي يتخلف اتجاهاً بحسب اختلاف الاشخاص. وينتهي الظهر في الاسفل ب بروز مستدير يقال له فص الانف

والانف مؤلف من هيكل بعضه عظمي وبعضه غضروفي تغطيه بعض عضلات ثم الجلد من الظاهر وغشاء مخاطي من الباطن. فالعظام التي تدخل في تاليف الهيكل المذكور هي العظام الانفيان والتوان الانفيان للفكين العلويين

اما الهيكل الغضروفي فهو مؤلف من خمس قطع وهي غضروفان علويان جانبيان وغضروفان سفليان جانبيان وغضروف الفاصل. فالغضروفان الجانبيان العلويان موضوعان اسفل الحافة السائبة للعظمين الانفيين. كل منهما مسطح مثلث الشكل حافته المقدمة اغلظ من الخلفية ومتصلة بغضروف الفاصل. وحافته الخلفية متصلة بالتوان الانفي للفك العلوي وبالعظم الانفي. حافته السفلى متصلة بالغضروف الجانبي السفلي بواسطة نسج ليفي. وله وجهان احدهما مشرف الى

لانها تنفذ من السطح وتبرز كالحمل المعوية. وهذه الحليمة على ثلاثة انواع كبرى ووسطى وصغرى. فالحليمة الكبرى كبيرة الحجم وعددها من ثمان الى عشر موضوعة بقرب قاعدة اللسان على شكل رقم السبعة اذا كان انفرجه مشرفاً نحو المقدم هكذا < . وهي بارزة مسطحة مستديرة الشكل متصلة من اسفلها بمركز حفرة كاسية الشكل ولما كان وضعها على الكيفية المذكورة كانت حولها حفرة مستديرة على هيئة الخندق المحيط باسوار المدينة ولذلك سموها الحليمة الخندقة . والحليمة الوسطى ويقال لها الفطرية ايضاً اكثر من سابقتها ومتفرقة على ظهر اللسان واكثر وجودها على جانبيه ورأسه وتتميز عما بقي من الحليمة بواسطة كبرها واستدارتها وحجرة لونها . وهي ضيقة عند اتصالها باللسان واسعة ومستديرة عند طرفها السائب وتغطيها حليمة ثانوية . والحليمة الصغرى ويقال لها الخيطية ايضاً تغطي الثلثين المقدمين لظهر اللسان . وهي دقيقة جداً مخروطية او خيطية الشكل مصفوفة صفوفاً تقابل صفي الحليمة الخندقة الا عند راس اللسان حيث وضعها عرضي وتغطيها حليمة ثانوية . وهي شديدة لدنة وكثيراً ما تتضمن شعراً دقيقاً . واما بناء الحليمة اللسانية فيظهر انه كبناء الحليمة الجلدية فانها مؤلفة من بروزات مخروطية الشكل مغطاة بطبقة سميكة من الكريات السطحية وتدخلها اوعية دموية واعصاب . ويوجد في الغشاء المخاطي للسان عدد وافر من الاجربة والغدد المخاطية . وبناء الغدد المذكورة كبناء الغدد الشفوية والثنية واكثر وجودها في الثلث الخلفي لظهر اللسان . وتصب قنواتها على سطح اللسان او في الحفر المحيطة بالحليمة الكبيرة

واما الطبقة السطحية فكاللبشرة للجلد مؤلفة من كريات وتغطي جميع الوجه السائب للسان . وقد تنصل برمتها عن اللسان بواسطة النتع او الغلي . وقد يمكن فصل كرياتها الغائرة على شكل طبقة مستقلة تقابل الشبكة المخاطية للجلد الا انه لا يوجد فيها مواد ملونة ثم ان اللسان منتسم طولاً الى شطرين متساويين بواسطة فاصل ليفي البناء . كل شطر منهما مؤلف من الياف عضلية ومواد دهنية ويحيطه غشاء مخاطي ودون ذلك طبقة ليفية تندغم بها الالياف العضلية التي تذهب الى الجهة السطحية للسان . وترتبط قاعدة اللسان بالعظم اللامي بواسطة رباط ليفي يقال له الغشاء اللامي اللساني . واما العضلات التي يتالف منها كل شطر فهي اولاً العضلات التي مر ذكرها وهي اللامية اللسانية والذقنية اللامية اللسانية والابرية اللسانية واللوية اللسانية وبعض العاصرة العليا وثانياً الياف عضلية منها الياف طولية عليا ومنها طولية سفلى ومنها مستعرضة . فالالياف الطولية العليا (ويقال لها العضلة اللسانية السطحية) طبقة سطحية من الياف منحرفة وطولية ممتدة من راس اللسان الى العظم اللامي . والالياف الطولية السفلى هي

ومنعكس من البشرة. ثم ان ما في باطن الغدد العرقية الصغيرة سائل وما في باطن الكبيرة منها مائل الى الجمودة مظلم يتضمن حبيبات ملوثة

اللسان

اللسان عضو الحس الخاص بالذوق . وهو موضوع في ارض الفم في الخلاء الواقع بين الجزئين الجانبيين لجسم الفك السفلي . قاعدته متجهة الى الخلف ومتصلة بالعظم اللامي بواسطة عضلات كثيرة ولسان المزمار بواسطة ثلاث ثنيات من الغشاء المخاطي

شكل ٢٤٢



وبالتهاء والبلعوم بواسطة القائمتين المتقدمتين والقائمتين الخلفيتين . ورأسه رقيق ضيق مشرف الى المقدم مقابل الوجه الباطن للاسنان القواطع السفلي . وجهه السفلي متصل بالفك السفلي بواسطة العضلتين الذقنيتين اللاميتين اللسانيتين . ومن جانبيه ينعكس الغشاء المخاطي الى الوجه الباطن للثة . وعند مقدمه تحت وجهه السفلي ثنية خاصة من الغشاء المذكور يقال لها قيد اللسان . واما ظهر اللسان فعليه اثر في الخط المتوسط يقسمه الى شطرين متساويين . وينتهي الاثر المذكور على بعد نحو نصف قيراط من قاعدة اللسان الى مقدم جراب مخاطي غائر يقال له الثقب الاعور . ثم ان الثلثين المقدمين للظهر خشنان مغطيان بحليجات وثلاثة الخلفي امس مغطى بغدد مخاطية

واللسان محاط على جميع مساحته السائبة بغشاء مخاطي . وبناء الغشاء المذكور كبناء الجلد فانه مؤلف من ادمة حاملة حليجات كثيرة وبشرة تغطيها كريات سطحية اما الادمة فبناؤها كبناء ادمة الجلد الا انها ارق واقل كثافة وتوزع فيها الاوعية والاعصاب التي ترسل فروعاً الى الحليجات وتندغم بها الياف العضلات الخاصة باللسان . والحليجات منتشرة على جميع الوجه العلوي للسان فتكسبه الخشونة الخاصة به وهي اكثر بروزاً من الحليجات الجلدية

شكل ٢٤٢ اللسان وحليجته الاثر الطولي الذي يقسم اللسان الى شطرين . وقد يتشعب شعبتين كما يشاهد عند القاعدة في الرسم ٢ و٢ شطر اللسان . واما البروزات المستديرة التي تشاهد في هذا الجزء وعند حافتي اللسان ورأسه فهي الحليجات النظرية . والحليجات الصغيرة التي تشاهد الحليجات النظرية متفرقة بينها في الحليجات الخيطية ٢ رأس اللسان ٤ و٤ حافته ٥ الحليجات الخندقة ٦ الثقب الاعور ٧ و٧ غدد مخاطية عند قاعدة اللسان ٨ اسان المزمار ٩ و٩ ثلاث ثنيات مخاطية تربط اسان المزمار باللسان . او ١٠ الترنان العظيمان للعظم اللامي

الشعر اللون الخاص به

وجذع الشعرة مؤلف من جزء مركزي يقال له الخنخاع ويحيطه جزء ليفي ثم الى الظاهر من ذلك الجزء الفشري. فالخنخاع شاغل لمركز الجذع وهو مفقود غالباً في الشعر الدقيق الذي يغطي سطح الجسد ومؤلف من كريات متضمنة حبيبات ملونة اودهنية. والجزء الليفي يتكوّن منه معظم الجذع وهو مؤلف من كريات مستطيلة لتحد وتكوّن اليافاً مغزلية الشكل. واما الكريات التي يتألف منها الجزء الفشري فموضوعة على هيئة طبقة مفردة محيطية بالجزء الليفي لتتحول الى قشور رقيقة مسطحة

والغدد الشحمية اكياس صغيرة موضوعة في جوهر الكوريون وموجودة في اكثر اجزاء الجلد ولا سيما في جلد الراس والوجه وحول فتحات الاست والانف والشم والاذن الظاهرة ولا توجد في راحة اليد واخص القدم. كل غدة منها مكوّنة من قناة واحدة ينتهي طرفها الغائر بانتفاخ كيسي الشكل ذي تجاويف كثيرة يختلف عددها من اثنين الى عشرين. والقناة المذكورة مبطنة بكريات سطحية (قشرية) حاوية دقائق من المادة الشحمية اذا تساقطت الى باطن القناة كانت الافراز الخاص بهذه الغدد. وفي الغالب تنفتح القنوات الى الاجربة الشعرية ويندر انتماحها الى سطح الجلد رأساً. وهذه الغدد كبيرة في الوجه وعند جناحي الانف وقد يخرج افرازها بالضغط على هيئة ديدان صغيرة واكبرها غدد ميوبوميوس الواقعة في الاجفان. وفائدة هذا الافراز تليين الجلد

والغدد العرقية اعضاء تُفرز بواسطتها معظم المواد المائية والبخارية التي تخرج من الجلد موضوعة في حفر صغيرة في الاجزاء الغائرة للكوريون او في النسيج الخلوي الذي تحت الجلد محاطة بمواد دهنية. وهي اجسام صغيرة حمراء ذات فصوص مكوّنة من انبوبة متلففة تنتهي بالقناة الناقلة. والقناة المذكورة تسير في جوهر الكوريون الى الاعلى سيراً مغزلياً ثم تستقيم وتنتهي على سطح البشرة بفتحة وريثة. وحجم هذه الغدد كبير في الاجزاء التي العرق فيها كثير كالابط والأربية وهي كثيرة العدد في راحة اليد حيث تُشاهد بالمكروسكوب فتحاتها في الثلوم التي تقاطع الخطوط البارزة وقد حسب المعلم كراوس ٢٨٠٠ فتحة لكل قيراط مربع في الراحة واقل من ذلك في الاخص وقال ان عدد جميع الفتحات في الجلد ٢٢٨١٢٤٨ وان ذلك يساوي مساحة ثمانية قراريط مربعة. واما تاليف الانبوبة التي تتكوّن من تلافيفها الغدة فمن طبقتين احدها ظاهرة مكوّنة من نسيج خلوي دقيق والثانية باطنه مكوّنة من كريات سطحية على هيئة غشاء مبطّن للطبقة الظاهرة

الاجزاء الاضافية للجلد

الاجزاء الاضافية للجلد الاظفار والشعر والغدد العرقية والغدد الشحمية وقنواتها. اما الاظفار والشعر فمن باب البشرة لان بناءها الجوهري واحد


الاظفار ابنية مسطحة لدنة قرنية موضوعة على الوجه الظهري للسلاميات الاخيرة وهي محدبة من وجهها الظاهر مقعرة من الباطن . ينقسم كل ظفر الى ثلاثة اقسام وهي اولاً الجذر المنغرس في ميزاب من الجلد ثانياً الجسم وهو الجزء الظاهر وثالثاً الحافة السائبة وهي الطرف المقدم. والظفر ملتصق التصاقاً شديداً بالادمة وموضوع وضعاً محكماً على وجهها الظاهر كوضع البشرة في محال اخر. ويقال للادمة النابت عليها الظفر الاصل لانه يتولد منها. وفي الاصل المذكور حلقات كثيرة الاوعية يشاهد لونها الوردي بواسطة شفاقة الظفر. ثم ان البشرة متصلة بالجذر وبالوجه السفلي للظفر اسفل حافته السائبة ولما كان بناء البشرة والظفر واحداً شوهد ان الظفر امتداد البشرة فان الاظفار مؤلفة من كريات موضوعة على شكل صفائح متراكبة كبناء البشرة . فكلما اندفعت كريات جديدة عند الجذر والوجه السفلي نما الظفر الى المقدم واما الكريات القديمة فانها تجف وتلتصق مكونة للجوهر القرني الظفري

والشعر كالبشرة في البناء وهو موجود على جميع سطح الجسد الا الراحة والاحص ويختلف في الطول والغلظ واللون تبعاً لافراد الناس وانواعهم. وقد يكون قصيراً يكاد لا يخرج من جرابه وطويلاً كشعر الراس وغليظاً كشعر الاهداب والوجه. وتنقسم الشعرة الى جذر وهو الجزء المنغرس في الجلد وجذع وهو ما كان بارزاً من السطح ورأس

اما الجذر فمستنقع عند طرفه على هيئة بصلة وهو ابيض اللون وارضى قواماً من الجذع مستقر في جراب مكوّن من انعكاس البشرة الى الباطن يقال له الجراب الشعري . فاذا كان الشعر طويلاً امتد الجراب الى النسج الخلوي الذي تحت الجلد . والجراب المذكور بصلي الشكل عند طرفه الغائر تصب فيه قناة او اكثر من الغدد الشحمية وهو مؤلف من طبقتين احدها ظاهرة مكونة من نسج خلوي ممتد من الكوريون والثانية باطنة مكونة من انعكاس البشرة فاذا قُلت شعرة خرج معها غالباً الطبقة البشرية على هيئة غمد للجذر. ثم انه يوجد عند قاعدة الجراب ارتفاع وعائي شبيه بالحلمات الحسية منه تتولد الشعرة وتنمو. واما الجذر نفسه فمستقر على الارتفاع المذكور وممتد من الطبقة البشرية المبطنة للجراب وهو مؤلف من كريات شبيهة بكرات البشرة كلها اخذت في النمو اندفعت الى الاعلى ويوجد في بعضها حبيبات ملونة هي التي تعطي

واما البشرة فعباره عن قشرة الجلد وهي موضوعة وضعا محكما على الطبقة الحليمية للادمة فتكون غطاء واقيا لسطح الجلد الحقيقي وتضع حدا للتغير المائي الذي يتصاعد من وجهه السائب. وتختلف في السماكة بحسب المحل فتكون سميكة صلبة قرنية في الاجزاء المعرضة للضغط والتاثير الجوي كراحة اليد واخص القدم ورخوة خلوية البناء في ما بقي. وهي مؤلفة من طبقات متراكبة يقال للطبقات الغائرة منها الشبكة المخاطية لانه يوجد فيها اسناخ او فتحات كاملة تشغلها الحليمات البارزة. واما الوجه السائب وهو الظاهر للبشرة فعليه خطوط محفورة تتقاطع فتكون اخلية كثيرة الجوانب او معينة الشكل. وهذه الثلوم كبيرة مقابل ثنيات المفاصل ودقيقة في غير اماكن كظهر اليد وهي واضحة في راحة اليد والاخص وموضوعة على شكل خطوط منحنية فاصلة بين الخطوط البارزة التي بروزها موقوف على وضع الحليمات صفوفاً. وتخرق البشرة قنيات واصلة الى قنوات الغدد الجلدية. واما البناء المكرسكوبي للبشرة فن كريات مسطحة ملتصقة

شكل ٢٤٢



بعضها ببعض ومرتب على شكل صفائح متراكبة في الطبقات الغائرة الكريات كبيرة ومستديرة او مستطيلة مشغولة بمادة مظلمة رخوة وفي الطبقات السطحية الكريات مسطحة شفافة جافة يستحيل ما في باطنها الى مادة قرنية. والسبب في هذا الاختلاف هو ان الكريات المذكورة تتولد في السائل الدموي وتُسكَب على الوجه الظاهر للادمة فكلما تقاربت الى الجهة السطحية تسطحت بواسطة

تجذ السائل الذي في باطنها فتجف وتصير على هيئة قشرة جافة. ثم ان اللون الاسود في الزنج والاسمر في السممر موقوف على وجود مادة ملونة ضمن الكريات ولا سيما في الغائرة منها الواقعة في الشبكة المخاطية وهي شبيهة بالمادة الملونة الموجودة في مشيمية العين

واما الشرايين التي تتوزع في الجلد فتتقسم اولاً الى فريعات في النسيج الذي تحت الجلد ثم تمر من اخلية الكوربون وتكون ضفيرة شعرية تتوزع في غدد الجلد واجربة الشعر وتنتهي في الطبقة الحليمية. والاوعية الليمفاوية كثيرة ولا سيما في الصفن وحول حمة الثدي. والاعصاب تصعد من اخلية الكوربون مع الاوعية الى الطبقة السطحية للادمة فتكون هناك ضفائر دقيقة تذهب منها فريعات الى الحليمات الحسية

شكل ٢٤٢ تكوين البشرة والكريات السطحية على العمود تبعاً لمذهب المعلم ثوان ١ حبيبة متولدة من السائل الدموي ٢ كرية متولدة من الحبيبة فصارت الحبيبة نواة لما ٣ كرية كروية الشكل ٤ كرية بيضية الشكل ٥ كرية اهليلجية الشكل ٦ كرية مسطحة فاذا تلامست جدرانها صارت قشرة ٧ قشرة نوية كانهامد من وجهها السطح ٨ مجموع كريات قشرية. وجميع ذلك ادوار متعاقبة في تكوين البشرة كما يظهر لدى النامل

فيه. وقد قسموا الادمة الى طبقتين طبقة غائرة يقال لها الكوربون وهي كلمة يونانية معناها الجلد وطبقة سطحية يقال لها الحلمية لوقوع الحليمات الحسية فيها
 فاكوربون مكوّن من حزم ليفية متينة معظم بنائه من النسيج الليفي الابيض الا انه يخالطه بعض الياف من النسيج الاصفر اللدن. والحزم المذكورة غليظة عند وجهه الباطن والخلايا المكوّنة من نصاب الحزم كبيرة تشغها مادة دهنية والغدد العرقية. وهذا الوجه ممتزج بالنسيج الخلوي الذي تحت الجلد. واما الوجه الظاهر فحزمه دقيقة حشكة التقاطع صغيرة الخلايا. ثم ان الكوربون يختلف في السماكة من ربع خط الى خط ونصف تبعاً للشغل الواقع فيه فهو سميك في الجهات المعرضة كراحة اليد واخص القدم وهو اسمك في الجهة الخلفية للجسد منه في المقدم وفي الوحشية للاطراف منه في الانسية. وهو رقيق لطيف جداً في الاجفان والصفن والقضيب. وفي الغالب الجلد اسمك في الذكور منه في الاناث والخلايا مشغولة بمادة دهنية وبالاخرية الشعرية والغدد العرقية والشحمية وتخرقها الاوعية الدموية والاعصاب الصاعدة الى الطبقة السطحية. ويوجد في الطبقات السطحية للكوربون الياف عضلية غير مخططة يتوقف على عملها تكثرش الجلد الذي يشاهد مدة البرد

والطبقة الحلمية واقعة على الوجه الظاهر للكوربون ومكوّنة من ارتفاعات عديدة دقيقة وعائية في غابة ما يكون من الحس تبرز عمودياً من وجهه المذكور يقال
 شكل ٢٤١
 لها الحليمات وهي الجزء الجوهري في عضو اللمس. والحليمات المذكورة بروزات مخروطية الشكل قواعدها متصلة بالكوربون ورؤوسها مشرفة الى الجهة السطحية. طول الواحدة منها نحو $\frac{1}{3}$ من القيراط وقطر قاعدتها نحو $\frac{1}{20}$. وهي قليلة العدد ودقيقة وغير منتظمة الانتشار على السطح العام للجسد ولكنها كثيرة وكبيرة في الاجزاء الشديدة الحس كالوجه الراحي لليد والاصابع والاخص وحول حلة الثدي وموضوعة على شكل خطوط منحنية متوازية تتكوّن منها الخطوط البارزة التي تشاهد على الوجه السائب للبشرة. بناؤها من الياف بعضها لدن وتنتهي في كل واحدة منها فريعات دموية على شكل عروات وفريعات عصبية كيفية انتهائها غير معلومة. ولم تشاهد الى الآن اوعية ليفاوية في الحليمات

شكل ٢٤١ قطعة من جلد راحة اليد ١ الطبقة الحلمية ٢ ثلوم طويلة تدل على وضع الحليمات على هيئة خطوط بارزة ٣ ثلوم عرضية تقسم الخطوط البارزة الى قطع صغيرة مربعة ٤ الشبكة المناطية وقد قُلبت عن الطبقة الحلمية فيشاهد على وجهها السفلي التقاعير المسببة عن بروز الحليمات ٥ قنوات عرقية تقوّمت بواسطة قلب الشبكة المناطية عن الادمة

الفصل الثامن


في اعضاء الحواس

اعضاء الحواس آلات يدرك بها العقل الاجسام الخارجة. وهي خمسة عضو اللمس والشم والذوق والسمع والبصر

الجلد

الجلد هو المجلس الرئيسي لحاسة اللمس. وهو غشاية ايضاً لوقاية الانسجة الغائرة وآلة معتبرة للافراز والامتصاص. تاليفة من طبقتين الادمة الى الباطن والبشرة الى الظاهر. ويقال للآدمة الجلد الحقيقي ايضاً

شكل ٢٤٠



اما الادمة فالجليات الحسية واقعة على سطحها والغدد العرقية والاجربة الشعرية والغدد الشحمية واقعة ضمن سماكتها او منغرسه في النسيج الخلوي الذي اسفلها. وهي مرنة في غاية ما يكون من اللدونة متينة على درجة عجيبة من الموافقة لوقاية الاجزاء الباطنة من الافاث. تاليفها من نسيج ليفي خلوي يداخله كثير من الاوعية الدموية والليمفاوية والاعصاب. والنسيج المذكور مكون من الياف بيض متصلة بالوضع يخالطها بعض الياف صفراء كثيرة او قليلة بحسب الجزء الواقعة

شكل ٢٤٠. فطع عمودي للجلد ١ البشرة ٢ الشبكة المحاطية وهي الطبقة الغائرة للبشرة ٣ ثننان من الجليبات الواقعة على سطح الادمة كما تشاهد في راحة اليد واخص القدم ٤ الكوريون وهو الطبقة الغائرة للادمة ٥ كريات دهنية ٦ غدة عرقية وفتاتها المغزاية كما يشاهد في راحة اليد واخص القدم ٧ غدة عرقية وفتاتها اكثر استقامة من الالفة كما يشاهد في جلد الراس ٨ شعرتان من شعر الراس مغلقتان يجراب لكل منها ٩ زوج من الغدد الشحمية وهما مستطرفتان الى جراب الشعرة بواسطة قناتين قصيرتين

بفروع من الضفيرة الباسورية العليا

والضفيرة المثانية تنشأ من مقدم الضفيرة الحوضية. اعصابها كثيرة متضمنة جانباً عظيماً من الياف شوكية وتصاحب الشرايين المثانية وتوزع في جانب المثانة وقاعدتها. وتذهب منها أيضاً خيوط كثيرة للحويصلتين المنويتين والقناة الناقلة

والضفيرة البروستاتية ممتدة من الجزء السفلي للضفيرة الحوضية. اعصابها كبيرة تتوزع في الغدة البروستاتا والحويصلتين المنويتين والبنا الانتصابي للفضيب. فالاعصاب التي تتوزع في البناء الانتصابي مقسومة الى قسمين هما اعصاب كهفية صغيرة تثقب الغطاء الليفي للفضيب عند اصله واعصاب كهفية كبيرة تسير الى المقدم على ظهر الفضيب وتتصل بالفرع الظهري للعصب الاستحيائي وتوزع في الجسم الكهفي والجسم الاسفنجي

والضفيرة المهبلية تنشأ من الجزء السفلي للضفيرة الحوضية وتوزع في جدران المهبل. ويختلط باعصاب هذه الضفيرة مقدار عظيم من الالياف الشوكية

والاعصاب الرحمية تنشأ من الجزء السفلي للضفيرة الخلفية اعلى اتصال فروع الاعصاب بالضفيرة الحوضية. وتصاحب الشرايين الرحمية الى جانب الرحم بين طبقتي الرباط العريض وتوزع في عنق الرحم والجزء السفلي لجسمه. وتذهب منها خيوط لجسم الرحم وقناتي فلويبيوس

الصدرية. فروعها العليا والسفلى مستطرفة بين العقد. وفروعها الوحشية تتواصل بالاعصاب القطنية الشوكية وهي غالباً اثنان لكل عقدة ونصاحب الشرايين القطنية حول اجسام الفقرات ثم تحت الاقواس الليفية التي تنشا منها بعض الياف العضلة الصلبية. وفروعها الانسية تسير الى الانسية الى مقدم الاورطي فتكون بعض الضفيرة الاورطية التي مر ذكرها. وينزل بعض هذه الفروع الى مقدم الشريانين الحرقفيين الاصليين فاذا وصلت الى الحافة العليا للعجز تواصلت وكونت الضفيرة الختلية. وتذهب منها خيوط دقيقة لاجسام الفقرات واربطتها

القسم الحوضي للسمباتوي

هذا القسم موضوع الى مقدم العجز على الجانب الانسي للثقب العجزية المقدمة. وهو مؤلف من اربع او خمس عقد على كل جانب متصلة بواسطة حبال مستطرفة بينها. ويتجد الحبلان السفليان الى مقدم العصعص بواسطة عقدة صغيرة يقال لها العقدة الفردة. الفروع العليا والسفلى حبال مستطرفة بين العقد في الاعلى والاسفل. والفروع الوحشية قصيرة جداً تتواصل بالاعصاب العجزية وهي اثنان لكل عقدة. وتتواصل العصب العصصي بالعجزي الاخير او بالعقدة الفردة. والفروع الانسية تتواصل الى مقدم العجز بالفروع التي تقابلها من الجانب المخالف فتتكون من الفروع العليا بعض الضفيرة الحوضية ومن السفلى ضفيرة نصاحب الشريان العجزي المتوسط

والضفيرة الختلية تتوزع في احشاء التجويف الحوضي. وضعها الى مقدم قاعدة العجز بين الشريانين الحرقفيين الاصليين. وهي مكونة من اتحاد خيوط كثيرة تنزل من جانب الضفيرة الاورطية والعقد القطنية والعقدتين الاوليتين العجزيتين. وتنقسم الضفيرة الختلية في الاسفل الى جزئين جانبيين هما الضفيران الختليتان السفليتان ويقال لها ايضاً الضفيران الحوضيتان

الضفيرة الختلية السفلى وهي الحوضية

هذه الضفيرة موضوعة بجانب المستقيم والمثانة في الذكور وبجانب المستقيم والمهبل والمثانة في الاناث. وهي مكونة اولاً من امتداد الضفيرة الختلية وثانياً من فروع ناشئة من العصب الثاني والثالث والرابع العجزية وثالثاً من بعض خيوط ناشئة من العقد العجزية. وعند اتصال هذه الاعصاب بعضها ببعض تظهر عليها عقد صغيرة. وتنشا من الضفيرة المذكورة ضفائر كثيرة تصاحب فروع الشريان الحرقفي الباطن وهي:

الضفيرة الباسورية السفلى تنشا من مؤخر الضفيرة الحوضية وتتوزع في المستقيم متواصلة

القسم القطني للسمياتوي

وفي الجانب الايسر خيطا من الرئوي المعدي

والضفيرة المعدية تصاحب الشريان المعدي الى القوس الصغير للمعدة وتحد بفروع من

الرئوي المعدي الايسر فتتوزع في المعدة

والضفيرة الكبدية تقبل خيوطاً من الرئوي المعدي الايسر والحجابي الايمن وتصاحب الشريان

الكبدي فتتوزع على فروعها في جوهر الكبد وعلى فروع الوريد البالي . وتذهب من هذه

الضفيرة فروع مرافقة لجميع فروع الشريان الكبدي وهي البوالي والمعدي الاثنا عشري

والمعدي الثربي الايمن والحوصلي

والضفيرة الطحالية مؤلفة من فروع ناشئة من العقدتين الهلاليتين اليمنى واليسرى ومن

الرئوي المعدي الايمن . تصاحب الشريان الطحالي وفروعه الى جوهر الطحال وترسل في اثناء

مسيرها اليه خيوطاً الى البنكرياس والى المعدة فتتكون من ذلك الضفيرة البنكرياسية والضفيرة

المعدية الثرية اليسرى

والضفيرة الماساريقية العليا امتداد الجزء السفلي للضفيرة الشمسية وتقبل فرعاً من الرئوي

المعدي الايمن . وهي محيطة بالشريان الماساريقي العلوي فتصاحبه الى الماساريقا منقسمة فيها

كاقسامه فتتوزع في البنكرياس وجميع الامعاء الدقيقة والاعور والقولون الصاعد والقولون

المستعرض . ولاغصاب هذه الضفيرة عقد كثيرة

والضفيرة الاورطية مكونة من فروع ناشئة من العقدتين الهلاليتين والضفيرتين الكلويتين

وتقبل بعض خيوط من العقد القطنية . وهي موضوعة على جانبي الاورطي ومقدمه بين منشأ الشريان

الماساريقي العلوي والماساريقي السفلي . وتنشأ من هذه الضفيرة الضفيرة الماساريقية السفلي

والضفيرة الختلية وبعض المنوية وترسل فروعاً للاجوف السفلي

والضفيرة الماساريقية السفلي معظم منشأها من الجانب الايسر للضفيرة الاورطية . وهي محيطة

بالشريان الماساريقي السفلي وتنقسم الى عدة صفائر ثانوية فتتوزع في القولون النازل والتعريج

السيبي والجزء العلوي للمستقيم

القسم القطني للسمياتوي

القسم القطني للسمياتوي موضوع الى مقدم العمود الفقري بجانب الحافة الانسية للعضلة الصليبية .

وهو مؤلف غالباً من اربع عقد متصلة الواحدة بالاخري بواسطة حبال مستطرفة . والعقد

المذكورة صغيرة الحجم سنجابية اللون شعيرية الشكل وضعها اقرب الى الخط المتوسط من العقد

ويوجد مشابهة كلية بين الاعصاب المحشوية والاعصاب القلبية. فان الاعصاب القلبية ثلاثة تنشأ من العقد الثلاث العنقية وتوزع في احشاء الصدر. والاعصاب المحشوية ثلاثة أيضاً تنشأ من العقد الظهرية وتوزع في احشاء البطن

والضفيرة الشمسية او الشراسيفية تتوزع في جميع الاحشاء البطنية. وهي شبكة خشكة مؤلفة من اعصاب وعقد موضوعة وراء المعدة والى مقدم الاورطي وساقى الحجاب محيطه بالمحور البطني واصل الشريان المساريقي العلوي وواصلة في الاسفل الى البنكرياس وفي الوحشية الى المحفظتين اعلى الكليتين. وهذه الضفيرة مكوّنة من المحشويين الكبيرين وبعض المحشويين الصغيرين ومنتهى الرئوي المعدي الايمن. وترسل خيوطاً على هيئة ضفائر تصاحب جميع الفروع الناشئة من مقدم الاورطي سيأتي ذكرها

والعقدتان الهاليتان للضفيرة الشمسية موضوعتان واحدة من كل جانب للضفيرة المذكورة. وهما اعظم جميع عقد الجسد غير منتظمتي الشكل مؤلفتان من عقد صغيرة وتتصلان من جانبيهما الانسي بالضفيرة الشمسية بواسطة فروع مستطرفة واما الضفائر الناشئة من الضفيرة الشمسية التي تصاحب فروع الاورطي فتابعة لعدد الفروع المذكورة وترافقها الى الاحشاء الخاصة بها وهي:

الضفيرة الحجابية ترافق الشريان الحجابي الى الحجاب المحاجر فتوزع فيه وترسل بعض خيوط الى المحفظة اعلى الكلية. منشأها من الجزء العلوي للعقدة الهالالية وهي اعظم في الجانب الايمن منها في الجانب الايسر. وعليها في الجانب الايمن عقدة صغيرة موضوعة على الوجه السفلي للحجاب تتوزع منها خيوط للاجوف والمحفظة اعلى الكلية والضفيرة الكبدية

والضفيرة اعلى الكلية مؤلفة من فروع ناشئة من الضفيرة الشمسية والعقدة الهالالية والاعصاب المحشوية والعصب الحجابي وتوزع في المحفظة اعلى الكلية

والضفيرة الكلوية مؤلفة من خيوط ناشئة من الضفيرة الشمسية والجزء الوحشي للعقدة الهالالية والضفيرة الاورطية وتأتيها ايضاً خيوط من المحشوي الصغير والمحشوي الكلوي. عدد هذه الخيوط من ١٥ الى ٢٠ وعليها عقد كثيرة تتوزع في الكلية

والضفيرة المنوية ناشئة من الضفيرة الكلوية وتقبل خيوطاً من الضفيرة الاورطية. وتصاحب الاوعية المنوية الى الخصيتين. واما الضفيرة المبيضية في الاناث فتتوزع في المبيض وقعر الرحم

والضفيرة البطنية امتداد من الضفيرة الشمسية تحيط المحور البطني ثم تنقسم تبعاً لاقسامه الى ثلاث ضفائر معدية وكبدية وطحالية. وتقبل هذه الضفيرة فرعاً من بعض الاعصاب المحشوية


القسم الصدري للسبباتوي

القسم الصدري للسبباتوي مؤلف من عقد متتابعة يطابق عددها في الغالب عدد الفقرات. وهي موضوعة على كل من الجانبيين للعمود مستقرة على رؤوس الاضلاع الا الثنتين العلويتين فانهما تستقران على جسي الفقرتين وتغطيها البليورا الضلعية. وهي صغيرة الحجم لونها سنجابي مضمومة بعضها الى بعض بواسطة زوائد حبلية الشكل ناشئة من جوهرها. وقد تتحد اثنتان منها فتكونان عقدة واحدة. والعليا منها متحدة غالباً بالعنقية الاخيرة

الفروع الوحشية لكل عقدة في الغالب اثنان يتواصلان بعصب من الاعصاب الشوكية والفروع الانسية من العقد الست العليا صغيرة جداً ترسل خيوطاً للاورطي الصدري وفروعه وخيوطاً اخر لاجسام الفقرات واربطتها. وتذهب فروع من العقدة الثالثة والرابعة فتدخل في تكوين الضفيرة الرئوية الخلفية

والفروع الانسية للعقد الست السفلى كبيرة بيضاء ترسل خيوطاً للاورطي وتتحد فتكون ثلاثة اعصاب حشوية هي الكبير والصغير والكلي

شكل ٢٢٩



فالعصب الحشوي الكبير مؤلف من فروع ناشئة من العقد الواقعة بين السادسة والعاشرة. والفروع المذكورة تتحد وتصير حبلًا واحدًا كبيرًا ينزل منحرفاً الى الانسية على مقدم اجسام الفقرات بجانب المنصف الخلفي ثم يتقب ساق الحجاب الحاجز وينتهي في العقدة الهلالية ويرسل فروعاً الى الضفيرة الكلوية والصفيرة اعلى الكلية. والعصب الحشوي الصغير مؤلف من خيوط ناشئة من العقد العاشرة والحادية عشرة ومن الحبل المستطرق بينهما. يتقب الحجاب مع سابقه وينتهي في الضفيرة الحشوية ويتواصل في الصدر بالكبير الحشوي. والعصب الكلي الحشوي ينشا من العقدة الاخيرة ويتقب الحجاب وينتهي في الضفيرة الكلوية والجزء السفلي للصفيرة البطنية

شكل ٢٢٩ العقد الصدرية للسبباتوي وقد رسمت العقد اكبر مما هي بالحقبة 'a' الاورطي 'b' الضلع الاول 'c' الضلع الحادي عشر 'd' العقدة الصدرية الاولى 'e' العقدة الصدرية الاخيرة '٢' العصب الحشوي الكبير '٤' العصب الحشوي الصغير '٥' العصب الكلي '٦' بعض الضفيرة العضدية

الى الضفيرة القلبية السطحية وقد ينزل الى الخلف منه فينتهي في الضفيرة الغائرة
والعصب القلبي المتوسط اكبرها وينشا من العقدة العنقية المتوسطة او من الجبل المستطرق
بينها وبين العقدة السفلى. في الجانب الايمن ينزل وراء السباتي الاولي وفي اصل العنق يقاطع
الشريان تحت الترقوة ثم يخدر على القصبة ويقبل خيوطاً من العصب المنجري الراجع ثم يتحد
بالضفيرة القلبية الغائرة. وفي الجانب الايسر يدخل الصدر بين السباتي الايسر والشريان تحت
الترقوة ويتحد بالجانب الايسر للضفيرة القلبية الغائرة

والعصب القلبي السفلي ينشا من العقدة العنقية السفلى او من العقدة الصدرية الاولى وينزل
وراء الشريان تحت الترقوة الى مقدم القصبة ويتحد بالضفيرة القلبية الغائرة متواصلاً بالمنجري
الراجع والقلبي المتوسط

واما الضفيرة القلبية الغائرة ويقال لها العظيمة ايضاً فموضوعة الى مقدم القصبة عند تشعبها
اعلى انقسام الشريان الرئوي ووراء القوس الاورطي. وهي مكونة من الاعصاب القلبية الناشئة من
العقد العنقية للسهباتوي والفروع القلبية للمنجري الراجع والرئوي المعدي الا العصب القلبي
العلوي الايسر من العقدة الاولى والفرع القلبي السفلي الايسر من الرئوي المعدي. وتنشا من
هذه الضفيرة فروع تتكون منها الضفيرة الاكليلية الخلفية وبعض الضفيرة الاكليلية المقدمة وفروع
اخر تذهب الى الضفائر الرئوية والى اذيني القلب

والضفيرة القلبية السطحية ويقال لها المقدمة ايضاً واقعة تحت القوس الاورطي والى مقدم
الشريان الرئوي الايمن. وهي مكونة من العصب القلبي العلوي الايسر والفرع القلبي السفلي
الايسر والايمن للرئوي المعدي وبعض خيوط من الضفيرة القلبية الغائرة. ويوجد احياناً
عقدة صغيرة عند مجتمع هذه الاعصاب الى الجانب الايمن من القناة الشريانية. ويتكون من
هذه الضفيرة معظم الضفيرة الاكليلية المقدمة وتذهب منها بعض خيوط الى الضفيرة الرئوية
المقدمة اليسرى مصاحبة للشريان الرئوي


والضفيرة الاكليلية الخلفية مؤلفة على جانب عظيم من خيوط ناشئة من الجهة اليسرى للضفيرة
القلبية الغائرة ومن خيوط قليلة ناشئة من الجهة اليمنى للضفيرة المذكورة. وهي محيطة بفروع
الشريان الاكليلي في الجهة الخلفية للقلب فتصاحبها الى جوهر القلب
والضفيرة الاكليلية المقدمة ممتدة من الضفيرة القلبية السطحية الا انها تقبل خيوطاً من الضفيرة
الغائرة. تسير الى المقدم بين الاورطي والشريان الرئوي مصاحبة للشريان الاكليلي الايمن على
الوجه المقدم للقلب

العنقي الرابع

الاعصاب القلبية

الاعصاب القلبية ثلاثة من كل جانب علوي ومتوسط وسفلي. ينشا العلوي من العقدة العنقية العليا والمتوسط من المتوسطة والسفلي من السفلي فالعصب القلبي العلوي ينشا بفرعين او اكثر من العقدة العنقية العليا وقد يقبل خيطاً من الحبل المستطرق بين العقدة المذكورة والمتوسطة. سيره في العنق وراء الشريان السباتي الاصلي والى مقدم العضلة العنقية الطويلة ثم يقاطع مقدم الشريان الدرقي السفلي والعصب الحنجري الراجع. ثم بعد ذلك يختلف سير الايمن عن الايسر. اما القلبي العلوي الايمن فيستدير في اصل العنق الى مقدم الشريان تحت الترقوة او الى الوراثة منه ثم بجانب الشريان اللا اسم له ثم الى موخر القوس الاورطي فيوصل الى الضفيرة القلبية الغائرة. ويتواصل هذا العصب في مسيره بفروع اخر من السمباتوي وعند منتصف العنق يقبل خيوطاً من العصب الحنجري الظاهر واسفل ذلك فرعاً او اثنين من الرئوي المعدي وعند دخوله الصدر يتحد بالحنجري الراجع. واما الايسر فينزل بجانب السباتي الايسر الى مقدم القوس الاورطي فيوصل

شكل ٢٢٨



شكل ٢٢٨ العصب السمباتوي ١ الضفيرة السباتية ٢ العصب السادس ٣ القسم الاول وهو العنقي للعصب الخامس ٤ العصب الانفي الحنكي ٥ اعلى الرقبة عصب فديان منقسماً الى فرعين هما السباتي والحنجري ٦ العصب الحنكي المقدم الثاني من عقدة ميكل ٧ العصب الدرقي الذي يتحد به الحبل الطويل ٨ العصب الوجهي ٩ العقدة العنقية العليا للسمباتوي ١٠ العقدة العنقية المتوسطة ١١ العقدة العنقية السفلى ١٢ اصول العصب الحشوي الكبير التي تنشا من بعض العقد الصدرية ١٣ العصب الحشوي الصغير ١٤ الضفيرة الكلوية ١٥ الضفيرة الشمسية ١٦ الضفيرة الماسارية ١٧ العقد النطنية ١٨ العقد العجزية ١٩ الضفيرة الثانية ٢٠ الضفيرة المستفيمية ٢١ الضفيرة النطنية ٢٢ المستقيم ٢٣ المائة ٢٤ المائة ٢٥ عرف الحرقفي ٢٦ الكليبة ٢٧ الاجوف السفلي • المحور البطني ٢٨ الرئة اليسرى ٢٩ القلب ٣٠ الحنجرة ٣١ الغدة تحت الفك ٣٢ الارتفاق الدرقي ٣٣ الفاصل الانفي ٣٤ المثانة ٣٥ ٣٦ باطن الخوذة

الى فسخين تتصل احداها بالعقدة المخجربة للساني البلعومي والاخرى بعقدة اصل الرئوي المعدي
في الثقب الوداجي

والفروع الانسية ثلاثة مجاميع. الاول فروع بلعومية تسير الى الانسية الى جانب البلعوم وتتصل
بفروع من الرئوي المعدي واللساني البلعومي فتعين في تكوين الضفيرة البلعومية. والثاني فروع
خجربة تتصل بالعصب المخجري العلوي وفروعه. والثالث العصب القلبي العلوي وسياتي
ذكره في الكلام على الاعصاب القلبية

والفروع المقدمة تتوزع على الشريان السباتي الظاهر وفروعه فتكون حول كل واحد منها
ضفيرة دقيقة قد توجد عليها عقد صغيرة. وتستطرق الضفائر المذكورة الى فرع ذات البطنين
للوجهي والى العقدة تحت الفك والى العقدة الاذنية

العقدة العنقية المتوسطة

هذه العقدة ويقال لها الدرقية ايضاً اصغر العقد الثلاث العنقية وقد لا توجد. وضعها حذاء
الفقرة العنقية الخامسة بقرب الشريان الدرقي السفلي او عليه ولذلك سماها المعلم ها للرعقدة
الدرقية. لها فروع عليا مستطرفة الى العقدة العنقية العليا وفروع سفلى مستطرفة الى العقدة
العنقية السفلى وفروع وحشية تسير الى الوحشية وتستطرق الى العصب الخامس والسادس
الشوكيين. وليست هذه الفروع الاخيرة دائمة الوجود. ولهذه العقدة فروع درقية وهي خيوط
صغيرة تصاحب الشريان الدرقي السفلي الى الغدة الدرقية وتتواصل وهي على الشريان بالعصب
القلبي العلوي فاذا دخلت الجسم الدرقي توصلت بالمخجري الرابع والمخجري الظاهر. وينشا منها
العصب القلبي المتوسط الذي سياتي الكلام عليه

العقدة العنقية السفلى

وضع هذه العقدة بين قاعدة التو المستعرض للفقرة العنقية الاخيرة وعنق الضلع الاول الى
الوراء من الشريان الفقري. شكلها غير منتظم وكثيراً ما تكون متصلة بالعقدة الصدرية الاولى.
لها فروع عليا مستطرفة الى العقدة العنقية المتوسطة. وفروع سفلى ينزل بعضها الى مقدم
الشريان تحت الترقوة وبعضها الى الخلف منه فتتصل بالعقدة الصدرية الاولى. واهم هذه
الفروع السفلى العصب القلبي السفلي الذي سياتي الكلام عليه. وفروع وحشية مؤلفة من جملة
خيوط بعضها يتواصل بالعصب السابع والثامن الشوكيين. وبعضها يصاحب الشريان
الفقري الى الاعلى فتكون ضفيرة حوله وترسل لجداره خيوطاً وتتواصل بالاعصاب الشوكية الى

وتصاحبها الى الاحشاء
فالجزء الرأسي للسهباتوي مؤلف من اربع عقد هي العينية والوتدية الحنكية او عقدة ميكل
والاذنية او عقدة ارنولد والعقدة تمت الفك وقد مرّ الكلام عليها في ذكر الاقسام الثلاثة للعصب
الخامس (شكل ٢١٥)

الجزء العنقي للسهباتوي

الجزء العنقي للسهباتوي مؤلف من ثلاث عقد عليا ومتوسطة وسفلى

العقدة العنقية العليا

هي اكبر العقد الثلاث موضوعة حذاء الفقرة الثانية والثالثة العنقيتين وقد تكون حذاء الرابعة
او الخامسة. لونها سنجابي احمر وشكلها في الغالب مغزلي معقد كأنها مكوّنة من عقد صغيرة.
مجاورتها الى المقدم لغمد الشريان السباتي الباطن والى الورا تستقر على المستقيمة الرأسية المقدمة
الكبيرة. فروعها: فرع علوي وفرع سفلي وفروع وحشية وفروع انسية وفروع مقدمة
فالفرع العلوي يظهر انه امتداد العقدة ويصعد بجانب السباتي الباطن ويدخل القناة السباتية
فينقسم الى فرعين احدهما وحشي يتوزع على الشريان السباتي الباطن فيكوّن الضفيرة السباتية.
والاخر انسي يرسل خيوطاً للسباتي الباطن ايضاً ثم يدوم سائراً الى المقدم فيكوّن الضفيرة الكهفية
اما الضفيرة السباتية فواقعة على الجانب الوحشي للسباتي الباطن وترسل فروعاً استطراقية
لعقدة كاسيريوس والعصب السادس والعقدة الوتدية الحنكية وترسل فروعاً لجدار الشريان
السباتي وللأم الجافية

والضفيرة الكهفية موضوعة اسفل الشريان السباتي والى الانسية منه وهو بجانب السرج
التركي في الجيب الكهفي. وترسل فروعاً استطراقية للعصب الثالث والرابع والخامس والسادس
وللعقدة العينية وترسل ايضاً فروعاً لجدار السباتي الباطن. والخيوط الانتهاية للضفيرتين
المدكورتين تستطيل الى المقدم فتحيط بالشريان الحني المقدم والشريان العيني وتستقصى الى الام
الحنونة والى الحجاج و**باطن المقلّة**

والفرع السفلي او النازل للعقدة العليا العنقية يستطرق الى العقدة المتوسطة العنقية
والفروع الوحشية كثيرة تستطرق الى بعض الاعصاب الججمية والى الاربعة العليا الشوكية.
واما الفروع الاستطراقية الى الاعصاب الججمية فمؤلفة من خيوط دقيقة تسير من العقدة
العليا العنقية الى عقدة العصب الرئوي المعدي والى العصب التاسع. وينشا منها خيط ينقسم

في العصب السهباتوي

السهباتيا كلمة يونانية معناها المشاركة في الاحساس فنُسبت لهذا العصب وصارت اسماً مميّزاً له بناءً على مذهب الفيسيولوجيين انه الواسطة التي تتم بها المشاركة بين الاعضاء البعيدة. وهو مؤلف من عقد مرتبطة بعضها ببعض بواسطة حبال متوسطة بينها. والعقد المذكورة ممتدة على كل من الجانبين للعمود الفقري من قاعة العجيزة الى العصعص وقد تُستقصى الى الراس حيث يكون وضع العقد في الاخلية الواقعة بين عظام الخوذة وعظام الوجه. ووضع هذين الحبلين المتعقدّين على شكل خطين متوازيين حتى العجز وهناك يتقاربان ثم يتواصلان بواسطة عقدة فردة موضوعة الى مقدم العصعص. وبعض المشرحين يقول ان الحبلين يتواصلان في الراس ايضاً بواسطة عقدة صغيرة يقال لها عقدة ربيّس موضوعة على الشريان الاستطراقي المقدم. ويتواصل الحبلان الجانبيان بين الطرفين المذكورين بواسطة خيوط عصبية مستطرفة بينهما وتقسّم العقد السهباتوية الى اقسام بحسب الجهة الواقعة في فيه مرتبة على الكيفية التابعة:

في الجهة الراسية	—	—	٢	عقد
العنقية	—	—	٣	
الظهريّة	—	—	١٢	
القطنية	—	—	٤	
العجزية	—	—	٥	
العصعصية	—	—	١	

واما الفروع التي تنشأ من العقد او تنتهي فيها فعلى ثلاثة انواع. الاول فروع استطراقية بين العقد مؤلفة من جوهر سنجابي والياف بيض في امتداد الياف الاعصاب الشوكية التي تسير الى العقد. الثاني فروع استطراقية من العقد الى الاعصاب الدماغية او الشوكية مؤلفة من الياف بيض سائرة من الاعصاب الى العقد وجوهر سنجابي سائر من العقد الى الاعصاب. الثالث فروع اصلية تنشأ من العقد وتوزع في الشرايين والاحشاء واكثرها يذهب الى عقد اخر موضوعة في الصدر والبطن ويخالطها الياف شوكية فتحيط بالشرايين على شكل صفائر دقيقة

العصب العضلي الجليدي

فروع هذا العصب مدة سيره في الساق عضلية تتوزع في القصية المقدمة والباسطة الطويلة
للإصابع والباسطة للإبهام. وأما فرعه الانتهائي الوحشي ويقال له الرسغي شكل ٢٢٢
يسير الى الوحشية مقاطعاً للرسغ تحت الباسطة القصيرة للإصابع فيتوزع
فيها وفي المفاصل الرسغية المشطية. والفرع الانتهائي الانسي امتداد القصي المقدم
ويصاحب الشريان الظهري القدي الى الجانب الانسي لظهر القدم وينقسم
في الخلاء الاول بين العظام الى فرعين يتوزعان في الجانبين المتجاورين
للإبهام والاصبع الاول متواصلاً بالفرع الانسي للعصب العضلي الجليدي



والعصب العضلي الجليدي احد الفرعين الانتهائين للشظوي ويتوزع
في عضلات الجانب الشظوي للساق وجلد ظهر القدم. يسير الى المقدم بين
العضلات الشظوية والباسطة الطويلة للإصابع ثم ينقسم الى الغائرة
عند الثالث السفلي للساق وينقسم الى فرعين انسي ووحشي. الا انه قبل انقسامه
المذكور يرسل فروعاً عضلية للشظويتين الطويلة والقصيرة وخبوطاً جلدية
لجلد الجزء السفلي للساق. وأما فرعه الانسي فيسير الى مقدم المفصل
الرسغي ثم على ظهر القدم ويتوزع في الجانب الانسي للإبهام والجانبين المتجاورين
للإصبع الاول والثاني. ويتوزع ايضا في جلد الكعب الانسي والجانب الانسي
للقدم متواصلاً بالصابغ الانسي والقصي المقدم. وفرعه الوحشي اكبر من
الانسي يسير على الجانب الوحشي لظهر القدم ويتوزع في الجوانب المتجاورة
للإصبع الثاني والثالث والرابع. ويتوزع ايضا في جلد الكعب الوحشي والجانب الوحشي للقدم
متواصلاً بالصابغ القصير. وليس هذا التقسيم للإصابع دائم الوجود بل قد يختلف. والحاصل
ان الفرعين المذكورين يتوزعان في جميع اصابع القدم والإبهام إلا الجانب الوحشي للإصبع الاخير
فانه يقبل فرعاً من الصافغ القصير والجانبين المتجاورين للإبهام والاصبع الاول فان فروعها
الاصبعية من القصي المقدم

شكل ٢٢٢ العصب العضلي الجليدي والعصب القصي المقدم ١ العصب العضلي الجليدي ٢ والعصب القصي المقدم مصاحباً
للشريان القصي المقدم

امتداده فيتوزع في كرة الاصبع

والعصب الاخصي الوحشي اصغر الفرعين الانتهاءين للقصي الخلفي يتوزع في الاصبع الرابع ونصف الثالث وبعض العضلات الغائرة. يسير منحرفاً الى المقدم مع الشريان الاخصي الوحشي الى الجانب الوحشي للقدم موضوعاً بين القابضة القصيرة للاصابع والقابضة الاضافية. فاذا وصل الى الخلاء الوقع بين القابضة القصيرة للاصابع والمبعدة للخنصر ارسل فروعاً للقابضة الاضافية والمبعدة للخنصر وانقسم الى فرعين سطحي وغائر. فالسطحي ينقسم الى عصيين اصبعيين يتوزع احدهما في الجانب الوحشي للخنصر والقابضة القصيرة له والعضلتين بين العظام للخلاء الرابع المشطي ويتوزع الثاني في الجانبين المتجاورين للاصبع الثالث والرابع ويتواصل بالاختصالي الانسي. والغائر يصاحب الشريان الاخصي الوحشي الى باطن الاخص تحت اوتار القوايض ويتوزع في جميع العضلات بين العظام الاثنتين اللتين في الخلاء الرابع وفي الخراطيبتين الوحشيتين والمقربة للابهام والمستعرضة القدمية


واما العصب المابضي الوحشي وهو الفرع الاخر الانتهاءي للعصب الوركي العظيم ويقال له الشظوي ايضاً فحجمه نحو نصف حجم المابضي الانسي. ينزل منحرفاً على الجانب الوحشي للخلاء المابضي بقرب حافة ذات الراسين الى الشظية ثم ينقب منشأ الشظوية الطويلة اسفل راس الشظية بنحو قيراطو وينقسم تحت العضلة المذكورة الى فرعين هما التصبي المقدم والعضلي الجلدي. الا انه قبل انقسامه يرسل فروعاً مفصلية وجلدية. فالفروع المفصلية اثنان يصاحبان الشريانين المفصليين الوحشيين العلوي والسفلي ويتوزعان في الجانب الوحشي للركبة وينشأ منه فرع ثالث يقال له الراجع يصاحب الشريان القصي الراجع ويتوزع في مقدم الركبة. والفروع الجلدية اثنان او ثلاثة تتوزع في جلد مؤخر الساق وجانبا الوحشي. ومنها فرع كبير يقال له الاستطراقي الشظوي يقاطع الراس الوحشي للتوأمية الى منتصف الساق ويتواصل بالصابغ الوحشي

والفرع القصي المقدم ينشأ من العصب الشظوي (وهو المابضي الوحشي) عند تشعبه الى فرعين بين الشظية والجزء العلوي للشظوية الطويلة. ويسير منحرفاً الى المقدم تحت الباسطة الطويلة للاصابع الى ان يصل الى الجانب الوحشي للشريان القصي المقدم اعلى منتصف الساق موضوعاً على الوجه المقدم للغشاء بين العظمين ثم ينزل مع الشريان الى مقدم المفصل الرسغي وهناك ينقسم الى فرع وحشي وفرع انسي. ويكون وضع هذا العصب اولاً الى الوحشية من الشريان القصي المقدم ثم الى مقدمه ثم الى الوحشية ايضاً عند المفصل الرسغي

المابضية ويخدر على مؤخر الساق مصاحباً للاوعية القصبية الخلفية الى الخلاء الواقع بين الكعب الانسي والعقب حيث ينقسم الى اخصي انسي واخصي وحشي. واما وضعه في الساق فانه يكون مستقراً على العضلات الغائرة وتغطيه اللقافة الغائرة والعضلات السطحية والجلد. ويكون في اول سيره الى الانسية من الشريان ثم يقاطعه فيصير الى الوحشية منه حتى الرسغ. وفي الثالث السفلي للساق وضعه على خط مواز للقافة الانسية لوتر اكيلس

فروعه عضلية واخصي جلدي وفرعان انتهائيان هما الاخصيان. فالفروع العضلية تنشأ منفردة او يجمع مشترك بينهما من الجزء العلوي للعصب وتوزع في القصبية الخلفية والقابضة الطويلة للاصابع والقابضة الطويلة للابهام. والفرع الاخصي الجلدي ينقب الرباط الخلفي الانسي ويتوزع في جلد العقب والجانب الانسي للاخص

والعصب الاخصي الانسي اكبر الفرعين الانتهائيين للقصي الخلفي ويصاحب الشريان الاخصي الانسي الى الجانب الانسي للقدم. يبدأ عند الكعب الانسي ويسير بين شكل ٢٢٦



المبعدة للابهام والقابضة القصيرة للاصابع وينقسم مقابل قاعه العظام المشطية الى اربعة فروع اصبعية ويتواصل بالاخصي الوحشي. فروعه . يرسل هذا العصب في مسيره فروعاً جلدية تثقب اللقافة الاخصية وتوزع في جلد الاخص وفروعاً عضلية تتوزع في المبعدة للابهام والقابضة القصيرة للاصابع وفروعاً مفصلية تتوزع في المفاصل الرسغية والمشطية وفروعاً اصبعية هي اربعة. يتوزع الاول في الجانب الانسي للابهام ويرسل خيطاً للقابضة القصيرة للابهام. والثاني يتشعب الى فرعين يتوزعان في الجانبين المتجاورين للابهام والاصبع الاول ويرسل خيطاً للعضلة الخراطينية الاولى. والثالث يتوزع في الجانبين المتجاورين للاصبع الاول والثاني والعضلة الخراطينية الثانية. والرابع يتوزع في الجانبين المتجاورين للاصبع الثاني والثالث ويقبل فرعاً استطراقياً من

الاخصي الوحشي وهذا الانقسام كانقسام العصب المتوسط في اليد. ثم ان كل عصب اصبعي يرسل خيوطاً جلدية ومفصلية وفرعاً ظهرياً مقابل السلامي الاخيرة يتوزع حول الظفر. واما

شكل ٢٢٦ منتهى العصب القصي الخلفي في اخص القدم حيث ينقسم الى الاخصيين الانسي والوحشي ١ الجانب الانسي للقدم ٢ الجانب الوحشي ٣ العقب ٤ العصب الاخصي الانسي ٥ العصب الاخصي الوحشي ٦ فرع للقابضة القصيرة للاصابع ٧ فرع للجانب الوحشي للفص ٨ فرع للخلاء الذي بين الاصبع الثالث والرابع ٩ و١٠ فروع اصبعية من الاخصي الانسي ١٠ فرع من الاخصي الانسي لانسي الابهام


تكون هذه الفروع ناشئة من الضفيرة العجزية . والفروع العضلية تتوزع في القوابض للساق وهي ذات الرأسين والوترية النصف والغشائية النصف . ويذهب منها فرع للمقربة العظيمة . وهذه الفروع تنشأ تحت العضلة ذات الرأسين

أما العصب المابضي الانسي فأكبر الفرعين الانتهاءين للعصب الوريكي العظيم ينزل على

شكل ٢٢٤ مؤخر الفخذ في الخط المتوسط للخلاء المابضي الى الجزء شكل ٢٢٥



السفلى للعضلة المابضية ثم يسير تحت قوس النعالية مع الشريان فيصير العصب القصي الخلفي . ويكون وضعه اولاً سطحياً جداً والى الوحشية من الاوعية المابضية ثم اذا وصل الى مقابل الركبة جاور الاوعية المذكورة وقاطع الشريان الى جانبه الانسي . ولهذا العصب فروع مفصالية وفروع عضلية وفرع جلدي هو الصافن القصير او الوحشي . فالفروع المفصالية ثلاثة غالباً وتتوزع في مفصل الركبة فيصاحب اثنان منها الشريانيين المفصليين الانسيين العلوي والسفلي ويصاحب الثالث الشريان الفرد . والفروع العضلية اربعة او خمسة تنشأ من العصب وهويين راسي التوأمية فتتوزع فيها وفي الاخضية والنعالية والمابضية . والصافن الوحشي او القصير ينزل بين راسي التوأمية فاذا وصل الى منتصف مؤخر الساق ثقب اللقافة الغائرة وقبل فرعاً استطراقياً من العصب



المابضي الوحشي . ثم يدوم نازلاً بقرب الجانب الوحشي لوتر اكيللس مرافقاً للوريد الصافن الوحشي وينعكف حول الكعب الوحشي ويتوزع في الجلد على الجانب الوحشي للقدم والخنصر والعصب القصي الخلفي امتداد العصب المابضي الانسي . يبدأ عند الحافة السفلى للعضلة

شكل ٢٢٤ بعض فروع العصب المابضي الانسي ١ العصب المابضي الانسي ٢ و٤ منتهى اعصاب جلدية في مؤخر الساق ٥ العصب الصافن الانسي وهو الطويل ٦ و٧ الصافن الوحشي وهو القصير
شكل ٢٢٥ العصب القصي الخلفي الموضع في مؤخر الساق وقد قطعت التوأمية والنعالية لاجل اظهار ١ العصب المابضي الانسي الذي يصير القصي الخلفي من الحافة السفلى للعضلة المابضية ٢ طرفه السفلي حيث ينضم الى الاخصي الانسي والاخصي الوحشي

العصب الوريكي العظيم

الشريان الاستحيائي ويسير بين طبقتي اللفافة العجانية الفائرة بجانب فرع العظم الوريكي ثم ينقب الرباط المعلق للفضيب ويصاحب الشريان الظهري للفضيب الى الحشفة حيث ينتهي . ويرسل فروعاً جلدية للفضيب وفرعاً كبيراً للجسم الكهفي متواصلاً بفروع من السيمباتوي . واما في الاناث فينتهي الفرع العلوي في البظر والسفلي في الشفر والعجان

والعصب الوريكي الصغير يتوزع في جلد العجان وموخر الفخذ والساق وفي عضلة واحدة هي الالوية الكبيرة وهو مكوّن في الغالب من فرعين ينشآن من الجزء السفلي للضفيرة العجزية . ينفذ من الحوض اسفل الهرمية وينزل مع الشريان الوريكي تحت الالوية الكبيرة الى حافتها السفلى ثم يسير في الوجه الخلفي للفخذ تحت اللفافة العريضة الى الجزء السفلي للخلاء المابضي حيث ينقب اللفافة فيصير جلدياً . ثم يصاحب الوريد الصافن الوحشي اسفل منتصف الساق وينتهي متواصلاً بالعصب الصافن الوحشي

واما فروعهُ فهي اولاً فرع عضلي هو الالوي السفلي يتوزع في الوجه الباطن للالوية الكبيرة . ثانياً فروع جلدية تنقسم الى مجموعتين احدها انسي و الاخر صاعد . فالجموع الانسي فروع تتوزع في الجلد في الجزء العلوي والانسي لموخر الفخذ . ومنها فرع طويل هو الاستحيائي السفلي ينحني الى المقدم اسفل الحدبة الوركية وينقب اللفافة العريضة ويتوزع في جلد الصفن . والفروع الصاعدة خيطان او ثلاثة تتوزع في الجلد الذي يغطي الالوية الكبيرة . ويرسل هذا العصب ايضاً في سيره الى الاسفل فروعاً تتوزع في جلد موخر الفخذ والخلاء المابضي والجزء العلوي للساق


والعصب الوريكي العظيم يتوزع في جلد الساق وفي عضلات موخر الفخذ وعضلات الساق والقدم . وهو اعظم اعصاب الجسد فان عرضه نحو ثلاثة ارباع القيراط وهو امتداد الجزء السفلي للضفيرة العجزية . يخرج من الحوض من الثقب العظيم العجزى الوريكي اسفل العضلة الهرمية وينزل بين المدور الكبير والحدبة الوركية على موخر الفخذ الى نحو ثلثه السفلي وهناك ينقسم الى فرعين كبيرين هما المابضي الانسي والمابضي الوحشي . وقد يقع الانقسام المذكور بين الضفيرة والثالث السفلي للفخذ فيسيران معاً الى الاسفل وقد تفصلهما الهرمية في الاعلى . ويستقر العصب الوريكي العظيم في مسيره الى الاسفل اولاً على العضلات المديرة الوحشية مع الشريان الوريكي والعصب الوريكي الصغير فتغطيه الالوية الكبيرة ثم على المقربة الكبيرة فيغطيها الراس الطويل لذات الراسين فروعهُ قبل انقسامه الى فرعيه المابضيين منها مفصلية ومنها عضلية . فالفروع المفصلية تنشأ من الجزء العلوي للعصب وتتوزع في المفصل الوريكي نافذةً من الوجه الخلفي لرباطه الخنفي . وقد

على خط افقي ثم تُحد وتُصير حبلًا واحدًا عريضًا مسطحًا. والضميرة المذكورة مثلثة الشكل قاعدتها عند نفوذ الاعصاب من العجز ورأسها عند الجزء السفلي للثقب العظيم العجزي الوركي وهي مستقرة على الوجه المقدم للعضلة الهرمية وتغطيها الى المقدم اللقافة الحوضية فتفصلها عن الشريان الوركي والاستحيائي وعن الاحشاء الحوضية

فروعها: فروع عضلية - العصب الالوي العلوي - الاستحيائي - الوركي الصغير - الوركي الكبير
اما الفروع العضلية فتتوزع في الهرمية والسادة الباطنة والتوأمتين والمربعة الخذية

والعصب الالوي العلوي ينشا من مؤخر العصب القطني العجزي ويخرج من الحوض من الثقب العظيم العجزي الوركي اعلى العضلة الهرمية مصاحباً للاوعية الالوية. وينقسم الى فرع علوي يتبع الخط المنشائي للالوية الصغيرة ويتوزع فيها وفي الالوية المتوسطة. وفرع سفلي يسير بين العضلتين المذكورتين فيرسل فروعاً اليها وينتهي في الشادة لغمد الخذالي قرب طرفها السفلي

شكل ٢٢٢



والعصب الاستحيائي ينشا من الجزء السفلي للضميرة القطنية ويخرج من الثقب العظيم العجزي الوركي اسفل الهرمية ثم يقاطع شوكة العظم الوركي ويدخل ثانيةً التجويف الحوضي من الثقب الصغير العجزي الوركي ثم يصاحب الاوعية الاستحيائية الى الاعلى والمقدم بجانب الجدار الوحشي للحفرة الواقعة بين العظم الوركي والمستقيم وينتهي بفرعين انتهائيين هما العصب العجائي والعصب الظهري للفضيب . ويرسل عند منشئه العصب الباسوري السفلي الذي يقاطع الحفرة الوركية المستقيمة ويتوزع في العاصرة الظاهرة للاست والجملد المحيط به. والعصب العجائي احد الفرعين الانتهائيين للاستحيائي وهو اكبرها واسفلها يصاحب الشريان العجائي السطحي وينقسم الى فروع جلدية وفروع عضلية . فالفروع الجلدية اثنان مقدم وخلفي يتوزعان في الجملد الى مقدم الاست والصفن والجزء السفلي للفضيب . والفروع

العضلية تتوزع في العجائية المستعرضة والمسرعة للبول والناصبة للفضيب والعاصرة لجري البول والجسم الاسفني . والعصب الظهري للفضيب هو الفرع العلوي الانتهائي للاستحيائي يصاحب

شكل ٢٢٢ الاعصاب التي تنهب من الضميرة العجزية الى الورك ومؤخر الخذ ١ والاعصاب العجزية الخلفية ٢ العصب الالوي العلوي ٣ العصب الاستحيائي ٥ العصب الوركي الصغير الذي يرسل الاستحيائي السفلي المشار اليه برقم ٤ ٦ العصب الوركي العظيم

وينقسم كل منها الى فرعين احدهما مقدم والاخر خلفي

فالفروع الخلفية للاعصاب العجزية صغيرة الحجم وتنفذ من الثقوب الخلفية العجزية الا الاخير الذي ينفذ بين العجز والعصعص. الثلاثة العليا منها عند نفوذها من القناة الشوكية مغطاة بالعضلة الشوكية المنفلجة وتنقسم الى فروع باطنة وظاهرة. فالباطنة صغيرة تتوزع في الشوكية المنفلجة. والظاهرة تتواصل بعضها ببعض وبالقطني الاخير والعجز الرابع وتنفذ الى الوجه الظاهر للرباط العظيم العجزى الوركي فتكون اقواساً عروية تحت الالوية الكبيرة تنشأ منها ثلاثة فروع تنقب العضلة المذكورة وتوزع في الجلد الذي يغطي الجزء الخلفي للجهة الالوية

والفرعان الخلفيان السفليان العجزيان موضوعان اسفل الشوكية المنفلجة يتواصلان بالعصب العصصي على مؤخر العجز وتنشأ منها خيوط تتوزع في الجلد الذي يغطي العصعص. والفرع الخلفي العصصي صغير يضع في مؤخر العصعص بعد ان يقبل فرعاً استطراقياً من العجزى الاخير

والفروع المقدمة العجزية تصغر في الحجم من الاعلى الى الاسفل وتنفذ من الثقوب العجزية المقدمة الا الخامس فانه ينفذ مع العصصي بين العجز والعصعص. وجميعها يتواصل بالعقدة العجزية للسيمباتوي عند نفوذها من الثقوب المذكورة. يتحد العجزى الاول بالقطني العجزى والثاني بالاول والثالث بهما فيتكون من ذلك الضفيرة العجزية. واما الرابع فيرسل فرعاً يتحد بالضفيرة العجزية وما بقي منه ينقسم الى فروع حشوية وفروع عضلية وخط استطراقي يتحد بالعجزى الخامس. فتتوزع الفروع الحشوية على المستقيم والمثانة في الذكور وعلى المثانة والمهبل في الاناث وتستطرق الفروع المذكورة الى فروع من السيمباتوي فيتكون من ذلك الضفيرة الخلفية. وتتوزع العضلية في الرافعة للاست والعصصية والعاصرة للاست. والعجزى الخامس ينقب العضلة العصصية فيتوزع فيها وفي الجلد متواصلًا في الاعلى بالعجزى الرابع وفي الاسفل بالعصصي واما الفرع المقدم للعصب العصصي فيحيط دقيق ينفذ عند منتهى القناة العجزية وينقب الرباط العجزى الوركي والعضلة العصصية ويضع في الجلد الذي يغطي مؤخر العصعص وجانبه متواصلًا بفرع من العجزى الخامس المقدم

الضفيرة العجزية

هذه الضفيرة مؤلفة من العصب القطني العجزى والفروع المقدمة للاعصاب العجزية الثلاثة العليا وفرع من العجزى الرابع والاعصاب المذكورة تنجم العليا منها الى الاسفل والوحشية والسفلى

تتوزع في جلد الجانب الانسي للفخذ

والعصب الصافن الطويل او الانسي اعظم الفروع الجلدية للعصب الفخذي المقدم يتقارب من الشريان الفخذي ويسير الى جانبه الوحشي تحت الخياطية في القناة الصفاقية حتى الفتحة السفلى في المقربة الكبيرة فيفارقه عند ذلك وينحدر عمودياً الى الجانب الانسي للركبة تحت الخياطية ثم يتقبب اللفافة الغائرة التي بين وتري الخياطية والرقيقة ويظهر تحت الجلد. ثم يسير الى الاسفل على الجانب الانسي للساق مصاحباً للوريد الصافن الانسي وينقسم عند الثالث السفلي للساق الى فرعين ينتهي احدهما عند الكعب الانسي ويسير الاخر الى مقدم الرسغ ويتوزع في الجلد على انسي القدم حتى الابهام

فروعها عند منتصف الفخذ يرسل فرعاً استطراقياً للضفيرة المكونة من العصب الساد والجلدي الانسي. وعند الجانب الانسي للركبة يرسل فرعاً كبيراً يتقبب الخياطية واللفافة العريضة ويتوزع في الجلد الى مقدم الركبة. ويتواصل الفرع المذكور بفروع من الجلدي الانسي والصافن الطويل والجلدي الوحشي فتتكون من ذلك ضفيرة يقال لها الضفيرة الرضية. واسفل الركبة يرسل فروعاً تتوزع في الجلد الى مقدم الساق وجانبها الانسي

واما الفروع الخلفية او الغائرة للعصب الفخذي المقدم فتقسم الى فروع عضلية وفروع مفصلية فالفروع العضلية تتوزع في المشطية وجميع عضلات مقدم الفخذ الا الشادة لغد الفخذ التي عصبها من الالوي والخياطية التي تاتيها فروع من الجلدي المتوسط او الانسي. والفروع المفصلية اثنان يتوزعان في مفصل الركبة احدهما خيط طويل دقيق ينشا من الفرع الذي يتوزع في المتسعة الوحشية ويتقبب الرباط المحفظي للمفصل من وجهه المقدم. والاخر ينشا من الفرع الذي يتوزع في المتسعة الانسية ويسير الى الاسفل مصاحباً للفرع الغائر من الشريان المتفهم الكبير ويتقبب الرباط المحفظي من جانبه الانسي ويتوزع في الغشاء الزلالي

في الاعصاب العجزية والعصب العصعصي

الاعصاب العجزية خمسة من كل جانب. تنفذ الاربعة العليا منها من القناة الشوكية بواسطة الثقوب العجزية واما الخامس فينفذ من الثقب الواقع بين العجز والعصعص. الاصول المنشائية للعجزية العليا والقطبية اعظم اصول الاعصاب الشوكية والاصول المنشائية للعجزية الاخير والعصب العصعصي اصغرهما. وهي اطول منها ايضاً لان الحبل الشوكي ينتهي عند الفقرة القطبية الاولى. ونظراً الى طولها وتعلقها بالحبل الشوكي يقال لها وهي داخل القناة الشوكية ذنب الفرس.

فروع الضفيرة القطنية

شكل ٢٢٢



يسير الى الاسفل بينها وبين المحرفية ويمر تحت رباط بويارت فينفذ الى الفخذ وهناك يتفرح وينقسم الى جزئين احدهما مقدم او جلدي والاخر خلفي او عضلي. ويكون منفصلاً وهو تحت رباط بويارت عن الشريان الفخذي بواسطة العضلة الصليبية مستمراً تحت اللقافة المحرفية

ويرسل هذا العصب وهو داخل الحوض فروعاً صغيرة للمحرفية وفرعاً يتوزع على الجزء العلوي للشريان الفخذي. واما خارج الحوض ففروعه:

من القسم الخلفي:

من القسم المقدم:

فروع عضلية

الجلدي المتوسط

فروع مفصليّة

الجلدي الانسي

الصابن الطويل

فالفرع الجلدي المتوسط يثقب اللقافة العريضة وحيثاً الخياطية ايضاً اسفل رباط بويارت بخو ثلاثة قراريط ثم ينقسم الى فرعين وحشي وانسي ينزلان على مقدم الفخذ ويرسلان فروعاً كثيرة الى الجلد حتى مقدم الركبة. ويتواصل الفرع الوحشي في الاعلى بفرع من التناسلي الفخذي والفرع الانسي في الاسفل بالجلدي الانسي. اعصاب الخياطية منه او من الجلدي الانسي

والعصب الجلدي الانسي يسير منحرفاً على غمد الشريان الفخذي في الاعلى وينقسم الى مقدمه او الى الانسية منه الى فرعين مقدم وانسي. فالفرع المقدم يثقب اللقافة العريضة عند الثالث السفلي للفخذ وينقسم الى فرعين احدهما يتوزع في الجلد حتى الجانب الانسي للركبة والاخر يقاطع الرضفة الى الجانب الوحشي من المفصل متواصلاً في سيره بالعصب الصابن الطويل. واما الفرع الانسي فينزل بجانب الحافة الانسية للخياطية الى الركبة وهناك يثقب اللقافة العريضة ويتواصل بالصابن الطويل ويرسل فروعاً للجلد. ثم ينزل على الجانب الانسي للساق متوزعاً في الجلد. وهذا الفرع يشترك في تكوين ضفيرة تحت اللقافة العريضة مكونة من مواصلة الصابن الطويل والساد. ثم ان العصب الجلدي الانسي قبل انقسامه الى فرعيه يرسل بعض خيوط

شكل ٢٢٢ العصب الفخذي المقدم ١ منفذ العصب الفخذي المقدم اسفل رباط بويارت ٢ انقسامه الى فروع ٣ الشريان الفخذي ٤ الوريد الفخذي ٥ فروع العصب الساد ٦ العصب الصابن الانسي وهو الطويل

قناة صفاقية في جوهر اللفافة العريضة ثم يصير سطحياً اسفل رباط بوبارت بنحو اربعة قراريط ويتوزع في الجلد الى مقدم الفخذ ووحشيه حتى الركبة . والخلفي يثقب اللفافة العريضة وينقسم الى فروع تتوزع في جلد الجهة الوحشية والخلفية للفخذ وتنتهي عند منتصف الفخذ


والعصب الساد يتوزع في العضلة السادة الظاهرة والعضلات المقربة للفخذ والمفصل الوركى ومفصل الركبة وحياناً في جلد الفخذ والساق . ينشا بفرعين احدهما من العصب القطني الثالث والاخر من الرابع وينحدر في جوهر العضلة الصليبية وينفذ من حافتها الانسية بقرب شفة الحوض ثم يسير على الجدار الجانبي للحوض اعلى الاوعية السادة ويدخل الجزء العلوي من الثقب الساد فيمر منه الى الفخذ وهناك ينقسم الى فرعين مقدم وخلفي منفصلين بواسطة المقربة القصيرة . فالفرع المقدم ينزل الى مقدم العضلة المذكورة وراء المشطية والمقربة الطويلة فاذا وصل الى الحافة السفلى للمقربة الطويلة تواصل بالعصب الجلدي الانسي والصافن الانسي ثم ينزل وينتهي على الشريان الفخذي . ويرسل هذا الفرع وهو بقرب الثقب الساد فرعاً مفصلياً للمفصل الوركى فاذا صار الى وراء المشطية ارسل فرعاً عضلية الى المقربة الطويلة والرقيقة وحياناً الى المقربة القصيرة والمشطية وقبل فرعاً استطراقياً من الاضافي الساد . وقد يمتد الفرع الاستطراقي المذكور الى منتصف الساق متوزعاً في الجلد الى الانسية . والفرع الخلفي يثقب السادة الظاهرة ويسير وراء المقربة القصيرة الى مقدم المقربة الكبيرة حيث ينقسم الى فروع كثيرة عضلية تتوزع في السادة الظاهرة والمقربة الكبيرة . وينشا منه فرع مفصلي يصاحب الشريان المابضي ويذهب الى مفصل الركبة

والعصب الساد الاضافي صغير الحجم ينشا من العصب الساد بقرب منشئه او بجيوب من القطني الثالث والرابع . ينزل بجانب الحافة الانسية للعضلة الصليبية ويقاطع جسم العظم العاني ثم يسير وراء العضلة المشطية فينقسم الى فروع عديدة تتوزع في العضلة المذكورة والمفصل الوركى ويرسل فرعاً استطراقياً للفرع المقدم من العصب الساد كما سبق . وقد يكون العصب الساد الاضافي صغيراً جداً او مفقوداً فينوب عنه فرع من العصب الساد

والعصب الفخذي المقدم اعظم فروع الضفيرة القطنية تنشا منه فروع عضلية تتوزع في الحرقفية والمشطية وجميع عضلات مقدم الفخذ الا الشادة لغد الفخذ وفروع جلدية تتوزع في مقدم الفخذ وانسيه وفي الساق والقدم وفروع مفصلية للركبة . ينشا من القطني الثالث والرابع ويقبل حزمة من الثاني وينحدر بين الياف الصليبية فينفذ من الجزء السفلي لحافتها الوحشية ثم

يثقب المخرفة الباطنة فيرسل خيوطا اليها وينفذ من الحلقة الظاهرة البطنية مصاحباً للجبل

شكل ٢٢١




المنوي ويتوزع في جلد الصفن والمجزء العلوي والانسي للفخذ في الذكور وفي الشفر في الاناث. وقد يكون هذا العصب صغيراً جداً وعند ذلك يكون الحرقفي الختلي كبيراً. وقد لا يوجد اصلاً

والعصب التناسلي الفخذي ينشا من القطني الثاني ويخيط قليلة من الفرع الاستطرافي بين الاول والثاني. يسير منحرفاً في جوهر العضلة الصليبية ثم ينزل على وجهها المقدم الى قرب رباط پوپارت فينقسم هناك الى فرع تناسلي وفرع فخذي. فالفرع التناسلي ينزل على الشريان الحرقفي الظاهر ثم يتقب اللقافة المستعرضة ويمر من الحلقة الباطنة البطنية ويصاحب الجبل المنوي الى الصفن فيتوزع في العضلة المعلقة للخصية في الذكور وينتهي في الرباط المستدبر في الاناث. والفرع الفخذي يسير بجانب الحافة الانسية للعضلة الصليبية تحت رباط پوپارت الى الفخذ حيث يتقب اللقافة العريضة ويتوزع في جلد الجهة العليا والمقدمة للفخذ. وتذهب منه خيوط للشريان الفخذي

والعصب الجليدي الوحشي ينشا من القطني الثاني او من عروة الاتصال التي بينه وبين الثالث ويتقب الحافة الوحشية الصليبية عند منتصفها ويقاطع الحرقفية الى الشرم الواقع اسفل الشوكة المقدمة العليا للحرقفي فيمر منه تحت رباط پوپارت الى الفخذ حيث ينقسم الى فرعين مقدم وخلفي. فالفرع المقدم يخدر في

٢٢١ رسم الضفيرة القطنية والصفيرة العجزية واعصاب الطرف السفلي ١ الاعصاب القطنية الاربعة العليا التي تتكون منها ومن فرع من الظهري الاخير الضفيرة القطنية ٢ الضفيرة العجزية المكونة من الاعصاب العجزية الاربعة العليا والعصب القطني الاخير ٣ العصبان العضليان الجليديان وهما الحرقفي الختلي والحرقفي الاربي الناشان من العصب القطني الاول ٤ العصب التناسلي الفخذي ٥ العصب الجليدي الوحشي ٦ العصب الفخذي المقدم ٧ فروع العضلية ٨ الفرع الجليدي المتوسط ٩ و١٠ الفرع الجليدي الانسي ١١ الصافن الانسي وهو الطويل ١٢ العصب الساد ١٣ العصب الالوي وهو فرع من العصب القطني العجزية ١٤ العصب الاستحيائي الباطن ١٥ العصب الوركي الصغير ١٦ العصب الوركي الكبير ١٧ العصب المابضي الانسي ١٨ المابضي الوحشي ١٩ فروع عضلية ٢٠ العصب القضي الختلي الذي ينقسم عند ٢١ الى العصبين الاخصيين ٢٢ الصافن الوحشي ٢٣ القضي المقدم ٢٤ العصب العضلي الجليدي الذي يتقب اللقافة العائرة وينقسم الى فرعين جليديين يتوزعان في ظهر التدم

شكل ٢٢٠



وأما فروع الضفيرة القطنية فهي :

المحرفي الختلي	الساد
المحرفي الأربي	الساد الإضافي
التناسلي الفخذي	الفخذي المقدم
الجلدي الوحشي	

وتقسم هذه الأعصاب إلى مجموعتين باعتبار الحمل الذي تتوزع فيه. فالمجموع الأول يشتمل على المحرفي الختلي والمحرفي الأربي وبعض التناسلي الفخذي التي تتوزع في الجزء السفلي لجدران البطن والثاني يشتمل على ما بقي ويتوزع في مقدم الفخذ والجانب الأيسر للساق

أما العصب المحرفي الختلي ويقال له أيضاً العضي الجلدي العلوي فينشأ من القطني الأول

ويثقب الحافة الوحشية للعضلة الصليبية عند جزئها العلوي ثم يقاطع مقدم القطنية المربعة بانحراف إلى عرف العظم المحرفي ويثقب العضلة المستعرضة من مؤخرها ثم ينقسم بينها وبين المنخرقة الباطنة إلى فرعين أحدهما محرفي والآخر ختلي. فالفرع المحرفي يثقب المنخرقتين الباطنة والظاهرة أعلى عرف المحرفي ويتوزع في جلد الجهة الألوية وراء الفرع الجانبي الجلدي للعصب الظهري الأخير. والفرع الختلي يدوم سائراً إلى المقدم بين المنخرقة الباطنة والمستعرضة فيثقب أولاً المنخرقة الباطنة ثم يثقب المنخرقة الظاهرة بقرب الخط المتوسط أعلى الحلقة البطنية الظاهرة ويتوزع في الجلد الذي يغطي الجهة الختلية

والعصب المحرفي الأربي ويقال له أيضاً العضي الجلدي السفلي أصغر من سابقه وينشأ معه من العصب الأول القطني ويثقب الحافة الوحشية للعضلة الصليبية أسفل مثقب المحرفي الختلي ثم يقاطع القطنية المربعة والمحرفية ويثقب المستعرضة بقرب مقدم عرف المحرفي ثم

شكل ٢٢٠ الضفيرة القطنية مع فروعها والصفيرة العجزية ١ الضفيرة القطنية ٢ الضفيرة العجزية ٣ والعصب المحرفي الختلي والعصب المحرفي الأربي ٤ العصب العضي الجلدي الوحشي ٥ و٦ و٧ فروع جلدية ناشئة من العصب الفخذي المقدم وهو المنار إليه برقم ٨ ٩ العصب التناسلي الفخذي ١٠ و١١ المنتهي السفلي للسمياتوي العظم ١١ العضلة المحرفية الباطنة ١٢ العضلات الثلاث العريضة للبطن ١٣ العضلة الصليبية الكبيرة (بسواس) ١٤ أجسام الفقرات القطنية ١٥ العضلة المربعة القطنية ١٦ أمجاب الحاجز ١٧ العضلة الحياطية

المحرفي الخنثلي واحياناً فرعاً اخر للعصب الاول القطني . فرعه الجانبي الجلدية عظيم الحجم يتوزع في الجلد الى مقدم الورك

في الاعصاب القطنية

في خمسة من كل جانب ينفذ الاول بين الفقرة الاولى القطنية والثانية والاخير بين القطنية الاخيرة وقاعدة العجز . اصول هذه الاعصاب اعظم والياؤها اكثر من اصول والياف بقية الاعصاب الشوكية . يتصل اصولها المقدمة بالخلفية في الثقوب بين الفقرات ثم تنقسم الى فرعين احدهما مقدم والاخر خلفي . فالفروع الخلفية تسير الى الخلف وتنقسم الى فروع ظاهرة تتوزع في الناصبة الشوكية والعضلات بين التوتات المستعرضة وتنشا من الثلاثة العليا خيوط تتوزع في جلد الجهة الالوية حتى المدور الكبير . وفروع باطنة تتوزع في الشوكية المفلجة والعضلات بين التوتات الشوكية . واما الفروع المقدمة فتتواصل بالعقد القطنية للسيمباتوي بواسطة خيوط دقيقة مصاحبة للشرايين القطنية حول اجسام الفقرات تحت العضلة الصليبية . ثم تسير الى الوحشية بانحراف تحت العضلة الصليبية او بين حزمها فترسل خيوطاً لها وللقطنية المربعة . وتتصل الفروع المقدمة للاعصاب الاربعة العليا القطنية بواسطة عروات استطراقية فتتكون من الاتصال المذكور الضفيرة القطنية . واما الفرع المقدم للعصب الخامس القطني فيستطرق اليه فرع من الرابع وينزل مقاطعاً لقاءة العجز ويدخل في تكوين الضفيرة العجزية متصلاً بالعجزى الاول ويقال للعصب المكوّن من اتصالها القطني العجزى

الضفيرة القطنية

تتكون هذه الضفيرة بواسطة عروات استطراقية بين الفروع المقدمة للاعصاب القطنية الاربعة العليا . وهي ضيقة من الاعلى وقد تتصل بالظهري الاخير بواسطة فرع دقيق يقال له الظهري القطني واسعة في الاسفل تتصل بالضفيرة العجزية بواسطة العصب القطني العجزى . وضعها في جوهر العضلة الصليبية الى مقدم التوتات المستعرضة للفقرات القطنية . واما كيفية تكوينها فهي ان العصب القطني الاول يرسل العصب المحرفي الخنثلي والمحرفي الاري وفرعاً استطراقياً للقطني الثاني . والثاني يرسل العصب الجلدية الوحشي والتناسلي الفخذي وفرعاً استطراقياً للثالث . والثالث يرسل فرعاً نازلاً للرابع وينقسم الى فرعين يعينان في تكوين العصب الفخذي المقدم والساد . والرابع يكمل تكوين الفخذي المقدم والساد ويعين في تكوين الساد الاضافي ويرسل فرعاً استطراقياً للخامس

الاضلاع ثم تسير بين الطبقتين الظاهرة والباطنة للعضلات المذكورة فاذا وصلت الى الغضاريف الضلعية كانت بين البليورا والطبقة الباطنة للعضلات بين الاضلاع. وعند النقص تقاطع الشريان الثديي الباطن والقصبة المثثة وثقب العضلات الباطنة بين الاضلاع والصدريّة الكبيرة وتنفذ الى جلد الثدي ومقدم الصدر فتكوّن الاعصاب الجلدية لمقدم الصدر فروعها. تنشأ منها خيوط كثيرة دقيقة تتوزع في العضلات بين الاضلاع والقصبة المثثة. وتنشأ منها ايضاً عند منتصف مسيرها بين العمود والقص فروع جانبية جلدية تنفذ من العضلات الى الجلد فينقسم كل منها الى فرعين مقدم وخلفي. تسير المقدمة الى المقدم وتتوزع في جلد الصدر والثدي والزوائد العليا للمنخرقة الظاهرة. وتسير الخلفية الى الخلف وتتوزع في الجلد الذي يغطي اللوح والظهرية العريضة. واما الفرع الجانبي الجلدي الناشئ من العصب الثاني بين الاضلاع فعظيم الحجم يقال له العصب الضلعي العضدي لانه ينفذ من العضلة الظاهرة بين الاضلاع ويقاطع الابط الى الجانبي الانسي للعضد فيتصل بمخيطة من عصب رزبرج ثم يثقب اللفافة ويتوزع في جلد النصف العلوي لانسي وموخر العضد. وقد يوجد عصب ثانٍ ضلعي عضدي ناشئ من العصب الثالث بين الاضلاع

الاعصاب السفلى بين الاضلاع

سير هذه الاعصاب الاخير منها الى الغضاريف الضلعية كسير سابقتها. فاذا وصلت الى الغضاريف المذكورة سارت وراءها بين العضلة المنخرقة الباطنة والمستعرضة الى المستقيمة فثقب غدها وتتوزع فيها وتنتهي بفروع جلدية عند الخط الابيض. وتتوزع هذه الاعصاب في اثناء مسيرها في العضلات بين الاضلاع والعضلات البطنية وفي جلد البطن. واما فروعها الخلفية فتتوزع في الجلد الذي يغطي الظهرية العريضة

الاعصاب الظهرية التي لها صفات خاصة بها

العصب الاول الظهرية. فرعه الخلفي يتوزع كالفروع الخلفية للاعصاب العنقية. واما فرعه المقدم فعظمه يدخل في تكوين الضفيرة العضدية وما بقي منه يسير كلالاعصاب بين الاضلاع وليس له غالباً فرع جانبي جلدي

والظهرية الاخير اعظم الاعصاب الظهرية يسير فرعه المقدم بجانب الحافة السفلى للضلوع الاخير الى مقدم العضلة القطنية المربعة ويثقب صفاق العضلة المستعرضة ويسير الى المقدم بينها وبين المنخرقة الباطنة فيتوزع كبقية الاعصاب السفلى بين الاضلاع ويرسل فرعاً للعصب

فالفرع الخلفية اصغر من المقدمة وتسير الى الخلف بين التوات المستعرضة وتنقسم الى فروع ظاهرة وفروع باطنة فالظاهرة تنفذ من العضلة الظهرية الطويلة وتوزع فيها وفي العجزية القطنية والروافع للاضلاع وغيرها والباطنة تتوزع في العضلات الغائرة للظهر. وتنشا من الفروع المذكورة اثنا عشر عصباً جلدياً تتوزع في الجلد الستة العليا من الفروع الباطنة والستة السفلى من الفروع الظاهرة

والفروع المقدمة ويقال لها الفروع بين الاضلاع اثنا عشر من كل جانب تقسم الى ستة عليا وستة سفلى. فتتوزع الستة العليا الا الاول في جدران الصدر وتتوزع الستة السفلى في جدران الصدر والبطن

الاعصاب العليا بين الاضلاع

تسير هذه الاعصاب الى المقدم في الاخلية بين الاضلاع مع الاوعية بين الاضلاع فتكون موضوعة



شكل ٢٢٩




شكل ٢٢٨

الى الاسفل منها. وهي موضوعة في مؤخر الصدر بين البليورا والطبقة الظاهرة للعضلات بين

شكل ٢٢٨ الاعصاب بين الاضلاع *a* العَضُد مَقْطُوعاً *b* العَضلة الصدرية الصغيرة *c* العَضلة المسننة الكبيرة *d* العَضلة تحت اللوح *e* العَضلة المستعرضة البطنية او او او الاعصاب الجلدية المقدمة للصدر والبطن *f* العَصَب الصدري الخلفي *g* اعصاب بين الاضلاع *h* الفرع الجانبي الجلدي للعَصَب الاخير بين الاضلاع

شكل ٢٢٩ الاعصاب الجلدية للصدر والبطن *a* العَضُد مَقْطُوعاً *b* العَضلة الصدرية الكبيرة *c* الظهرية العريضة *d* المنخرقة الظاهرة *e* المسننة الكبيرة او او الاعصاب الجلدية المقدمة للصدر والبطن *f* الفرع المقدمة للاعصاب الجلدية الجانبية للصدر والبطن *g* فروعها الخلفية *h* و *i* فروع جلدية من الاقدام الخلفية للاعصاب القطنية *j* العَصَب الحرفي الخلفي

شكل ٢٢٧



الباطحة الطويلة والى الوحشية من الشريان الكعبري فاذا وصل الى اعلى الرسغ بنحو ثلاثة قراريط انعكف الى مؤخر الساعد تحت وتر العضلة المذكورة وثقب للنافذة فصار سطحياً ثم ينقسم الى فرعين . احدهما وحشي صغير يسير الى الجانب الكعبري للابهام ويتوزع في جلد تلك الجهة والكرة متواصلاً بفرع من الجليدي الوحشي . والآخر انسي يتواصل اعلى الرسغ بفرع من الجليدي الوحشي ويتواصل في قفا اليد بالفرع الظهرى للعصب الزندي فيكون قوساً ثم ينقسم الى اربعة اعصاب اصبعية يتوزع الاول في الجانب الزندي للابهام والثاني في الجانب الكعبري للسبابة والثالث في الجانبين المتجاورين للسبابة والوسطى والرابع في الجانبين المتجاورين للوسطى والبصر والعصب الخلفي بين العظمين اعظم الفرعين الانتهايين للعضلي المغزلي يثقب الباطحة القصيرة وينعكف الى مؤخر الساعد بين الياف العضلة المذكورة ويسير الى الاسفل بين الطبقة السطحية والطبقة الغائرة من العضلات الى ان يضل الى الغشاء بين العظمين عند منتصف الساعد . ثم ينزل على الغشاء المذكور وقد صغر حجمه جداً الى مؤخر الرسغ فتظهر فيه عقدة تذهب منها خيوط الى مفصل الرسغ . وهذا العصب يتوزع في جميع عضلات الجهة الكعبرية والجهة الخلفية للساعد الالمرفقية والباطحة الطويلة والباسطة الطويلة الكعبرية للرسغ

الاعصاب الظهرية

هي اثنا عشر من كل جانب ينفذ الاول بين الفقرة الظهرية الاولى والثانية والاخير بين الظهرية الاخيرة والقطبية الاولى . اصولها المنشئية قليلة العدد صغيرة الحجم تتحد المقدمة منها بالخلفية في الثقوب بين الفقرات فتصير جذعاً واحداً اذا نفذ من الثقب انقسم الى فرعين احدهما خلفي او ظهري والاخر مقدم او بين الاضلاع

شكل ٢٢٧ اعصاب مؤخر الساعد وظهر اليد ١ والعصب الزندي ٢ والعصب الخلفي بين العظمين ٣ فرع عضدي جليدي ٤ العصب الكعبري ٥ اعصاب ظهر الاصابع ٦ الفرع الظهرى للعصب الزندي

والخيوط المفصالية للرسغ تنوزع في الرسغ

والفرع الراجي السطحي يتوزع في العضلة الراحية الصغيرة وجلد انسي اليد وينتهي بفرعين اصبعيين يتوزع احدهما في الجانب الزندي للخنصر والاخر في جانبه الكعبري وفي الجانب الزندي للينصر

والفرع الراجي الغائر يمر بين المبعدة للخنصر والقابضة الصغيرة له ويتبع سير القوس الراجي الغائر تحب اوتار القوايض. وعند منشاء يرسل فروعاً لعضلات الخنصر وخططين للخرطبتين الانسييتين. وعند تقاطعه للزغ الغائر من اليد يرسل فرعين لكل من الاخالية بين العظام فرعاً للعضلة الظهرية وفرعاً للعضلة الراحية بين العظام. وعند نهايته بين الابهام والسبابة يتوزع في المقربة للابهام والراس الانسي للقابضة الصغيرة للابهام

والعصب العضلي المغزلي اعظم فروع الصغيرة العضدية يتوزع في عضلات مؤخر العضد والساعد وجلد جميع تلك الجهة واليد. ينشا من الحبل الخلفي مع العصب المنعكف ويكون موضوعاً في اول سيره وراء الشريان الابطي والجزء العلوي من الشريان العضدي سائراً الى الاسفل الى مقدم وتري الظهرية العريضة والمستديرة الكبيرة. ثم يعكف حول العضد في الميزاب المغزلي مع الشريان الغائر العلوي والوريد ويمر من الجانب الانسي الى الجانب الوحشي للعظم تحت الثلاثية الرووس. ثم يتزل من الجانب الوحشي للعضد بين العضدية المقدمة والباطحة الطويلة الى مقدم العقدة الوحشية حيث ينقسم الى فرعين الكعبري والعصب الخلفي بين العظمين

فروعه: فروع عضلية - فروع جلدية - الكعبري - العصب الخلفي بين العظمين

فالفرع العضلية تنوزع في الثلاثية الرووس والمرفقية والباطحة الطويلة والباسطة الطويلة الكعبرية للرسغ والعضدية المقدمة منقسمة الى ثلاثة اقسام انسية وخلفية ووحشية والفروع الجلدية ثلاثة واحد انسي واثنان وحشيان. فالانسي ينشا في الخلاء الابطي ويقاطعه الى الجانب الانسي للعضد ويتوزع في جلد مؤخر العضد حتى المرفق. والوحشيان يتقبان الراس الوحشي للثلاثية الرووس. فيتوزع العلوي منها في جلد النصف السفلي لمقدم العضد تابعاً لسير الوريد الراسي. واما السفلي فانه يتقبب للنافقة اسفل مندغم الذالية ويتزل الى الرسغ متوزعاً مدة سيره في الجلد ومتواصلاً عند نهايته بفرع من العصب الجلدي الوحشي

والعصب الكعبري يدوم من العصب العضلي المغزلي سائراً باستقامة الى الاسفل تحت

شكل ٢٢٦



ويشقب الفاصل العضلي الانسي وينزل في الميزاب الواقع بين العقدة الانسية للعضد والتوالمرفقي مصاحباً للشريان الغائر السفلي . وفي المرفق يكون مستقراً على مؤخر العقدة الانسية ويسير الى الساعد بين رأسي القابضة الزندية للرسغ . وفي الساعد يسير سيراً مستقيماً على جانبه الزندي مستقراً على القابضة الغائرة للاصابع تغطي نصفه العلوي القابضة الزندية للرسغ واما نصفه السفلي فيكون الى الوحشية منها ولا يغطيه الا الجلد واللفافة . ثم ان وضع هذا العصب يكون في اول الامر بعيداً عن الشريان الزندي ثم يصير الى جانبه الانسي . وفي الرسغ يقطع العصب الزندي الرباط الحلقني الى الوحشية من العظم البسلي ثم ينقسم الى فرعين راحي سطحي وراحي غائر

واما فروع العصب الزندي فهي :

في الساعد : فروع مفصالية للمرفق - فروع عضلية - فرع جلدي -
 فرع ظهري - خيوط مفصالية للرسغ
 في اليد : راحي سطحي - راحي غائر

فالفرع المفصالية للمرفق تنشأ من العصب وهو في الميزاب بين العقدة الانسية والتوالمرفقي وتتوزع في المفصل المرفقي


والفروع العضلية اثنان ينشآن بقرب المرفق ويتوزع احدهما في القابضة الزندية للرسغ والثاني في القابضة الغائرة للاصابع

والفرع الجلدي ينشأ عند منتصف الساعد وينقسم الى فرعين احدهما سطحي يشقب اللفافة بقرب الرسغ ويتوزع في الجلد . والثاني غائر يصاحب العصب الزندي الى الراحة ويتوزع في جلد الراحة

والفرع الظهري ينشأ على الرسغ بنحو قيراطين ويسير الى المؤخر ثم يشقب اللفافة الغائرة ويسير على الجانب الزندي للرسغ واليد ويتوزع في الجانب الانسي للخنصر وفي جانبه الوحشي وفي الجانب الانسي للبصر

شكل ٢٢٦ اعصاب مقدم الساعد واليد ١ العصب المتوسط ٢ الفرع المقدم العصب العضلي المغزلي وهو الكعبري
 ٣ العصب الزندي ٤ انقسام العصب المتوسط في راحة اليد الى الابهام والسبابة والوسطى والجانب الكعبري البنصر ٥ انقسام العصب الزندي الى جانبي الخنصر والجانب الزندي للبنصر

السبابة الكعبري ويرسل فرعاً للخراطينية الاولى. والرابع على الجانبيين المتجاورين للسبابة والوسطى. والخامس على الجانبيين المتجاورين للوسطى والبصر. واما النصف الزندي للبصر والخنصر فتأتيها



شكل ٢٢٥



شكل ٢٢٤

فروع من العصب الزندي . ثم ان كل فرع اصبعي يرسل مقابل قاعدة السلاحي الاولى فرعاً ظهرياً يتواصل بالفروع الظهرية التي سيأتي الكلام عليها. وينقسم كل فرع اصبعي عند طرف الاصبع الى فرعين يتوزع احدهما في كرة مقدم الاصبع والاخر في الكتلة التي تحت الظفر. والاعصاب الاصبعية موضوعة الى الانسية والسطحية من الشرايين الاصبعية

والعصب الزندي موضوع في الجانب الانسي للطرف العلوي ويتوزع في عضلات الساعد واليد وجالدها. منشأه من الحبل الانسي للضفيرة العضدية . ويكون في اول سيره موضوعاً الى الانسية من الشريان العضدي ثم عند منتصف العضم يقاطع الراس الانسي لثلاثية الرووس


شكل ٢٢٤ وشكل ٢٢٥ اجسام باسيفي وهو مشرح ابطا لباني وصفها اولاً سنة ١٨٢٠ ثم في سنة ١٨٤٠. والاجسام المذكورة كذل صغيرة بيضية الشكل يختلف طولها من نصف خط الى ثلاثة خطوط موضوعة على الاطراف الانتهاية المحيطية للالياف العصبية ولا سيما في الراحة والاختص في النسيج الحلوي الذي تحت الجلد. فيل ان عددها في راحة اليد والوجه الراحي للاصابع يبلغ ستماية جسم وهي شفافة لامعة تشتملها خطوط بيضاء. واما بناؤها الميكروسكوبي فاولاً من تجويف مركزي يتضمن الطرف السائب الليفة عصبية مجردة من غدها ومادتها البيضاء اي انه لم يبق منها الا محورها الاسطواني وانما من صفاغ خلوية النسيج متناعبة يبلغ عددها من عشرين الى ستين ويشغل الخلايا التي بين الصفاغ والتجويف المركزي سائل مصلي وتنتهي الليفة العصبية على هيئة كتلة مستديرة وقد تكون مفروضة

شكل ٢٢٤ قسم من عصب اصبعي. والكتل المستديرة موضوعة عليه هي اجسام باسيفي

شكل ٢٢٥ جسم من اجسام باسيفي " عنفة b الليفة العصبية c المحور الاسطواني الذي يتضمنه التجويف المركزي كمتنى

الليفة c وd الصفاغ العصبية

شكل ٢٢٢



او الى الوحشية منه . ثم اذ انزل الى العضد كان وضعه اولاً الى الوحشية من الشريان العضدي ثم يصالبه في منتصف سيره الى المقدم غالباً ثم يكون الى جانبيه الانسي حتى ثنية المرفق وهناك تغطيه لفافة ذات الرأسين وتفصله عن المفصل المرفقي العضدية المقدمة . واما في الساعد فيسير بين راسي الكابة المستديرة ثم ينزل تحت القابضة السطحية الى اعلى الرباط الحفلي بنحو قيراطين فيصير هناك سطحياً موضعاً بين القابضة السطحية والقابضة الكعبرية للرسغ فلا يغطيه حينئذ الاً الجلد واللفافة . ثم يسير تحت الرباط الحفلي الى اليد فروعاً . لا ترسل فروع من العصب المتوسط وهو في العضد . واما في الساعد فهي فروع عضلية والمقدم بين العظمين والراحي الجلدي . فالفروع العضلية تتوزع في العضلات السطحية التي الى

مقدم الساعد الاً القابضة الزندية للرسغ . والفرع المقدم بين العظمين يتوزع في العضلات الغائرة لمقدم الساعد مصاحباً للشريان بين العظمين ومنتهياً في الكابة المربعة . والفرع الراحي الجلدي ينشأ من العصب المتوسط عند اسفل الساعد ويثقب اللفافة اعلى الرباط الحفلي ثم ينقسم الى فرعين يقاطعان الرباط المذكور ويتوزعان في جلد كرة الابهام وجلد الراحة متواصلين بالجلدي الوحشي والزندي

واما في راحة اليد فيستقر العصب المتوسط على اوتار القوابض ويغطيه الجلد واللفافة الراحة . وينقسم الى فرعين احدهما وحشي يتوزع في بعض عضلات الابهام ويرسل فروعاً اصبعية الى الابهام والسبابة . والاخر انسي يرسل فروعاً اصبعية الى نصف السبابة والوسطى ونصف البنصر وهذه الفروع الاصبعية خمسة يذهب الاول والثاني على جانبي الابهام . والثالث على جانب

شكل ٢٢٢ الضفيرة العضدية وفروعها التي تذهب الى العضد ١ والعضلة الاخيمية المقدمة التي الى وراها وجانها الوحشي الاعصاب التي تتكون منها الضفيرة العضدية ٢ و٣ العصب المتوسط ٤ العصب الزندي ٥ العصب العضلي الجلدي ٥ الاعصاب الصدرية ٦ العصب الحجابي الناشي من العصب الثالث والرابع والخامس العنقية

والعصب العضلي الجلدي ويقال له الجلدي الوحشي ايضاً يتوزع في بعض عضلات العضد وجلد الساعد. ينشأ من الحبل الوحشي مقابل الحافة السفلى للصدرية الصغيرة ثم يثقب العضلة الغراية العضدية ويسير منحرفاً بين ذات الرأسين والعضدية المقدمة الى الجانب الوحشي للعضد ثم يثقب اللفافة الغائرة اعلى المرفق بقليل ويصير جلدياً. ويرسل في اثناء مسيره في العضد فروعاً للغراية العضدية وذات الرأسين والعضدية المقدمة وخيوطاً لمفصل المرفق والعظم العضدي. واما الجزء الجلدي لهذا العصب فانه يسير وراء الوريد المتوسط الراسي وينقسم حذاء المفصل المرفقي الى فرع مقدم وفرع خلفي. فالقدم ينزل على الجانب الكعبري للساعد الى الرسغ ثم يثقب اللفافة الغائرة ويصاحب الشريان الكعبري الى مؤخر الرسغ. ويتواصل بالعصب الكعبري ويرسل خيوطاً لجلد كرة الابهام. والخلفي ينشأ عند منتصف الساعد ويسير الى الاسفل على مؤخر الجانب الكعبري الى الرسغ فيتوزع في الثالث السفلي لجلد الساعد متواصلاً بالعصب الكعبري والفرع الجلدي الوحشي للعضلي المغزلي

والعصب الجلدي الانسي صغير الحجم وينشأ من الحبل الانسي مع العصب الزندي والراس الانسي للمتوسط. ويسير الى الاسفل على الجانب الانسي للعضد ثم يثقب اللفافة الغائرة هو والوريد الباسيقي نحو منتصف العضد فيصير جلدياً وينقسم الى فرعين. احدهما مقدم يسير غالباً الى مقدم الوريد المتوسط الباسيقي ثم ينزل على الوجه المقدم للجانب الانسي للساعد متوزعاً في الجلد حتى الرسغ ومتواصلاً بفرع جلدي من العصب الزندي. والخلفي يسير الى الاسفل الى الجانب الانسي للوريد الباسيقي وينعكف على العقدة الانسية الى مؤخر الساعد فينزل وينتهي اسفل منتصف الساعد بقليل متوزعاً في الجلد ومتفهماً اعلى المرفق بالجلدي الانسي الاصغر واعلى الرسغ بالزندي

والعصب الجلدي الانسي الاصغر يتوزع في الجلد على الجانب الانسي للعضد وهو اصغر فروع الضفيرة العضدية. ينشأ مع الجلدي الانسي والزندي من الحبل الانسي ويسير في الخلاء الابطي موضوعاً اولاً تحت الوريد الابطي ثم الى الانسية منه ومتواصلاً بالعصب الضلعي العضدي. ثم يتخذ على الجانب الانسي للشريان العضدي الى نحو منتصف العضد فيثقب اللفافة الغائرة ويتوزع في جلد مؤخر الثالث السفلي للعضد حتى المرفق. ويقال لهذا العصب احياناً عصب رزبرج والعصب المتوسط يسير في الخط المتوسط للعضد والساعد الى اليد منشاه باصلين احدهما من الحبل الوحشي والاخر من الانسي يعانقان الجزء السفلي للشريان الابطي ويتجانان الى مقدمه

في جوهر الاخمعية المقدمة. ثم يسير العصب وراء الضفيرة العضدية والاعوية الابطية مستقرًا على الوجه الظاهر للمسننة الكبيرة ويتوزع فيها حتى حافتها السفلى والعصب اعلى اللوح ينشأ من الحبل المكون من العصب الخامس والسادس والسابع العنقية ويسير منحرفًا الى الوحشية تحت المربعة المنحرفة ويدخل الحفرة اعلى الشوكة من الشرم الذي في الحافة العليا للوح ثم يسير تحت العضلة اعلى الشوكة وينعكف على مقدم الشوكة وينزل الى الحفرة تحت الشوكة فيتوزع في العضلتين المذكورتين ويرسل فروعًا للفصل الكتفي

فروع الضفيرة العضدية اسفل الترقوة


الى الصدر: الصدران المقدمان
الى الكف: الفروع اسفل اللوح - المنعكف
الى العضد والساعد واليد: العضلي الجلدي - الجلدي الانسي - الجلدي الانسي الاصغر - المتوسط - الزندي - العضلي المغزلي

فالصدران المقدمان يتوزعان في الصدريتين. احدهما وحشي او سطحي ينشأ من الحبل الوحشي ويسير الى الانسية مقاطعًا للاوعية الابطية ويتوزع في الوجه الباطن للصدرية الكبيرة. والاخر انسي او غائر ينشأ من الحبل الانسي ويسير الى الاعلى بين الشريان والوريد الابطين وقد يثقب الوريد ثم يتحد بخيط استطراقي من الفرع الوحشي فتذهب فروع من العروة المكونة من الاتحاد المذكور الى الوجه الغائر للعضلتين الصدريتين اي الصغيرة والكبيرة

والاعصاب اسفل اللوح ثلاثة علوي وسفلي وطويل تنشأ من الحبل الخلفي. فالعلوي يتوزع في الجزء العلوي للعضلة تحت اللوح. والسفلي يدخل الحافة الابطية للعضلة المذكورة وينتهي في المستديرة الكبيرة. والطويل اكبرها يسير على الحافة السفلى للعضلة تحت اللوح ويتوزع في الظهرية العريضة

والعصب المنعكف يتوزع في المفصل الكتفي وبعض عضلاته والجلد. ينشأ من الحبل الخلفي مع العصب العضلي المغزلي ويسير وراء الشريان الابطي والى مقدم العضلة تحت اللوح ثم عند حافتها السفلى يتجه الى الخلف وينقسم الى فرعين. احدهما علوي ينعكف حول عنق العضد تحت الذالية مع الشريان المنعكف الخلفي فيتوزع في العضلة المذكورة والجلد. والاخر سفلي يرسل خيوطًا عند منشئه للمستديرة الصغيرة والجزء الخلفي للذالية ثم يثقب اللقافة الغائرة ويتوزع في الجلد. ويرسل ايضًا قبل انقسامه عند منشأه خيطًا مفصليًا لمفصل الكتف

شكل ٢٢٢



المقدمة. وتتواصل أيضاً بخيوط من السيمبانوني مجاورتها. في العنق تستقر الضفيرة العضدية أولاً بين الاخيمية المقدمة والاخيمية المتوسطة ثم الى الاعلى والوحشية من الشريان تحت الترقوة ثم تمر أسفل العظم الترقوي والعضلة تحت الترقوة على الضلع الاول والسن الاول المسننة الكبيرة. وفي الابط يكون وضعها اولاً الى الوحشية من الجزء الاول للشريان الابطي ثم تحيطه في جزئه الثاني بحيث يكون حبل الى الانسية منه وحبل الى الوحشية وحبل الى الخلف. وفي الجزء السفلي للخلاء الابطي ترسل فروعها الانتهاية للطرف العلوي فروعها. تُقسَم فروع الضفيرة العضدية الى مجموعتين فروع تُرسل اعلى الترقوة وفروع تُرسل اسفلها

فروع الضفيرة العضدية اعلى الترقوة

الاستطراقي - العضلية - الصدري الخلفي - اعلى اللوح

فالفرع الاستطراقي ينشا من العصب الخامس العنقي ويستطرق الى الحجابي متحداً به على الوجه الظاهر للاخيمية المقدمة والفروع العضلية تنوزع في العنقية الطويلة والاخيميات والمربعتين المعينتين والعضلة تحت الترقوة. ويتصل الفرع الذي يذهب الى العضلة تحت الترقوة بالعصب الحجابي غالباً بواسطة خيط

والعصب الصدري الخلفي ويقال له الصدري الطويل والعصب التنفسي الظاهر للمعلم بل ينشا باصلين من الخامس والسادس العنقيين بعد خروجهما من الثقوب بين الفقرات ويتعدان

شكل ٢٢٢ الضفيرة العضدية وفروعها مع توزيعها ١ الضفيرة العضدية ٢ العصبان الصدريان المقدمان ٣ الصدري الخلفي وهو العصب التنفسي الظاهر للمعلم بل ٤ العصب الحجابي ٥ العصب اعلى اللوح ٦ الاعصاب اسفل اللوح ٧ العصب العضلي الجلدني ٨ نقطة ثقب هذا العصب للعضلة الغرابية العضدية ٩ العصب الجلدني الانسي وقد وضع الرقعة عند ثقب هذا العصب للثافة الغائرة ١٠ منشا العصب المتوسط براسين ١١ ثنية المرفق حيث يسير العصب المتوسط بين راسي الكابة المستديرة للكعبرة والقابضة السطوية للاصابع ١٢ فروع العضلية ١٣ العصب المقدم بين العظمين ١٤ العصب المتوسط عند مروره تحت الرباط الحجابي وانقسامه الى ستة فروع انتهائية. واما الفرع الذي يتقاطع الرباط الحجابي فهو الراجحي السطوي ١٥ العصب الزندي ١٦ نقطة مروره بين راسي القابضة الزندية للرسخ ١٧ فرع الظهري ١٨ منتهاه حيث ينقسم الى فروعين راجحي سطوي وراجحي غائر ١٩ العصب العضلي المغزلي ٢٠ فروع العضلية لثلاثة الرؤوس ٢١ العصب الجلدني ٢٢ العصب الحجابي بين العظمين حيث ينشب العضلة الباطحة النصيرة ٢٣ العصب الكعبري. وهذان العصبان هما الفرعان الانتهايمان للعضلي المغزلي ٢٤ نقطة ثقب العصب الكعبري للثافة الغائرة ٢٥ العصب المنعكف

بين التواتر المستعرضة الى فروع وحشية وفروع انسية. فتتوزع الوحشية في عضلات جانب العنق وهي العنقية الصاعدة والعنقية المستعرضة والقفوية الحليمية. واما الفرع الوحشي للعصب الثاني العنقي فاعظمها وكثيراً ما يتحد بالثالث ويتوزع في المضاعفة والطحالية والقفوية الحليمية. والفروع الانسية اعظم من المقدمة وتتوزع في عضلات العنق وهي المضاعفة والشوكية النصف العنقية والعضلات بين الشوكات والمفجعة الشوكية

واما الفرع الخلفي للعنقي الاول وهو تحت الموخري فاعظم من الفرع المقدم وينفذ من القناة الشوكية بين العظم الموخري والقوس الخلفي للحاملة وراء الشريان الفقري ويتوزع في المستقيمات والمخرفتين والمضاعفة. وليس لهذا الفرع فرع وحشي كبقية الاعصاب العنقية والفرع الخلفي للعصب الثاني العنقي اعظم جميع الفروع الخلفية العنقية ويرسل فروعاً للمخرفة السفلى ثم ينقسم الى فرعين وحشي وانسي. فالانسي منها عظيم يقال له الموخري العظيم يصعد الى الاعلى وينفذ من المضاعفة والمربعة المخرفة عند ارتباطها بالعظم الموخري ويتوزع في جلد الجبهة الى الفم

والفرع الخلفي للثالث العنقي اصغر من سابقه ويتوزع في جلد مؤخر الراس

في الضمفيرة العضدية

الضمفيرة العضدية مكوّنة من اتحاد الفروع المقدمة للاعصاب العنقية الاربعة السفلى والعصب الاول الظهري. وتمتد من الجزء السفلي لجانب العنق الى الابط. وهي واسعة عند مبداها ضيقة مقابل الترقوة واسعة في الابط وتنقسم مقابل التو الغرابي الى عدة فروع تتوزع في الطرف العلوي. وجميع الاعصاب التي تدخل في تكوين هذه الضمفيرة متساوية الحجم فيتحد العصب الخامس والسادس والسابع وتصبح حبلًا واحدًا بقرب الحافة الخلفية للاخيمية المتوسطة ويتحد العنقي الثامن بالظهري الاول فيتكون من ذلك حبل اخر. وهذان الحبلان يصاحبان الشريان تمت الترقوة الى الابط موضوعين الى الوحشية منه بحيث يكون الحبل المؤلف من العنقي الثامن والظهري الاول اقرب اليه. ثم يرسل كل حبل منها فسجة حذاء الترقوة وحياناً في الابط تحتان فيتكون من ذلك حبل ثالث. ويكون وضع الحبال الثلاثة المذكورة في مركز الابط على شكل ان احدها الى الوحشية من الشريان الابطي والثاني الى الانسية والثالث الى الخلف. وتتواصل الضمفيرة العضدية بالضمفيرة العنقية بواسطة فرع مستطرق بين الرابع والخامس وبالعصب الحجابي بواسطة فرع من الخامس يتحد بالعصب المذكور على الوجه الظاهر للاخيمية

وتنزل بين الحافة الخلفية للقصبة الحلمية والمربعة المنخرقة ثم تنقسم الى فروع انسية او قصبية تتوزع في الجلد الى الخط المتوسط ومتوسطة او ترقوية تتوزع في الجلد الذي على العضلة الصدرية والذالية ووحشية او اخربية تتوزع في جلد اعلى وموخر الكتف

الفروع الغائرة للصفيرة العنقية (الفروع الانسية)

الفروع الاستطراقية جملة خيوط تمر من عروة العصب الاول والثاني العنقيين عند مقدم الحاملة الى العصب الرئوي المعدي وتحت اللسان والسيبانوي والفروع العضلية تنشا من العنقي الاول ومن العروة المكونة منه ومن الثاني وتوزع في المقدمتين المستقيمتين والجانبية المستقيمة

والاستطراقي التاسع مكوّن غالباً من خيطين احدهما ناشئ من العصب الثاني والاخر من الثالث يتواصلان بالتاسع النازل الى مقدم غمد السباتي فيكونان معه عروة

والعصب الحجابي ينشا من العصب الثالث والرابع العنقيين ويقبل فرعاً استطراقياً من الخامس . واما سيره فانه ينزل الى اصل العنق موضوعاً بانحراف الى مقدم الاخعية المقدمة ثم يقاطع الجزء الاول من الشريان تحت الترقوة ماراً بينه وبين الوريد تحت الترقوة . فاذا دخل التجويف الصدري قاطع الشريان الثديي الباطن عند اصله وانحدر عمودياً الى مقدم جذر الرئة وبجانب التامور الى ان يصل الى الحجاب الحاجز فينقسم الى فروع تثقب العضلة المذكورة وتتوزع في وجهها السفلي . الحجابي الايمن غائر الوضع واقصر من الايسر وضعة الى الجانب الوحشي من الوريد اللا اسملة والاجوف العلوي . والايسر اطول من الايمن نظراً الى اتجاه القلب الى الجهة اليسرى وغور الحجاب في هذه الجهة ويقاطع القوس الاورطي . ويرسل كل منهما خيوطاً للتامور واللبورا ويقبل خيطاً من السيبانوي وخيطاً من الخامس والسادس العنقيين

الفروع الغائرة للصفيرة العنقية (الفروع الوحشية)

الفروع الاستطراقية فروع ذاهبة من الصفيرة العنقية الى العصب الشوكي الاضافي وتصل به في جوهر القصبة الحلمية والمربعة المنخرقة وفي الخلاء الواقع بينها والفروع العضلية اولاً فرع للقصبة الحلمية ناشئ من العنقي الثاني وفرعان للرافعة لزاوية اللوح من العنقي الثالث وفروع للاخعية المتوسطة والمربعة والمنخرقة من الثالث والرابع

الفروع الخلفية للأعصاب العنقية

جميع هذه الفروع للأعصاب العنقية الا العصبين الاولين تسير الى الخلف وتنقسم وراء العضلات

مرتبة على الكيفية الآتية:

العنقي السطحي	صاعدة	سطحية
الاذني العظيم		
الموخرى الصغير	نازلة	
الفصية		
الترقوة		
الاقزمية	انسية	
استطراقية		
عضلية		
الاستطراقي التاسع		
الحجابي	وحشية	
استطراقية		
عضلية		

الفروع السطحية للضفيرة العنقية (شكل ٢١٧)

العنقي السطحي ينشا من العصب الثاني والثالث العنقيين وينعكف حول الحافة الخلفية للفصية الحلمية ويسير وراء الوداجي الظاهر الى مقدم العضلة المذكورة ويثقب اللفافة الغائرة ويتوزع في الجزء المقدم والحجابي للعنق تحت العضلة الجلدية. ولهذا العصب فرعان احدهما صاعد والاخر نازل

والاذني العظيم ينشا من العصب الثاني والثالث العنقيين وينعكف حول الحافة الخلفية للفصية الحلمية ثم يثقب اللفافة الغائرة ويصعد تحت العضلة الجلدية الى الغدة النكفية حيث ينقسم الى فروع كثيرة. منها وجهية تقاطع الغدة النكفية وتتوزع في جلد الوجه وبعضها يغوص في جوهر الغدة ويتواصل بالعصب الوجهي. ومنها اذنية تتوزع في مؤخر الصيوان. وواحد حلبي يقاطع التواحلبي ويتوزع في الجلد وراء الأذن

والموخرى الصغير ينشا من العصب الثاني العنقي وينعكف حول الحافة الخلفية للفصية الحلمية اعلى سابقه ويصعد عمودياً بجانب الحافة المذكورة الى مؤخر جانب الراس ثم يثقب اللفافة الغائرة ويدوم صاعداً خلف الاذن متوزعاً في العضلة المؤخرية الجبهية والجلد. ويرسل فرعاً للعضلة الاذنية العليا

واما الفروع النازلة ويقال لها اعلى الترقوة فتشا من العصب الثالث والرابع العنقيين

وصفيحة المحور والثامن وهو الاخير بين الفقرات العنقية الاخيرة والظهرية الاولى. وينقسم كل عصب منها عند خروجه من الثقب بين الفقرات الى فرع مقدم وفرع خلفي. فالفروع المقدمة للعنقية الاربعة العليا تكوّن الضفيرة العنقية والفروع المقدمة للعنقية الاربعة السفلى مع الظهري الاول تكوّن الضفيرة العضدية

الفروع المقدمة للاعصاب العنقية

الفرع المقدم للعصب الاول العنقي صغير الحجم ينفذ من القناة الشوكية سائراً في ميزاب على القوس الخلفي للحاملة تحت الشريان الفقري ثم ينزل الى مقدم التواء المستعرض للحاملة ويتواصل بفرع صاعد من العصب العنقي الثاني. وتستطرق منه خيوط الى الرئوي المعدي وتحت اللسان والسيباتوي وتوزع منه فروع في العضلة المستقيمة الجانبية والمستقيمتين المقدمتين والفرع المقدم للعصب الثاني العنقي ينفذ من القناة الشوكية بين القوس الخلفي للحاملة وصفيحة المحور ويسير الى المقدم على الجانب الوحشي للشريان الفقري وينقسم الى فرع صاعد يتصل بالعنقي الاول وفرعين نازلين يتصلان بالثالث

والفرع المقدم للثالث العنقي اعظم من سابقه ينزل عند نفوذه من الثقب بين الفقرات الى الاسفل والوحشية وراء القصية الحلمية وينقسم الى فرع صاعد يتصل بالعنقي الثاني ويستطرق الى السيباتوي والشوكي الاضائي وينقسم الى السطحي العنقي والاذني العظيم. وفرع نازل ينزل الى مقدم الاخعية المقدمة ويتمم بالعنقي الرابع والفرع المقدم للرابع العنقي كسابقه في الحجم. يقبل فرعاً من الثالث ويرسل فرعاً استطرافياً للغماس. ثم يسير الى الاسفل والوحشية وينقسم الى خيوط كثيرة تقاطع المثلث الخلفي للعنق وتسير الى الترقوة والآخرم. ويرسل غالباً فرعاً للعصب الحجابي

والفروع المقدمة للعصب الخامس والسادس والسابع والثامن العنقية كبيرة الحجم جداً فهي اكبر من سابقتها الا انها متساوية الحجم. وهذه الفروع تدخل في تكوين الضفيرة العضدية

في الضفيرة العنقية

الضفيرة العنقية مكونة من الفروع المقدمة للاعصاب الاربعة العليا العنقية. وهي موضوعة الى مقدم الفقرات الاربعة العليا ومستقرة على العضلة الرافعة لزاوية اللوح والاخعية المتوسطة وتغطيها القصية الحلمية

تقسم فروعها الى مجموعتين سطحي يتوزع في الجلد والعضلة الجلدية وغائر يتوزع في العضلات

الثقوب بين الفقرات وليس لها عقدة

عقد الاعصاب الشوكية

هذه العقد واقعة على الاصول الخلفية للاعصاب الشوكية شكلها بيضي لونها يميل الى الحمرة وقدرها تابع لتدر العصب الذي تتكوّن عليه. وهي موضوعة في الثقوب بين الفقرات خارج الثقوب التي تنفذ منها الاعصاب في الام الجافية ويستثنى من ذلك العصب الاول والثاني العنقيان اللذان عقدتاها موضوعتان على قوسي الفقرتين اللتين يبران عليهما والاعصاب العجزية والعصب العصعصي التي عقدها موضوعة داخل القناة الشوكية. ثم ان الحزمتين للاصول الخلفية تدخلان العقدة وتخرجان منها جذعاً واحداً يتحد بالاصل المقدم بحيث تتخالط اليافهما وتصبح جذعاً واحداً ينفذ من الثقب بين الفقرتين ثم ينقسم الى فرع مقدم يتوزع في الجزء المقدم للجسد وفرع خلفي يتوزع في الجزء الخلفي الا ان كل فرع منها مكون من الياف آتية من الاصلين

الفروع المقدمة للاعصاب الشوكية

هذه الفروع تتوزع في اجزاء الجسد الواقعة الى مقدم العمود الفقري وفي الطرفين العلويين والطرفين السفليين. وهي في الغالب اعظم من الفروع الخلفية ويكون حجمها تابعاً لحجم الجزء الذي تتوزع فيه. وكل فرع منها متصل بالاسمياتوي بواسطة خيوط دقيقة. وهي منفصلة بعضها عن بعض في الجهة الظهرية واما في الجهة العنقية والقطنية والعجزية فتكوّن صفائر مشوشة التركيب قبل توزعها

الفروع الخلفية للاعصاب الشوكية

هي اصغر من المقدمة غالباً وتتشا من الجذع المكوّن من اتحاد الاصول المقدمة بالخلفية في الثقوب بين الفقرات ثم تسير الى الخلف وتنقسم الى فروع وحشية وانسية تتوزع في العضلات والجلد وراء العمود الآ العنقي الاول والعجزية السفلي

في الاعصاب العنقية

تتعاظم اصول هذه الاعصاب من الاول الى الخامس ثم يبقى حجمها واحداً الى الثامن. اصولها الخلفية اعظم من المقدمة. اتجاهاها اقل انحرافاً من بقية الاعصاب الشوكية فينتجه الاول الى الوحشية وقليلاً الى الاعلى والثاني افتي وما بقي متجه الى الوحشية والاسفل. وينفذ جذع العنقي الاول الذي يقال له تحت المؤخري بين العظم المؤخري والقوس الخلفي للحاملة. والثاني بين القوس المذكور

في الاعصاب الشوكية

تسمت هذه الاعصاب بالشوكية لانها تنشأ من الحبل الشوكي وتنفذ من الثقوب بين الفقرات الواقعة في كل من الجانبين للعمود الشوكي. وهي احد وثلاثون زوجاً تنقسم الى مجاميع تقابل الجهات التي تخرج منها وهي هذه :


عجزية - ٥	عنقية - ٨
عصصية - ١	ظهرية - ١٢
٢١	قطنية - ٥

فيري ان عددها يطابق عدد الفقرات الآ في الجهة العنقية والعصصية

اصول الاعصاب الشوكية

ينشا كل عصب شوكي باصليين احدهما مقدم او محرك والثاني خلفي او حاس

شكل ٢٢١




فالاصول المقدمة تنشأ من ثقب في القائمة المقدمة للحبل الشوكي تتقارب الى الفرجة المقدمة المتوسطة كلما نزلت الى الاسفل. والاصول الخلفية تنشأ من القائمة الخلفية وهي اكثر عدداً من الاصول المقدمة الا انها ادق والطف وتنفصل عن الاصول المقدمة بواسطة الرباط المسنن. وعند خروجها نحو الثقب الواقع في الام الجافية تتحد وتكون حزمتين تقبلان غداً من الغشاء المذكور وتدخلان العقدة الخاصة بالاصل الخلفي. وكذلك الاصول المقدمة تتحد وتكون حزمتين بقرب

شكل ٢٢١ جزء من التسم العنقي للحبل الشوكي كما يشاهد من المؤخر ١ و ١ الفرجة المتوسطة الخلفية ٢ و ٢ الاصول الخلفية للاعصاب العنقية . وقد قطعت عند منشئها في الجانب الخلفي لاجل اظهار الاصول المقدمة ٢ و ٢ الرباط المسنن الفاصل بين الاصول المقدمة والاصول الخلفية ٤ العصب الشوكي الاضافي صاعداً بين الاصول الخلفية والرباط المسنن . وقد قطع هنا العصب في الجانب الخلفي ٥ وه الام الجافية ٦ و ٦ فتحات في الام الجافية لمرور اصول الاعصاب ٧ و ٧ عند الاصول الخلفية للاعصاب الشوكية ٨ الاصول المقدمة للاعصاب الشوكية . وقد قطعت الاصول الخلفية لاجل اظهار الاصول المقدمة سائرة لتتحد بالعصب على بعد يسير من العقدة

تذهب فروع من وجهها المحدث إلى المقدم وتوزع في القصبة اللامية والقصبة الدرقية والكتفية اللامية. وقد يوجد التاسع النازل مضمناً في غمد السباتين والدرقي اللامي فرع صغير ينشا من العصب تحت اللسان عند الحافة الخلفية للامية اللسانية ويقاطع القرن العظيم للعظم اللامي ويتوزع في العضلة الدرقية اللامية والفروع العضلية تتوزع في العضلة الأبرية اللسانية واللامية اللسانية والذقنية اللامية والذقنية اللامية اللسانية. وتذهب منها فروع دقيقة إلى الأعلى إلى جوهر اللسان

شكل ٢٢٠



خمسة عشر من الفرجة التي بين الهرم المقدم والجسم الزيتوني وهي امتداد الحنط الذي تبرز منه الاصول المقدمة للاعصاب الشوكية . وتنضم الخيوط المذكورة فتصير حزمتين نثقبان الام الجافية مقابل الثقب اللقيي المقدم ثم نثقبان فتصيران عصباً واحداً ينزل عمودياً من الثقب المذكور الى مساحة زاوية الفك السفلي ويكون اولاً غائراً تحت السباتي الباطن والوداجي الباطن ثم يسير بينهما الى المقدم فيصير سطحياً اسفل العضلة ذات البطنين . ثم يعكف حول الشريان الموخري ويصالب السباتي الظاهر اسفل وتر ذات البطنين . ثم يمر بين العضلة الضرسية اللامية واللامية اللسانية الى الذقنية اللامية اللسانية حتى راس اللسان فيرسل فروعاً الى جوفه

ويتواصل هذا العصب بالرئوي المعدي عند خروجه من الحنجمة وبالسيمباتوي والعصب الاول والثاني العنقيين مقابل الحاملة وبالعصب الذوقي عند الحافة المقدمة للعضلة اللامية اللسانية واما فروعهُ فهي :

التاسع النازل - والدريقي اللامي - والفروع العضلية

فالتاسع النازل فرع دقيق طويل ينشأ من العصب تحت اللسان عند انعكافه حول الشريان الموخري وينحدر منحرفاً على غمد السباتي الباطن والسباتي الاصلي الى ان يتجاوز منتصف العنق فيتصل بالفروع الاستطراقية الآتية من العصب الثاني والثالث العنقيين على هيئة عروة

شكل ٢٢٠ تشرح جانب العنق لاجل اظهار اعصاب اللسان ١ قطعة من العظم الصدغي شاملة الصاخ السعي الظاهر والتونين الحلي والابري ٢ العضلة الابرية اللامية ٣ الابرية اللسانية ٤ الابرية البلعومية ٥ اللسان ٦ و١٨ اللامية اللسانية ٧ الذقنية اللامية اللسانية ٨ الذقنية اللامية ٩ القصية اللامية ١٠ القصية الدرقية ١١ الدرقية اللامية التي يفرع عليها الفرع الدريقي اللامي للعصب تحت اللسان ١٢ الكنتنية اللامية مقاطعة للشريان السباتي (١٢) والوريد الوداجي الباطن (١٤) ١٥ السباتي الظاهر ١٦ السباتي الباطن ١٧ العصب الذوقي من الخامس الذي يرسل فرعاً للعقدة تحت الفك (١٨) ثم يتواصل في المقدم بالعصب تحت اللسان ١٩ قناة الغدة تحت الفك وهي قناة هوارتن سائرة نحو المقدم الى الغدة تحت اللسان . واما العقدة تحت الفك فهي الجسم الصغير الموضوع بين رقم ١٨ و١٩ ٢٠ العصب اللساني البلعومي داخل راء العضلة اللامية اللسانية ٢١ العصب تحت اللسان منعكفاً حول الشريان الموخري ٢٢ العصب التاسع النازل الذي يكون عروة مع الاستطراقي التاسع (٢٣) الناشئ من الاعصاب العنقية العليا ٢٤ العصب الرئوي المعدي نافذاً بين السباتي الاصلي والوداجي الباطن ليدخل الصدر ٢٥ العصب الوجهي نافذاً من الثقب الابري الحلي ومقطعاً للشريان السباتي الظاهر

وتذهب من الضفيريّين المذكورين فروع الى شعب المسالك الهوائية وتصل الى جوهر الرئتين والفروع المرئية ينشأ بعضها اعلى منشأ الفروع الرئوية وبعضها اسفلها وتتواصل بفروع مثلها من العصب الخلف وتكوّن الضفيرة المرئية

والفروع المعديّة هي الفروع الانتهاية للرئوي المعدي. فيتوزع العصب الايمن في الجهة الخلفية للمعدة ويتحد بالجانب الايسر للضفيرة المحشوية وبالضفيرة الطحالية للسيمباتوي. ويتوزع الايسر في الجهة المقدمة للمعدة ويتواصل بفروع من العصب الايمن والسيمباتوي وتذهب منه بعض خيوط بين طبقتي الثرب الاصغر الى الضفيرة الكبدية

العصب الحادي عشر وهو الشوكي الاضافي

هذا العصب مؤلف من جزئين احدهما اضافي للرئوي المعدي والاخر شوكي يتوزع في القصية الحلمية والمربعة المنخرقة

فالجزء الاضافي اصغرهما وينشأ باربعة او خمسة خيوط دقيقة من القائمة الجانبية اسفل منشأ الرئوي المعدي تستقصى الى كتلة سنجابية في مؤخر النخاع المستطيل. ويتصل في الثقب الوداجي بالعقدة العليا للرئوي المعدي وبالعصب المذكور اسفل العقدة السفلى ويرسل فرعين يتحدان بالفرع البلعومي والمخجري العلوي للرئوي المعدي

والجزء الشوكي ينشأ بجملة خيوط من القائمة الجانبية للجل مقابل الفقرة العنقية السادسة وتتصل الخيوط المذكورة بالقرن المقدم لللال السنجابي. ويصعد بين الرباط المسنن والاصول الخلفية للاعصاب الشوكية ويدخل الحجمة من الثقب العظيم ثم يتجه الى الوحشية نحو الثقب الوداجي مضمناً في غده واحد مع الرئوي المعدي. وعند خروجه من الثقب المذكور يسير الى الخلف وراء الوريد الوداجي الباطن ثم ينزل وراء ذات البطنين والابرية اللامية الى الجزء العلوي للقصية الحلمية فيثقب هذه العضلة ويقاطع الثلث المؤخري وينتهي في الوجه الغائر للمربعة المنخرقة. ومدة مروره في القصية الحلمية يرسل اليها جملة فروع ويتواصل بفروع من العصب العنقي الثالث. وفي الثلث المؤخري يتواصل بالعنقي الثاني والثالث ويعين في تكوين الضفيرة العنقية. وعند مقدم المربعة المنخرقة تاتي فروع من العنقي الثالث والرابع والخامس ويتواصل بالفروع الخلفية للاعصاب الشوكية. وينتهي متوزعاً في المربعة المنخرقة

العصب الثاني عشر وهو العصب تحت اللسان

العصب الثاني عشر هو العصب المحرك للسان وينشأ بجملة خيوط عددها من عشرة الى

والسيمباتوي فتتكون من ذلك الضفيرة البلعومية وراء العاصرة المتوسطة نذهب منها فروع الى عضلات البلعوم وغشائه المخاطي

والخجري العلوي هو العصب الحاس للخجيرة. ينشأ من العقدة السفلى وينزل بجانب البلعوم وراء السباتي الباطن وينقسم الى فرعين خجري ظاهر وخجري باطن. فالظاهر ينزل بجانب الخجيرة وراء القصبة الدرقية ويتوزع في الحلقية الدرقية والجسم الدرقي ويرسل فروعاً للضفيرة البلعومية والعاصرة السفلى ويتواصل بالعصب القلي العلوي للسيمباتوي. والباطن يتزل الى الفتحة الواقعة في الغشاء الدرقي اللامي فيمر منها مع الشريان الخجري العلوي ويتوزع في الغشاء المخاطي للخجيرة وفي العضلة الطرجهالية متضمماً بالخجري الراجع

والخجري الراجع او السفلي هو العصب المحرك للخجيرة. ينشأ في الجانب الايمن الى مقدم الشريان تحت الترقوة وينعكف من الامام الى الخلف حول الشريان المذكور ثم يصعد منحرفاً بجانب القصبة وراء السباتي الاصلي والشريان الدرقي السفلي. وينشأ في الجانب الايسر الى مقدم قوس الاورطي وينعكف من الامام الى الخلف عند اثر القناة الشريانية ثم يصعد الى جانب القصبة. وكل من العصيين المذكورين في سيره الى الخجيرة موضوع بين القصبة والمريء فيرسل فروعاً للقناتين. وعند انعكافه حول الشريان يرسل فروعاً للضفيرة القلبية الغائرة. وعند الجزء السفلي للغضروف الحلقى يرسل فروعاً لجميع عضلات الخجيرة الاحلقية الدرقية التي ياتيها فرع من الخجري العلوي. ويرسل خيوطاً للغشاء المخاطي وفرعاً استطرقياً للخجري العلوي

والفروع العنقية القلبية اثنان او ثلاثة تنشأ من العصب الرئوي المعدي وهو في العنق. فالعليا منها صغيرة تتحد بالاعصاب القلبية للسيمباتوي. والسفلي واحد ينشأ من الرئوي المعدي عند دخوله التجويف الصدري. فالايمن منها يسير الى مقدم الشريان اللا اسم له ويتصل باحد الاعصاب القلبية الذاهبة الى الضفيرة الغائرة. والايسر يسير الى مقدم القوس الاورطي وينتهي في الضفيرة القلبية السطحية

والفروع الصدرية القلبية تنشأ في الجانب الايمن من الرئوي المعدي وهو بجانب القصبة وتمر الى الانسية وتنتهي في الضفيرة القلبية الغائرة. وتنشأ في الجانب الايسر من الخجري الراجع وتنتهي كسابقتها

والفروع الرئوية المقدمة اثنان او ثلاثة صغيرة تتحد بخيوط من السيمباتوي فتتكون منها الضفيرة الرئوية المقدمة

والفروع الرئوية الخلفية تتحد بخيوط من السيمباتوي فتتكون منها الضفيرة الرئوية الخلفية.

الأصلي إلى أصل العنق. إلى هنا يكون سير العصيين الأيمن والأيسر واحداً وأما بعد ذلك فيختلفان في الجانب الأيمن يقطع العصب الشريان تحت الترقوة ويسير بينه وبين الوريد تحت الترقوة وينحدر بجانب القصب إلى مؤخر أصل الرئة حيث يتفرع فيكون شبكة ضفيرة هي الضفيرة الرئوية الخلفية. وينزل من الشبكة المذكورة حبلان على المريء يتواصلان بفروع من العصب المخالف فتتكون من ذلك الضفيرة المرئية ثم تجتمع الفروع فتصير حبلًا واحدًا ينزل على الوجه المؤخر للمريء ويتوزع في الوجه الخلفي للعدة متواصلًا بالجانب الأيسر للضفيرة الحشوية وبالضفيرة الطحالية

وفي الجانب الأيسر يدخل العصب التجويف الصدري بين السباتي الأيسر والشريان تحت الترقوة وراء الوريد اللاسمة. ثم يقطع قوس الأورطي وينزل وراء أصل الرئة اليسرى على مقدم المريء إلى المعدة فيتوزع في وجهها المقدم. وتذهب بعض فروعها إلى الثرب المعدي الكبدي فتتحد بالضفيرة الكبدية اليسرى

ويتواصل هذا العصب بواسطة العقدة الوداجية بالجزء الإضافي للعصب الإضافي الشوكي وبالعقدة الحجرية للعصب اللساني البلعومي وبالوجهي والسمياتوي. وبواسطة العقدة السفلى بالعصب تحت اللسان والعقدة العنقية العليا للسمياتوي والعروة الواقعة بين العصب الأول والثاني العنقيين

وأما فروع العصب الرئوي المعدي فتتقسم إلى أربعة أقسام تبعاً لمنشأها وهي :

في الحفرة الوداجية :	الأذني
في العنق :	البلعومي والمخجري العلوي والمخجري الراجع والعنقية القلبية
في الصدر :	الصدرية القلبية والرئوية المقدمة والرئوية الخلفية والمرئية
في البطن :	المعدية


فالفرع الأذني ينشأ من العقدة الوداجية ثم يتحد به خيط من اللساني البلعومي ويقاطع الحفرة الوداجية إلى فتحة عند أصل التواء الأبري فيدخلها ويخترق جوهر العظم الصدغي ثم ينفذ إلى الظاهر بين التواء الحلمي والفتاة السمعية الظاهرة ويتوزع في جلد مؤخر الصيوان. وعند نفوذه إلى الظاهر يتواصل بفريع من الأذني الخلفي للوجهي

والفرع البلعومي هو المحرك الرئيسي للبلعوم والهاة. ينشأ من العقدة السفلى ويقبل خيطاً من الجزء الإضافي للإضافي الشوكي. ثم يقطع الشريان السباتي الباطن فإذا وصل إلى الحافة العليا للمعصرة المتوسطة انقسم إلى خيوط كثيرة تتواصل بمثلها من اللساني البلعومي والمخجري العلوي

الغشاء المخاطي والحبيبات على جانب هذا العضو

العصب العاشر وهو الرئوي المعدي

شكل ٢١٩



هذا العصب احد الاقسام الثلاثة للعصب الثامن ويقال له احياناً التائه او المتخير فانه يسير في العنق والتجويف الصدري الى الجزء العلوي للبطن فهو اكثر الاعصاب المعجمية توزعاً. وهو مؤلف من خيوط محركة وحاسة فيقدم لاعضاء الصوت والتنفس اليافاً حاسة ومحركة وللبلعوم والمرى والمعدة والقلب اليافاً محركة. منشأه الظاهر ثمانية او عشرة خيوط من القائمة الجانبية وراء الجسم الزيتوني واسفل منشأ العصب اللساني البلعومي تستقضى الى كتلة سنجابية بقرب الجزء السفلي لارض البطن الرابع. وتحد الخيوط المذكورة فتكون حبالاً مسطحة يسير الى الوحشية ويقاطع الجزارة وينفذ من الثقب الوداجي الى خارج المعجمة مصحوباً بالعصب الشوكي الاضافي الذي يكون مضمناً معه في غمد واحد والعصب اللساني البلعومي الذي يكون الى مقدمه منفصلاً عنه بفاصل غشائي. وتشاءد عليه وهو في هذه الجهة العقدة الوداجية التي يتصل بها الجزء الاضافي للعصب الشوكي الاضافي. ثم بعد نفوذه من الثقب الوداجي تتكون عليه عقدة اخرى يقال لها العقدة السفلى وتحد به اسفلها خيوط اخرى من الجزء الاضافي للعصب الشوكي الاضافي. ثم يتحد في العنق متجهاً باستقامة ضمن غمد السباتيين فيكون واقفاً بين الشريان السباتي الباطن والوريد الوداجي الباطن الى الغضروف الدرقي ثم بين الوريد المذكور والسباتي

شكل ٢١٩ منشأ العصب اللساني البلعومي والرئوي المعدي والشوكي الاضافي ١ و٢ و٣ و٤ والتخاع المستطيل ١ الهرم المقدم ٢ الجسم الزيتوني ٤ الجسم الحلي ٢ جسر فرويلويس ٥ العصب الوجهي ٦ منشأ العصب اللساني البلعومي ٧ عقدة أندرش ٨ جذع العصب المذكور ٩ العصب الشوكي الاضافي ١٠ العقدة العليا الرئوي المعدي ١١ العقدة السفلى ١٢ جذع الفرع البلعومي منه الذي يتصل بفرع من اللساني البلعومي (٨) وبفرع من المخبري العلوي (١٥) فتكون الضفيرة البلعومية ١٦ فروع القلب ١٧ الفرع المخبري الرابع ١٨ الفروع الرئوية المقدمة والقلبية ١٩ الفروع الرئوية الخلفية ٢٠ الضفيرة المرئية ٢١ الفروع المعدي ٢٢ منشأ العصب الشوكي الاضافي ٢٣ فرعه الذي يذهب الى العضلة النصية الحليبية ٢٤ فروعها للربعة المترفة

الحزم المستديرة . ويسير هذا العصب الى الوحشية مقاطعاً للجزازة وينفذ الى خارج الحنجمة من الجزء المركزي للثقب الوداجي في غمد خاص به من الام الجافية والعنكبوتية الى مقدم العصب الرئوي المعدي والشوكي الاضافي . وعند خروجه من الثقب المذكور يسير الى المقدم بين الوريد الوداجي والشريان السباتي الباطن ويخدر الى مقدم الشريان واسفل التتوالابري وعضلاته الى الحافة السفلى للعضلة الابرية البلعومية . ثم ينحني الى الانسية فيكون قوساً على جانب العنق مستقراً على الابرية البلعومية والعاصرة المتوسطة ويسير تحت العضلة اللامية اللسانية وينتهي متوزعاً في الغشاء المخاطي للهاة وقاعدة اللسان والغدد المخاطية التي للفم واللوزة

ويُشاهد عليه في مروره من الثقب الوداجي عقدتان احدها عليا صغيرة يقال لها العقدة الوداجية والثانية سفلى كبيرة يقال لها العقدة الحجرية او عقدة اندرش . فالعقدة العليا الوداجية موضوعة في الجزء العلوي للميزاب الذي يستقر فيه العصب مدة مروره من الثقب الوداجي وهي صغيرة جداً واقعة على الجانب الوحشي للعصب . والعقدة السفلى الحجرية واقعة في انخفاض في الحافة السفلى للجزء الحجري من العظم الصدغي وهي اعظم من سابقتها تنشأ منها خيوط توصل العصب اللساني البلعومي باعصاب اخر عند قاعدة الحنجمة

ويتواصل العصب اللساني البلعومي بالرئوي المعدي والسيمباتوي والوجي . وله فرع استطراقي يقال له الفرع الطيلي او عصب يعقوب ينشأ من العقدة الحجرية ويسير في قناة عظيمة عند قاعدة الجزء الحجري للصدغي فتحتمها واقعة في الخط البارز الذي يفصل القناة السباتية عن الحفرة الوداجية ثم ينفذ الى التجويف الطيلي وينقسم الى ثلاثة فروع استطراقية فيتصل اولها بالضفيرة السباتية والثاني بالعصب الحجري السطحي الاكبر في فرجة فلوبيوس والثالث ينفذ من الحنجمة ويتصل بالعقدة الاذنية . وينشأ من عصب يعقوب ثلاثة فروع اخر تتوزع في الكوة المستديرة والكوة البيضية والغشاء المبطن لقناة اوستاكيوس والطوبة


واما فروع العصب اللساني البلعومي فهي السباتية والبلعومية والعضلية واللوزية واللسانية . فالفروع السباتية تخدر بجانب الشريان السباتي الباطن الى نقطة تشعبه من السباتي الاصلي وتتواصل بالفرع البلعومي للرئوي المعدي والسيمباتوي . والبلعومية ثلاثة واربعة خيوط تتواصل مقابل العاصرة المتوسطة للبلعوم بالفروع البلعومية للرئوي المعدي والحجري العلوي والسيمباتوي فتتكون من ذلك الضفيرة البلعومية . والعضلية تتوزع في الابرية البلعومية . واللوزية تتوزع في اللوزة وتكون ضفيرة محيطة بها تذهب منها فروع للهاة فتواصل بالاعصاب اللهوية . واللسانية اثنان يتوزع في احدهما في الغشاء المخاطي الذي يغطي قاعدة اللسان والثاني يثقب جوهر اللسان ويتوزع في

فرع الى الاسفل ليتواصل بالعصب العنقي السطحي الناشئ من الضفيرة العنقية وما بقي يتوزع في العضلة الجلدية

العصب الثامن وهو السمعى

العصب السمعى هو الجزء اللين للعصب السابع تبعاً لتسمية ولس والعصب الثامن تبعاً لتسمية سويمرن. يتوزع في الاذن الباطنة وهو خاص بحاسة السمع. واما الجزء الصلب للعصب السابع ويقال له الوجي فهو العصب المحرك لعضلات الوجه

شكل ٢١٨



منشأ هذا العصب من خطوط كثيرة بيض هي الخطوط المستعرضة البارزة من الفرجة المتوسطة الخلفية في ارض البطن الرابع. ويتصل ايضاً بالجوهر السنجاي للنخاع المستطيل الذي يشاهد في ارض البطن الرابع. وقال المعلم فوقيل ان اصول هذا العصب تتصل بالجوهر السنجاي للنخاع اسفل ساقه المتوسطة وبالجزارة والجوهر السنجاي الواقع عند حافتي قلم

الكتابة. واما العصب فانه يلتف على الجسم الحبلي ويقبل منه اليافا ثم يسير الى المقدم مقاطعاً للحافة الخلفية لساق النخاع مصاحباً للعصب الوجي فيدخل معه القناة السمعية وينقسم الى فرعين يتوزع احدهما في القوقعة والاخر في الدهليز والقنوات الهلالية. وهذا العصب لين القوام جداً عارٍ من النيوريلما ويقبل وهو في القناة خيطاً او اثنين من العصب الوجي

العصب التاسع وهو اللساني البلعومي

يتوزع هذا العصب في اللسان والبلعوم فهو عصب الحس العام للغشاء المخاطي المبطن للبلعوم واللمة واللوزة وعصب الحركة للعضلات البلعومية والعصب الخاص بحاسة الذوق في الثلث المؤخر للسان. وهو اصغر الاعصاب الثلاثة التي يتالف منها العصب الثامن وينشأ بثلاثة او اربعة خيوط من الجزء العلوي للنخاع المستطيل وراء الجسم الزيتوني واما منشأه الغائر فيستقضي بين حزم القائمة الجانبية الى كتلة سنجائية في الجزء السفلي لارض البطن الرابع الى الوحشية من

شكل ٢١٨ منشأ العصب السمعى وتوزيعه ١ النخاع المستطيل ٢ جسر فروابوس ٣ و ٤ ساق النخاع من المبيض
٥ العصب الثامن ٦ العصب التاسع ٧ العصب السمعى متوزعاً في التيه ٨ العصب السادس ٩ العصب الوجي ١٠ العصب الرابع ١١ العصب الثالث

والجويل الطلي ينشا من الوجهي عند مؤخر الطلبة قبل خروجه من الثقب الابري الحلي بنحو ربع قيراط. يصعد في قناة خاصة به على خط مواز لقناة فلوبيوس وينفذ الى التجويف الطلي. ثم يسير في التجويف المذكور الى المقدم بين المطرقي والركابي وينفذ الى فرجة كلاسيربوس. ثم ينزل بين العضلتين الجناحيتين ويتواصل بالعصب الذوقي ويصاحبه الى الغدة تحت الفك وينتهي في العضلة اللسانية

والاذني الحلي ينشا بقرب الثقب الابري الحلي ويسير الى الاعلى الى مقدم التتوالحلي ثم ينقسم الى فرعين فرع اذني يتوزع في العضلة الاذنية الخلفية وفرع مؤخري يتوزع في الجزء المؤخري للعضلة المؤخرية الجبهية والجلد

والابري اللامي فرع طويل دقيق يسير الى الانسية ويدخل العضلة الابرية اللامية عند منتصفها وفرع ذات البطنين ينشا غالباً من جذع مشترك بينه وبين سابقه وينقسم الى جملة خيوط تتوزع في البطنين الحلي للعضلة ذات البطنين ويذهب منه خيط يتعد بالعصب اللساني البلعومي واما القسم الصدغي الوجهي فاعظم الفرعين الانتهاءين للوجهي يسير الى الاعلى والمقدم في الغدة النكفية ويصالب عنق التتوالقسي للفك السفلي وينقسم الى فروع تتوزع على الصدغ والجزء العلوي للوجه. وهي فروع صدغية وفروع وجنية وفروع تحت الحجاج. فالفروع الصدغية تقاطع القوس الزوجي وتصعد الى الجهة الصدغية فتتوزع في العضلة الاذنية المقدمة والجلد وبعضها يتوزع في الجزء الجهي للعضلة المؤخرية الجبهية والمحيطة الجفنية. والفروع الوجنية تسير على العظم الوجهي الى الزاوية الوحشية للحجاج وتتوزع في المحيطة الجفنية والمجعدة للحاجب. والفروع تحت الحجاج تسير اقبياً الى المقدم وتتوزع بين الحافة السفلى للحجاج والنم فالسطحية منها تتوزع في العضلات السطحية للوجه والجفن السفلي والهرمية الانفية والغائرة تسير تحت الرافعة للشفة العليا فتتوزع فيها وفي الرافعة لزاوية النم وتكون صغيرة مع الفرع تحت الحجاج الناشئ من العصب الفكي العلوي

والتسم العنقي الوجهي للعصب الوجهي يسير منحرفاً الى الاسفل والمقدم في الغدة النكفية حيث تتصل به فروع من العصب الاذني العظيم الى ان يصل حذاء زاوية الفك السفلي فينقسم الى فروع ثمانية وفروع اعلى الفك وفروع اسفل الفك. فالفروع الثمانية تقاطع العضلة المضغية وتتوزع في العضلة المبوقة والمحيطة الشفوية. والفروع اعلى الفك تسير الى المقدم تحت العضلة الجلدية والخافضة لزاوية النم وتتوزع في عضلات الشفة السفلى والذقن والجلد. والفروع اسفل الفك تسير الى المقدم تحت العضلة الجلدية فتتوزع اقواساً في الجزء العلوي للعنق ويذهب منها

العصب السابع وهو الوجهي

الغدة النكفية ويصالب الشريان السباتي الظاهر وينقسم وراء فرع الفك السفلي الى فرعين اصليين هما الصدغي الوجهي والعنقي الوجهي تذهب منها فروع كثيرة تتوزع في العضلات السطحية لجانب الراس والوجه والجزء العلوي للعنق ويتواصل العصب الوجهي مدة سيره باعصاب كثيرة . وقد قسموا التواصل المذكور الى اقسام تبعاً لسير العصب اولاً في القناة السمعية الباطنة ثم في قناة فلوپيوس ثم عند نفوذه من الثقب الابري الحلمي واخيراً في الوجه كما يظهر من الجدول الآتي

في القناة السمعية الباطنة : بالعصب السبعي

في قناة فلوپيوس :
 بعقدة ميكل بواسطة العصب الحجري العظيم
 بالعقدة الاذنية بواسطة العصب الحجري الصغير
 بالسهباتوي بواسطة العصب الحجري الوحشي

عند مخرجه من الثقب الابري الحلمي :
 بالعصب الرئوي المعدي
 بالعصب اللساني البلعوي
 بالصفيرة السباتية

بالعصب الاذني العظيم
 بالعصب الاذني الصدغي

في الوجه : بالاقسام الثلاثة للعصب الخامس

واما الفروع التي تشعب من العصب الوجهي فعلى ما ياتي :

في قناة فلوپيوس :
 الطبلي
 الحبيبي الطبلي

عند مخرجه من الثقب الابري الحلمي :
 الاذني الخلفي
 فرع ذات البطنين
 الابري اللاي

في الوجه :
 الصدغي
 الوجهي
 تحت الحجاج
 الفتي
 اعلى الفك
 اسفل الفك
 الفروع الصدغية الوجهية
 الفروع العنقية الوجهية

فالفرع الطبلي ينشا من العصب الوجهي مقابل الهرم وهو فرع صغير يتوزع في العضلة الركابية والعضلة الراخية للطلبة

الخلفي لذات البطنين والابرية اللامية واللسانية والركابية والراخية للطلبة . منشأه الظاهر من القائمة الجانبية للتحاع المستطيل في الميزاب الواقع بين الجسم الزيتوني والجسم الحبيبي . واما منشأه الغائر فيستقصى الى ارض البطنين الرابع حيث يتصل بالنواة السنجابية التي يتصل بها العصب السادس . وهذا العصب اقرب قليلاً الى الخط المتوسط من العصب السمعي وهو موضوع بقرب الحافة السفلى للجسر فيقبل بعض الياف منه

ويسير هذا العصب الى المقدم والوحشية على ساق الخنخ ويدخل القناة السمعية الباطنة مع العصب السمعي . ويكون وضعه في القناة المذكورة اولاً الى الجانب الانسي للعصب السمعي ثم يستقر في ميزاب على العصب المذكور ويتصل به بواسطة خيط او اثنين . ثم عند اقصى هذه



شكل ٢١٧

القناة يدخل قناة فلوپيوس فيمتنخ ويصير على شكل عقدة ممتمة ويتبع سيرها المتعرج في الجزء الحجري للعظم الصدغي الى ان يصل الى الثقب الابري الحلي فينفذ منه ويسير الى المقدم في جوهر

شكل ٢١٧ العصب الوجهي وبعض فروع الضفيرة العنقية ١ العصب الوجهي نافذاً من الثقب الابري الحلي ومقاطعاً لفرع الفك السفلي . وقد قطعت الغدة النكفية لاطهار العصب ٢ الفرع الاذني الخلفي ٣ فروع صدغية متواصلة بفروع من العصب اعلى الحاج (٤) وهو فرع من العصب الخامس ٥ فروع تحت الحاج متواصلة بمنحرفها من الفكي العلوي (٦) فروع اعلى الفك متواصلة بالعصب الذقني (٨) وهو فرع من الفكي السفلي ٩ فروع اسفل الفك متواصلة بالعصب العنقي الطويل (١٠) وهو فرع من الضفيرة العنقية فتكون ضفيرة (١١) اعلى الغدة تحت الفك . ولما كان توزيع العصب الوجهي على هيئة مشعة تتواصل اطرافه بعروا استطرافية سي التوزيع المذكور اندم الاوذي ١٢ العصب الاذني العظيم وهو احد الفروع الصاعدة للضفيرة العنقية ١٣ المورخي الصغير الذي يصعد على الحافة الخلفية العضلة القصية الحلمية ١٤ فروع سطية وغائرة نازلة من الضفيرة العنقية ١٥ العصب الشوكي الاضائي مرسلأ فرعاً للوجه الظاهر من المربعة المتفرقة ١٦ المورخي الكبير وهو الفرع الخلفي للعصب العنقي الثاني

على الوجه الانسي للعصب الفكي السفلي عند خروجه من الثقب البيضي وحول منشأ العصب الجناحي الانسي . وتتصل بالعصب الفكي السفلي وفرعه الجناحي الانسي بخطين او ثلاثة دقيقة قصيرة فتقبل منه اصلها المحرك وتتصل ايضاً بالعصب الاذني الصدغي فتقبل منه اصلها الخامس . وتتصل بالسيمباتوي بواسطة خيط آتٍ من الضفيرة المحيطة بالشريان السحائي المتوسط . وتتصل بالعصب اللساني البلعومي والعصب الوجهي بواسطة العصب الحنجري الصغير . ويتوزع منها خيط للعضلة الشادة للطنبة وخيط للشادة للهاة

في العقدة تحت الفك

هذه العقدة صغيرة مستديرة الشكل موضوعة اعلى الجزء الغائر للغدة تحت الفك بقرب الحافة الخلفية للعضلة الضرسية الالامية . تتصل بالعصب الذوقي وتقبل فرعاً من الحبل الطلي فتتواصل بواسطة العصب الوجهي . وتتواصل بالسيمباتوي بواسطة خيوط ناشئة من الاعصاب المحيطة بالشريان الوجهي . وتنشأ منها خمسة اوستة فروع تتوزع في الغشاء المخاطي للغم وقناة هوارتن والغدة تحت الفك

العصب السادس وهو المبعد للمقلة^(١) (شكر ٢١٤)

العصب السادس وهو المبعد يتوزع في العضلة المستقيمة الوحشية . منشأه الظاهر بخيوط جملة من الهرم المقدم بقرب الجسر او من الحافة السفلى للجسر نفسه . واما منشأه الغائر فقد استقصاه المعلم مايوبين حزم الهرم المقدم الى الجزء الخلفي للثغاع المستطيل . وهذا العصب يتقبب الام الجافية اسفل التواء السري الخلفي ويستقر في ميزاب بجانب جسم العظم الوتدي . ثم يتقدم في الجيب الكهفي ماراً على الجانب الوحشي للشريان السباتي الباطن وتحد به هناك جملة خيوط من الضفيرة السباتية وخيط واحد من عقدة ميكل وخيط اخر من العصب العيني . ويدخل التجويف الحجاجي من الفرجة الوتدية ويسير بين راسي المستقيمة الوحشية الى ان يتوزع في وجهها العيني

العصب السابع وهو الوجهي

العصب الوجهي ويقال له الجزء الصلب من العصب السابع لولس هو العصب المحرك لجميع عضلات الوجه والعضلة الجلدية والمبوقة . ويتوزع ايضاً في عضلات الاذن الظاهرة والباطن

(١) هو المحرك الوحشي في الكتب المصرية

والمفصل الفكي والغدة النكفية. ويتواصل بالوجهي والعقدة الاذنية
والعصب الذوقى وهو اللساني احد العصبين الخاصين بحاسة الذوق يتوزع في الحبيبات
والغشاء المخاطي في الثلثين المقدمين للسان. وضعه غائر في جميع سيره فيكون اولاً تحت الجناحية
الوحشية مع العصب السني السفلي ثم يمر بين الجناحية الانسية والوجه الباطن لفرع الفك
السفلي ويقاطع العاصرة العليا للبلعوم فاذا وصل الى جانب اللسان سار بين العضلة الابرية
اللامية والجزء الغائر للغدة تحت الفك ثم يقاطع قناة هوارتن ويسير بجانب اللسان الى راسه
تحت الغشاء المخاطي. ويتواصل العصب الذوقى بالعقدة تحت الفك والعصب تحت اللسان.
واما فروعها فقليلة تتوزع في الغشاء المخاطي للخم واللثة والغدة تحت اللسان والحبيبات اللسانية
وتنغم فريعاته الانتهاية عند راس اللسان بالعصب تحت اللسان

والعصب السني السفلي اعظم الفروع الثلاثة للجدع الخلفي من العصب الفكي السفلي . يسير
الى الاسفل مع الشريان السني السفلي اولاً تحت العضلة الجناحية الوحشية ثم بين الرباط الجانبي
الانسي وفرع الفك الى الثقب السني . ثم يتقدم في القناة السنية في جوهر الفك السفلي تحت
الاسنان الى الثقب الذقني حيث ينقسم الى فرعين انتهائيين . احدهما يدوم متقدماً الى الخط
المتوسط فيتوزع في السنين القاطعين والنايب . والآخر الذقني ينفذ من الثقب الذقني وينقسم
تحت الحافضة لزاوية الفم الى فرعين وحشي يتوزع في العضلة المذكورة والمحيطة الشفوية والجلد
متواصلاً بالوجهي وانسي يصعد الى الشفة السفلى تحت المربعة الذقنية فيتوزع في العضلة المذكورة
والغشاء المخاطي للشفة السفلى والجلد متواصلاً بالوجهي . واما فروع العصب السني السفلي
فالضرسى اللامي والضرسية


فالفرع الضرسى اللامي ينشا من العصب السني السفلي قبيل دخوله الثقب السني ويسير
في ميزاب على الوجه الباطن لفرع الفك السفلي ويتوزع في الوجه الجلدي للعضلة الضرسية
اللامية والبطن المقدم لذات البطنين . والفروع الضرسية تنفذ من ثقب في اصول الاضراس
الى باطنها

وتتصل بالعصب الفكي السفلي عقدتان صغيرتان هما العقدة الاذنية التي تتصل بجذعه
والعقدة تحت الفك التي تتصل بفرعه اللساني اي بالعصب الذوقى

في العقدة الاذنية

العقدة الاذنية ويقال لها عقدة ارنولد ايضاً صغيرة بيضية الشكل لونها سنجابي احمر موضوعة

شكل ٢١٦



والصدغيان الغائران احدهما مقدم ينعكس الى الاعلى عند الخط الجناحي اللودني . والاخر خلفي صغير موضوع في موخر الحفرة الصدغية . يتوزعان في الوجه الغائر للعضلة الصدغية

والفرع الفكي يثقب الجناحية الوحشية وينحدر الى العضلة المبوقة وينقسم الى فرعين علوي وسفلي يتوزعان في العضلة المذكورة والجلد والغشاء المخاطي المبطن للفم متواصلًا بالعصب الوجهي

والفرعان الجناحيان يذهب احدهما الى العضلة الجناحية الانسية وهو طويل دقيق له علاقة شديدة بالعقدة الاذنية . والاخر يتوزع في الجناحية الوحشية

وكثيراً ما يكون ناشئاً من الفرع الفكي وقد ينشا بنفسه من الجذع المقدم للعصب الفكي السفلي واما الجذع الخلفي لهذا العصب فاعظم الجذعين ويقبل بعض خيوط من الاصل المحرك .

وينقسم الى ثلاثة فروع هي الاذني الصدغي والذوقي والسنني السفلي

فالعصب الاذني الصدغي ينشا غالباً باصليين يمرّ بينهما الشريان السعائمي المتوسط . ويسير اولاً الى الخلف الى الجانب الانسي لمفصل الفك ثم ينعكف الى الاعلى مع الشريان الصدغي بين الاذن الظاهرة والتوالقي للفك تحت الغدة التكفية ثم ينفذ منها الى الظاهر وينقسم الى فرعين صدغيين . احدهما خلفي يتوزع في العضلة الاذنية المقدمة والجزء العلوي من الصيوان والجلد . والاخر مقدم يصاحب الشريان الى قمة الراس ويتوزع في جلد الجهة الصدغية متواصلًا بالعصب الوجهي . وتذهب من هذا العصب فريعات للاذن الظاهرة والذاتة السمعية الظاهرة

شكل ٢١٦ اقسام العصب الخامس ولاسيا فسة الثالث وهو الفكي السفلي ١ انحجاج ٢ كهف هيور ٣ اللسان ٤ الفك السفلي ٥ اصل العصب الخامس الذي تتكوّن منه عقدة كاسيريوس ٦ فسة الاول وهو العيني ٧ فسة الثاني وهو الفكي العلوي ٨ فسة الثالث وهو الفكي السفلي ٩ الفرع الجبهوي من القسم الاول الذي ينقسم عند رقم ١٤ الى فرعين هما اعلى البكرة واعلى انحجاج ١٠ الفرع الدمعي الذي يتفرع قبل دخوله الغدة الدمعية ١١ الفرع الانفي ١٢ الانفي الباطن الذي يدخل الثقب المصفوي المقدم ١٣ الانفي الظاهر ١٤ الفرعان اعلى البكرة واعلى انحجاج ١٥ القسم الفكي العلوي ١٦ السنان الخلفيان ١٧ السنني المتوسط ١٨ السنني المقدم ١٩ الفروع الانتهاية للفكي العلوي وهي الجفنية والانفية والشفوية ٢٠ الفرع انحجاجي للفكي العلوي ٢١ عصب فديان لعقدة ميكل ٢٢ خمسة فروع مقدمة الفكي السفلي وهي المضغي والصدغي والجناحيان والفكي وجميعها اعصاب محرّكة ٢٣ العصب الذوقي من الفكي السفلي الذي يتحد بوالجلد الطبلي على زاوية حادة ٢٤ العصب السنني السفلي الذي ينتهي في الفروع الذقنية ٢٥ الفروع الذقنية ٢٦ العصب الاذني الصدغي ٢٧ الفروع الاذنية ٢٨ الفرع الضربي اللامي


الانفيتين من الثقب الوندي الحنكي وتوزع في الغشاء المخاطي الذي يغطي التريبي العلوي والمتوسط والاخلية المصفوية الخلفية والجزء العلوي والموخر للفاصل الانفي. والعصب الانفي الحنكي يدخل الحفرة الانفية مع بقية الاعصاب الانفية ويسير بجانب الجزء السفلي للفاصل الانفي ثم ينحدر الى سقف الفم ويتوزع في الغشاء المخاطي وراء الاسنان القواطع والفروع الخلفية اثنان وهما عصب قديان والعصب البلعومي. فعصب قديان ينشا من مؤخر العقدة ويسير في قناة قديان فيرسل وهو فيها فروعاً للغشاء المبطن لمؤخر سقف الانف والفاصل الانفي ونهاية قناة اوستاكيوس. ثم ينقسم الى فرعين وهما الحنجري العظيم والسباتي. فالفرع الحنجري العظيم يتقب الغضروف الشاغل للثقب المزق الخلفي ويمر تحت عقدة كاسيريوس ويدخل قناة فلوبيوس ويتحد بالعصب الوجهي. فهو بالحقيقة ناشئ من الوجهي وذاهب الى العقدة الوندية الحنكية مكوّناً اصلها المحرك. والفرع السباتي اقصر واغظ من الحنجري سنجابي اللون مائل للحفرة رخو القوام يقاطع الثقب المزق ويدخل القناة السباتية ويتحد بالضفيرة السباتية. واما العصب البلعومي ويقال له الجناحي الحنكي ففرع صغير ينشا من مؤخر العقدة وقد ينشا من عصب قديان. يسير في القناة الجناحية الحنكية مع الشريان الجناحي الحنكي ويتوزع في البلعوم

القسم الفكي السفلي للعصب الخامس

العصب الفكي السفلي يتوزع في اسنان الفك السفلي ولثته وفي جلد الصدغ والاذن الظاهرة وفي الجزء السفلي للوجه والشفة السفلى وعضلات المضغ ويرسل فرعاً للسان هو احد العصيين الخاصين بجاسة الذوق. وهو اعظم الاقسام الثلاثة للعصب الخامس وموّلّف من اصلين احدهما حاس وهو الاكبر ينشا من عقدة كاسيريوس والاخر محرك وهو الاصغر يسير تحت العقدة المذكورة ويتحد بالعصب الفكي السفلي عند نفوذه من الثقب البيضي. ثم ينقسم الى جذعين مقدم وخلفي

فالجذع المقدم اصغرهما ويقبل معظم الاصل المحرك ويتوزع في عضلات المضغ منقسماً الى اربعة فروع المضغية والصدغيين الغائرين والفي والجناحيين فالفرع المضغية يسير الى الوحشية اعلى الجناحية الوحشية الى مقدم المفصل الصدغي الفكي ويقاطع الشرم السيني مع الشريان المضغية ويتوزع في العضلة المضغية. ويرسل احياناً فرعاً للعضلة الصدغية وخطاً لمفصل الفك

فروعها الى اربعة مجاميع وهي فروع صاعدة الى الحجاج وفروع نازلة الى الحنك وفروع انسية ذاهبة الى الانف وفروع خلفية ذاهبة الى البلعوم



فالفروع الصاعدة خيطان او ثلاثة تدخل الحجاج من الفرجة الوتدية الفكية وتتوزع في السمحاق والفروع النازلة وهي الحنكية تتوزع في سقف الفم واللهاة واللوزة والغشاء المبطن للانف. وهي ثلاثة مقدم ومتوسط وخلفي. فالمقدم ينحدر في القناة الحنكية الخلفية وينفذ في الحنك الصلب ويسير الى المقدم في ميزاب في الحنك حتى الاسنان القواطع فيتوزع في اللثة والغشاء المخاطي للحنك الصلب. ويرسل فروعاً للانف وفروعاً للهاة. والمتوسط ينحدر في القناة الحنكية الخلفية مع سابقه ويتوزع في الغلصمة واللوزة واللهاة. والخلفي ينفذ من ثقب خاص به وراء الثقب الحنكي الخلفي ويتوزع في الرفاعة للهاة والغلصمة المفردة واللهاة واللوزة

والفروع الانسية تتوزع في الفاصل الانفي والجدار الوحشي للحفرتين الانفيتين وتقسّم الى فروع انفية عليا وعصب انفي حنكي. فالفروع الانفية العليا اربعة او خمسة تدخل مؤخر الحفرتين

شكل ٢١٥ العقد الججمية للعصب السيمباتوي ١ عقدة ريبس ٢ خيط منها مستطرق الى الضفيرة السباتية ٣ الضفيرة المذكورة ٤ العقدة العينية وهي العدسية التي ترسل فروعاً هدية ٥ بعض القمم السفلي للعصب الثالث الذي يستطرق الى العقدة المذكورة بواسطة فرع قصير غليظ (هو اصلها الفصير) ٦ بعض العصب الانفي الذي يتصل بهذه العقدة بواسطة فرع طويل (هو اصلها الطويل) ٧ خيط دقيق مرسل منها الى الوراة للضفيرة السباتية ٨ بعض العصب السادس وهو في الجيب الكهفي حيث يقبل فرعين من الضفيرة السباتية ٩ عقدة ميكل وهي الوتدية الحنكية ١٠ الاعصاب الوتدية الحنكية ١١ فروعها النازلة وهي الحنكية ١٢ فروعها النازلة وهي الانفية ١٣ الفرع الانفي الحنكي ١٤ عصب فديان وهو احد الفرعين الخلفيين للعقدة ١٥ فرعه السباتي الذي يتصل بالضفيرة السباتية ١٦ فرعه الخجري الذي يتصل بالعصب الوجهي ١٧ العصب الوجهي ١٨ الحبل الطويل الذي ينزل ويتحد بالعصب الذوقي ١٩ العصب الذوقي ٢٠ العقدة تحت الفك التي تنقل الحجاب الطويل وفروعاً اخر من العصب الذوقي ٢١ العقدة العينية العليا السيمباتوي * العقدة الانفية الحنكية وهي عقدة كلوكي

الحجاجي من الفرجة الوتدية الفكية وينقسم عند موخر التجويف المذكور الى فرعين هما الصدغي والوجني. فالصدغي يسير في ميزاب في الجدار الوحشي للحجاج ثم ينفذ من ثقب في العظم الوجني الى الحفرة الصدغية ويصعد بين العظم والعضلة الصدغية فيثقبها ويثقب اللقافة الصدغية اعلى الفوس الزوجي بنحو قيراط ويتوزع في جلد الصدغ وجانب الجبهة متواصلاً بالعصب الوجهي والفرع الاذني الصدغي للعصب الفك السفلي. والوجني يسير بجانب الزاوية الوحشية السفلى للحجاج وينفذ من ثقب في العظم الوجني الى الوجه فيثقب المحيطة الجفنية ويتواصل بالوجهي والوتديان الحنكيان ينزلان الى العقدة الوتدية الحنكية وهي عقدة ميكل

والسينان الخلفيان ينشآن من العصب عند دخوله القناة اسفل الحجاج. احدها خلفي يسير في قناة واقعة في جوهر الفك العلوي ويتصل بالسني المقدم مقابل الحفرة النابية. وترسل منه فروع كثيرة تتكوّن منها ضفيرة دقيقة في الجدار الوحشي للفك العلوي. وتذهب من الضفيرة المذكورة خيوط الى باطن الاضراس والى كهف هيمور واللثة. والفرع الاخر مقدم يتوزع في اللثة والعضلة المبوقة

والفرع السني المقدم كبير الحجم ينشا من العصب الفك العلوي قبيل خروجه من الثقب اسفل الحجاج. يسير في قناة خاصة به في الجدار المقدم للكهف ويتفيم بالسني الخلفي. وتذهب منه خيوط الى القاطعين والنايب وذوي الحدبتين الاول ويذهب غيرها الى مقدم الصماخ السفلي والفروع الجفنية تصعد وراء المحيطة الجفنية فتتوزع فيها وفي الجلد وملتحم الجفن السفلي والفروع الانفية تنجم الى الانسية وتتوزع في عضلات جانب الانف والجلد والفروع الشفوية تنحدر وراء الرافعة للشفة العليا وتتوزع في الشفة العليا والغشاء المخاطي للثمن والغدد الشفوية

وجميع هذه الفروع تتصل بخيوط من العصب الوجهي اسفل الحجاج فتكوّن ضفيرة مشوشة يقال لها الضفيرة اسفل الحجاج

في العقدة الوتدية الحنكية ويقال لها عقدة ميكل

هذه العقدة اعظم العقد الحنجمية موضوعة وضعاً غائراً في الحفرة الوتدية الفكية بقرب الثقب الوتدي الفكى شكلها مثلث لونها سنجابي يميل الى الحمرة. ولها كبقية العقد اصل محرك واصل حاس واصل سيباتوي. فالاصل المحرك ناشئ من الوجهي بواسطة عصب قديان والاصل الحاس من الخامس والاصل السيباتوي من الضفيرة السباتية بواسطة عصب قديان. تقسم

العقدة الأذنية والعقدة تحت الفك. وتقبل هذه العقد خيوطاً حاسة من العصب الخامس وخيوطاً محرّكة وسيمبانتوية من مصادر مختلفة. ويقال لهذه الخيوط اصول العقد وتصل ايضاً العقد بعضها ببعض وبالقسم العنقي للسيمبانتوي

اما العقدة العينية ويقال لها العدسية والهدبية فصغيرة مربعة الجوانب مسطحة لونها سنجابي مائل الى الحمرة قدرها نحو راس الدبوس موضوعة في مؤخر الحجاج بين العصب البصري والمستقيمة الوحشية محاطة بمادة دهنية بحيث يتعسر تشریحها. فروعها الاستطراقية ويقال لها الاصول ثلاثة احدها طويل ينشأ من الفرع الانفي للعيني والثاني قصير ينشأ من الفرع الذي يتوزع في المنخرقة السفلى وهو من فروع العصب الثالث. والثالث اصل سيمبانتوي يأتي من الضفيرة الكهفية. واما الفروع التي تتوزع منها فهي الاعصاب الهدبية القصيرة عددها من عشرة الى اثني عشر خيطاً دقيقاً تسير الى المقدم على شكل حزمتين واحدة اعلى والاخرى اسفل العصب البصري. فاذا وصلت الى مؤخر المقلة تثبت الصلبة وسارت على وجهها الباطن وتوزعت في العضلة الهدبية والقزحية

القسم الفكي العلوي للعصب الخامس

هذا العصب هو القسم الثاني من العصب الخامس وهو متوسط الوضع والمجتم بين العيني والفكي السفلي ووظيفته الحس. يبدأ عند منتصف عقدة كاسيريوس على هيئة رباطة مسطحة مضفرة وينفذ من الثقب المستدير فيصير اسطواناني الشكل شديد القوام ثم يقطع الحفرة الوندية الفكية وير في القناة اسفل الحجاج في ارض الحجاج وينفذ الى الوجه من الثقب تحت الحجاج فيكون حينئذ واقعاً تحت الرافعة للشفة العليا منقسماً الى فروع كثيرة تتوزع في جانب الانف والجفن السفلي والشفة العليا ومتواصلاً بخيوط من العصب الوجي وتنقسم فروع هذا العصب الى ثلاثة مجاميع تبعاً للمكان الذي تنشأ منه على ما يأتي :

الحجاجي	}	في الحفرة الوندية الفكية :
الوتديان المخنكيان		
السنين الخلفيان	}	في القناة اسفل الحجاج :
السني المقدم		
الجفنية	}	في الوجه :
الانفية		
الشفوية	}	

فالفرع الحجاجي ينشأ من انصب الفكي العلوي في الحفرة الوندية الفكية ويدخل التجويف

واعلى الحجاج . فالفرع اعلى البكرة اصغرهما يمر الى الانسية اعلى بكرة المخرفة العليا ويسير بينها وبين الثقب اعلى الحجاج ويصعد الى الجبهة بقرب العظم وراء المعدة للحاجب والموخرية الجبهية فيتوزع فيهما ويضع في جلد الجبهة . والفرع اعلى الحجاج يسير الى المقدم في الثقب اعلى الحجاج فيرسل خيوطاً للجفن العلوي ثم يصعد الى الجبهة وينتهي بفروع عضلية وجلدية وسمحاقية . فالفروع العضلية تتوزع في المعدة للحاجب والموخرية الجبهية والمحيطة الجفنية . والجلدية اثنان انسي ووحشي يتوزعان في جلد الجبهة ويصلان في الورا الى القفا . والسمحاقية تنشأ من الفروع الجلدية وتتوزع في السمحاق الذي يغطي العظم الجبهي والعظمين الجداريين

والفرع الانفي غائر الوضع بالنسبة الى الفرعين السابقين . يدخل الحجاج بين رأسي المستقيمة الوحشية ويمر الى الانسية مقاطعاً للعصب البصري اسفل الرافعة للجفن والمستقيمة العليا فاذا بلغ الجدار الانسي للحجاج نفذ من الثقب المصفوي المقدم الى باطن الجبهة فيسير في ميزاب قليل الغور الى مقدم الصفيحة الغربالية للمصفوي ثم ينحدر من الشق الذي الى جانب عرف الديك فيصل الى باطن الانف حيث ينقسم الى فرعين احدهما يتوزع في الغشاء المخاطي بقرب مقدم الفاصل الانفي والاخر ينحدر في ميزاب واقع في الوجه الباطن للعظم الانفي ويرسل خيوطاً الى الغشاء المخاطي المبطن لمقدم الجدار الوحشي للانف ثم ينفذ الى الظاهر بين العظم الانفي والغضروف الجانبي وينتهي في جلد جناح الانف وراسه متواصلاً بالعصب الوجي


وتنشأ من العصب الانفي ثلاثة فروع هي العقدية والهدبية واسفل البكرة . فالعقدي فرع دقيق طوله نحو نصف قيراط ينشأ غالباً من الانفي بين رأسي المستقيمة الوحشية ويسير الى المقدم ويدخل العقدة الهدبية وهي العينية فيكون اصلها الطويل . والفروع الهدبية الطويلة اثنان او ثلاثة تنشأ من الانفي عند مقاطعه للعصب البصري وتحد بالفروع الهدبية القصيرة الآتية من العقدة الهدبية ثم تثقب مؤخر الصلبة فتسير بينها وبين المشيمية الى المقدم وتتوزع في العضلة الهدبية والنزحية . والفرع اسفل البكرة ينشأ من الانفي وهو مارٌّ من الثقب المصفوي المقدم ويسير الى المقدم على الحافة العليا للمستقيمة الانسية ويتوزع في المحيطة الجفنية وجلد الجفنين وجانب الانف والملتحم والكيس الدمعي

في عقد العصب الخامس

تصل بالاقسام الثلاثة للعصب الخامس اربع عقد صغيرة هي جميع ما للسيمباتوي في الدماغ . فتصل بالنسبة الاولى العقدة العينية وبالثاني العقدة الوتدية الحنكية وهي عقدة ميكل وبالثالث

الدمعية والغشاء المخاطي المبطن للعين والآنف وفي عضلات الحجاب والجهة والجلد. ينشأ من الجزء العلوي لعقدة كاسير يوس على هيئة رباطة مسطحة طولها نحو قيراط تسير الى المقدم على الجانب الوحشي للجيب الكهفي اسفل الاعصاب الاخر التي تمر في هذه الجهة وتنقسم قبيل دخولها التجويف الحجاجي من الفرجة الوتدية الى ثلاثة فروع وهي الجبهي والدمعي والانفي فالفرع الدمعي اصغر الفروع الثلاثة للعيني وكثيراً ما يكون منشأهُ بخطين احدهما من العيني والاخر من العصب الرابع. يسير الى المقدم ويدخل التجويف الحجاجي من الجزء الاضيق للفرجة الوتدية ويمر بجانب الحافة العليا للمستقيمة الوحشية مع الشريان الدمعي. فاذا دخل الغدة الدمعية ارسل خيوطاً لها وللتمتم ثم ينتهي في جلد الجفن العلوي متواصلاً بخيوط من العصب الوجهي


شكل ٢١٤



والفرع الجبهي اعظم فروع العيني وقد يُعدّ باعتبار جرمه واتجاهه انه امتدادهُ. يدخل الحجاج اعلى العضلات من الجزء الاعلى والاسوع للفرجة الوتدية ويسير الى المقدم في الخط المتوسط بين الرافعة للجفن العلوي والسحاق فاذا بلغ منتصف التجويف انقسم الى فرعين وهما اعلى البكرة

شكل ٢١٤ اعصاب الحجاج كما تشاهد من الوحشية ١ قطع العظم الجبهي . الى وراء الرقم الجيب الجبهي والى مقدمه الجلد ٢ الفك العلوي . والى مقدم الرقم الجيب الفكي وهو كيف هيمور ٣ بعض الظعم الوتدي ٤ الرافعة للجفن والمستقيمة العليا ٥ الخرفة العليا ٦ الخرفة السفلى ٧ الجزء المغلي للمستقيمة الوحشية مقطوعاً ومحدوداً الى المقدم ٨ جزءها الحجاجي محدوداً الى الاسفل . ويشاهد العصب السادس متفرعاً عليها ٩ المستقيمة السفلى ١٠ العصب البصري ١١ الشريان السباتي الباطن نافذاً من الجيب الكهفي ١٢ الشريان العيني ١٣ العصب الثالث ١٤ فرعهُ الذاهب الى الخرفة السفلى . وبين هذا الفرع والعصب السادس (٨) يشاهد فرع العصب الثالث الذي يذهب الى المستقيمة السفلى ١٥ العصب الرابع ١٦ جذع العصب الخامس ١٧ عقدة كاسير يوس ١٨ العصب العيني ١٩ العصب الفكي العلوي ٢٠ العصب الفكي السفلي ٢١ العصب الجبهي ٢٢ فرعهُ الذاهبة لجلد الجهة ٢٣ العصب الدمعي ٢٤ العصب الانفي ٢٥ العصب الانفي سائراً على المستقيمة الانسية الى الثقب المصفوي المقدم ٢٦ العصب اسفل البكرة ٢٧ فرع هدي طويل من الانفي ٢٨ الاصل الطويل للعقدة العينية النائي من العصب الانفي ٢٩ العقدة العينية التي ترسل من مقدمها الاعصاب المدبية الصغيرة ٣٠ القلعة

فتدخل الياف الاصل الخلفي عقدة كبيرة هلالية الشكل مستقرة في انخفاض بقرب راس الجزء
الحجري للصدغي يقال لها عقدة كاسيريوس واما الاصل المقدم فيمر تحت العقدة المذكورة من
غير ان تكون له علاقة بها فاذا خرج من الجبهة اتحد باحد الاجزاء الناشئة منها



شكل ٢١٢

وعقدة كاسيريوس المذكورة تقبل في جانبها الانسي خيوطاً من الضفيرة السباتية للسمياتوي
وترسل منها فروع دقيقة للخيبة المخيطة والام الجافية. وتنشأ من حافتها المقدمة المشرفة الى الامام
والوحشية ثلاثة فروع عظيمة هي العيني والفكي العلوي والفكي السفلي. فالقسم العيني والقسم الفكي
العلوي من العصب الخامس مؤلفان من الياف ناشئة من الاصل العظيم اي الخلفي ومن عقدة
كاسيريوس وخاصان بالحس العام فقط. واما القسم الثالث اي الفكي السفلي فمكوّن من الياف
ناشئة من الاصلين فهو وحدة بالحقيقة يشبه الاعصاب الشوكية

القسم العيني للعصب الخامس

هو اول الاقسام الثلاثة للعصب الخامس واصغرهما. وهو عصب حاس يتوزع في المقلة والعقدة

شكل ٢١٢ العصب الخامس وفروعه ١ منشأه باصلين ٢ نفوذه من جسر فروايوس ٣ عقدة كاسيريوس ٤ العصب
العيني ٥ العصب الجبهي الذي يرسل الفرع اعلى البكرة ثم ينفذ الى الجبهة من الثقب اعلى الحجاج ٦ العصب الدمعي
٧ العصب الانفي ٨ نفوذه من الثقب السفلي المقدم حيث يرسل الفرع اسفل البكرة ٩ اتصاله بالعقدة العينية ١٠ اتصال
العصب الثالث بالعقدة المذكورة. وهذه العقدة ترسل الاعصاب الهدية من وجهها المقدم ١١ العصب الفكي العلوي ١٢ الفرع
الحجاجي ١٣ العصبان الوديان الحنكيان النازلان الى عقدة ميكل. والفروع النازلة من العقدة المذكورة هي الاعصاب الحنكية
١٤ و ١٤ السني المقدم والسنيان الخلفيان ١٥ الفروع التي تنفذ من الثقب تحت الحجاج ١٦ العصب الفكي السفلي ١٧ جذعه
المقدم وهو العفلي ١٨ جذعه الخلفي. والسهم فاصل بين الجذعين ١٩ العصب الذوقي ٢٠ الحبل الطليل الذي يتصل به
على زاوية حادة ٢١ العقدة تحت الفك ٢٢ العصب السني السفلي ٢٣ الفرع الضرسى اللامي ٢٤ العصب الاذني الصدغي
الذي ينقسم وراة مفصل الفك السفلي ثم يتحد التمان ٢٥ فرعه الاستطراقي للعصب الوجهي ٢٦ امتداده الى الصدغ

اعظمها يسير بين المستقيمتين السفلي والوحشية الى المنخرقة السفلى ويرسل فرعاً غليظاً للعقدة العدسية وخطين الى المستقيمة السفلى. وجميع هذه الفروع تدخل العضلات من وجهها العيني

العصب الرابع وهو الاشفاقي^(١) (شكل ٢١٤)

العصب الرابع ويقال له العصب البكري اصغر الاعصاب المججمية ويتوزع في العضلة المنخرقة العليا. ينشأ من الجزء العلوي لصمام قيوسنس وراء الخصى وينقسم اسفل الاجسام الرباعية الى حزمتين فتنشأ المقدمة منهما من نواة سنجابية بقرب الخط المتوسط لارض قناة سلفيوس والخلفية من نواة سنجابية عند الجزء العلوي لارض البطنين الرابع بقرب منشأ العصب الخامس. وتصل الحزمتان عند منشأها برباطة مستعرضة مكونة من الياض بيض تقاطع وجه الشقة. واما العصب فانه يلتف على الجانب الوحشي لساق الخ اعلى الجسر ثم يتقب الام الجافية عند الحافة السائبة للخيمة المخيضية بقرب النوا السري الخلفي ويسير الى المقدم بجانب الجدار الوحشي للجيب الكهفي ثم يدخل التجويف المحجاجي من الفرجة الوندية ويسير الى الانسية ويتوزع في الوجه العيني للعضلة المنخرقة العليا

ويقبل هذا العصب وهو في الجدار الوحشي للجيب الكهفي خيوطاً من الضفيرة السباتية للسمباتوي. وقد يختلط بالقسم العيني للعصب الخامس وقد يرسل فرعاً لتكوين العصب الدمعي. ويرسل ايضاً فرعاً راجعاً يسير بين طبقات الخيمة

العصب الخامس

العصب الخامس ويقال له الثلاثي الوجهي والثلاثي التواحي اعظم الاعصاب المججمية ويشبه الاعصاب الشوكية بانه ينشأ باصلين وبان الاصل الخلفي عليه عقدة. وهو مختلف الوظائف فانه العصب العظيم الحاس للراس والوجه والمحرك لعضلات المضغ الامبوقة وفرعه اللساني احد العصبين الخاصين بجاسة الذوق. ينشأ باصلين احدهما خلفي عظيم حاس والثاني مقدم صغير محرك. منشأه الظاهر من جانب جسر فروليوس. ويتكون الاصل الاصغراي المقدم من ثلاث اواربع حزمات والاكثر اي الخلفي من سبعين الى مئة وتفصل الاصلين بعض الياض مستعرضة من الياض الجسر. واما منشأه الغائر فيستقصى الاصل الحاس بين الالياض المستعرضة للجسر الى القائمة الجانبية للناع المستطيل وراء الجسم الزيتوني ويستقصى الاصل المحرك الى الهرم المقدم. ويسير الاصلان الى المقدم وينفذان من فتحة في الام الجافية عند رأس الجزء المحجري للعظم الصدغي

(١) هو الاشفاقي في اصطلاح المدرسة المصرية على ان الكلمة اليونانية تعبد الاشفاق لا الاشتيان

بالعصبين البصرين فتعد اليافاً مجمعية بين السريرين البصرين ويقال لها الالياف بين الدماغ. واما الالياف الواقعة في الحافة المتدمة للجمع فتوصل العصبين البصرين للجانبين المخالفين من غير ان تكون لها علاقة بالامتدادين البصرين وتعد اليافاً مجمعية بين الشبكيين. والالياف الوحشية للامتداد البصري تدوم الى العصب البصري الذي الى جانبها. والالياف المركزية للامتداد البصري تدوم الى العصب البصري في الجانب المخالف فتصالب في الجمع اليافاً مثلها من الامتداد الاخر

والعصبان البصريان ينشآن من الجزء المقدم للجمع ثم يفرج الواحد عن الاخر ويصير مستديراً الشكل شديد القوام محاطاً بغمداتٍ من العنكبوتية. ثم اذا نفذ العصب من الثقب البصري نال غمداً ثانياً من الام الجافية غير انه عند دخول العصب الى التجويف الحجاجي ينتسم الغمد المذكور الى طبقتين تختلط احدهما بسحق الحجاج وتدوم الثانية محيطة بالعصب الى الطبقة الصلبة. واما العصب فانه يسير في التجويف الحجاجي الى ان يصل الى المقلة فيثقب الطبقة الصلبة والطبقة المشيمية عند مؤخرها وقليلاً الى الجانب الانفي من مركزها ثم ينسط فتتكون الشبكية من الانبساط المذكور. ويثقب العصب البصري قبل بلوغه الى المقلة بقليل شريان صغير يقال له الشريان المركزي الشبكي هو فرع من الشريان العيني يمر في باطن العصب ويتوزع في الوجه الباطن للشبكية مصحوباً باوردة نقابله

العصب الثالث وهو المحرك للمقلة (شكل ٢١٤)


العصب الثالث وهو المحرك للمقلة يتوزع في جميع عضلات المقلة الا المنخرفة العليا والمستقيمة الوحشية ويرسل ايضاً فروعاً محرّكة للقرنية. وهو عظيم الحجم مستدير الشكل شديد البنية. منشأه الظاهر من الوجه الانسي لساق الخ الى مقدم الجسر. ومنشأه الغائر يستقي الى باطن الساق حيث تتصل بعض اليافه بالحل الاسود وبعضها ينزل بين الالياف الطولية للجسر وبعضها يصعد ويتصل بالاجسام الرباعية وصمام فيوسنس. فاذا نفذ من الدماغ احاطه غمد من الام الحنوننة ثم يثقب الام الجافية عند الجانب الوحشي للتو السري الخلفي ويسير بجانب الجدار الوحشي للجيب الكهفي ثم ينتسم الى فرعين يدخلان التجويف الحجاجي من الفرجة الوتدية بين رأسي المستقيمة الوحشية. اما الفرع العلوي وهو الاصغر يسير الى الانسية مقاطعاً للعصب البصري ويتوزع في المستقيمة العليا والرافعة للجفن العلوي. والفرع السفلي وهو الاعظم ينقسم الى ثلاثة فروع يذهب احدها اسفل العصب البصري الى المستقيمة الانسية والثاني الى المستقيمة السفلى والثالث وهو

الخيط المذكورة عقيب نزولها الى الحفرة الانفية صغيرة شبكية توضع في الغشاء المبطن للانف ويختلف العصب الشهي عن بقية الاعصاب في البناء في انه يتضمن جوهرًا سنجابيًا في باطنه وفي كونه رخو القوام. وخيوطه عديدة الجوهرا الابيض لشوان ولا تنقسم الى لويقات وتُشبه الالياف الجلانية في ان لها نوى وفي ان بناءها من حبيبات دقيقة

العصب الثاني وهو البصري

هذا العصب يتوزع في المقلة فقط وهو العصب الخاص بجاسة البصر. ويتواصل العصبان للجانبين المخالفين في الجمع البصري ويستقصيان من الجمع المذكور الى الدماغ بواسطة الامتدادين البصريين

شكل ٢١٢




فالامتداد البصري ينقسم عند اتصاله بالدماغ الى رباطين تُستقصيان الى السيرين البصريين والجسمين المعقدين والاجسام الرباعية. فالالياف التي تنشأ من السير البصري يُستقصى بعضها الى ظاهر السير وبعضها الى باطنه. ومن هذا المنشأ ينفذ الامتداد البصري على الوجه السفلي لساق الخ على هيئة رباطة مسطحة عارضة من النوريلما متصلة بالساق بواسطة حافتها المقدمة ثم يصير شكلها اسطوانيًا وتقدم الى الامام فتقبل اليافًا من الحدة الرمادية والصفحية الرمادية ثم تتحد بالعصب المخالف فيتكوّن من ذلك الجمع البصري

والجمع البصري مستقر في الميزاب البصري للعظم الوتدي تحده من الامام الصفحية الرمادية ومن الخلف الحدة الرمادية ومن الجانبين الخلاء ان المثقوبان المقدمان. ويحصل في الجمع المذكور بعض اتصال بين الياف العصبين البصريين. فان الالياف التي تتكوّن منها الحافة الانسية للامتداد البصري تدوم من الجانب الواحد من الدماغ الى الاخر من غير ان تكون لها علاقة

شكل ٢١٢ الزوج الثاني وهو البصري ومنشأه سبعة ازواج اخر ١ والمقلتان وقد سلحت الطبقة الصلبة والمخيمية في البصر منها لاجل اظهار الطبقة الشبكية التي هي انبساط العصب البصري ٢ الجمع البصري ٣ الجسمان الابيضان ٤ النوع ٥ جـ ر فارولديوس ٦ الخنازير المستطيل والرقم موضوع على الهرم المقدم الامين ٧ الزوج الثالث وهو الحرك المقلنة ٨ الزوج الرابع وهو الاشفاقي ٩ الزوج الخامس وهو التوامي الثلاثي ١٠ الزوج السادس وهو المبعد المقلنة ١١ الزوج السابع وهو العصب الوجعي والسمعي ١٢ الزوج الثامن وهو اللساني البلعوي والرئوي المعدي والشوكي الاضافي ١٣ الزوج التاسع وهو العصب تحت اللسان

السنجابي ينشأ من حلقة سنجابية غائصة في الفص المقدم ويتضمن اليافاً بيضاً متصلة بالجسم المضلع والاصل الانسي او التصير مكوّن من الياف بيض تنشأ من الجزء الانسي والخلفي للفص المقدم وتصل بالتلغيف القبوي على ما قال المعلم فوقيل




شكل ٢١١

فهذه الاصول الثلاثة تُتحد وتكوّن رباطة مسطحة ضيقة في الوسط اكثر من الطرفين. وهي رخوة الغوام متضمنة مقداراً عظيماً من الجوهر السنجابي. اذا مرّت الى الامام كان وضعها في فرجة غائرة بين تلتفينين مستقرة على الوجه السفلي للفص المقدم بجانب الفرجة الطولية وتثبت في موقعها بواسطة العنكبوتية التي تغطيها. فاذا وصلت الى الصفيحة الغربالية للعظم المصفوي انبسطت على هيئة كتلة مستطيلة مكونة من جوهر سنجابي ابيض يقال لها البصلة الشمية. ويرسل من الوجه السفلي للبصلة المذكورة نحو عشرين خيطاً تنفذ من الثقوب الغربالية وتوزع في الغشاء المخاطي للانف. ويحيط بكل خيط زائدة انبوية من الام الجافية والام الحنون فتضع الاولى في السحاق المبطن للانف والثانية في النيوريلما اي الغدد العصبي. وتقسّم الخيوط عند دخولها الى الحفر الانفية الى ثلاثة مجاميع فينتشر المجموع الانسي في الثالث العلوي للفواصل الانفي والمتوسط في سقف الانف والوحشي على العظم القربني العلوي والقربني المتوسط ووجه المصفوي الى مقدمها. ويتكوّن من

شكل ٢١١ العصب الشهي وفروعه الداهية الى الفاصل الانفي. وقد نُثرت العظام طولاً الى يسار الفاصل ١ الجيب الجبهي ٢ العظم الانفي ٣ عرف الديك للمصفوي ٤ الجيب الوتدي الايسر ٥ السرج التركي ٦ التواء القاعدي للوتدي والمؤخري ٧ الفتحة الخلفية للفترة الانفية اليمنى ٨ فتحة بوق اوستاكوس في الجزء العلوي للبلعوم ٩ العصب الشهي ١٠ اصوله الثلاثة المشابهة ١١ بصلته التي تشاهد خيوطها منتشرة في الغشاء الختامي ١٢ العصب الانفي وهو فرع من العصب العينين. ويشاهد انه نافذ من الشق الذي في مقدم الصفيحة الغربالية وينقسم الى فرعيه الظاهر والباطن ١٣ العصب الانفي الحنكي وهو فرع من الغدة الوتدية الحنكية ويرسل فروعاً الى الغشاء المخاطي للفاصل الانفي ١٤ الثقب الحنكي المقدم الذي يمر منه العصب السابق ١٥ فروع العصب الانفي الحنكي للحنك ١٦ العصب الحنكي الخلفي والمقدم ١٧ الفاصل الانفي

المنشا السطحي او الظاهر الا ان اليافها تستقصى في كل حال الى باطن الدماغ فيقال لذلك



شكل ٢١٠

المنشا الغائر او الحقيقي

العصب الاول وهو الشمي

العصب الاول او الشمي هو العصب الخاص بحاسة الشم وقد يعد جزءاً من الجوهراخي مندفعاً الى المقدم الى ان يصل الى العضو الذي يتوزع فيه. ينشا بثلاثة اصول فالاصل الوحشي او الطويل رباطة ضيقة بيضاء لينة يسير الى الوحشية مقاطعاً للفرجة سلقينوس ويغوص في جوهر الفص المتوسط للشمخ. ويستمص منشأه الغائر الى الجسم المضع والالياف السطحية للسريير البصري والمجمع المقدم وتلايف جزيرة ريل. والاصل المتوسط او

شكل ٢١٠ الاعصاب المحببة وهي داخل المحببة ١ العصب الشمي منتفخاً عند مقدمه على هيئة بصلة ٢ و٢ العصبان البصريان مارين من الثقبين البصريين ٣ و٣ المركان للثقبين ثاقبين الام الجافية بقرب التوئين السريين الخلفيين ٤ و٤ الاشفاقيان . ويشاهد في اليمين ان العصب ثاقب للام الجافية وفي اليسار ان الام الجافية رُتعت والعصب سائر في الجيب الكهفي ٥ وه الثلاثي التوأمي وتُشاهد في اليمين اقسام الثلاثة مع عندة كاسيريوس (١٥ و١٦ و١٧ و١٨) ٦ المبعدان للثقب ٧ و٧ العصبان الوجهي والسعي ويستنصبان في اليمين الى القسم الخجري للصدغي ٨ و٨ اللساني البلعوي والرثوي المعدي والشوكي الاضافي ٩ و٩ العصب تحت اللسان مولفًا من حزم تثقب الام الجافية عند الثقب الثاني المقدم ١٠ الام الجافية عند ارتباطها بعرف الديك ١١ الصفيحة الغرابلية المصفوي ١٢ الجسم الخامي والتبع ١٣ و١٣ الشريمان السبائيان الباطنان ١٤ و١٤ الجيبان الكهفيان ١٥ عندة كاسيريوس ١٦ العصب العيني ١٧ العصب الفكي العلوي ١٨ العصب الفكي السفلي. وهذه الثلاثة اقسام العصب الخامس ١٩ انتفاخ في العصب الوجهي ٢٠ سبر العصب الوجهي في قناة فلويوس الى الثقب الابري الحلي

في الاعصاب الججمية

الاعصاب الججمية تسعة من كل جانب فهي تسعة ازواج وجميعها تنفذ من ثقب في قاعدة الججمية. وقد سميت باسماء العدد تبعاً لوضعها النسبي في خروجها من تجويف الججمية وسمت ايضاً باعتبار المحل الذي توزع فيه او الوظيفة الخاصة بها. فاذا حسبت باعتبار ترتيب خروجها من الامام الى الخلف كانت على ما ياتي :

الاول :	الشمي
الثاني :	البحري
الثالث :	المحرك للمقلة
الرابع :	الاشفائي او البكري
الخامس :	الثلاثي الوجي او الثلاثي التوأمي
السادس :	المبعد او المحرك الوحشي للمقلة
السابع :	الوجي او الوجه الصلب السمعي او الجزء اللين
الثامن :	اللساني البلعومي الرئوي المعدي او الثائث الشوكي الاضافي
التاسع :	تحت اللسان

هذه تسمية ولس واما المعلم سويمرن قسمها الى اثني عشر زوجاً فجعل السابع اثنين والثامن ثلاثة وهو الاصح بلا خلاف الا انهم لا يزالون يتبعون في عامة المدارس تسمية ولس وقد نُسِمَ ايضاً باعتبار وظيفتها الى اربعة مجاميع وهي اعصاب الحس الخاص واعصاب الحس العام واعصاب الحركة والاعصاب الممزوجة

فاعصاب الحس الخاص هي الشمي والبحري والسمعي وبعض اللساني البلعومي والفرع اللساني للعصب الخامس

واعصاب الحس العام معظم الخامس وبعض اللساني البلعومي واعصاب الحركة محرك المقلة والاشفائي وبعض القسم الثالث للعصب الخامس والمبعد والوجي وتحت اللسان

والاعصاب الممزوجة الرئوي المعدي والشوكي الاضافي ثم ان جميع الاعصاب الججمية متصلة بجزء من الوجه الظاهر للدماغ فيقابل المشنا المذكور

فالساقان العلويتان ويقال لهما الزائدتان من المخنج الى الخصيتين توصلان للمخنج بالمخ فتذهبان الى المقدم والاعلى الى الخصيتين ثم تصعدان اسفلها الى ساقى المخ والسريرين البصريين فتتكوّن منها بعض الالياف المنحنية المنفرجة . ويتكوّن من كل ساق بعض الحد الجانبي للبطين الرابع وتصل برفيقتها من الجانب المخالف بواسطة صام فيونسس . وهما ممتدتان من صفائح الزائدة الدودية السفلى ومن الالياف البيض الناشئة من باطن الجسم المسنّن . واليافهما الانسية تتصلب اسفل الاجسام الرباعية بحيث تذهب بعض الياف النصف الايمن للمخنج الى النصف الايسر للمخ والعكس

والساقان السفليتان ويقال لهما الزائدتان الى النخاع توصلان المخنج بالنخاع المستطيل فتسيران الى الاسفل الى الجزء الخلفي للنخاع بحيث يتكون منها بعض الجسمين الجبليين . ثم يتصلان في الاعلى على الخصوص بالصفائح الخاصة بالوجه العلوي للمخنج ويتصلان في الاسفل بالتوائم الثلاث للنخاع من كل جانب وهكذا بالشرط الجانبي للجبل الشوكي الا القائمتين المتوسطتين الخلفيتين

والساقان المتوسطتان ويقال لهما الزائدتان الى الجسر اعظم سوق المخنج توصلان النصفين الكرويين للمخنج الواحد بالآخر فتكوّنان مجعما العظيم المستعرض . تاليهما من الياف منحنية ناشئة من الجهة الجانبية للنصف الواحد الكروي وذاهبة الى ما يقابلها من النصف الاخر في الجانب المخالف . ومنها تتكون الالياف المستعرضة لجسر فروليوس

سنجابي غير واضح في الاعلى ابيض في الاسفل. كل حزمة منها مكونة من الياف ناشئة من النائمة الجانبية والجسم الحبلي وتصعد الى الخ. ونطاق الجزء السفلي لارض البطين خطوط عرضية بيضاء ناشئة من الفرجة المتوسطة الخلفية يدخل بعضها ساق المخنج وبعضها الاصول المنشائية للعصب السمعي وبعضها يسير الى الاعلى والوحشية في ارض البطين

والغشاء المبطن للبطين الرابع ممتد من البطين الثالث بواسطة قناة سلفيوس ويستطرق التجويف الى الخلاء تحت العنكبوتية بواسطة ثقب في الام الحنونة الممتدة بين المخنج والنخاع المستطيل. والصفيرتان المشبهتان للبطين الرابع تبرزان الى البطين من كل جانب سائرتين من الزائدة الدودية السفلى الى الحافة الوحشية للجسمين الحبلين. والجوهر السنجابي الواقع في ارض البطين طبقة سميكة ممتدة الى الاعلى من الجمع السنجابي للحبل حتى قناة سلفيوس ما عدا رسوبات خاصة تتعلق بمنشأ بعض الاعصاب. ويشاهد في النصف العلوي للبطين بروز ينشأ منه العصب السادس والعصب الوجيه باصل مشترك وفي النصف السفلي ثلاثة بروزات من كل جانب ينشأ منها العصب الثامن والعصب التاسع

في بناء المخنج. اذا قُطع احد النصفين الكرويين للمخنج قطعاً عمودياً عند النقطة المتوسطة بين مركزه والزائدة الدودية العليا شوهد انه مؤلف من ساق مركزي ابيض يتضمن في باطنه جسماً مسنناً. وانه تنشأ من الساق المذكورة صفائح بيض مغطاة بجوهر سنجابي ومن مقدمه ثلاث زوائد كبيرة يقال لها سوق عليا ومتوسطة وسفلى توصل للمخنج بما بقي من الدماغ

فالصفائح نحو عشرين اثني عشرة لوجيه المخنج اي العلوي والسفلي متفرعة من الساق على زاوية قائمة في المقدم وحادة في الخلف. وتتفرع منها صفائح اخرى ثانوية ومنها اخرى ثالثة فيكون الوجه المقطوع على شكل شجرة نسي شجرة الحيوة. وكل صفيحة مولفة من جوهر ابيض مغطى بطبقة من جوهر سنجابي. فالجوهرا ابيض ناشئ من الساق المركزية ومن الياف تذهب من صفيحة واحدة الى اخرى. والجوهر السنجابي شبيه بالجوهرا التشريحي لتلايف الخ

والجسم المسنن ويقال له عقدة المخنج موضوع قليلاً الى الانسية من مركز الساق البيضاء ومكون من محفظة مفتوحة في جزئها المقدم اذا قطعت قطعاً عمودياً ظهر شكلها المسنن. وهو محاط بالياف بيض ويتضمن مثل ذلك في باطنه فتذهب الالياف الناشئة منه وتختلط بالساقين العلويتين للمخنج



وسوق المخنج ثلاثة ازواج علوي ومتوسط وسفلي توصله بما بقي من الدماغ

باللوزين مجمع سنجاي مُثَمَّ الظاهر يقال له الرباط المثلم. والى مقدم الغلصمة العقدة وهي الطرف
المقدم للزائدة الدودية السفلى بارزة في تجويف البطن الرابع. والى كل من جانبي العقدة طبقة
رقيقة من الجواهر الابيض توصل الاجزاء المجاورة بعضها ببعض يقال لها الشقة اللبية الخلفية
تغطيها غالباً اللوزة. وبين العقدة والغلصمة والشقة المذكورة حفرة غائرة يقال لها عش السنون

في فصوص المنحج. يُقسم كل نصف كروي الى جزئين علوي وسفلي بواسطة الفرجة العظيمة
الافقية التي تبدأ عند الجسر في المقدم وتسير افقياً حول المحافة السائبة لكل من النصفين
الكروين الى ان تصل الى الخط المتوسط في الجهة الخلفية. وتنشا من هذه الفرجة الاصلية فرجات
كثيرة ثانوية تنصل المنحج الى فصوص. فينقسم الوجه العلوي لكل من النصفين الكرويين الى
فصين احدهما مقدم مربع الشكل يمتد الى المحافة الخلفية للزائدة الدودية والآخر خلفي هلالى
الشكل يمتد من منتهى الفص المقدم الى الفرجة العظيمة الافقية. واما الوجه السفلي لكل من
النصفين الكرويين فينقسم الى خمسة فصوص تُعد من الامام الى الخلف وهي اولاً الجزارة موضوعة
الى الخلف والاسفل من الساق المتوسط المنحج ويقال لها احياناً الفصيص الرئوي المعدي لانه
موضوع وراء العصب الرئوي المعدي. ثم اللوزة وضعها على جانب الفرجة المتوسطة التي يقال
لها الوادي وهي بارزة الى البطن الرابع. ثم الفص ذو البطنين وضعه الى الوحشية من اللوزة
ويتصل بالهرم. ثم الفص الدقيق وضعه وراء ذي البطنين ويتصل بالجزء الخلفي للهرم وبالجمع
القصير. ثم الفص الخلفي السفلي وضعه الى الخلف من سابقه ويتصل بالجمع القصير في الوادي

في البطن الرابع. البطن الرابع ويقال له بطين المنحج ايضاً هو الخلاء الواقع بين الوجه
الخلفي للثغاع المستطيل والجسر من المقدم والمنحج من الخلف. وهو ضيق من الاعلى والاسفل عريض
في المنتصف. حداه الجانبيان مكوّنان في الاعلى من الساقين العلويين للمنحج (هما الزائدتان
الذاهبتان من المنحج الى الخصيتين) وفي الاسفل من الهرمين الخلفيين المنفرجين والجسمين الحبلين.
سقفه مقوّس مكوّن من صام فيوسنس والوجه السفلي للمنحج الذي يُشاهد عليه في هذه الجهة
اربعة بروزات اثنان في الخط المتوسط هما العقدة والغلصمة واثنان على جانبي الغلصمة هما
اللوزتان. واما حده المقدم ويقال له الارض فمكوّن من الوجه الخلفي للثغاع المستطيل والجسر
ويُشاهد فيه في الخط المتوسط الفرجة المتوسطة الخلفية التي تضيع في الاعلى وتنهي في الاسفل
بنقطة قلم الكتابة عند اجتماع الهرمين الخلفيين. والى كل جانب من الفرجة المتوسطة بروزان
طوليان ممدبان قليلاً يقال لها الحزمتان المستديرتان يمتدان على جميع طول الارض لونها

ويفصلها شرم اخر الى الخلف يقال له الشرم الخلفي للخنج يدخل فيه الجزء العلوي لمنجل الخنج .
وتمتد بين الشرمين الزائدة الدودية العليا منقسمة الى ثلاثة فصوص وهي النصف المركزي الموضوع



في الشرم المقدم والنصف المرتفع وهو الجزء البارز من مركز الزائدة والمجمع البسيط وهو فص صغير
موضوع في الشرم الخلفي

وجهه السفلي مقسوم الى نصفين كرويين جانبيين بواسطة انخفاض يقال له الوادي يمتد
من الامام الى الخلف في الخط المتوسط . ويستقر النصفان الكرويان الجانبيان في الحفرتين
المؤخرتين السفليتين . والانخفاض المتوسط اي الوادي يقبل في الامام الجزء الخلفي للخنج
المستطيل ويبرز من ارضه بعض النصف المتوسط للخنج الذي يقال له هنا الزائدة الدودية السفلى .
واما الاجزاء التي تتالف منها الزائدة المذكورة فهي من الخلف الى الامام المجمع القصير الموضوع
في الشرم الخلفي . ثم بروز مخروطي الشكل يقال له الهرم . ثم بروز اعظم منه يقال له الغلصمة
موضوع بين فصين مستديرين شاغلين لجانبي الوادي يقال لهما اللوزتان . ويوصل الغلصمة

شكل ٢٠٨ البناء الكرسكولي للخنج . a الجوهري المكون من الياف . والى الاعلى منه طبقة متوسطة بينه وبين
الجوهري الثوري يقال لها الطبقة الحديدية وهي مؤلفة من الياف ونوى . والى السطحية الجوهري السنجابي المكون من حبيبات الى
الظاهر وكريات ذنبية بقرب الطبقة الحديدية

شكل ٢٠٩ الوجه العلوي للخنج ١ و١ و١ محيط الخنج ٢ الشرم الخلفي للخنج ٣ النصف الكروي الايمن ٤ الزائدة
الدودية العليا ٥ الاجسام الرباعية التي يعانها الدم المقدم للخنج ٦ و٦ قطع ساق الخنج

وتتصل الثانية بالجسم المعقد الانسي والخصية الانسية

في بناء الخ. الجوهرابيض للنصفين الكرويين مكوّن من الياف على ثلاثة انواع. النوع الاول الياف منفرجة او ساقية توصل النصف الكروي بالحبل الشوكي والنخاع المستطيل. الثاني الياف مستعرضة مجمعية توصل النصف الكروي بالآخر في الجانب المخالف. الثالث الياف طولية مجمعية توصل الاجزاء البعيدة الواقعة في نصف واحد كروي. فالالياف المنفرجة او الساقية مكونة من جسم واليااف اضافية. فاليااف الجسم تنشأ في قوائم الحبل والنخاع المستطيل وتدخل الخ بواسطة ساق الخ حيث تكون مرتبة على شكل حزمتين يفصلها الحبل الاسود. والالياف المستعرضة المجمعية مكونة من الجسم الصلب والمجمع المقدم والمجمع الخلفي وتوصل النصفين الكرويين الواحد بالآخر مقاطعة للخط المتوسط. والالياف الطولية المجمعية توصل الاجزاء البعيدة في النصف الكروي الواحد بعضها ببعض فتتكون منها القوة والرباطة الهلالية وسوق الغدة الصنوبرية والخطوط الطولية واليااف التليفنقبوي


في المخنج

المخنج جزء من الدماغ واقع في الحفرتين الموقرتين السفليتين. وضعه اسفل النصفين الخلفيين للسخ تنصله عنهما الخيمة. وزنه العام في الذكور خمس اواق ونصف ويبلغ اشده من الوزن بين السنة الخامسة والعشرين والاربعين. نسبتة الى الخ في الذكور كنسبة ١ الى $\frac{8}{7}$ وفي الاناث كنسبة ١ الى $\frac{8}{6}$ واما في الاطفال فمقداره النسبي اصغر من ذلك جداً فهو كنسبة ١ الى ٢٠ على ما قال المعلم كروفيليه. شكلة مستطيل مسطح من الاعلى الى الاسفل فيكون قطره الاعظم من الجانب الى الجانب. طوله من الجانب الى الجانب من ثلاثة قراريط ونصف الى اربعة ومن الامام الى الخلف من قيراطين الى قيراطين ونصف. تاليته من جوهر سنجابي وجوهرابيض السنجابي ادكن ما هو في الخ ووضعته الى الظاهر والابيض الى الباطن. وسطحه خال من التلايف وانما تقاطعه تلوم او فرجات مختلفة الغور تقابل الصفائح التي ظاهره مؤلف منها

وجهة العلوي فيه بعض ارتفاع عند الخط المتوسط وانخفاض نحو المحيط. وهو مؤلف من نصفين كرويين يتصلان بواسطة فص متوسط مرتفع يقال له الزائدة الدودية العليا. وهذا الفص المتوسط هو الجزء الجوهري من المخنج واما النصفان الكرويان فاضافيان لا يوجدان في بعض الحيوانات كالاسماك والزحافة ولا يبلغان اشدهنوها الا في الانسان. ويفصل النصفين الكرويين الى الامام شرم غائر يقال له الشرم المقدم للمخنج محيط بالاجسام الرباعية الى الوراء.

والاجسام الرباعية (المحدرات التوأمية الاربع) اربعة بروزات موضوعة اثنان الى المقدم واثنان الى الخلف يفصلها انخفاض صليبي . وضعها وراء البطين الثالث والمجمع الخلفي . فالزوج المقدم يقال له الاليتان اعظم من الزوج الاخرها مستطيلان من الامام الى الخلف ولونهما سنجابي . والزوج الخلفي يقال له الخصيتان هما كرويان ولونهما ابيض من الزوج الاول . وتتصل الاجسام المذكورة بالجزء الخلفي للسريين البصريين وبساق الخ . وهي موضوعة اعلى المسلك المستطرق من البطين الثالث الى البطين الرابع . وتقبل الاجسام الرباعية ليافاً بيضاء من الحزمة الزيتونية من الاسفل وتتصل بالخيخ بواسطة حبل عظيم ابيض من كل من الجانبيين يقال له الساق العلوي للخيخ الذي ينفذ من الاجسام المذكورة الى السريين البصري . وهي اعظم في الحيوانات منها في الانسان وتولد في الجنين مدة الادوار الاول لتكوينه

شكل ٢٠٧




وصمام فيوسنس صفيحة رقيقة بيضاء ممتدة بين الساقين العلويتين للخيخ تغطي القناة المستطرفة من البطين الثالث الى البطين الرابع فيتكون منها بعض سقف البطين الرابع . والصمام المذكور ضيق من المقدم يتصل بالخصيتين عريض من الخلف يتصل بالزائدة الدودية للخيخ . وعليه خط مرتفع نازل من الاجسام الرباعية تشاهد الى كل جانب منه الالياف التي ينشأ بها العصب الرابع والجسمان المعقدان ككتلتان صغيرتان مسطحتان مستطيلتان موضوعتان الى الوحشية من الاجسام

الرباعية الواحدة الى الوحشية من الامتداد البصري والثانية الى الانسية منه . وفي هذه الجهة يشاهد الامتداد البصري منقسماً الى حزمتين تتصل احدها بالجسم المعقد الوحشي والالية الوحشية

شكل ٢٠٧ قطع النطر الايمن لقاعدة الدماغ لاجل اظهار الالياف المنفرجة ١ التماع المستطيل ٢ نصف جسر فرولبوس ٣ ساق الخ التي يصابها العصب البصري وتنتشر في السريين البصري والجسم المضلع ٤ العصب البصري عند المجمع البصري ٥ العصب البصري عند منشأه ٦ العصب الشهي ٧ الجسمان الابيضان . وان يسار الرق قد قطع بعض الدماغ لاجل اظهار الالياف المنفرجة ٨ الياف الهرم المقدم سائرة في جسر فرولبوس ٩ الالياف السائرة في السريين البصري ١٠ الالياف التي تدخل الجسم المضلع ١١ الياف النصف الكروي ١٢ العصب الخامس الذي ينشأ باصلين ١٣ الياف الهرم المقدم التي تسير الى الوحشية وتدخل جوهرا للخيخ مع الياف الجسم الحبل فتكون سافة السفلى ١٤ قطع النصف الواحد للخيخ بحيث تظهر تجريرة الحية ١٥ النصف الاخر غير مقطوع

به بواسطة جزء مستعرض هو المجمع المتوسط للبطين الثالث

والبطين الثالث فرجة ضيقة مستطيلة واقعة بين السريرين البصريين فهما حذاء الجانبين وممتدة الى قاعدة الدماغ. يحدّه من الاعلى الوجه السفلي للشقة المتوسطة والقبوة. وتكون ارضه من الاسفل هذه الاجزاء معدودة من الامام الى الخلف وهي الصفحة الرمادية والمحدبة الرمادية والقمع والجسمان الابيضان والخلاء المثقوب الخلفي. وتقاطع هذا البطين ثلاثة مجامع. فالجمع المقدم جبل مستدير ابيض موضوع الى مقدم القائمتين المقدمتين للقبوة يثقب الجسمين المخططين وينفذ الى جوهر النصفين الكرويين. والمجمع المتوسط من جوهر سنجابي يوصل السريرين البصريين. والمجمع الخلفي رباطة مسطحة من الياف بيض توصل السريرين البصريين من الخلف والى الوراء من البطين الثالث الغدة الصنوبرية مستقرة على الاجسام الرباعية



فالغدة الصنوبرية جسم صغير سنجابي اللون مائل الى الحمرة مخروطي الشكل كثير الصنوبر موضوع وراء المجمع الخلفي بين الاليتين اللتين يستقر عليهما. وهذه الغدة ملتصقة بالوجه السفلي للشقة المتوسطة طولها نحو اربعة خطوط وعرضها عند القاعدة نحو خطين او ثلاثة. قاعدتها مرتبطة بالخ بواسطة بعض الياف مستعرضة وبواسطة اربع سوق دقيقة من الجوهر الابيض اثنتان منها علويتان تسييران الى المقدم على المحافة العليا والانسية للسريرين البصريين وتختلطان بالقائمتين المقدمتين للقبوة. والساقان السفليتان نحدران عمودياً من قاعدة الغدة على الجزء الخلفي والانسي للسريرين البصريين. وهذه الغدة كثيرة الاوعية معظمها فيها من الجوهر السنجابي وبعض الياف بيض. ويوجد في قاعدتها تجويف صغير يتضمن سائلاً شفافاً لزجاً وحيوانياً مادة رملية مؤلفة من فوسفات الكلس وكر بوناته وفوسفات المغنيسيا والامونيا وشي من مادة حيوانية

شكل ٢٠٦ البطين الثالث والرابع ١ البطين الخامس الواقع بين طهني الفاصل اللاحق ٢ والجسمان المخططان ٣ والسريران البصريان ٤ طرفها الخلفي ٥ الرباطة الملالية ٦ والقائمتان المقدمتان للقبوة مقطوعتين ٧ المجمع المتوسط البطين الثالث ٨ المجمع الخلفي للبطين الثالث. والخلاء الذي فيه الجسمان المذكوران الواقع بين السريرين البصريين من البطين الثالث ٩ الغدة الصنوبرية ١٠ والساقان العلويتان للغدة الصنوبرية اللتان تتقدمان وتختلطان بالقائمتين المقدمتين للقبوة ١١ والاليتان ١٢ والخصيتان ١٣ و١٤ زائدتان تذهبان من الالية والخصية الى السرير البصريين ١٥ والجسمان المقدمان ١٦ الصفحة العليا من الحزمة الزيتونية ١٧ والساقان العلويتان للشيخ ١٨ و١٩ ساقا الخ ٢٠ صام فيونسس ٢١ قطع الساق العليا للشيخ ٢٢ قطع الساق المتوسطة ٢٣ قطع الساق السفلي ٢٤ البطين الرابع ٢٥ فلم الكتابة ٢٦ الحزمة الرقيقة ٢٧ منشا العصب السمي ٢٨ القائمة المقدمه للجلل الشوكي ٢٩ القائمة الجانبية

من المقدم وبالجسم الصلب من الخلف. ويستقر وجهه السفلي على الشقة الفاصلة التي تفصله عن البطن الثالث. وحافته الجانبيتان تكوّنان بعض ارض البطنين الجانبيين وتلاصقان بالضفيريّين المشيبتين. والقائمتان المتدّمتان للقبوة ويقال لها الساقان ايضاً تنقوسان الى الاسفل نحو قاعدة الدماغ منفصلين بخلاء ضيق. تاليها من الياف بيض مخدرة في جداري البطن الثالث ووضعها وراء المجمع المقدم. وعند قاعدة الدماغ تنثني الالياف المذكورة على نفسها وتنبسط فيتكون منها الجزء الظاهر للجسمين الابيضين ومن هناك قد تستقصى الى السرير البصري. والقائمتان الخلفيتان ملتصقتان عند منشأها بالوجه السفلي للجسم الصلب تنفرج القائمة الواحدة عن الاخرى وتحدّر الى القرن النازل للبطين الجانبي فتصير امتداد الحافة المقعرة للقرن الكبشي الاكبر. والجسم المشرشر ليس الا الحافة الرقيقة للقائمة الخلفية. ويُشاهد على الوجه السفلي للقبوة نحو جزئها الخلفي بين القائمتين الخلفيتين المنفرجتين خطوط منها ما هو عرضي ومنها ما هو طولي او منحرف يقال لها القيثارة. ويُشاهد بين القائمتين المتدّمتين للقبوة والطرفين المتدّمين للسريرين البصريين ثقب يبضي من كل جانب يقال له ثقب منرو. وهذان الثقبان يستطرقان من البطنين الجانبيين الى البطن الثالث في الاسفل

والشقة المتوسطة غشاء وعائي منعكس من الام المحنونة الى باطن الدماغ نافذ من الفرجة المستعرضة ماراسفل الطرف الخلفي المستدبر للجسم الصلب والقبوة واعلى الاجسام الرباعية والغدة الصنوبرية والسريرين البصريين. شكلها مثلث وهي فاصلة الوجه السفلي لجسم القبوة عن تجويف البطن الثالث. حافتها الخلفية محيطة بالغدة الصنوبرية. طرفها المقدم مقسوم الى شعبتين تذهبان الى البطنين الجانبيين فيتكون منها الطرف المقدم للصفيرة المشيبتية. وتبرز من وجهها السفلي الى الورا ششرتان هما الضفيران المشيبتان للبطين الثالث. ويسري على وجهها السفلي وربدا جالينوس يتحدان الى الخلف في جذع واحد يصب في الجيب المستقيم

والسريران البصريان كتلتان عظيمتان مستطيلتان موضوعتان بين الجزئين المنفرجين للجسمين المضاعين. ظاهرها ابيض وباطنها مؤلف من الياف بيض مزوجة بجوهر سنجابي. كل منهما مستقر على الساق الخفية التي الى جانبه ومعانقها. يحدّه من الوحشية الجسم المضلع والرابطة الهلالية. ومن الانسية يكون الحد الجانبي للبطين الثالث وتمر على حافته العليا ساق الغدة الصنوبرية. وجهه العلوي سائب يُشاهد بعضه في البطن الجانبي وتغطي بعضه القبوة. وجهه الخلفي بارز الى القرن النازل للبطين الجانبي. وجهه الانسي يلامس رقيقه من الجانب الخالف ويتصل

والقرن المتوسط ويقال له النازل اعظم قرون البطين الجانبي ويخترق الفص المتوسط للخ منعكفاً حول الجزء الخلفي للسري البصري الى ان ينتهي بقرب فرجة سلفيوس . يجده من الاعلى الجواهر اللبي للفص المتوسط والوجه السفلي للسري البصري ومن الاسفل القرن الكبشي الاكبر والمخالب والبروز الابيض والجسم المشرشر والصفيرة المشيمية واللفافة المسننة والفرجة المستعرضة فالقرن الكبشي الاكبر (وهو قرن امون) بروز ابيض مستطيل منعكف على هيئة قرن الكبش يمتد على جميع طول ارض القرن المتوسط للبطين الجانبي ينتهي من الاسفل بطرف متسع عليه ارتفاعات وانخفاضات متعاقبة شبيهة بمخالب الحيوان فيقال له الخلب . اذا قُطع القرن الكبشي الاكبر قطعاً عرضياً شوهد انه الوجه الباطن لتليف الجسم الصلب الذي ينثني على نفسه كالقرن بحيث يكون الجزء الابيض المحذب بارزاً الى تجويف البطين والجزء السنجالي واقعاً على وجه الخ حيث تُشاهد اللفافة المسننة وهي حرف الجواهر السنجالي للفص المتوسط . واما الجواهر الابيض للقرن الكبشي فتتخذ اليافه من الجسم المشرشر الى القبوة والجسم الصلب والجسم المشرشر امتداد القائمة الخلفية للقبوة كما مر

والفرجة المستعرضة تُشاهد عند فصل الجسم المشرشر عن السري البصري وهي واقعة اسفل القبوة ويجدها من الجانب الواحد القبوة والنصف الكروي ومن الجانب الاخر السري البصري . وتمر الام الحنوننة من ظاهر الدماغ بواسطة الفرجة المذكورة الى البطينات فتتكون منها الصفيرتان المشيمتان

واما الفاصل اللامع فيكون الحد الانسي للبطين الجانبي وهو فاصل رقيق فيه بعض شفافة يرتبط من الاعلى بالوجه السفلي للجسم الصلب ومن الاسفل بالجزء المقدم للقبوة ومن المقدم بركبة الجسم الصلب . شكله مثلث عريض من المقدم ضيق من الخلف . مؤلف من صفيحتين يفصلهما خلاء ضيق هو البطين الخامس . فتكون كل صفيحة منها فاصلة بين البطين المذكور الى الانسية والبطين الجانبي الى الوحشية . والبطين الخامس مغشى بغشاء مصلي ويشغله سائل ولا يستطرق في البالغ الى البطين الثالث خلافاً للجنين

والقبوة وريقة طولية ليفية البناء موضوعة اسفل الجسم الصلب ممتدة منه في الخلف ومنفصلة عنه في المقدم بواسطة الفاصل اللامع . وهي مؤلفة من نصفين متساويين واحد لكل نصف كروي يتصلان في الخط المتوسط فيتكون من الاتصال المذكور جسم القبوة وينفصلان في المقدم والخلف فتتكون من ذلك القائمتان المقدمتان والقائمتان الخلفيتان للقبوة . اما الجسم فمثلث الشكل ضيق من الامام واسع من الخلف . يتصل وجهه العلوي في الخط المتوسط بالفاصل اللامع

فالتجويف المركزي للبطين الجانبي مثلث الشكل يحدهُ من الاعلى الوجه السفلي للجسم الصلب فيتكوّن من ذلك سقف التجويف، ويحدهُ من الانسية الفاصل اللامع الذي يفصله عن البطين المخالف ويوصل الوجه السفلي للجسم الصلب بالقبوة. وارضهُ مكوّنة من هذه الاجزاء معدودة من الامام الى الخلف وهي الجسم المضلع والرباطة الهلالية والسرير البصري والصفيرة المشيمية والجسم المشرشر والقبوة

والقرن المقدم مثلث الشكل يقبّه الى الوحشية في الفص المقدم وينعكف حول الطرف المقدم للجسم المضلع. يحدهُ من الاعلى والامام الجسم الصلب ومن الخلف الجسم المضلع والقرن الخلفي ويقال له التجويف الاصبعي ينعكف الى الخلف في جوهر الفص الخلفي متجهًا الى الخلف والوحشية ثم الى الانسية. ويشاهد في ارضه بروز طولي يقال له القرن الكبشي الاصغر (قرن أمون الاصغر) وبين القرن المتوسط بروز اخر املس يُقال له البروز الجانبي

والجسم المضلع موضوع الى مقدم السرير البصري. وهو بيضي الشكل غائص في الجوهري الابيض للنصف الكروي يظهر بعضه في التجويف المركزي والقرن المقدم للبطين الجانبي. وهذا الجزء الظاهر مخروطي الشكل قاعدته مشرفة الى المقدم ورأسه الى الخلف والوحشية بحيث يدخل السريران البصريان في الانفراج الحادث عن اتجاه رأسي الجسمين المضلعين الى الوحشية. وهو سخاوي الجوهري الا انه يشاهد في باطنه الياف بيضاء تعطيه منظرًا مضلعًا ومنها اسمه


والرباطة الهلالية رباطة ضيقة بيضاء موضوعة في الانخفاض الواقع بين الجسم المضلع والسرير البصري. تنحدر من المقدم مصاحبة للقائمة المقدمة للقبوة وتدوم من الخلف الى القرن المتوسط للبطين الجانبي حيث تضع. تاليفها من الياف بيض طويلة واسفلها ويريد اوائنان يحملان الدم من الجسم المضلع والسرير البصري وينتهيان في وريد جالينوس

والصفيرة المشيمية غشاء كثير الاوعية واقع في حافة الشقة المتوسطة. تنعكف في ارض البطين الجانبي فتستطرق من المقدم الى الصفيرة التي على الجانب المخالف بواسطة ثقب عظيم بيضي يقال له ثقب منرو ومن الخلف تنحدر في القرن المتوسط للبطين الجانبي حيث تتصل بالام الحنوننة بواسطة الفرجة المستعرضة. وهي مجمع للشرايين والاوردة فتُرسل الشرايين فروعًا الى الاجزاء المجاورة والاوردة تصب في وريدي جالينوس

والجسم المشرشر رباطة ضيقة بيضاء موضوعة وراء الصفيرة المشيمية يتكوّن منه الحرف الجانبي للقائمة الخلفية للقبوة ويتصل بالحافة الانسية للقرن الكبشي الاكبر الواقع في القرن المتوسط النازل للبطين الجانبي

ظاهراً يقال له الركبة ثم تنعكس الى المقدم فيقال للانعكاس المذكور المنقار الذي يرتبط بالنص
المقدم الخي ويتصل بالجمع البصري بواسطة الصفيحة الرمادية ويرسل عند منتهاه حزمتين من
الجوهر الابيض تذهبان الى الخلف منفرجتين على الخلاء المثقوب المقدم حتى مدخل فرجة
سلفيوس فيقال لها ساقا الجسم الصلب . واما من الخلف فيكون ثنية غليظة مستديرة تنعكف
الى المقدم فتصير امتداد القبة . واما وجهه العلوي فيشاهد بالعين المجردة انه مؤلف من الياف
مستعرضة مجموعة على هيئة حزم ويشاهد في الخط المتوسط خط طوي منخفض يقال له القيد
تحده من الجانبين خطوط طولية . ووجهه السفلي امتداد القبة من الخلف ومنفصل عنها الى المقدم
بواسطة الفاصل اللامع الذي يكون حاجزاً عمودياً بين البطينين الجانبيين . وتنفذ الياف الجسم
الصلب الى باطن النصفين الكرويين من الجانبين فتوصل النص المقدم والمتوسط وجزءاً من
الخلفي بعضها ببعض

شكل ٢٠٥



اذا قطع الجسم الصلب قطعاً عمودياً على جانبي
القيد ظهر تجويفان عظيمان غير منتظمين يمتدان
الى جميع طول كل من النصفين الكرويين يقال لها
البطينان الجانبيان . وهما تجويفان مصليان مكونان
من الجزء العلوي للخلاء البطيني العام الواقع في باطن
الدماغ ومبطنان بغشاء مندى بسائل مصلي . وضع كل
منهما في احد النصفين الكرويين وينفصلان الواحد
عن الاخر بواسطة الفاصل اللامع

ويتكون كل بطين جانبي من تجويف مركزي يقال
له الجسم وثلاثة تجاويف اخر اصغر منه يقال لها القرون


ممتدة من التجويف المركزي الى جهات مختلفة . فالقرن المقدم ينحني الى المقدم والوحشية في باطن
الفص المقدم . والقرن الخلفي ينحني الى الخلف في الفص الخلفي . والقرن المتوسط ينحدر في الفص المتوسط

شكل ٢٠٥ البطينان الجانبيان للخ ١ و ١ قطع النصفين الكرويين على مساحة اسفل الجسم الصلب . وتناهد على السطح
نقط الاوعية الدموية المقطوعة وعند المحيط الجوهر السنجابي ٢ قطعة صغيرة من ركبة الجسم الصلب ٣ حده الخلفي وقد قطع
الجزء المتوسط للجسم الصلب الذي يكون سقف البطينين ٤ انبيين لاجل اظهار التويفين المذكورين ٤ بعض الفاصل اللامع .
والخلاء الذي بين طبقتيه هو البطين الخامس ٥ القرن المقدم ٦ بداية القرن المتوسط ٧ القرن الخلفي ٨ الجسم المصلي
لاحد البطينين ٩ الرابطة المثلالية ١٠ بعض السريد البصري ١١ الصفيحة المشيمية موضوعة الى يسار الرقم ومستطوقة الى
البطين الخلفي بواسطة ثقب منرو الذي يشار اليه بخط مستعرض عند رقم ١٢ القبة ١٢ بداية قرن امون الاكبر الذي
ينزل الى القرن المتوسط

باطن الخ

إذا قُطع الجزء العلوي من النصفين الكرويين اعلى مساحة الجسم الصلب نحو نصف قيراط ظهر الجوهر الابيض الباطن للخ. وهو مركز بيضي الشكل مؤلف من الجوهر الابيض محاط من الجانبين بجافة ضيقة متعرجة من الجوهر السنجاي متساوية المساحة يقال له المركز البيضي الاصغر. يُشاهد على سطحه نقط دقيقة حمراء ناشئة عن خروج الدم من الاوعية الدموية المنقطعة وتكون كثيرة وداكنة اللون في التهاب الدماغ او احتمائه. ثم اذا فصل ما بقي من النصف الكروي الواحد فصلاً خفيفاً عن الاخر شوهد ان رباطاً عريضاً من الجوهر الابيض يوصلها

شكل ٢٠٤



عند قعر الفرجة الطولية يقال له الجسم الصلب ويقال لحافتي النصفين الكرويين اللتين تغطيان الجسم المذكور شفا الخ يتكون منها التليف الخاص بالجسم الصلب وهو التليف القبوي ويقال للخلاء الواقع بين الشفر والوجه العلوي للجسم الصلب بطين الجسم الصلب. ثم اذا قُطع النصفان الكرويان على مساحة الجسم الصلب ظهر جوهرة الابيض موصلاً النصفين الكرويين ويظهر ايضاً الخلاء الواسع للجوهر اللي محاطاً بالحافة المتعرجة للجوهر السنجاي ويقال له المركز البيضي الاكبر لفيوسس والجسم الصلب" (وهو المجمع العظيم) طبقة

سميكة من الياف مستعرضة موضوعة عند قعر الفرجة الطولية توصل النصفين الكرويين للخ الواحد بالآخر فهو مجمعها العظيم المستعرض ومنه يتكوّن سقف الخلاء الواقع في باطن كل من النصفين الكرويين الذي يقال له البطين الجانبي. طول الجسم الصلب نحو اربعة قراريط ويمتد الى نحو قيراط ونصف من مقدم الخ والى نحو قيراطين ونصف من مؤخره وهو اوسع في الخلف من الامام وفيه بعض نقويس من الامام الى الخلف وينتهي في المقدم بجافة مستديرة تنعكف الى الاسفل والخلف بين النصفين المقدمين للخ الى قاعدة الدماغ وتختفي في سيرها الى الاسفل انحناء

شكل ٢٠٤ قطع الخ على نوع يظهر المركز البيضي الاكبر والجسم الصلب او ١ النصفان المقدمان للخ ٢ و ٢ النصفان الخلفيان ٢ و ٢ الفرجة الطولية التي يدخلها النبل الخي ٤ و ٤ سقفا البطين الجانبيين ٥ و ٥ ركة الجسم الصلب ٦ و ٦ الجسم المذكور وعليه خطوط مستعرضة ٧ و ٧ طرفه الخلفي ٨ قبه ٩ و ٩ خطوطه الطولية

(١) هو الجسم المندمل في بعض الكتب المصرية

الوضع العام للاجزاء التي يتألف منها الخ

الساق منها نحو ثلاثة ارباع القيراط وعلى سطحه خطوط طولية. ونقاط كل ساق قبل دخولها في النصف الكروي حزمة بيضاء مسطحة هي الامتداد البصري. وفي باطن الساق كتلة سنجابية سوداء يقال لها المحل الاسود. ويشاهد العصب الثالث نافذاً من الجانب الانسي للساق والعصب الرابع ملتفاً حول جانبها الوحشي من الاعلى. تأليف الساق من طبقتين من الياض بيض طولية صاعدة من الجسر احدها سطحية والثانية غائرة تفصلها كتلة سنجابية هي المحل الاسود. اما الالياف السطحية فممتدة الى الاعلى من الهرمين المقدمين الى الجسر ثم الى الخ ويقال لها احياناً القشرة. والالياف الغائرة ممتدة الى الاعلى الى الخ من القائمة الجانبية والقائمة الخلفية للتحاع المستطيل ومن الحزمة الزيتونية. وتختلط بهذه الالياف الياض ناشئة من الخنج فيتكوّن منها الوجه الخفي للساق ويقال للوجه المذكور الغطاء

واما الفصان الخلفيان للخنج فمجبوبان عن النظر بواسطة الوجه العلوي للخنج وجسر فرولوس. فاذا رُفعت هذه الاجزاء ظهر ان النصفين الكرويين منفصلان بواسطة الفرجة الطولية العظيمة الا انه تنجزها الى المقدم المحافة المستديرة للجسم الصلب

الوضع العام للاجزاء التي يتألف منها الخ

عند دخول ساق الخ في النصفين الكرويين تنفرج الساق الواحدة عن الاخرى بحيث يتكون بينهما خلاء يقال له الخلاء بين الساقين. فاذا صعدنا الى الاعلى ولجمت الالياف التي تتألفان منها في كتلتين عظيمتين من الجوهر السنجابي يقال لها السرير البصري والجسم المضلع وذلك من كل جانب. وهما من عقد الدماغ بارزان على هيئة ارتفاعين مستديرين من الجانب العلوي والانسي لكل من الساقين. ويتصل النصفان الكرويان الواحد بالآخر اعلى الكتل المذكورة بواسطة الجسم الصلب فهو المجمع العظيم المستعرض لها. واما الخلاء الواقع بين الوجه السفلي للجسم الصلب والوجه العلوي للعقد والجزاء المحيطة بالخلاء بين الساقين فيكوّن التجويف البطيني العام. ويُقسّم الجزء العلوي من التجويف المذكور الى قسمين بواسطة فاصل عمودي يقال له الفاصل اللامع ها البطينان الجانبيان. والجزء السفلي من التجويف يكوّن البطين الثالث الذي يستطرق الى البطينين الجانبيين من الاعلى الى البطين الرابع من الخلف. والبطين الرابع هو الخلاء الواقع بين التحاع المستطيل والجسر الى المقدم والخنج الى الخلف. والبطين الخامس هو الخلاء الضيق الواقع بين الطبقتين اللتين يتألف منها الفاصل اللامع

مثلث بارز مشغول بتلايف خاصة به يقال انه جزيرة ريل . وهذه التلايف يغطيها جانبها
الفرجة فلا تظهر الا عند الشق

والخلاء المثقوب المقدم موضوع الى الجهة الانسية من فرجة سلقيموس . شكله مثلث يحده من
الامام تليف الفص المقدم واصول العصب الشبي ومن الخلف الامتداد البصري ومن الوحشية
الفص المقدم وبداءة فرجة سلقيموس ومن الانسية يختلط بالصفحة الرمادية فتقاطعه ساق الجسم
الصلب . وسي بالخلاء المثقوب لان فيه ثقباً كثيرة دقيقة لمرور الاوعية الى جوهر الجسم الصلب
والجمع البصري موضوع في الخط المتوسط وراء الصفحة الرمادية وهو ملتقى العصبين
البصريين . ويوجد بين الامتدادين البصريين من الامام وساق الخ من الخلف خلاء معين
الشكل يقال له الخلاء بين الساقين تُشاهد فيه هذه الاجزاء من المقدم الى الخلف : الحدة
الرمادية واتمع والجسم النخاعي والجسمان الابيضان والخلاء المثقوب الخلفي


فالحدبة الرمادية بروز من الجوهـر السنجابي موضوع بين الامتدادين البصريين والجسمين
الابيضين ويكون بعض ارض البطن الثالث وهو امتداد الجوهـر السنجابي لهذا التجويف . وتذهب
منتصف وجهه السفلي زائدة انبوية مخروطية الشكل من جوهر سنجابي طولها نحو خطين متجهه
الى الاسفل والمقدم فترتبط بالفص الخلفي للجسم النخاعي ويقال للزائدة المذكورة القمع . وتستطرق
قناة القمع الى البطن الثالث

والجسم النخاعي كتلة صغيرة وعائية سنجابية اللون مائلة الى الحمرة وزنها من خمس الى عشر
قحبات شكلها بيضي موضوعة في السرج التركي . مؤلفة من فصين مقدمها الاكبر شكله مستطيل
فيه بعض تعبير من الخلف لقبول الفص الخلفي الذي شكله مستدير . بناؤه كبناء الغدد اللاقنية لها
والجسمان الابيضان ويقال لها الحليمان ايضاً كتلتان صغيرتان مستديرتان بيضاويتان
قدر الواحد منهما كالفولة موضوعان الواحد بجانب الاخر وراء الحدبة الرمادية . تكويتها من
الساقين المقدمين للقبوة ولذلك يقال لها احبائناً بصلمتا القبوة . تاليقها في الظاهر من الجوهـر
الابيض وفي الباطن من السنجابي

والخلاء المثقوب الخلفي موضوع بين الجسمين الابيضين من المقدم وجسر قروليموس من الخلف
وساق الخ من الجانبين . يتكون منه الجزء الخلفي لارض البطن الثالث وتمر من ثقبه التي هي
كثيرة ودقيقة اوعية دموية الى السريرين البصريين

وساق الخ حزمتان غليظتان اسطوانيتان من الجوهـر الابيض تنفذان من الحافة المقدمة للجسر
وتصعدان بانفراج الى المقدم والوحشية فتدخلان الجزء السفلي من النصفين الكرويين . طول

شكل ٢٠٢



الفاصلة بين الفصين المقدمين الشريانان الخيان
المقدمان صاعدان نحو الجسم الصلب. ويشاهد في
الطرف الخلفي منها الجزء المقدم المنحني للجسم الصلب
نازلاً الى قاعدة الدماغ

والجسم الصلب ينتهي عند قاعدة الدماغ بحافة
مقعرة متصلة بالحدبة الرمادية الأئنة تتوسط بينهما
طبقة رقيقة من الجواهر السنجاي يقال لها الصفيحة
الرمادية. وتُشاهد الصفيحة المذكورة برفع المجمع
البصري وجذبه الى الخلف. ويذهب من الوجه
السفلي للجسم الصلب من كل من الجانبين حزمة
بيضاء عريضة متجهة الى الخلف والوحشية تنتهي

عند بداية فرجة سلفيوس ويقال للجزمتين المذكورتين ساقا الجسم الصلب. وسياتي وصف هذا

الجسم بالتفصيل في الكلام على الاجزاء الواقعة في باطن الخ

والصفيحة الرمادية طبقة رقيقة من الجواهر السنجاي ممتدة الى الخلف من منتهى الجسم الصلب
اعلى المجمع البصري الى الحدبة الرمادية. وهي امتداد الجواهر السنجاي للخلاء المنتوب المقدم من
كل جانب وتكون الجزء المقدم من الحد السفلي للبطين الثالث

والعصب الشهي يُشاهد مع بصلته على جانب الفرجة الطولية مستقرًا على الوجه السفلي

للفص المقدم

وفرجة سلفيوس تنصل الفص المقدم عن الفص المتوسط ويمرّ فيها الشريان الخي المتوسط.
ويُشاهد عند بداية الفرجة المذكورة حزمة الياف بيضاء توصل الفص المقدم بالمتوسط يقال
لها الحزمة الكلايية. واذا تتبعنا الفرجة الى الوحشية شوهد انها تنقسم الى فرعين يحيطان بخلاء

شكل ٢٠٢ الوجه السفلي للدماغ وهو قاعدته ١ الفص المقدم للنصف الكروي الايمن ٢ الفص المتوسط ٣ الفص
الخلفي الذي يتجه للخلف ٤ النظر الايمن للخلف ٥ الطرف الخلفي للزائدة الدودية السفلي من الخلف ٦ الجرازة ٧ الفرجة
الطولية ٨ العصبان الشيمان والرقم موضع يقرب ارتفاعها البصري ٩ الخلاء المنتوب المقدم الموضوع عند الطرف الانسي
وفرجة سلفيوس التي تحجبها الحافة الانسية للفص المتوسط ١٠ المجمع البصري وقد وضع الرقم على الصفيحة الرمادية بين
انفراج العصبين البصريين من المجمع البصري ١١ الحدبة الرمادية التي يبرز منها القنع ١٢ الجسمان الابيضان ١٣ الخلاء
المنتوب الخلفي الذي يحده من الجانبين الساقان الخيان والعصبان الثالثان ١٤ جسر فروليوس ١٥ احد ساق الخ ١٦ العصب
الخامس بارزا من جانب الجسر. والعصب الصغير الذي يقربه هو الرابع ١٧ الزوج العصبي السادس ١٨ العصب الوجهي
والسمعي ١٩ المرمان المقدمان لتخاع المستطيل. واسفل الرقم تصالب اليانها ٢٠ العصب اللساني البلعوي والرئوي المعدبي
والشوكي الاضافي ٢١ عصب تحت اللسان ٢٢ الاصل المقدم للعصب الشوكي العنقي الاول

وسنابية على التعاقب. وبعض التلافيف ولا سيما ما كان منها بقرب الجسم الصلب مؤلف من ست طبقات. ولا يوجد مشابهة تامة بين التلافيف في جميع الادمغة او تناسب بينها في الجانبين للدماغ الواحد. ولذلك لا يعتبرون الا اربعةً منها تميز نظراً الى جرمها وثباتها في المشاهدة وهي اولاً تلافيف الجسم الصلب ويقال له القبوي ثانياً تلافيف فوق الحجاج ثالثاً تلافيف الفرجة الطولية رابعاً التلافيف الواقعة على الوجه الوحشي للنصف الكروي

واما الفرجات فتغور في الغالب الى نحو قيراط. الا انها تختلف من هذا القبيل في الادمغة بل وفي الدماغ الواحد. واكثرها غوراً ما كان على الوجه الظاهر المحذب للسخ. واكثر الفرجات غوراً واحدة واقعة في الوجه الانسي على مساحة الجسم الصلب حذاء القرن الخلفي للبطين الجانبي

الوجه السفلي للسخ ويقال له القاعدة

يقسم الوجه السفلي لكل من النصفين الكرويين الى ثلاثة فصوص مقدم ومتوسط وخلفي فالفص المقدم مثلث الشكل راسه الى الخلف فيه بعض تقعر ويستقر على الوجه العلوي المحذب لقبوة الحجاج وينفصل عن الفص المتوسط بواسطة فرجة سلفيوس. والفص المتوسط اكثر بروزاً من سابقه يستقر على الحفرة المتوسطة لقاعدة الجمجمة. والفص الخلفي يستقر على الجمجمة وتحدّه من المقدم الحافة المقدمة للسخ

والاجزاء التي تُشاهد على الوجه السفلي للسخ في الخط المتوسط كثيرة تُعدّ من المقدم الى الخلف وهي

الفرجة الطولية	الحدة الرمادية
الجسم الصلب وساقاه	الشمع
الصفحة الرمادية	الجسم النخاعي
العصب الشبي	الجسمان الابيضان
فرجة سلفيوس	الخلاء المثقوب الخلفي
الخلاء المثقوب المقدم	ساقا السخ
المجمع البصري	

اما الفرجة الطولية فتفصل النصفين الكرويين الواحد عن الاخر فصلاً غير كامل. فانها تفصل النصفين المقدمين والنصفين الخلفيين فصلاً كاملاً. واما الجزء المتوسط بينها فمشغول برباط عظيم مستعرض مؤلف من الجوهر الابيض يقال له الجسم الصلب. ويشاهد في الفرجة

وأما الفاصل فيقسم الجسر الى نصفين جانبيين الأانه لا يمتد الى أكثر من نصفه الخلفي . وهو مؤلف من الياف مقدمة خلفية والياف مستعرضة . فالالياف المقدمة الخلفية تنشأ من ارض البطن الرابع ومن الالياف المستعرضة للجسر . والالياف المستعرضة تنشأ من ارض البطن الرابع

الوجه العلوي للخ

الخ في الانسان هو الجزء الاعظم من الدماغ . وجهه العلوي يبضي الشكل اعرض في الخلف منه في المقدم ممدب منتسم الى نصفين جانبيين ايمن وايسر بواسطة الفرجة الطولية العظيمة يقال لها النصفان الكرويان . والفرجة المذكورة ممتدة على جميع طول الخ في الخط المتوسط وتصل في الاسفل الى قاعدة الدماغ من الامام والخلف واما في الوسط فيوجد مجمع واسع مستعرض يوصل النصفين الكرويين الواحد بالآخر هو الجسم الصلب . ويستقر في هذه الفرجة المنجل الخي . ولكل نصف كروي وجه ظاهر ممدب يقابل قبوة الجمجمة . ووجه انسي مسطح ملاصق للنصف المقابل فيتكوّن من الوجهين الانسيين جانبا الفرجة الطولية . ووجه سفلي ويقال له القاعدة غير منتظم الشكل يستقر من المقدم على الحفرتين المقدمة والمتوسطة لقاعدة الجمجمة ومن الخلف على الجمجمة الخيجية

في تلافيف الخ . اذا رُفعت الام الحنونة شوهد ان الوجه الظاهر لكل من النصفين الكرويين مؤلف من ارتفاعات معقدة يقال لها تلافيف منفصلة بعضها عن بعض بواسطة شكل ٢٠٢ فرجات مختلفة الغور . ويتكوّن الوجه الظاهر للتلافيف وجوانب الفرجات وقعرها من الجواهر السنجاي فيقال له هنا الجواهر القشري . واما باطن التلافيف فمكون من الجواهر الابيض وتخلط الياف بيضاء بالجواهر السنجاي الواقع في جوانب الفرجات وقعرها . ويظهر من الترتيب المذكور ان التلافيف في غاية ما يكون من المناسبة لاجل زيادة كمية الجواهر السنجاي في حيز منحصر ولاجل انتشار السطح السنجاي لتنتهي الالياف فيه . الا انه اذا حُقّق النظر في الجواهر القشري السنجاي شوهد انه مؤلف من اربع طبقات طبقتين سنجايتين وطبقتين بيضاويتين . فالطبقة الظاهرة بيضاء مختلفة السماكة والطبقة التي بعدها صفيحة غليظة سنجاية مائلة الى الحمرة ثم طبقة رقيقة بيضاء ثم طبقة رقيقة سنجاية ملاصقة للالياف البيضاء الخاصة بالنصفين الكرويين . وعلى ذلك يكون تاليف الجواهر القشري السنجاي من طبقات بيضاء



شكل ٢٠٢ الجواهر القشري للخ a الجواهر اللي b الطبقة الغائرة من طبقات الجواهر القشري c الطبقة الثانية d الطبقة الثالثة e الطبقة الرابعة وهي السطحية

والجوهـر السنجابي النخاع المستطيل امتداد ما في باطن الحبل وهو موضوع في طرفه السفلي كوضعه في الحبل اي على شكل هلالين متحدين من وجهها المحدب . وما علا ذلك يوجد ترايبب سنجابية في جزئه العلوي موضوعة بين الالياف البيضاء . منها الجسم المسنن الى المقدم ومنها كتل موضوعة في الجزء الخلفي ينشأ منها العصب الاضافي الشوكي والرئوي المعدي واللساني البلعومي وتحت اللسان

وارض البطين الرابع هو الخلاء الواقع بين النخاع المستطيل والنخخ ومولفة من الوجه الخلفي للنخاع المستطيل ويجدها انفراج الهرمين الخلفيين وتنتهي من الاسفل بقلم الكتابة . وما بين انفراج الهرمين الخلفيين يظهر الجوهـر السنجابي للنخاع المستطيل وهو امتداد الجوهـر السنجابي لمجمع الحبل

جسر قروليوس

جسر قروليوس ويقال له الحدة الخفية ايضاً واسطة الاتصال بين اجزاء الدماغ بعضها ببعض وهي الخ من الاعلى والنخاع المستطيل من الاسفل والنخخ من الخلف . وضعه اسفل ساق الخ واعلى النخاع المستطيل وبين النصفين الكرويين للنخخ . وجهه السفلي مكوّن من حزمة الياف بيضاء ممتدة عرضاً بين النصفين الكرويين للنخخ مقوسة على هيئة جسر اعلى النخاع المستطيل وهو بارز مربع الشكل يستقر على التو القاعدي للعظم المؤخري . وعليه في الخط المتوسط ميزاب يستقر فيه الشريان القاعدي . وجهه العلوي يكون بعض ارض البطين الرابع ويضيق من كل من الجانبين فيصير حبلًا غليظاً مستديراً يدخل الى باطن النخخ فهو ساقه المتوسط بناء الجسر من الياف عرضية وطولية يتخللها جوهـر سنجابي . فالالياف العرضية توصل النصفين الكرويين للنخخ الواحد بالآخر فهي مجمعة المستعرض العظيم . وهي موضوعة على شكل طبقتين احدها سطحية والآخرى غائرة . فالسطحية تنشأ من ساق الخ وتذهب رأساً الى الانسية فتتلاقى في الخط المتوسط . والغائرة تقاطع الالياف الطولية الصاعدة من النخاع المستطيل وتضمن جانباً عظيماً من الجوهـر السنجابي بين اليافها . والالياف الطولية للجسر ممتدة اولاً من الجسم الهرمي المقدم فاذا وصلت الى الحافة العليا للجسر نفذت الى ساق الخ وثانياً من الجسم الزيتوني . وهذه الالياف تنقسم في الجسر الى حزمتين تصعد احدها الى الاجسام الرباعية واما الاخرى فتصاحب الياف القائمة الجانبية الى الخ . وثالثاً من الياف من القائمة الجانبية والقائمة الخلفية للحبل وحزمة من الجسم الزيتوني . وهذه الالياف يتخللها كثير من الجوهـر السنجابي وتظهر في ارض البطين الرابع حيث يقال لها الحزم المستديرة ثم تنفذ الى باطن ساق الخ

من المقدم الى الخلف وذلك لكل من النصفين اللذين يتألف منهما النخاع المستطيل فالهرم المقدم حزمة من الالياف البيضاء منفصل عن رفيقه من الجانب الخالف بواسطة الفرجة المقدمة المتوسطة وعن الجسم الزيتوني بواسطة انخفاض خفيف هو امتداد القائمة المقدمة للجل الشوكي . اذا فصل الهرمان من الاسفل شوهد ان اليافها الباطنة تقاطع الا ان التقاطع المذكور لا يقتصر على الياف الهرمين ولكنه يشمل ايضاً الياف الجزء الغائر للقائمتين الجانبيتين من الجل . واما الالياف الظاهرة فلا تقاطع وهي ناشئة من القائمتين المقدمتين للجل ونافذة الى الاعلى من جسر فروليوس . وليس في الهرمين المقدمين شيء من الجوهر السنجابي

والجسم الزيتوني كتلة بارزة بيضية الشكل موضوعة الى الوحشية من الهرم المقدم منفصلة عنه بواسطة ميزاب ضيق وعن الجسر بانخفاض غائر . ولا يمتد الجسم الزيتوني في الاسفل الى مسافة الهرم المقدم بل هو اقصر منه جداً . بناء هذا الجسم في الظاهر من الياف بيضاء اكثرها موضوع طولاً وفي الباطن من جوهر سنجابي يقال له الجسم المسنن تذهب منه الياف بيضاء تجتمع بالياف صاعدة من القائمة المقدمة للجل بعضها الى الوحشية وبعضها الى الخلف من الجسم الزيتوني فتتكون من ذلك حزمة يقال لها الحزمة الزيتونية

والجسم الحبلي اعظم القوائم التي يتألف منها النخاع المستطيل . وهو امتداد القائمة الخلفية للجل الشوكي . شكله مستدير حبلي موضوع بين الجسم الزيتوني الى المقدم والهرم الخلفي الى الخلف منفصل عنها بميزابين ضيقين . وفي صعود الجسمين الحبليين الى الاعلى ينفرجان فينسب من ذلك انفراج الطرف العلوي للنخاع المستطيل ويعينان في تكوين الحدين الجانبيين للبطين الرابع ثم ينفذ كل منهما الى النصف الكروي المخنجي الذي على جانبه فيتكون منه الساق السفلي للمخنج . تأليف الجسم الحبلي في الباطن من جوهر سنجابي وفي الظاهر من الياف ممتدة من القائمة الخلفية للجل وبعض الياف من القائمة الجانبية وحزمة من القائمة المقدمة . اذا دخل الجسر


انقسم الى حزمتين تذهب الوحشية منها الى المخنج وتخلط الانسية بالهرم الخلفي فتصعد الى الخ والهرم الخلفي حزمة رقيقة على هيئة حبل ابيض ضيق موضوع على جانب الفرجة المتوسطة الخلفية منفصل عن الجسم الحبلي بميزاب ضيق . تأليفه من الياف بيضاء فقط هي امتداد القائمة المتوسطة الخلفية للجل . ثم ان الهرمين يكونان في اول الامر متقاربين ثم ينفرجان في الاعلى ويضيقان في الجسمين الحبليين . والجزء العلوي منها يكون الحدين الجانبيين لقلم الكتابة واما الفاصل للنخاع المستطيل فاليااف بيضاء تنشأ اعلى تقاطع الهرمين المقدمين وتجه من الخلف الى المقدم في الخط المتوسط فتقسم النخاع الى نصفين جانبيين

وجسر فرولوس يستقر على الجزء العلوي من التوافقا عدي . وهو واسطة الانصال بين
الاجزاء التي يتألف منها الدماغ فانه يقبل من الاعلى ساقى الخ ومن الجانبين ساقى الخنج ويتصل
من الاسفل بالنخاع المستطيل

والنخاع المستطيل يمتد من الحافة السفلى للجسر الى الجزء العلوي من الحبل الشوكي . وهو
موضوع اسفل الخنج ويستقر على الجزء السفلي من الميزاب القاعدي للعظم الموخري
في ثقل الدماغ . وزن الدماغ في الذكر البالغ على التعديل نحو $49\frac{1}{3}$ اوقية وفي الانثى نحو
٤٤ اوقية . ووزنوا ادمغة ٢٧٨ رجلاً فكان اعلاها ٦٥ اوقية وادناها ٢٤ . ووزنوا ادمغة ١٩١
امراً فكان اعلاها ٥٦ اوقية وادناها ٢١ . ويظهر ان الدماغ ينمو بسرعة عظيمة الى السنة
السابعة ثم ينمو بطيئاً الى الرابعة عشرة وتتهقر سرعة النمو منها الى العشرين ومنها الى الثلاثين ومنها
الى الاربعين اذ يقف النمو . وفي الشينوخة ينقص وزنه نحو اوقية كل عشر سنين . ولا يخفى ما في
كل ذلك من النسبة بين قوة العقل وكمية ثقل الدماغ . وكذلك وجدوا ان ادمغة بعض
المشاهير في العقل تتجاوز ٦٠ اوقية وانها قلما تتجاوز ٢٣ اوقية في البله . والدماغ البشري اعظم
ادمغة الحيوانات الا الفيل والحوت

النخاع المستطيل

النخاع المستطيل هو الجزء العلوي المتعاطف من الحبل الشوكي . يمتد من الحافة العليا للاطلس
الى الحافة السفلى لجسر فرولوس ويتجه بانحراف الى الاسفل والخلف فيكون وجهه المقدم مستقراً
على الميزاب القاعدي للعظم الموخري ووجهه الخلفي داخلاً بين النصفين الكرويين للخنج بحيث
تتكون منه ارض البطنين الرابع . شكله هرمي طرفه الواسع الى الاعلى وطرفه الضيق الى الاسفل
عند انصاليه بالحبل . طوله قيراط وربع وعرضه نحو نصف ذلك . على وجهه شكل ٢٠١
المقدم في الخط المتوسط فرجة تنتهي عند الحافة السفلى للجسر في الثقب الاعور
وعلى وجهه الخلفي فرجة اخرى تمتد في الاعلى الى ارض البطنين الرابع
وهناك تضيع . وهاتان الفرجتان تقسمانه الى نصفين متساويين كل نصف منهما
ينقسم الى اربع قوائم بواسطة ميازيب طولية وجميع ذلك امتداد مثله من
الحبل الشوكي . والقوائم المذكورة هي الهرم المقدم والجسم الزيتوني والجسم الحبلي والهرم الخلفي تعد



شكل ٢٠١ قطع النخاع المستطيل عرضاً عند الجزء السفلي للجسمين الزيتونيين ١ و١ الهرمان المقدمان ٢ الفرجة
المقدمة المتوسطة ٣ الجسم الزيتوني وفي باطنه الجسم المسنن ٤ الجسم الحبلي ٥ الجوهرة السنجابي للجسم الحبلي ٦ الهرمان الخلفيان
٧ ارض البطنين الرابع

الدماغ

الدماغ موضوع في التجويف الجمجمي واقسامه الكبرى اربعة الخ والمخخ وجسر فروليوس والنخاع المستطيل

فالخ هو الجزء الاعظم من الكتلة الدماغية شاغل لمعظم التجويف الجمجمي مستقر على الحفرتين المقدمتين والحفرتين المتوسطتين لقاعدة الجمجمة ومنفصل في الخلف عن المخخ بالخميمة المخيخية. وعند منتصف وجهه السفلي جزء ضيق يذهب بعضه الى المقدم ثم يسير الى الاسفل الى جسر فروليوس ومنه الى النخاع المستطيل ومنه الى النخاع الشوكي فيقال له ساق المخ. والبعض الاخر ينزل من الجزء المذكور الى المخخ فيقال له ساق المخخ. هذا على الجانب الواحد فهما ساقان للخ وساقان للمخخ



والمخخ موضوع في الحفرتين الموخرتين الخلفيتين منفصل عن الوجه السفلي للفصين الخلفيين من الخ بواسطة الخميمة. وله ستة سوق اثنان يصعدان الى الخ واثنان ينزلان الى النخاع المستطيل واثنان يخلطان الى المقدم فيتكوّن منها جسر فروليوس

شكل ٢٠٠ قطع عمودي للدماغ بحيث ينقسم الخ الى نصفين الكرويين والمخخ والنخاع المستطيل الى نصفين جانبيين
 ١ الوجه الانسي للنصف الكروي الايسر ٢ السطح المقطوع للمخخ الذي يناهذ عليه شجرة الحوية ٣ النخاع المستطيل عند اتصاله بالمخ الشوكي ٤ جسر فروليوس الذي نشاهد فيه الباف المرصين المقدمين صاعدة من النخاع المستطيل الى ساق الخ ٥ الجسم المتدمل الذي يغني من المقدم الى الاسفل فينتهي عند قاعدة الدماغ ويستدير من الخلف فيحيط بالقبة ٦ قائمتها المقدّمة التي تنتهي في الجسم الابيض ٧ الجسم الابيض ٨ الفاصل الاعمق ٩ الشفة المتوسطة ١٠ قطع الجمع المتوسط الموضوع في البطن الثالث ١١ قطع الجمع المقدم ١٢ قطع الجمع الخلفي. والجمع المذكور الى يمار الرقم ١٣ الاجسام الرباعية التي تستقر عليها الغدة الصنوبرية ١٤ الغدة الصنوبرية ١٥ قناة سلفيوس المتطرفة بين البطن الثالث والبطن الرابع ١٦ البطن الرابع ١٧ جسر فروليوس ١٨ الساق اليسرى للخخ التي ينشأ منها العصب الثالث ١٩ الحدية الرمادية التي يبرز منها النع وعلى طرفه الغدة النخامية ٢٠ العصب البصري ٢١ العصب الشقي الايسر الذي ينتهي من المقدم على هيئة بصلة

الواقعين في الوجه الباطن للعظم المؤخري فتتضمن هناك الجيبين الجانبيين ومن المقدم بالحافة العليا للجزء المخري من العظم الصدغي فتتضمن هناك الجيبين المخريين العلويين. ويرتبط المنجل الخفي بوجهها العلوي عند الخط المتوسط فيتكون من ملتقاهما الجيب المستقيم. ثالثاً المنجل الخفي وهو زائدة صغيرة من الام الجافية مثلثة الشكل تنحدر بين الفصين الجانبيين ^{للخنج} من الخلف فترتبط من قاعدتها الى الاعلى في الجزء الخفي والسفلي للتحفة ومن الخلف بالخط الصليبي السفلي للعظم المؤخري فتتضمن هناك الجيب المؤخري الخفي

الأم الحنوننة

الام الحنوننة غشاء ليفي لطيف كثير الاوعية التي تاتي من السباتي الباطن والفكري. وهو مؤلف من ضفيرة دموية دقيقة يحياها نسيج خلوي في غاية ما يكون من الدقة. ويحيط بجميع الوجه الظاهر للدماغ ويغوص بين جميع تلافيفه وصفائحه ويستطيل الى الباطن فيكون الشفة المتوسطة والصفائر المشيمية في البطينات. ويظهر ان وظيفتها الخاصة انها مجنعة الاوعية الدموية التي تذهب منها فريعات دقيقة الى باطن الدماغ فتغذيه. قيل ان اعصابه من السيمباتوي ومن العصب الثالث والسادس والوجهي والرئوي المعدي والاضافي الشوكي


العنكبوتية

العنكبوتية غشاء مصلي في غاية ما يكون من الرقة ومنها اسمها محيط بالدماغ وينعكس على الوجه الباطن للام الجافية. وهو كقبة الاغشية المضلطة على شكل كيس مغلق مؤلف من طبقتين جدارية وحشوية. فالطبقة الجدارية تغطي الوجه الباطن للام الجافية وتنعكس على الزوائد التي تنصل النصفين الكرويين والخنج. والطبقة الحشوية محيطة بالدماغ الا انها تنفصل عنه بالام الحنوننة ونسيج خلوي رخو يقال له النسيج تحت العنكبوتية ويمكن اظهار هذه الطبقة بنفخ الهواء بواسطة انبوبة ما بينها وبين الام الحنوننة. فيشاهد انها لا تلتصق بالام الحنوننة في كل مساحتها ولا تغوص في الفرجات الواقعة بين تلافيف الدماغ. ويقال للخلاء الواقع بينها وبين الام الحنوننة الخلاء تحت العنكبوتية. والخلاء المذكور غير متساو في جميع اجزاء الدماغ الا انه واسع عند القاعدة ويشغله سائل صافٍ ملح الطعم يقال له السائل الدماغي الشوكي فائدته انه يقي الدماغ من الصدمات القوية التي قد تصيبه من الخارج. ويوجد ايضاً سائل اخر بين الطبقة الجدارية والطبقة الحشوية الا انه قليل الكمية بالنسبة الى السائل الدماغي الشوكي

الباطن مغطى بكريات سطحية ومبطن بالطبقة الجدارية للعنكبوتية. ويرسل زوائد كثيرة الى التجويف المحجمي فتسند الاجزاء المختلفة للدماغ وتقيها وعند القاعدة يرسل زائدة الى الثقب الاعور ويبطن الميزاب الشهي فتذهب منه زوائد انبوبية محيطة بالحويط الشمية النافذة من الثقوب الغربالية. ومنه زائدة تنفذ الى الحجاج من الفرجة التودية واخر من الثقب البصري فتكون غداً للعصب البصري يصاحبه الى المقلة. وتنصل الصفائح اللينية لهذا الغشاء في بعض المواضع فيتكون من الانفصال المذكور جيوب لمرور الدم الوريدي. وتُشاهد على الوجه العلوي للام الجافية عند الجيب الطولي العلوي اجسام كثيرة بيضاء صغيرة يقال لها اجسام باكينوس تقبلها حفر في الوجه الباطن للجحمة وهي مجهولة الفائدة. شرايينه كثيرة الا ان اكثر توزعها في العظام وهي السحائي المقدم من السباتي الباطن والمتوسط والصغير من الفكي الباطن والخلفي من الموخري والخلفي الثاني من القفري وفرع من البلعومي الصاعد. واورده تصب في الجيوب الاثنان منها يرافقان الشريان السحائي المتوسط وينفذان من الثقب الشوكي

واما زوائد الام الجافية التي تُرسل الى باطن الجحمة ويقال لها الفواصل ايضاً فتلاث وهي اولاً الخيل الخي وهو قوسي الشكل ينحدر عمودياً في الفرجة الطويلة بين النصفين الكرويين وهو ضيق من الامام يرتبط بعرف الديك وواسع من الخلف يرتبط بالوجه العلوي للخيمة المخيخية . حافته العليا محدبة ترتبط بالخط المتوسط للوجه الباطن من الجحمة وتضمن الجيب الطولي العلوي . حافته السفلى سائبة مقعرة متقاربة للجسم الصلب تتضمن الجيب الطولي السفلي . ثانياً الخيمة المخيخية وهي صفيحة من الام الجافية مرتفعة من وسطها نازلة عند محيطها على هيئة الخيمة . وهي تغطي الوجه العلوي للخيل وتسند النصفين الخلفيين للخيل بحيث لا يضغطان الخيل . ترتبط من الخلف بالخطين المستعرضين

شكل ١٩٩



شكل ١٩٩ قطع عمودي للراس لظهور زوائد الام الجافية وبعض اجزاء الدماغ ١ و١ قطع عمودي للراس ٢ الجيب المحجمي ٣ الخيل الخي ٤ ارتباطه بعرف الديك ٥ ارتباطه بما يقابل الدرز السهي ٦ الحافة السفلى المنعرة للخيل الخي ٧ اتصاله بالخيمة المخيخية ٨ الخيمة ٩ ارتباطها بالنسج المحجري للعظم الصدغي ١٠ حافتها المسائبة ١١ تلافيف النصف المقدم اليمين للعز ١٢ الطرف المقدم للجسم الصلب ١٣ الفاصل اللامع ١٤ قطع الجمع المقدم ١٥ الساق المقدم للنبوة ١٦ منتصف النبوة ١٧ طرفها الخلفي الذي يتصل بالجسم الصلب ١٨ الوجه الانسي للدرز البصري ١٩ قطع الجسم المضلع ٢٠ الجدار الباطني البطين الثالث ٢١ قطعة من الام الجافية مقلوبة ٢٢ قطع الشريان السباتي الباطن

الواحدة بالآخرى فمفصل عن ارض الفرجة المتوسطة المقدمة بالمجمع الابيض المقدم وعن ارض الفرجة المتوسطة الخلفية بالمجمع الابيض الخلفي. وقد اختلف المشرحون كثيراً في هذه الايام من جهة سير الالياف في الحبل ونهاية وصولها. الا ان المعلم برون سيكار قد اظهر ان الالياف الحاسية للاصل الخلفي تعبر الى الشطر المخالف ثم تصعد الى الدماغ وان الالياف المحركة للاصل المقدم تصعد رأساً في الشطر الواقع في جهتها الى النخاع المستطيل وهناك تعبر الى الجانب المخالف عند تقاطع الياف الجسدين الهرميين. وبنى المعلم المذكور مذهبه على ثلاثة امتحانات وهي اولاً اذا قُطع شطر من شطري الحبل قطعاً عرضياً في الجهة الظهرية فقد الحيوان قوة الحركة في الجانب المتطوع اسفل خط التقطع وبقي الحس سليماً في الجانب المذكور واما في الجانب المخالف فيفقد الحس وتبقى قوة الحركة سليمة. ثانياً اذا قُطع الشطر المخالف في الجهة العنقية عقيب القطع الاول الظهرية فقد الحس الذي كان بقي اولاً سليماً. ثالثاً اذا قُطع الحبل في الجهة القطنية قطعاً طويلاً اي من الفرجة المقدمة الى الفرجة الخلفية فقد الحيوان جميع الحس في الطرفين السفليين وبقيت قوة الحركة سليمة وذلك لان القطع اصاب الالياف الحسية التي تعبر من الشطر الواحد الى الاخر بواسطة المجمع عند دخولها في الحبل خلافاً للالياف المحركة التي لا تتقاطع الا في الاعلى في النخاع المستطيل. فهذه الامتحانات ظهر المشرحون كيفية سير الالياف التي عجزوا عن ادراكها بالمكروسكوب

في القناة المركزية. هي قناة دقيقة جداً قد لا يُحَقَّق وجودها في البالغين ممتدة على جميع طول الحبل الشوكي مخرقة الجوهر السنجابي للمجمع ومستطرفة من الاعلى عند طرف قلم الكتابة الى ارض البطن الرابع ومن الاسفل الى الخيط الانتهاء. وهي مبطنه بكرات اسطوانية هدية. وليس هذه القناة اهمية الامن حيث كونها بقية التجويف للاسطوانة الاصلية التي يتكوّن منها الحبل الشوكي في الدور الاول للجنين

في اغشية الدماغ

اغشية الدماغ ثلاثة وهي الام الجافية والعنكبوتية والام الحنونية


الأم الجافية

هذا الغشاء غليظ كثيف عديم المرونة يبني البناء مبطن لباطن الجمجمة فيكون سمحاً لها الباطن. وجهه الظاهر خشن ملتصق الصفاقاً شديداً بالوجه الباطن للعظام ولا سيما مقابل الدروز وعند قاعة الجمجمة. وعند حافة الثقب العظيم يصير امتداد الام الجافية الخاصة بالحبل الشوكي. وجهه

على جميع طولِه بواسطة جوهَر عَصَبِي مستعرض يقال له الجمع فالفرجة المقدمة المتوسطة اوسع ولكنها اقل غوراً من الخلفية وتضمن زائدة من الام الحنونة وارضها مكونة من الجمع الابيض المقدم المثقوب باوعية دموية نافذة الى مركز الحبل . والفرجة الخلفية المتوسطة الطف جداً من سابقها وأكثر ظهورها في اعلى الحبل واسفل وتغور الى نحو نصف سماكة الحبل . وتضمن زائدة دقيقة جداً من الام الحنونة وارضها مكونة من طبقة رقيقة من الجوهَر الابيض هي الجمع الابيض الخلفي . واما الفرجات الجانبية فاثنتان من كل جانب وهما الفرجة الجانبية المقدمة والفرجة الجانبية الخلفية . فالاولى منهما وهية تقابل النقط التي تخرج منها الاصول المقدمة للاعصاب الشوكية والثانية فرجة دقيقة غائصة الى الجوهَر السنجابي تقابل مخرج الاصول الخلفية للاعصاب الشوكية

في قوائم الحبل . الفرجات المذكورة تقسم كل شطر من شطري الحبل الى ثلاث قوائم وهي اولاً القائمة المقدمة الواقعة بين الفرجة المتوسطة المقدمة والفرجة الجانبية المقدمة . وهي امتداد الهرم المقدم للنجاع المستطيل ومنها تخرج الاصول المقدمة للاعصاب الشوكية . ثانياً القائمة الجانبية الواقعة بين الفرجة الجانبية المقدمة والفرجة الخلفية وهي امتداد القائمة الجانبية للنجاع المستطيل واعظم القوائم جرماً . ثالثاً القائمة الخلفية الواقعة بين الفرجة المتوسطة الخلفية والفرجة والفرجة الجانبية الخلفية وهي امتداد الجسم الحبل للنجاع المستطيل . وبعض المشرحين يضيفون قائمة رابعة اضافية للسابقة ويسمونها القائمة المتوسطة الخلفية

في بناء الحبل . اذا قُطِع الحبل قطعاً عرضياً شوهد انه مؤلف من جوهَرين ابيض شكل ١٩٨ وسنجابي . فالابيض واقع الى الظاهر ومنه تاليف معظم الحبل . والسنجابي شاغل المركز يُشاهد في القطع العرضي انه على هيئة كتلتين هلاليتين واحدة في كل شطر



جانبي من الحبل . ويتحد الهلالان من وجهها المحدب برباط سنجابي مستعرض يقال له الجمع فيكون تعبيرها مشرفاً الى الوحشية . ولكل هلال قرنان مقدم وخلفي فالخلفي طويل ضيق يقرب من السطح عند الفرجة الجانبية الخلفية . والقرن المقدم قصير غليظ لا يصل الى السطح ولكن الى نقطة اتصال الاصول المقدمة للاعصاب . واما الجمع السنجابي الذي يوصل الكتلتين الهلاليتين

شكل ١٩٨ قطع عرضي للحبل الشوكي بين العصب الثالث والرابع العنقيين ١ الفرجة المقدمة المتوسطة ٢ انحناء يدل على وضع الفرجة الخلفية المتوسطة التي لا تظهر جلياً في هذا الجزء من الحبل ٣ و٤ القائمتان الجانبيتان المتقدمتان ٤ و٥ القائمتان الخلفيتان ٥ القرن المقدم للهلال السنجابي ٦ قرنة الخلفي ٧ الفرجة الجانبية الخلفية التي ينتهي فيها القرن الخلفي ٨ الجمع الذي يربط الهلالين

الى الفرجة المقدمة والفرجة الخلفية وتكون ايضاً غمداً لكل من الخيوط التي تتألف منها الاعصاب الشوكية وغمداً عاماً للاعصاب . ويمتد منها على الخط المتوسط لوجهها المقدم رباط طولي ليفي ورباطان اخران على جانبيها يقال لهما الرباطان المستننان . وعند منتهي الحبل تضيق الام الحنونة وتستديم الى الاسفل على هيئة خيط دقيق طويل يقال له الخيط الانتهائي ينحدر في مركز ذنب الفرس ويختلط بالام الجافية حيث تنسد على مساواة اعلى القناة العجزية . واما بناء الام الحنونة فليفى وعائى ولها اعصاب ناشئة من السيمباتوي والاصول الخلفية للاعصاب الشوكية والرباط المسنن رباط ليفي ضيق ممتد من الام الحنونة واقع الى كل من جانبي الحبل على جميع طوله وفاضل الاصول المقدمة عن الاصول الخلفية للاعصاب الشوكية . حافته الانسية مختلطة بالام الحنونة عند جانب الحبل وحافته الوحشية عليها اسنان مثلثة الشكل تتصل من رؤوسها بالام الجافية عددها نحو عشرين . فائدته ان يحمل الحبل مثبتاً اياه في السائل المحيط به

الحبل الشوكي

الحبل الشوكي ويقال له نخاع الشوكي ايضاً هو الجزء الاسطوانى المستطيل من المركز الدماغى الشوكى الموضوع في القناة الشوكية . طوله غالباً نحو ١٦ او ١٧ اقيراطاً ووزنه اذا تجرد عن اغشيته واعصابه نحو اوقية ونصف فتكون نسبته الى الدماغ كنسبة ١ الى ٢٣ . ويمتد من الثقب العظيم الى الحافة السفلى للفقرة القطنية الاولى فيكون شاعلاً لثلاثي طول القناة الشوكية وينتهي بخيط دقيق من الجوهر السنجاني يقال له الخيط الانتهائى موضوع بين الاعصاب التي يتألف منها ذنب الفرس . هذا في البالغ واما في الجنين فيمتد قبل الشهر الثالث الى قعر القناة العجزية وفي الطفل عند الولادة الى الفقرة الثالثة القطنية والسبب في هذا الاختلاف ان نمو العظام اسرع من نمو الحبل . وينفصل الحبل عن جدران القناة بالاعشية والسائل المار ذكرها . ويشاهد تعاضم في قطره في الجهة العنقية وفي الجهة القطنية . فالتعاضم العلوي يمتد من الفقرة الثالثة العنقية الى الظهريه الاولى وقطره الاعظم من الجانب الى الجانب وذلك يقابل مخرج الاعصاب التي تذهب الى الطرفين العلويين . والتعاضم السفلي واقع مقابل الفقرة الظهرية الاخيرة وقطره الاعظم من المتدم الى الخلف وذلك يقابل مخرج الاعصاب التي تذهب الى الطرفين السفليين . شكله اسطوانى مسطح ويشاهد على وجهه المقدم في الخط المتوسط فرجة طولية يقال لها الفرجة المقدمة المتوسطة وعلى وجهه الخلفى فرجة اخرى تمتد كسابقتها على جميع طول الحبل في الخط المتوسط هي الفرجة الخلفية المتوسطة . وهاتان الفرجتان تقسمان الحبل الى شطرين متساويين يتجدان في الخط المتوسط

اغشية الحبل الشوكي

يكون غمدًا واسعًا حول الحبل. والثاني باطن يقال له الام الحنونه وهو غشاء خلوي وعائي محيط بجميع سطح الحبل وملامس له. والثالث متوسط بينهما يقال له العنكبوتية وهو كيس مصلي يحيط بالحبل وينعكس على الوجه الباطن للام الجافية

فالام الجافية الخاصة بالحبل امتداد الام الجافية المحيطة بالدماع. وهي غمد واسع محيط بالحبل ومنفصل عن الجدران العظمية للقناة الشوكية بواسطة نسيج رخو خلوي دهني وضميرة وريدية. ويرتبط بحيط الثقب العظيم وبالرباط الخلفي المشترك على جميع طول القناة الشوكية بواسطة نسيج ليفي ويمتد في الاسفل الى اعلى العجز وهناك ينسد الا انه ترسل منه زائدة على هيئة حبل دقيق يذهب الى مؤخر العصعص وهناك يختلط بالسحايا. وجهه الباطن املس مغطى بكرات كثيرة الجوانب ويشاهد في كل من جانبيه الفتحات المزروجة لمرور الاصلين لكل من الاعصاب الشوكية وبصاحبها امتداد انبوية من الطبقة اللينية للام الجافية. وهذه الاغداد تصاحب الاعصاب العجزية ايضا فتكون اطول في الاسفل منها في الاعلى. وتختلف الام الجافية الخاصة بالحبل عن المحيطة بالدماع من جهة وجوه وهي اولاً انها لا تلتصق بالجدار العظمي للقناة الشوكية اذ له سحاق خاص به. ثانياً لا ترسل زوائد الى فرجات الحبل ثالثاً لا تنفصل صفائحها اللينية ليتكون منها جيوب. وكل ذلك مما ينافي لما يشاهد في الدماغ كما سيأتي. واما بناء الام الجافية فمن نسيج ايض ليفي تُقاطع الالياف بعضها بعضاً. او عيينها الدموية قليلة ويظهر انها خالية من الاعصاب والعنكبوتية غشاء رقيق مصلي يحيط بظاهر الحبل و منعكس على الوجه الباطن للام الجافية فيلتصق به التصاقاً شديداً ويقال للطبقة المحيطة بالحبل الطبقة المشوية وللطبقة المبطنه للوجه الباطن من الام الجافية الطبقة الجدارية وللخلاء الواقع بينها التجويف العنكبوتي. ولما كانت الطبقة المشوية غمدًا واسعًا حول الحبل تكون خلاء بينهما يقال له الخلاء تحت العنكبوتية وهو عظيم في الجزء السفلي من القناة الشوكية محيط بالاعصاب التي يتكون منها ذنب الفرس. وضمن الخلاء المذكور سائل مصلي يقال له السائل الدماغي الشوكي لانه يستطرق غالباً الى مثله في التجويف البطني العام للجحمة بواسطة فتحة في الطبقة اللينية الخاصة بالحد السفلي للبطين الرابع. وهذا الخلاء والسائل الذي يشغله واقعان بين الطبقة المشوية للعنكبوتية والام الحنونه. ثم ان الطبقة المشوية للعنكبوتية ترسل زوائد انبوية تحيط باصول الاعصاب الى مخرجها من الام الجافية وهناك تختلط بالطبقة الجدارية. ولا يظهر ان للعنكبوتية اوعية او اعصاباً

والام الحنونه امتداد الام الحنونه للدماغ الا انها اغلظ واكثف منها مؤلفة من نسيج ليفي مرتب على شكل حزم طولية. وهي مغطيه لجميع سطح الحبل وملتصقة به التصاقاً شديداً وترسل زوائد

ويقال لنتطة الاتصال بين العصب والمركز المنشأ او الاصل. فان كانت الحزمة المولف منها العصب ناشئة من نقطة واحدة قيل ان منشأ ذلك العصب مفرد وان كان منشأه بجزمتين قيل مزدوج وقد يكون لكل اصل منها وظيفة خاصة به كما في الاعصاب الشوكية. والمنشأ الظاهر للعصب هو نقطة اتصاله بظاهر المركز والمنشأ الباطن هو نقطة اتصاله بالاجزاء الباطنة للمركز التي هي منشأه الحقيقي

واما العصب السيمبباتوي فمكون من الياف انبوية وجلائنية الا ان اليافة الانبوية اصغر حجماً من الياف الاعصاب الدماغية الشوكية. فاكان من فروع سنجاي اللون تغلبت فيه الالياف الجلائنية على الانبوية وما كان منها ابيض فبالعكس. وقد تسير الحبال السنجائية والبيضاء معاً في عصب واحد من غير اختلاط كما يشاهد في الفروع الاستطراقية بين العقد السيمبباتوية والاعصاب الشوكية وفي الحبال الاستطراقية بين العقد نفسها

وظيفة الالياف العصبية سواء كانت من المجموع الدماغية الشوكي او المجموع السيمبباتوي ان تحمل تأثيرات على نوعين. فالاعصاب الحاسة ويقال لها الداخلة تحمل التأثيرات من اطرافها المحيطية الى المراكز العصبية فيشعر العقل على هذه الطريقة بواسطة الدماغ بوجود الاجسام الخارجة. والاعصاب المحركة ويقال لها الخارجة تنقل التأثيرات من المراكز العصبية الى الاجزاء التي تتوزع فيها الاعصاب وفائدة التأثيرات المذكورة ان تسبب الانقباضات العضلية او تفعل على وظائف التغذية والنمو والافراز

المركز الدماغية الشوكي

هذا المركز مؤلف من جزئين عظيمين وهما النخاع الشوكي والدماغ

الحبل الشوكي واغشيته

اذا قصيد اظهار النخاع الشوكي واغشيته تجرد العضلات عن الميزابين الفقريين على جميع طولها ثم ينشر العمود من كل جانب حذاء اصول التوتات المستعرضة من الفقرة العنقية الثالثة الى العجز ثم تفصل الاقواس الفقرية بالازميل

اغشية الحبل الشوكي

الاغشية المحيطة بالحبل الشوكي ثلاثة. احدها ظاهر يقال له الام الجافية وهو غشاء ليفي متين


قسمين عظيمين وهما أولاً اعصاب المجموع الدماغى الشوكى ويقال لها اعصاب الحيوة الحيوانية فانها تنوزع في اعضاء الحس الخاص والجلد والعضلات التي هي الآلات الفاعلة للحركة. وثانياً اعصاب المجموع السيمبانوي او العقدي ويقال لها اعصاب الحيوة الالية فان اكثر توزعها في الاحشاء والوعية الدموية

فالاعصاب الدماغية الشوكية مكوّنة من الياف كثيرة عصبية مضمومة بعضها الى بعض ومحاطة بغمد واحد غشائي. ويقال لحزمة صغيرة من هذه الالياف الاصلية المحاطة بغمد حويل. فان كان العصب صغيراً كان تاليفه من حويل واحد وان كان كبيراً تألف من جملة منها يحيطها غمد واحد عام. ويقال للغمد المحيط بالحويل نيوريلما. ولا يدخل في تأليف الاعصاب الدماغية الشوكية من الالياف الجلاتينية الا ما قلّ جداً فيكاد يكون جميع تكوينها من الالياف الانبوية العصبية. والوعية الدموية التي تنوزع في الاعصاب تنتهي على هيئة صغيرة شعرية دقيقة وضع اوعيتها في الغاب مواز لسير الحبيبات التي يتالف منها العصب

والمعلوم الى الان ان الالياف العصبية تذهب على سير واحد غير متقطع من المركز الى المحيط من غير ان يختلط جوهرها بجوهر الياف اخر ولو انضمت في غمد واحد او توصلت او تفرعت او تضمرت فتبقى كل ليفة اصلية سليمة على حدتها الى النهاية. ويقال للاستطراق الكائن بين بعض الاعصاب تضمر. فتكوّن الضفائر احياناً من الاجذاع الاصلية للاعصاب كالضفائر العنقية والعضدية والتطنية والعجزية وحياناً من الحزيمات الانتهائية كالضفائر التي تتكوّن في محيط الجسد. وكيفية ذلك ان الاعصاب تنقسم أولاً ثم تتحد ثم تنقسم بحيث يحصل من هذا الاتصال والانفصال على التعاقب صغيرة مشوشة التركيب الا انه في كل ذلك لا يقع اختلاط في الالياف الاصلية بل تبقى كل ليفة سليمة الاستقلال

ولكل ليفة عصبية طرفان احدهما مركزي متصل بالمركز العصبي الذي تنشأ منه والثاني محيطي متصل بالانسجة التي يذهب اليها. ويظهر ان منشأ الالياف من المراكز العصبية يكون تارة على شكل عروات وتارة على شكل ان كلما تقاربت الليفة الى الكرية العصبية المركزية فقدت المادة البيضاء وتمدد غمدها الى ان يحيط بالكرية. وطريقة توزيع الاعصاب في المحيط هي ان حزيمات من الالياف العصبية تكوّن في الغالب ضفائر دقيقة اذا قسمت ارسلت الالياف الاصلية الى الاجزاء المجاورة فتواصل تارة على هيئة عروات كما يشاهد في الاذن الباطنة والحبيبات اللسانية والجلدية والنسيج العضلي المخطط. وتوزع تارة على هيئة فربعات دقيقة سائبة متفرعة من ليفة واحدة اصلية كما يشاهد في الشبكية. وتارة على هيئة ضفائر دقيقة كما في البريتون

بالنسبة الى الاول له زوائد كالاذناب بعضها يغيب في النسيج العصبي للمراكز وبعضها يُستنصَى الى الالياف العصبية



واما العقد فمراكز عصبية مستقلة اصغر حجماً واقلّ تشوشاً في البناء من الدماغ متصلة بعضها ببعض وبالمحور الدماغي الشوكي وبالاغصاب في جهات مختلفة. وهي واقعة على الاصل الخلفي لكل من الاغصاب الشوكية وعلى الاصل الخلفي اي الحسي للعصب الخامس الججمي وعلى العصب الوجيه واللساني البلعومي والرئوي المعدي. واما السيمباتوي فجزءه مؤلف منها مضمومة بعضها الى بعض على هيئة خرز السجدة وتوجد ايضاً على فروع هذا العصب في الراس والعنق والصدر والبطن وعند اتصال الفروع السيمباتوية باغصاب المجموع الدماغي الشوكي. اذا قُطعت شوهد انها مؤلفة من مادة سنجامية مائلة الى الحمرة تقاطعها الياف كثيرة بيضاء عصبية. وتختلف كثيراً من جهة الحجم فيكون اكبرها في البطن واصغرهما وهو ما لا يُشاهد الا بالمكروسكوب على الاغصاب التي تتوزع في الاحشاء. وهي محاطة بغلاف هو امتداد غمد الاغصاب يرسل زوائد كثيرة الى باطن العقدة حاملة الوعية الدموية الغذائية. ثم ان بناء جميع العقد واحد نظراً الى الاجزاء الجوهرية فان جميع المراكز العصبية مكونة من جوهر حويصلي عصبي تقاطعه الياف عصبية انبوية وجلاتينية


واما الاغصاب فمجال مستديرة او مسطحة متصلة من الطرف الواحد بالمركز الدماغي الشوكي او العقد ومن الطرف الآخر متوزعة في النسيجة الجسد فهي استطراق بينهما. وتقسّم الاغصاب الى

شکل ١٩٦ كريات نجمية من الجوهر الشجائي للثغاع الشوكي
شکل ١٩٧ كريات نجمية من الثغاع الشوكي والدماغ a جدار الكرية b السائل الذي تتضمنه c مادة ملونة d نواة
e اتصال الجدار بغمد ليفة عصبية f ليفة عصبية

فيظهر من التحليل السابق ان الجوهـر الدماغي مُكوّن من اليومن محلول في الماء ومتحد بمواد دهنية واملاح. واما المواد الدهنية فمعظمها حامض دماغيك وما عداه كولسترين وحامض فسفوريك زيتي واولين ومركرين

في البناء الميكروسكوبي للمجموع العصبي. يتكوّن الجوهـر الليفي العصبي من نوعين من الالياف وها الالياف الانبوية والالياف الجللاتينية. وهذان النوعان يدخلان في تركيب اكثر الاعصاب الا ان الالياف الانبوية تغلب في اعصاب المجموع الدماغي الشوكي والجللاتينية في المجموع السيمباتوي

شكل ١٩٥



فالالياف الانبوية مؤلفة من انايب دقيقة غشائية داخلها الجوهـر العصبي الخاص. والجوهـر المذكور مكوّن من مادتين احدهما شفاقة شاغلة محور الانبوية يقال لها المحور الاسطواني. والثانية محيطة بها بيضاء اللون مظلمة يقال لها المادة البيضاء لشوان. ويُظن ان فائدة المحور الاسطواني حمل القوة العصبية وان فائدة المادة البيضاء حفظ القوة العصبية من التبدد في الاجزاء المجاورة.

ويختلف حجم الانايب فتكون $\frac{1}{2}$ الى $\frac{1}{3}$ جزء من الفيراط في الجذع وفروع الاعصاب ومن $\frac{1}{1000}$ الى $\frac{1}{12}$ في المادة السنجابية للدماغ والنخاع الشوكي

والالياف الجللاتينية يتالف منها معظم جذع المجموع السيمباتوي وفروعه وتدخل ايضاً اكثر اواقل في تاليف اعصاب المجموع الدماغي الشوكي. اذا اجتمع كثير منها كان لونها سنجاياً مائلاً الى الصفرة وهي مسطحة رخوة فيها نوى مستديرة او بيضية متساوية البعد بعضها عن بعض. ويختلف قطرها من $\frac{1}{2}$ الى $\frac{1}{16}$. ويُظن ان هذه الالياف مؤلفة من مادة تقابل المحور الاسطواني في الالياف الانبوية فهي كالياف المذكورة الا انها خالية من الانايب الغشائية والمادة البيضاء لشوان

واما الجوهـر الحويصلي العصبي فيتميز بلونه السنجاوي المائل الى الحمرة وقوامه اللين. ويوجد في الدماغ والنخاع الشوكي والعقد ممتزجاً بالجوهـر الليفي وهو عديم الوجود في الاعصاب على الاطلاق. تاليفه من حويصلات نوية يقال لها الكريات العصبية. وهي على نوعين الاول صغير مستدير الشكل او بيضي اكثره في العقد السيمباتوية والثاني شجي او ذواذنان وهو كبير

شكل ١٩٥ الياف وكريات عصبية ١ الياف عصبية متوازية الوضع ومنتهية على هيئة عروات ٢ ليفة عصبية منتهية على هيئة انتفاخت ٣ ليفة عصبية يشاهد فيها من الظاهر الى الباطن العمود والمادة البيضاء لشوان والمحور الاسطواني ٤ كرية عصبية مستديرة ويشاهد فيها نواة وضمن النواة نوية ٦ كرية ذات اذنان ٧ مواد حبيبية

الفصل السابع

في المجموع العصبي

المجموع العصبي مؤلف أولاً من اعضاء مركزية يتصل بعضها ببعض ويقال لها في الجملة المركز الدماغي الشوكي والمحور وثانياً من العقد السيمباتوية وثالثاً من اعصاب فالمرکز الدماغي الشوكي يتضمن الدماغ والحبل الشوكي والاعصاب التي تنشأ منهما والعقد التي توجد في الاعصاب. وقد سماه المعلم بيشات المجموع العصبي الخاص بالحياة الحيوانية لان الارادة والحس العام والحس الخاص تتعلق به. والمجموع العنقي او السيمباتوي مؤلف من سلسلة مزدوجة عليها عقد يتصل بعضها ببعض بواسطة حبال عصبية. وهي موضوعة الى جانبي العمود الفقري وتنشأ منها اعصاب عليها عقد تذهب الى الاحشاء الواقعة في التجويف الصدري والبطني والحوضي. وميز بيشات هذا المجموع بكونه خاصاً بالحياة الآلية اذ كان عمله متعلقاً بوظائف الحياة الآلية والمجموع العصبي مكوّن من جوهرين متميزين يختلفان في الكثافة واللون والبناء المكرسكوي والتركيب الكيماوي وهما الجوهري الحويصلي العصبي والجوهري اللبني العصبي وكثيراً ما يقال للاول الجوهري السنجابي وللثاني الابيض او اللبي. فيعرف الجوهري السنجابي من لونه السنجابي المائل الى الحمرة وهو في الغالب مجموع في كتل تتخلل البناء اللبني في الدماغ والنخاع الشوكي والعقد. واما الجوهري اللبني العصبي فاكثرو وجوداً من الاول ومنه يتكوّن جانب عظيم من المراكز العصبية وهو الجزء الرئيسي من الاعصاب التي توصل المراكز بالانسجة والاعضاء

وقد حلل المعلم لسين الجوهريين فوجد تركيبها الكيماوي كما يأتي: الجوهري السنجابي الجوهري الابيض

٧٢٤٠	٨٥٤٢	ماء
٩٤٩	٧٤٥	مادة البومينية
١٢٤٩	١٤٠	دهن عديم اللون
٤٩	٢٤٧	دهن احمر
١٤٠	١٤٤	اوسازوم وكتنانات
١٤٢	١٤٢	املاح حامض فصفوريك

جدعاً عند منشاء الأورطي بقاطع القوس ويصعد على القصبة إلى أسفل العنق فيصب في القناة الليمفاوية اليمنى . وأوعية الجانب الأيسر تمتد وتصير جديعاً يصعد على القصبة ويصب في القناة الصدرية

الأوعية الليمفاوية تنشأ من الوجه الخلفي للغدة التيموسية وتنتهي من الجانبين في الوداجيين الباطنين

الأوعية الدرقيّة تنشأ من الفصين الجانبيين وتكوّنان جديعين يصب الأيمن منهما في القناة الليمفاوية اليمنى والأيسر في القناة الصدرية

الأوعية المرئية تكوّن ضفيرة حول المريء وتمرّ من غدد المنصف الخلفي ثم تتواصل بأوعية الرئتين وتنتهي في القناة الصدرية

النازل والمستقيم وينتهي في الغدد القطنية

الغدد والأوعية الليمفاوية للصدر

الغدد الليمفاوية الغائرة للصدر الغدد بين الاضلاع والثديية الباطنة والمنصفية المقدمة والمنصفية الخلفية

فالغدد بين الاضلاع صغيرة موضوعة على جانبي العمود الفقري بقرب المفاصل الضلعية الفقرية وبعضها موضوع بين طبقتي العضلات بين الاضلاع. والغدد الثديية الباطنة موضوعة في الطرف المقدم للاخوية بين الاضلاع بجانب الاوعية الثديية الباطنة. والغدد المنصفية المقدمة موضوعة بعضها الى مقدم التامور على الحجاب وبعضها حول الاوعية الكبيرة عند قاعدة القلب. والغدد المنصفية الخلفية على هيئة سلسلة موضوعة بجانب الاورطي والمريء تتواصل بالغدد القطنية من الاسفل والعنقية الغائرة من الاعلى والغدد بين الاضلاع من الجانبيين

والاوعية الليمفاوية السطحية للصدر تسير على سطح الصدرية الكبيرة والمربعة المنخرقة والظهرية العريضة وتنتهي في الغدد الابطية. واوعية الثدي تسير في سلسلة غدد صغيرة موضوعة بجانب الحافة السفلى للصدرية الكبيرة وتنتهي في الغدد الابطية. واوعيتها الغائرة تقسم الى اوعية بين الاضلاع وثديية باطنة وحجابية. فالاوعية بين الاضلاع تتبع سير الاوعية بين الاضلاع فتسير الى الخلف وتمر من الغدد بين الاضلاع وتنتهي في القناة الصدرية بقرب العمود. والثديية الباطنة تبدأ في جدران البطن وتصعد بجانب الاوعية الثديية الباطنة وتنتهي عند اصل العنق فتصب من اليمين في فروع القناة الليمفاوية اليمنى ومن اليسار في القناة الصدرية. والحجابية بعضها يصب الى المقدم في الاوعية الثديية الباطنة وبعضها الى الخلف في الاوعية المنصفية الخلفية

الغدد الشعبية عشر او اثنتا عشرة غدة موضوعة حول انقسام القصبة الى شعبتين وجذري الرئتين. لونها في البالغ يميل الى السمرة وفي الشينوجة اسود. وكثيراً ما تكون مجلساً للتحاصيل الدرنية واوعية الرئة مجموعان احدهما سطحي موضوع اسفل البليورا على ظاهر الرئة والاخر غائر مرافق للاوعية الدموية على الشعب وكلاهما ينتهيان في الغدد الشعبية عند جذر الرئتين. واما الاوعية الخارجة من هذه الغدد فاثنتان او ثلاثة تصعد على القصبة وتمر من الغدد القصبية والرئية وتنتهي من اليمين في القناة الليمفاوية اليمنى ومن اليسار في القناة الصدرية

واوعية القلب مجموعان سطحي موضوع تحت الطبقة المصلية على ظاهر القلب وغائر موضوع تحت الغشاء المبطن لتجاويفه. وهي تابعة لسير الاوعية الاكليلية. فاوعية الجانب الايمن لتحد وتصير

القوس الصغير للمعدة

الغدد الليمفاوية للمعدة صغيرة الحجم بعضها موضوع على مسير قوسها الصغير والكبير وبعضها بين طبقتي الثرب المعدي الطحالي وبعضها محيط بفتحينها القلبية والبوابية . واوعيتها بعضها سطحي موضوع بين الطبقة المصلية والطبقة العضلية وبعضها غائر موضوع بين الطبقة العضلية والطبقة المخاطية . فمنها ما يسير الى الاعلى وينتهي في غدد القوس الصغير ومنها ما يسير الى الاسفل وينتهي في غدد القوس الكبير ومنها ما يسير الى اليسار وينتهي في الغدد الطحالية ومنها ما يسير الى اليمين وينتهي في الغدد البوابية والغدد الاورطية

الغدد الليمفاوية للطحال موضوعة في فرجه . واوعيتها سطحية موضوعة تحت الطبقة البريتونية وبعضها غائرة موضوعة في جوفه . وهي مرافقة لسير الاوعية الدموية فتمر اولاً من غدد صغيرة ثم تقبل اوعية البنكرياس وتصب اخيراً في القناة الصدرية

المجموع الليمفاوي واللبنى للامعا

الغدد الليمفاوية للامعا الدقيقة موضوعة بين طبقتي المساريقا في الخلايا الواقعة بين تفاريع الاوعية المساريقية العليا ولذلك يقال لها الغدد المساريقية . عددها من مئة الى مئة وخمسين وقدرها من الفولة الى اللوزة . اكثرها واكبرها موضوع بقرب الاثني عشري من الاعلى والاعور من الاسفل

واوعيتها الليمفاوية على نوعين احدهما خاص ببناء المعاء يسير طولاً على وجهه الظاهر تحت الطبقة البريتونية ثم يصب في الغدد المساريقية والاخر يبدأ في الخجل المعوي في جوف الغشاء المخاطي وهو الاوعية اللبنية . والاوعية اللبنية موضوعة في النسيج المتوسط بين الطبقة المخاطية والطبقة العضلية وتسير سيراً حلقياً حول المعاء مرافقة لفروع الاوعية المساريقية ثم تسير بين طبقتي المساريقا وتدخل الغدد المساريقية فاذا خرجت منها اتحدت وكوّنت جذعين كبيرين ان ثلاثة تنتهي في القناة الصدرية

الغدد الليمفاوية للمعاء الغليظ اقل من الغدد المساريقية وموضوعة على جانبه الملتصق في الخلايا المكوّنة من الشرايين القولونية والباسورية قبل تفرعها . واقلها عدداً ما كان بجانب القولون المستعرض

واوعيتها الليمفاوية مقسومة الى مجموعتين احدهما يسير من الاعور والقولون الصاعد والقولون المستعرض ويدخل غدد المعاء الغليظ ثم يصب في الغدد المساريقية . والاخر يسير من القولون

الغدد المحيطة الاوعية الحرقفية الظاهرة وتقبل في سيرها الاوعية الشراسيفية الغائرة والحرقفية المنعكفة والحرقفية القطنية

اوعية المثانة تنشأ من جميع سطحها ثم تتحد باوعية البروستاتا والحويصتين المنويتين وتدخل الغدد الموضوعة بقرب الشريان الحرقفي الباطن

اوعية المستقيم كبيرة الحجم تمر اولاً من غدد صغيرة موضوعة في جداره الوحشي وفي الرباط المستقيمي ثم تدخل الغدد العجزية او القطنية

اوعية الرحم تنقسم الى سطحية موضوعة تحت البريتون وغائرة موضوعة في جوهر الرحم. فاوعية العنق واوعية المهبل تدخل الغدد الحرقفية الباطنة والغدد العجزية. واوعية الجسم والقاع تسير الى الوحشية ضمن الرباطين العريضين ثم تتحد باوعية المبيضين والرباطين العريضين وقناتي فلوبيوس وتصل مع الاوعية المبيضية وتصب في الغدد القطنية. وهي صغيرة في غير مدة الحمل كبيرة جداً فيها

اوعية الخصية بعضها سطحي موضوع على سطح الطبقة الغدية وبعضها غائر في جوهر الخصية والبربخ. يتكوّن منها اجزاء كبيرة تصعد مع الحمل المنوي وترافق الاوعية المنوية الى البطن فتصب في الغدد القطنية

اوعية الكلية تنشأ من ظاهرها وباطنها ثم تتحد في الفرجة وتقبل اوعية الحالب والحفظة اعلى الكلية وتصب في الغدد القطنية

اوعية الكبد تنقسم الى سطحية وغائرة. فالغائرة تسير في القنوات البابية ثم في الحافة اليمنى للثرب الصغير وتدخل الغدد الموضوعة في مسير الشريان الكبدي والثوس الصغير للمعدة. والسطحية الموضوعة على الوجه المحدب للكبد تنقسم الى مجموعتين احدهما يسير من الامام الى الخلف والاخرى من الخلف الى الامام. فالاعوية التي تسير من الامام الى الخلف تتحد وتكوّن اجزاءً ثم تدخل بين طبقتي الرباطين الجانبيين الايمن والايسر والرباط الاكليلي المتوسط بينهما ثم يفتق بعضها الحجاب ويدخل الغدد المنصفية الخلفية وبعضها يدخل الغدد المحيطة بالاجوف السفلي. والاعوية التي تسير من الخلف الى الامام مؤلفة من مجموعتين احدهما يصعد بين طبقتي الرباط العريض ويفتح الحجاب وينتهي في الغدد المنصفية المتقدمة والاخرى تعكف حول الحافة المتقدمة للكبد الى وجهه المتفرع ثم ينتهي في الغدد الواقعة في الحافة اليمنى للثرب الصغير. والاعوية السطحية الموضوعة على الوجه المتفرع للكبد مختلفة السير. فاوعية النصف الايمن تنتهي في الغدد القطنية واوعية الحوصلة المرارية تنتهي في غدد الحافة اليمنى للثرب الصغير واوعية النصف الايسر تنتهي في غدد

القصي المقدم والشظوي والقصي الخلفي فتصعد معها وتنتهي في الغدد المابضية. وأما الأوعية الليمفاوية الخارجة من الغدد المذكورة فترافق الوريد الفخذي وتنتهي في الغدد الأربية الغائرة. والأوعية الخارجة من الغدد الأربية تسير تحت رباط بويارت وتستطرق إلى الغدد المحيطة بالأوعية الحرقفية الظاهرة. والأوعية الغائرة الألوية والوركية تابعة سير الأوعية الدموية وتنتهي في الغدد الألوية والوركية عند الثقب العظيم العجزي الوري

الغدد والأوعية الليمفاوية للحوض والبطن

الغدد الليمفاوية الغائرة التي في الحوض الحرقفية الظاهرة والحرقفية الباطنة والعجزية والتي في البطن القطنية. فالغدد الحرقفية الظاهرة سلسلة غير منتظمة حول الأوعية الحرقفية الظاهرة ثلاث منها موضوعة وراء القوس الفخذي. تتواصل من الأسفل بالغدد الفخذية ومن الأعلى بالقطنية. والحرقفية الباطنة محيطة بالأوعية الحرقفية الباطنة وتقبل أوعية مقابلة لفروع الشريان الحرقفي الباطن وتتواصل بالغدد القطنية. والعجزية موضوعة على الوجه المقدم للعجز وبعضها في الرباط المستقيمي. وهذه الغدد والحرقفية الباطنة تتعاظم في الأمراض الخبيثة للمثانة والمستقيم والرحم. والقطنية كثيرة جداً موضوعة إلى مقدم الفترات القطنية محيطة بالأوعية الحرقفية الأصلية والأورطي والأجوف السفلي وتقبل أوعية الطرفين السفليين والحوض والمخصيتين وبعض الأحشاء البطنية. وأما الأوعية الخارجة من هذه الغدد فتتحد وتكون أجزاء كبيرة تتألف منها ومن الأوعية اللبينة بداءة القناة الصدرية. والغدد المذكورة تتعاظم جداً في الأمراض الخبيثة للمخصيتين والطرفين السفليين فيجب الانتباه لهذا الأمر قبل الأعمال الجراحية التي تتعلق بذلك

والأوعية الليمفاوية للبطن والحوض تقسم إلى سطحية وغائرة

فالأوعية السطحية لجدران البطن والحوض تابعة سير الأوعية الدموية السطحية فينتهي بعضها في الغدد الأربية السطحية العليا وبعضها في الحرقفية الظاهرة وبعضها في القطنية. وأوعية القسم الألوي تنتهي في الغدد الأربية السطحية. وأوعية الصفن والعجان تتبع سير الأوعية الدموية الحرقفية الظاهرة وتنتهي في الغدد الأربية السطحية. وأوعية الفصيب موضوعة على جانبيه وظهره وتنتهي في الغدد الأربية السطحية العليا. وأما أوعيته الغائرة فتنتهي في الغدد الحرقفية الباطنة

والأوعية الغائرة للحوض والبطن تابعة سير الشرايين الرئيسية. فالخاصة منها بجدران الحوض تتبع الشريان الألوي والوركي والساد ثم الحرقفي الباطن فتتحد أخيراً بالأوعية الليمفاوية القطنية. وأما الأوعية الخارجة من الغدد الأربية فتدخل الحوض أسفل رباط بويارت وتمر من سلسلة

تقسم الى مجموعتين علوي موضوع بجانب رباط بويرارت يقبل اوعية جلد الصفن والقضيب وجدران البطن والعجان والقسم الالوي. وسفلي محيط بالفتحة الصافية للنافذة العريضة حول منتهي الوريد الصافن الانسي يقبل الاعوية الليمفاوية للطرف السفلي. والغدد المذكورة تتعاضد في الامراض التي تتعلق بالاجزاء التي تنشأ منها اوعيتها الداخلة. فان كان المرض في القضيب او الصفن او الشفرين او العجان واسفل البطن او القسم الالوي تعاضدت الغدد العليا وان كان في الطرف السفلي تعاضدت الغدد السفلي

والغدد الغائرة القصبية المقدمة والمابضية والاربية الغائرة والالوية والوركية. فالغدة القصبية المقدمة اذا وجدت تكون موضوعة بجانب الشريان القصي المقدم في القسم العلوي للساق على الغشاء بين العظمين. والغدد المابضية اربع او خمس صغيرة الحجم محيطت بالاعوية المابضية غائصة في النسيج الخلوي ودهن الخلاء المابضي. والغدد الاربية الغائرة موضوعة اسفل النافذة الغائرة حول الشريان والوريد الفخذيين. وهي صغيرة الحجم وتتواصل بالغدد الاربية السطحية بواسطة الفتحة الصافية. والغدد الالوية موضوعة اعلى العضلة الهرمية والوركية اسفلها مستقرة على الاعوية الخارجة من الثقب العظيم العجزي الوريكي

والاعوية الليمفاوية للطرف السفلي مقسومة الى سطحية وغائرة

فالاعوية السطحية موضوعة بين الجلد والنافذة السطحية وتقسم الى مجموعتين انسي تابع لسير الوريد الصافن الانسي ووحشي تابع لسير الوريد الصافن الوحشي. فالاعوية الانسية اكثر من الوحشية تبدأ من الجانب الانسي للقدم وظهره ويسير بعضها قدماً الكعب الانسي وبعضها خلفه ثم تصعد الى الساق مع الوريد الصافن الانسي وتنعكف معه وراء التواء القصي لعظم الفخذ فتصاحبه الى الاربية وينتهي في الغدد الاربية المحيطة بالفتحة الصافية. واما الاعوية الخارجة من الغدد المذكورة فبعضها يثقب النافذة الغربالية وغمد الاعوية الفخذية وينتهي في غدة واقعة في القناة الفخذية فيحصل من ذلك استطراق بين اوعية الطرف السفلي واعوية الجذع الليمفاوية وبعضها يثقب النافذة العريضة وينتهي في الغدد الاربية الغائرة. والاعوية الوحشية تنشأ من الجانب الوحشي للقدم وتصعد الى مقدم الساق فاذا صارت الى اسفل الركبة قاطعت القصبية من الوحشية الى الانسية واتحدت بالاعوية الانسية. وبعضها يسير وراء الكعب الوحشي ويصاحب الوريد الصافن الوحشي على موخر الساق وينتهي في الغدد المابضية

والاعوية الغائرة قليلة العدد تصاحب الشرايين الغائرة وهي اثنان او ثلاثة لكل من الشريان

الغدد والأوعية الليمفاوية للطرف العلوي

تقسم غدد الطرف العلوي الى سطحية وغائرة. فالغدد السطحية قليلة العدد صغيرة الحجم ربما وُجد منها اثنان او ثلاث الى مقدم المرفق وواحدة او اثنان اعلى التو اللامي الانسي للعضد بقرب الوريد الباسليقي. والغدد الغائرة قليلة العدد ايضاً ربما شوهدت في مسير الأوعية الكعبرية والزندية. ومنها سلسلة غدد صغيرة سائرة الى الجانب الانسي للشريان العضدي

والغدد الابطنية كبيرة الحجم عددها غالباً من عشر الى اثني عشرة. بعضها موضوع على هيئة سلسلة محيطة بالأوعية الابطنية غائصة في نسج خلوي رخو تقبل اوعية العضد. وبعضها منتشر في نسج الابط الخلوي. وما بقي مصنف على هيئة سلسلتين احدهما سائرة بجانب الحافة السفلى للصدرية الكبيرة حتى الثدي فتقبل اوعية مقدم الصدر والثدي والاخرى سائرة بجانب الحافة السفلى لجدار الابط الموخر فتقبل اوعية جلد الظهر. ولذلك يشاهد تعاظم الغدد الابطنية في الامراض الخبيثة والسلع وغيرها التي تصيب الكتف واعلى الظهر ومقدم الصدر والثدي والبطن والطرف العلوي

والأوعية الليمفاوية السطحية للطرف العلوي تنشأ من جلد اليد وتسير الى الساعد فتتقسم الى مجموعتين انسي يصاحب الوريد الزندي وفروعه الى ثنية المرفق ثم الوريد الباسليقي الى الابط حيث تتحد بالأوعية الغائرة وتصب في الغدد الابطنية. ووحشي يرافق الوريد الكعبري وفروعه الى ثنية المرفق وهناك اكثرها تتحد بالمجموع الانسي وبعضها يرافق الوريد الراسي في الجانب الوحشي للعضد فنهنا ما يقاطع العضلة ذات الراسين وينتهي في الغدد الابطنية ومنها واحد او اثنان يبقى سائراً مع الوريد الراسي بين الصدرية الكبيرة والذالية وينتهي في الغدد تحت الترقوة والأوعية الغائرة للطرف العلوي مرافقة للشرايين فتكون مولفة في الساعد من ثلاثة مجاميع مرافقة للشريان الكعبري والزندي وبين العظمين. وفي سيرها الى الاعلى تنواصل بالأوعية السطحية وتر من الغدد التي في مسيرها ثم تدخل الغدد الابطنية وتحت الترقوة وتنتهي عند اصل العنق من اليسار في القناة الصدرية ومن اليمين في القناة الليمفاوية اليمينية

الغدد والأوعية الليمفاوية للطرف السفلي

الغدد الليمفاوية للطرف السفلي تنقسم الى مجموعتين سطحي محصور في التسم الاربي وغائر فالغدد الاربية السطحية موضوعة تحت الجلد كبيرة الحجم وعددها من ثمان الى عشر غدد.

ومتسومة الى مؤخرية وضعها في مؤخر الراس عند ارتباط العضلة المؤخرية الجبهية واذنية خلفية وضعها بقرب الطرف العلوي للقضية الحلمية. والغدد السطحية للوجه اكثر عدداً من غدد الراس وتنقسم الى نكفية بعضها سطحي وبعضها غائر وزوجية موضوعة تحت القوس الزوجي وفيه موضوعة على سطح المبوقة وتحت الفك وهي اكبرها موضوعة تحت جسم الفك السفلي


والاوعية الليمفاوية السطحية للرأس تنقسم الى مقدمة وخلفية. فالمقدمة مصاحبة لسير الشريان الصدغي الى مقدم الاذن تسير الى الغدد الليمفاوية النكفية ومنها الى غدد العنق. والخلفية مصاحبة لسير الشريان المؤخري فتسير اولاً الى الغدد المؤخرية والاذنية الخلفية ومنها الى الغدد العنقية. والاوعية الغائرة للغدة تنقسم الى سحائية ومخية. فالسحائية تصاحب الشرايين السحائية فتخرج من ثقب في قاعدة الجمجمة وتحدد بالغدد الليمفاوية الغائرة للعنق. والمخية موضوعة بين العنكبوتية والام الحنونة وتنتهي في الغدد الغائرة للعنق

والاوعية السطحية للوجه اكثر عدداً من اوعية الراس. تبدأ من جميع سطحه ونقاطع الوجه بانحراف مصاحبة للوريد الوجهي ثم تخترق الغدد الفمية موضوعة على سطح المبوقة وتنتهي في الغدد الليمفاوية تحت الفك التي تقبل اوعية الشفتين. والاوعية الغائرة للوجه ناشئة من الغشاء المخامي للانف والغشاء المخاطي للحم والبلعوم تصاحب فروع الشريان الفكي الباطن وتنتهي في الغدد الغائرة النكفية والعنقية

والغدد الليمفاوية للعنق تنقسم الى سطحية وغائرة. فالغدد العنقية السطحية بعضها موضوعة بين العضلة الجبلية والقضية الحلمية على مسير الوريد الوداجي الظاهر واكثرها في المثلث الخلفي للعنق الواقع بين الترقوة والقضية الحلمية والمربعة المنخرقة. ومنها عدد قليل صغيرة الحجم الى مقدم الخنجره وجانبية. والغدد العنقية الغائرة كثيرة العدد كبيرة الحجم موضوعة على هيئة سلسلة غير منقطعة بجانب غدد الشريان السباتي ممتدة من قاعدة الجمجمة الى التجويف الصدري فتتواصل بالغدد الصدرية

والاوعية العنقية السطحية والغائرة ممتدة من اوعية الراس والوجه وتخترق غدد السلسلة الموضوعة بجانب غدد السباتي فتتصل بها اوعية البلعوم والمرئ والخنجره والقصبه والغدة الدرقية. وعند اسفل العنق تقبل بعض اوعية ليمفاوية من الصدر وتحدد فتصير جذعاً واحداً يصب من اليسار في القناة الصدرية ومن اليمين في القناة الليمفاوية اليمنى

شكل ١٩٤



قسامين او اكثر يتحدان في الاعلى وقد تنقسم في جزءها العلوي الى فرعين ينتهي احدهما في الوريد تحت الترقوة في الايسر والاخر في اليمين مع القناة الليمفاوية . ولها صمامات كثيرة ولا سيما في جزءها العلوي ولها صمامان عند منتهيها تغيرها متجه نحو الوريد فيمنعان دخول الدم الوريدي اليها . فروعها . تقبل القناة الصدرية وهي في البطن عند مبدأها اربعة او خمسة اجزاء كبيرة من الغدد الليمفاوية البطنية وجذع الاوعية اللبنية . وتقبل في الصدر اوعية النصف الايسر للجدار الصدري واوعية الغدد القصية والغدد بين الاضلاع واوعية الرئة اليسرى والجانب الايسر للقلب والقصبية والمرئ . وعند منتهيها اوعية الجانب الايسر للراس والعنق واوعية الطرف العلوي الايسر . بناؤها من ثلاث طبقات ظاهرة ومتوسطة وباطنة

والقناة الليمفاوية اليمينية جذع قصير طوله نحو قيراط وقطره من خط الى خط ونصف يقبل الليمفا من الجانب الايمن للراس والعنق ومن الطرف العلوي الايمن والجانب الايمن للجدار الصدري والرئة اليمنى والجانب الايمن للقلب والوجه المحذب ابي العلوي

للكبد . وينتهي عند زاوية اتصال الوريد تحت الترقوة الايمن بالوداجي الباطن الايمن وله عند مصبه صمامان هلاليان يعارضان دخول الدم الوريدي الى القناة

الغدد والأوعية الليمفاوية للراس والعنق

الغدد الليمفاوية السطحية للراس صغيرة الحجم قليلة العدد منحصرة في القسم الخاني

شكل ١٩٤ سير ومنتهى القناة الصدرية ١ قوس الاورطي ٢ الاورطي الصدري ٣ الاورطي البطني وقد قُطعت فروعها الرئيسة عند منتهيها ٤ الشريان اللام ٥ منقسماً الى السباتي الايمن وتحت الترقوة الايمن ٥ السباتي الايسر ٦ تحت الترقوة الايسر ٧ الوريد الاجوف العلوي ٨ الوريدان اللذان يتكوّن من اتحادها الاجوف العلوي ٩ نقطة اتصال الوريد الوداجي الباطن بالوريد تحت الترقوة بحيث يتكوّن من ذلك الوريد اللام ١٠ الوريد النزد الاكبر ١١ مصب الوريد النزد الاصغر في الاكبر ١٢ الحاصل الكيلوسي الذي يقبل اجزاءاً ليمفاوية ١٣ القناة الصدرية التي تنقسم الى فرعين هذا منتصف الفقرات الظهرية يتحدان بعد ذلك . واما سير القناة وراء قوس الاورطي فيشار اليه بخط منقط ١٤ انعكاس القناة عند اصل العنق حيث تقبل فروعاً ليمفاوية قبل مصبها في الوريد تحت الترقوة الايسر عند اتحاد الوداجي الباطن ١٥ منتهى القناة الليمفاوية اليمينية

الأورطي والأجوف السفلي والأوعية الحرقفية وفي المنصف المقدم والخلفي. شكلها مسطح بيضي أو مستدير وجرمها من حبة صغيرة إلى اللوزة ولونها إذا قُطعت سنجابي مائل إلى الحمرة. تاليف الغدة منها من غلاف خلوي يكون محفظة لها وترسل منه زوائد إلى باطنها على هيئة فواصل. وتشغل الخلايا الواقعة بين الفواصل المذكورة نحو الظاهر اجسام صغيرة مستديرة ونحو الباطن مادة لبية سنجابية اللون. ويظن ان في باطن هذه الخلايا يحدث تغيير في الليمفا والكيلوس بوجهها للامتزاج بالدم. وطريقة دخول الأوعية الغدة وخرجها منها ان الوعاء الليمفاوي أو الكيلوسي اذا قارب الغدة انقسم الى جملة فروع يقال لها الأوعية الداخلة. وعند دخولها الغدة تتصل طبقتها الظاهرة بالغلاف المحفظي للغدة ثم تتفرع وتسير سيراً متعرجاً في جوفها وتتفهم فتكون صغيرة. وتحد الأوعية التي تتألف منها الصغيرة فتكون فرعاً أو اثنين يخرجان من الغدة فتعود اليها طبقتها الظاهرة ويقال لها الأوعية الخارجة

جميع الأوعية الليمفاوية تصب في جذعين هما القناة الصدرية والقناة الليمفاوية اليمنى. فالقناة الليمفاوية اليمنى تجمع السائل الليمفاوي من الجانب الأيمن للراس والعنق والصدر والرئة اليمنى والجانب الأيمن للقلب والوجه المحذب للكبد. والقناة الصدرية تجمع الليمفا ما بقي من الجسد والكيلوس من الأمعاء

القناة الصدرية والقناة الليمفاوية اليمنى

القناة الصدرية تنقل الكيلوس ومعظم الليمفا إلى الوريد تحت الترقوة الأيسر عند اتصاله بالوريد الوداجي الباطن الأيسر. طولها نحو عشرين قيراطاً في البالغ ممتدة من الفقرة القطنية الثانية إلى أصل العنق. تبدأ في البطن على هيئة انتفاخ مثلث الشكل هو الحاصل الكيلوسي الموضوع إلى مقدم الفقرة القطنية الثانية إلى يمين الأورطي ومؤخره وبجانب الساق اليمنى للحجاب. وتصل إلى التجويف الصدري من الفتحة الأورطية للحجاب فيكون وضعها حيثئذ في المنصف الخلفي إلى مقدم العمود الفقري بين الأورطي والوريد الفرد. ثم تميل إلى اليسار مقابل الفقرة الظهرية الرابعة وتصل وراء القوس الأورطي إلى يسار المريء خلف القسم الأول للوريد تحت الترقوة الأيسر فتنفذ من الفتحة العليا للتجويف الصدري. ثم تنعكف إلى الأسفل إلى مقدم الأضغعية المتقدمة فتكون قوساً يصب بقرب زاوية اتصال الوريد الوداجي الباطن الأيسر بالوريد تحت الترقوة الأيسر. قدر القناة الصدرية عند مبدأها كريشة الأوز إلا أنها تضيق كثيراً في منتصف الصدر ثم تتمدد قبل منتهيها. وهي متعرجة السير وكثيراً ما تنقسم نحو منتصفها إلى

الشعرية تخلل جوهر الانسجة وترسل فروعاً صغيرة ذاهبة الى غدة بالقرب منها او الى جذع ليمفاوي . والغائرة اقل عدداً واكبر حجماً من السطحية وتصاحب الاوعية الدموية الغائرة . كيفية منشأها غير معلومة الا انه يظن انها كالاعوية السطحية . والاعوية الليمفاوية على العموم اكثر عدداً من الاوردة الا انها اصغر وتنفم بواسطة اوعية قطرها كقطر الاوعية التي في توصلها وانصالها بعضها ببعض لا يزيد قطرها اتساعاً وذلك من الصفات الخاصة بالاعوية الليمفاوية تأليف الاعوية الليمفاوية كالشرايين والاوردة من ثلاث طبقات ظاهرة ومتوسطة وباطنة . فالظاهرة خلوية ليفية مكونة من نسيج خلوي تخلطه الياف عضلية طويلة الوضع . وهي رقيقة متينة توصل الوعاء بالانسجة المجاورة وتفي الطبقتين الباقيتين . والمتوسطة عضلية مكونة من الياف عضلية مستعرضة او حلقية الوضع . والباطنة قشرية مكونة من غشاء اساسي تغطي كريات سطحية مستطيلة نووية . والاعوية الليمفاوية اوعية غذائية تتوزع في طبقتها الظاهرة والمتوسطة والاعوية الليمفاوية صمامات كثيرة هلالية الشكل حافتها الخدبة متصلة بجدار الوعاء وحافتها

شكل ١٩٢



المقعرة سائبة موضوعة غالباً اثنين اثنين الواحد مقابل الاخر ومساوله في الجرم . ويمتد جدار الوعاء اعلى اتصال الصمام به على هيئة جيب فينشأ من ذلك المنظر المعقد الخاص بالاعوية الليمفاوية . وتتشني الصمامات نحو مجرى السيل الليمفاوي فاذا تتهقر تمددت وعارضت رجوعه الى الوراء . اكثر وجودها بقرب الغدد الليمفاوية والعنق والطرفين العلويين والغدد الليمفاوية اجسام صغيرة غدية البناء موضوعة في اثناء سير الاوعية الليمفاوية والبنية في العنق والوجه انظاها للراس وفي الابط ومقدم المرفق من الطرف العلوي وفي الاربية والخلعاء المابضي من الطرف السفلي وفي المساريقا ويابناب

شكل ١٩٢ غدة واعوية ليمفاوية A غدة من غدد الاربية الليمفاوية محتوية بالزريق B وعاء ليمفاوي داخل الى الغدة من الطرف السفلي . وقربها اوعية اخرى مثله B وعاء ليمفاوي خارج من الغدة وقربها اوعية مثلها B وعاء من الاوعية الليمفاوية السطحية للغدة C احد الاوعية الليمفاوية الندية مفتوحاً فتحاً طويلاً لاظهار الصمامات التي في باطنه C جيب واقع بين ثنية الصمام وجدار الوعاء d وجه احدى قطعي الصمام مشنية نحو مجرى السيل e حافتها الهلالية الخدبة المتصلة بجدار الوعاء


الفصل السادس

في الاوعية والغدد الليمفاوية

تسمى هذه الاوعية بالليمفاوية نسبة الى سائل في باطنها يقال له الليمفا وهي كلمة يونانية معناها الماء. وتسمى ايضاً بالماصة لانها تمتص مواد معلومة من الجسد وتحملها الى الدورة الدموية. ويشتمل المجموع الليمفاوي على الاوعية اللبئية امي الكيلوسية التي تُعدُّ اوعية ليمفاوية للعا الدقيق ولا تختلف عن الاوعية الليمفاوية العامة الا من حيث انها تحمل سائلاً لبني اللون مدة الهضم وتنقله الى الدم بواسطة القناة الصدرية والسائل المذكور هو الكيلوس

الاعوية الليمفاوية دقيقة على غاية ما يكون من اللطف جدرانها شفافة بحيث يشاهد منها السائل الذي في باطنها وقلماً يختلف حجمها. وهي معقدة المنظر كالحبوب المنظومة في سلك السبجة وذلك ناشئ عن وجود صمامات في باطنها. ومدة سيرها تنقسم كثيراً انقساماً مثنوياً فاذا بلغت الغدد الليمفاوية التي تمر منها انقسمت الى جملة فروع صغيرة. وتشاهد في جميع انسجة واعضاء الجسد ما خلا الدماغ والحبل الشوكي والمقلة والغضاريف والاورام واغشية البيضة والمشيمة والحبل السري والاطافر والبشرة والشعر. واختلفوا من جهة وجودها في جوهر العظم

نقسم الاوعية الليمفاوية الى سطحية وغائرة. فالسطحية التي على ظاهر الجسد موضوعة تحت الجلد مصاحبة للاوردة السطحية وتنب اللفافة الغائرة فتتحد بالاعوية الليمفاوية شكل ١٩٢ الغائرة. والاعوية الليمفاوية السطحية التي في باطن الجسد موضوعة في النسيج الخلوي الواقع تحت الغشاء المخاطي في المسالك الهوائية والغذائية والتناسلية البولية وفي النسيج الخلوي الواقع تحت الغشاء المصلي في الاعضاء المغطاة به. قيل انها تنشأ على هيئة ضفائر حشكة اكبر من الضفائر



شكل ١٩٢ اوعية ليمفاوية من جلد الثدي مخنونة a ضفيرة سطحية b ضفيرة اغور من سابقها c وعاء ليمفاوي سائراً نحو الغدد الابطية

اليسرى غير أنه في أكثر الأحوال يتحد وريد الفص المتوسط للرئة اليمنى بوريد الفص العلوي
 فيكون اثنان لكل جانب يصب كل واحد منها على حدته في الأذنين اليسرى. وقد يحصل بعض
 خلل في هذا الترتيب. وأما وضعها بالنسبة إلى الأجزاء المجاورة لها فإن فروع الشريان الرئوي
 إلى المقدم ثم الشعب الرئوية ثم الأوردة الرئوية إلى الخلف هذا في باطن الرئة. وأما عند جذر
 الرئة فالأوردة إلى المقدم ثم الشريان ثم الشعب إلى الخلف. والأوردة المذكورة إذا
 دخلت التامور تغطي وجهها المقدم بطبقة مصلية منه وسار الوريدان الأيمنان
 وراء الأذنين اليمنى والأورطي الصاعد والأيسران إلى مقدم
 الأورطي الصدري مصاحباً للشريان الرئوي
 الأيسر

فالوريد القلبي العظيم يبدأ عند راس القلب ويصعد في الميزاب المقدم بين البطينين الى قاعدة البطينين ثم ينحني الى الجانب الأيسر حول الميزاب الذي بين الأذنين اليسرى والبطين الأيسر الى ان يصل الى مؤخر القلب فيصب في الجيب الأكليلي وله عند فمحه مصبه صامان . ويقبل الوريد القلبي الخلفي وفروعاً من الأذنين اليسرى والبطين الأيسر ولجميع هذه الفروع صامات

والوريد القلبي الخلفي يبدأ عند راس القلب بفروع متواصلة بفروع سابقه ويصعد في الخلفي بين الميزاب البطينين الى قاعدة القلب وينتهي في الجيب الأكليلي ولفمحه صام . ويقبل فروعاً من الوجه الخلفي للبطينين

والأوردة القلبية المقدمة ثلاثة واربعة فروع صغيرة تجمع الدم من الوجه المقدم للبطين الأيمن ويصب كل منها على حده في الجزء السفلي للأذنين اليمنى . ومن هذه الفروع فرع عظيم يسير على الحافة اليمنى للقلب ويقال له وريد جالينوس

وأوردة تيمبسيوس عديدة دقيقة ترجع الدم من الجوهر العضلي للقلب رأساً بدون ان يدخل المجرى الوريدي فانها تصب بفمحات دقيقة جداً في الوجه الباطن للأذنين اليمنى وأما الجيب الأكليلي فيجزئ من الوريد القلبي العظيم موضوع في القسم الخلفي للميزاب الذي بين الأذنين اليسرى والبطين الأيسر . طوله نحو قيراط كثير التمدد تغطيه الألياف العضلية للأذنين اليسرى . ويقبل الوريد القلبي العظيم والوريد القلبي الخلفي وينتهي في الأذنين اليمنى بين الأجوف السفلي والفتحة الأذينية البطينية . وله عند مصبه صام مكون من ثنية هلالية من الغشاء المبطن للقلب يقال له الصمام الأكليلي ولجميع الفروع التي تصب فيه صامات

الأوردة الرئوية

خدمة هذه الأوردة ان ترد الدم من الرئتين الى الأذنين اليسرى . وهي اربعة اثنان لكل رئة وتختلف عن باقي الأوردة من جملة وجوه وهي أولا انها تحمل دمًا شريانيًا لا وريديًا . ثانياً انها خالية من الصامات . ثالثاً ان سعتها لا تزيد عن سعة الشرايين التي تصاحبها إلا بما قل . رابعاً تصاحب الشرايين مفردة لا مزدوجة . وتبدأ بشبكة شعرية منتشرة على جدران الخلايا الشعبية حيث تكون امتداد تفاريع الشريان الرئوي ثم تتحد فتصير جذعاً واحداً لكل فصيص فاذا اتحدت الاجزاء المذكورة صارت خمسة اوردة وريد لكل فص اي ثلاثة للرئة اليمنى واثنين

الطحالي. وفروعه الباسورية تنفم بفروع الحرقفي الباطن فيتكوّن من ذلك اتصال بين المجموع الباي والمجموع الوريدي العام

والوريد المساريقي العلوي يجمع الدم من الامعاء الدقيقة والاعور والجزء الصاعد والجزء المستعرض من القولون تبعاً لتفريع الشريان المساريقي العلوي. وتتخذ الفروع المذكورة وتصير جذعاً واحداً كبيراً يصعد مع الشريان المقابل له ويسير الى مقدم الجزء المستعرض للاثني عشري ويتحد بالوريد الطحالي وراء الحافة العليا للبنكرياس فيتكوّن من اتحادها الوريد الباي

والوريد الطحالي يبدأ بنخسة اوستة فروع كبيرة تجمع الدم من جوه الطحال. فاذا اتحدت وصارت جذعاً واحداً اتجه من اليسار الى اليمين وراء الحافة العليا للبنكرياس واتحد عند طرفه العظيم بالوريد المساريقي العلوي على زاوية قائمة فيتكوّن من ذلك الوريد الباي. ويقبل هذا الوريد في سيره الوريد المساريقي السفلي والفروع الدقيقة من الطرف الايسر للمعدة والوريد المعدي الثربي الايسر والبنكرياسي الاثني عشري وفروعاً من البنكرياس

والوريد المعدي صغير يرافق سير الشريان المعدي من اليسار الى اليمين على حافة القوس الصغير للمعدة وينتهي في الوريد الباي

والوريد الباي مكوّن من اتحاد الوريد المساريقي العلوي بالطحالي الى مقدم الاجوف السفلي وراء الطرف العظيم للبنكرياس. ينفذ من الحافة اليمنى للثرب الصغير ويصعد الى الوجه السفلي من الكبد فيدخل الفرجة المستعرضة مكوّناً للجيب الباي وينقسم الى فرعين يرافقان تفاريع الشريان الكبدي والقناة الكبدية في جوه الكبد. فاليمين من هذين الفرعين اغلظ واقصر من الايسر. واما طول الوريد الباي فمخواربعة قراريط وبينما يكون مضمناً في الثرب الصغير يكون واقعاً وراء الشريان الكبدي والقناة الكبدية وبينها بحيث تكون القناة الى اليمين والشريان الى اليسار. ويقبل الوريد المعدي والوريد الحوصلي فاذا صار ضمن الكبد قبل الدم الراجع من فروع الشريان الكبدي

الأوردة القلبية

الأوردة التي ترجع الدم من جوه القلب هي:

الوريد القلي العظيم — الوريد القلي الخلفي — الأوردة القلبية المقدمة — وأوردة تيبسيوس


وهو في الميزاب الموضوع في مؤخر الكبد. ولاصامات لهذه الاوردة

المجموع الباي من الاوردة

المجموع الباي مؤلف من اربعة اوردة عظيمة تتجمع الدم من الاحشاء الهضمية فاذا اتحدت صارت جذعاً واحداً يقال له الوريد الباي الذي يدخل الكبد ويتفرع في جوهه ثم تجتمع هذه التفرع فتصير الاوردة الكبدية وتنتهي في الاجوف السفلي. والاوردة الاربعة المذكورة جميعها مفردة وهي :

المساريقي السفلي - المساريقي العلوي - الطحالي - المعدي

الوريد المساريقي السفلي يجمع الدم من المستقيم والتعريج السيني والقولون النازل بواسطة فروع تقابل فروع الشريان المساريقي السفلي. وهذه الفروع تتحد وتصير جذعاً واحداً يسير



شكل ١٩١

وراء البريتون صاعداً وراء البنكرياس والجزء المستعرض للاثني عشري ويصب في الوريد

شكل ١٩١ الوريد الباي ١ الوريد المساريقي السفلي ٢ البنكرياس ٣ الوريد الطحالي الذي يصب فيه المساريقي السفلي بعد مروره وراء البنكرياس ٤ الطحال ٥ اوردة معدية صابة في الوريد الطحالي ٦ الوريد المساريقي العلوي ٧ التسم النازل من الاثني عشري ٨ قسمة المستعرض الذي يقطع الوريد المساريقي العلوي وبعض الشريان المساريقي العلوي ٩ الوريد الباي ١٠ الشريان الكبدية ١١ القناة الصفراوية المشتركة ١٢ انقسام القناة والوعية في الفرجة المستعرضة للكبد ١٣ القناة المحوية المستطرفة من الحوصلة المرارية الى القناة المشتركة

للكدب. ومن المومخر يستقر على العمود الفقري والساق اليمنى للحجاب الحاجز والشريان الكلوي الايمن والشرايين القطنية اليمنى. ومن الجانِب الايسر للاورطي. ويقبل مدة سيره الاوردة القطنية والمنوي الايمن والكلوبين والوريد الايمن اعلى الكلية والحجابية والكبدية

اما الاوردة القطنية فتلاثة او اربعة الى كل جانب تجمع الدم من العضلات والجلد في الجهة القطنية ومن جدران البطن وتقبل فروعاً من الضفائر الشوكية وتذهب حول جانبي اجسام الفقرات تحت العضلة الصليبية الكبيرة وتنتهي في مؤخر الاجوف السفلي

والاوردة المنوية تنفذ من مؤخر الخصية وتقبل فروعاً من البربخ فتكون صغيرة كثيرة التشبك اسفل الحلقة البطنية الظاهرة هي الصغيرة المنوية. وفروع هذه الصغيرة عديدة جداً تصعد مع الحبل المنوي الى مقدم القناة الناقلة فاذا دخلت التجويف البطني اتحدت وصارت فرعين يصعدان على العضلة الصليبية واحد منهما الى كل جانب من الشريان المنوي ثم يتحدان فيصيران وعاءً واحداً يصب في الاجوف السفلي على الجانِب الايمن وفي الوريد الكلوي الايسر على الجانِب الايسر. وليس لهذه الاوردة صامات

والاوردة المبيضية شبيهة بالمنوية في الذكور. تبدأ بصغيرة في الرباط العريض وقناة فلوبيوس بقرب المبيض وتتواصل بالصغيرة الرحمية وتنتهي كالاوردة المنوية. وهذه الاوردة كالرحمية تتعاطم جداً مدة الحمل

والوريدان الكلويان كبيران موضوعان الى مقدم تقاريع الشريانين الكلوبين. والايسر منها اطول من الايمن يسير الى مقدم الاورطي ويقبل الوريد المنوي الايسر والحجابي السفلي الايسر ويصب غالباً في الاجوف السفلي اعلى مصب الوريد الايمن بقليل

والوريد الايمن اعلى الكلية يصب في الاجوف والايسر في الكلوي الايسر والحجابي

والاوردة الحجابية تابعة لسير الشرايين الحجابية. وينتهي الايمن العلوي مقابل اتحاد الوريد بين اللاسم لها والايسر العلوي في الوريد الايسر العلوي بين الاضلاع او في الثديي الباطن الايسر. والوريدان السفليان تابعان سير الشريانين الحجابيين السفليين وينتهي الايمن منها في الاجوف السفلي والايسر في الوريد الايسر الكلوي

والاوردة الكبدية تبدأ في جوهر الكبد من الفروع الانتهاية الشبكية للوريد الباني. وتتحذ هذه الاوردة فتصير ثلاثة اجزاء عظيمة تجمع نحو الحافة الخلفية للكبد وتصب في الاجوف السفلي

الدم من ظاهر الحوض بواسطة الوريد الالوي والوركي والاستحيائي الباطن والساد ومن الاحشاء التي في باطنه بواسطة الوريد الباسورية والصفيرة المثانية البروستاتية في الذكور وبواسطتها بواسطة الوريد الرحمية والصفيرة المهبلية في الاناث. وهو موضوع اولاً الى الجهة الانسية ثم الى الجهة الخلفية من الشريان الحرقفي الباطن وينتهي مقابل المنفصل العجزي الحرقفي حيث يتحد بالحرقي الظاهر ليكون الوريد الحرقفي المشترك. واما الوريد الباسورية المذكورة آنفاً فمحيطة بالجزء السفلي للمستقيم. والصفيرة المثانية البروستاتية محيطة بعنق المثانة والبروستاتا. والوريد الظهري للفضيب كبير ينتهي في الوريد السابقة. والصفيرة الرحمية على جانبي الرحم. والمهبلية محيطة بالغشاء المخاطي للمهبل

والوريد الحرقفي المشترك مكون من اتحاد الوريد الحرقفي الظاهر بالباطن عند مقدم المنفصل العجزي الفكري. يذهب منحرفاً الى الاعلى فيلأقي رفيفة من الجانب الخالف ويتحد به على زاوية حادة مقابل الغضروف المتوسط بين الفقرة القطنية الرابعة والخامسة الى الجانب الايمن فيتكوّن من اتحادهما الوريد الاجوف السفلي. فالحرقي المشترك الايمن اقصر من الايسر واتجاهه يقرب من العمودية ويصعد اولاً وراء الشريان المقابل له ثم الى الوحشية منه. واما الايسر فاطول واشد انحرافاً في سيره ويكون وضعه اولاً الى الانسية من الشريان المقابل له ثم الى الخلف من الشريان الحرقفي الاصيلي الايمن. وكل من هذين الوريدين يقبل الاوردة الحرقفية القطنية واحياناً الاوردة العجزية الجانبية. وما عدا ذلك يقبل الايسر منها الوريد العجزي المتوسط. ولاصامات لهذين الوريدين. واما الوريد العجزي المتوسط فيرافق الشريان المقابل له وينتهي في الوريد الحرقفي المشترك الايسر غالباً وفي بداية الاجوف السفلي احياناً

والوريد الاجوف السفلي (شكل ١٨٩) يجمع الدم من جميع الاجزاء الواقعة اسفل الحجاب الحاجز. وهو مكون من اتحاد الوريدين الحرقفيين المشتركين على الجانب الايمن من الغضروف المتوسط بين الفقرة القطنية الرابعة والخامسة. واما سيره فانه يصعد الى مقدم العمود الشوكي الى الجانب الايمن من الاورطي فاذا وصل الى الوجه السفلي للكبد سار في ميزاب واقع في حافته الخلفية. ثم ينفذ من المركز الوتري للحجاب ويدخل التامور فتغطيه الطبقة المصلية للغلاف المذكور وينتهي في الجزء السفلي والمؤخر للأذن اليمنى. وله عند مصبه في الاذين صمام يقال له صمام اوستاكيوس يكون عظيم الحجم مدة الحياة الجنينية. مجاورته الى المقدم من الاسفل الى الاعلى للماساريقا والجزء المستعرض من الاثني عشري والبنكرياس والوريد الباني والحافة الخلفية

اللفافة الغائرة في الجزء السفلي للخلاء المأبضي وينتهي في الوريد المأبضي بين رأسي العضلة التوأمية. والعصب الصافن الوحشي يصاحب هذا الوريد في سيره. ويقبل فروعاً كثيرة كبيرة من مؤخر الساق. وله صامان أحدهما دائماً الوجود بقرب مصبه في الوريد المأبضي

والأوردة الغائرة للطرف السفلي مصاحبة للشرايين وفروعها فهي الأوردة المرافقة لها. وتبدأ هذه الأوردة بانحداد أوردة الشريانين الأخصيين فيتكوّن من الاتحاد المذكور الوريدان المرافقان للشريان القصبي الخلفي اللذان يقبلان الوريدين المرافقين للشريان الشظوي. وأما الوريدان المرافقان للشريان القصبي المقدم فهما امتداد الوريدين المرافقين للشريان الظهرى للقدم ويثقبان الغشاء بين العظمين عند الجزء العلوي للساق ثم يتحدان بالوريد بين القصبيين الخلفيين فيتكوّن من الاتحاد المذكور الوريد المأبضي. والصامات في الأوردة الغائرة كثيرة جداً

والوريد المأبضي المكوّن من اتحاد الأوردة السابقة يصعد في الخلاء المأبضي إلى الفتحة التوربية الواقعة في العضلة المقربة الكبيرة فيصير هناك الوريد الفخذي. ووضع هذا الوريد في جزئه السفلي إلى الأنسية من الشريان المأبضي وبين رأسي التوأمية يكون إلى السطحية منه وأعلى مفصل الركبة إلى الوحشية منه. ويقبل فرعين من التوأمية والأوردة المنفصلة والصافن الوحشي. وعدد الصامات في هذا الوريد غالباً أربعة

والوريد الفخذي يصاحب الشريان الفخذي في الثلثين العلويين للفخذ. وهو إلى الوحشية منه في الجزء السفلي من مسيره ثم يصير إلى الخلف منه ثم إذا وصل إلى أسفل رباط يويارت صار الوريد إلى الأنسية من الشريان على مساحة واحدة معه. ويقبل فروعاً عضلية كثيرة ويصب فيه الوريد الفخذي الغائر أسفل رباط يويارت بخو قيراط ونصف والصافن الأنسي عند منتهاه. صاماته أربعة أو خمسة

والوريد الحرقفي الظاهر يبدأ عند منتهى الفخذي تحت القوس الفخذي ويصعد إلى الأعلى على شفة الحوض وينتهي مقابل المفصل الحرقفي العجزي حيث يتحد بالحرقفي الباطن ليكون الوريد الحرقفي المشترك. ووضعه في الجانب الأيمن أولاً على الجانب الأنسي للشريان الحرقفي الظاهر ثم يميل شيئاً فشيئاً إلى الجهة الخلفية منه. وأما في الجانب الأيسر فإلى الجانب الأنسي من الشريان. ويقبل أعلى رباط يويارت الوريد الشراسيفي والحرقفي المنعكف. وليس لهذا الوريد صامات والوريد الحرقفي الباطن مكوّن من الأوردة المرافقة لفروع الشريان الحرقفي الباطن فيقبل

اوردة الطرف السفلي

شكل ١٩٠



تقسم هذه الاوردة الى سطحية وغائرة. فالسطحية موضوعة تحت الجلد بين طبقتي اللفافة السطحية. والغائرة مرافقة للشرايين. وللجموعين صمامات لانها اكثر عدداً في الاوردة الغائرة منها في السطحية

الأوردة السطحية اثنان الصافن الانسي والصافن الوحشي فالصافن الانسي ويقال له الطويل ايضاً يبدأ بضميرة دقيقة تغطي ظهر القدم وجانبه الانسي ويصعد الى مقدم الكعب الانسي ثم على الجانب الانسي للساق وراء الحافة الانسية للقصبة مصحوباً بالعصب الصافن الانسي فاذا وصل الى الركبة مرّ الى الخلف وراء العقدة الانسية لعظم الفخذ وصعد على الجانب الانسي للفخذ ثم يمر من الفتحة الصافية الواقعة في اللفافة العريضة وينتهي في الوريد الفخذي اسفل رباط پوپارت بقيراط ونصف. ويقبل هذا الوريد في سيره فروعاً جلدية من الساق والفخذ وعند الفتحة الصافية الوريد الشراسيفي الظاهر والحرفي المنعكف الظاهر والاستحيائي الظاهر. وكثيراً ما نتحد الفروع الوريدية الواقعة في الجزء الانسي والمؤخر للفخذ فتكون جذعاً يصب في الصافن الانسي قرب الفتحة المذكورة وقد يصب فيه جذع اخر مكون من اوردة الجانب الوحشي للفخذ. ويتواصل هذا الوريد باوردة اخرى مسيره من الاسفل الى الاعلى. وتختلف صمامات هذا الوريد من جهة عددها فتكون من اثنين الى ستة معظم وضعها في الفخذ

والوريد الصافن الوحشي ويقال له القصير ايضاً مكون من فروع تجمع الدم من ظهر القدم وجانبه الوحشي. يصعد وراء الكعب الوحشي على الجانب الوحشي لوتر اكيلس ويقاطعه على زاوية حادة فيصل الى الوجه الخلفي للساق على خطه المتوسط ثم يصعد باستقامة ويشق

شكل ١٩٠ الوريد الصافن الانسي ١ الفتحة الصافية في اللفافة العريضة ٢ الوريد الشراسيفي السطحي ٣ الوريد الاستحيائي الظاهر ٤ الوريد المنعكف الحرفي السطحي ٥ الوريد الصافن الوحشي

الأوردة الشوكية

تُقسم الأوردة الشوكية إلى أربعة مجاميع وهي أولاً الأوردة الموضوعة على ظاهر العمود الشوكي ثانياً الأوردة الموضوعة في باطن العمود ثالثاً أوردة اجسام الفقرات رابعاً أوردة الحبل الشوكي

١. أما الأوردة الموضوعة على ظاهر العمود الشوكي فيقال لها الأوردة الظهرية الشوكية تجمع الدم من الجلد المغطي للعمود ومن العضلات التي في الميابين الفقريين وتكون شبكة محيطة بالنتوات الشوكية والمستعرضة والمفصلية والصفائح لجميع الفقرات. وتتواصل الشبكات بعضها ببعض بواسطة فروع صاعدة ونازلة وتتواصل بالأوردة التي في باطن القناة الشوكية بواسطة فروع تثقب الأربطة الصفراء. وتنتهي بين اقواس الفقرات في الأوردة العنقية والأوردة بين الأضلاع والأوردة القطنية والعجزية

٢. والأوردة التي في باطن العمود موضوعة بين الكيس الفقري والفقرات. وهي مؤلفة من ضفيريّين طويلتين أحدهما مقدمة والآخرى خلفية. فالمقدمة مؤلفة من قناتين ويريد يتين عظيمتين متعرجتين تمتدان على جميع طول القناة الفقرية من الثقب العظيم إلى قاعدة العصعص واحدة إلى كل جانب من الوجه الخلفي لاجسام الفقرات. وتتواصل القناتان المذكورتان بواسطة فروع مستعرضة مقابل كل فقرة. وتتواصلان أيضاً بالأوردة الظهرية الشوكية والأوردة العنقية والأوردة بين الأضلاع والقطنية والعجزية بواسطة الثقوب بين الفقرات. والخلفية مؤلفة من قناتين أيضاً موضوعتين واحدة من كل جانب بين الوجه الباطن للصفائح والكيس الفقري. وتتواصلان أحدهما بالآخرى وثتاهما بالأوردة المقدمة بواسطة فروع مستعرضة وبالأوردة الظهرية الشوكية من الثقوب بين الفقرات

٣. وأوردة اجسام الفقرات تنفذ من الثقوب التي على وجهها الخلفي وتحد بالاجذاع التي توصل الأوردة الشوكية الطولية المقدمة. وهذه الأوردة تسير في ميازيب متعرجة في جوهر اجسام الفقرات شبيهة بالميازيب الكائنه في الطبقة المزروجة للعظام الخوذية

٤. وأوردة الحبل الشوكي مكونة من ضفائر ويريدية دقيقة متعرجة مغطية لجميع وجه الحبل وواقعة بين الام الحنونية والعنكبوتية. وتنفذ هذه الأوعية من الفرجة المتوسطة الخلفية خاصة. وبقرب قاعدة الحنجمة تحد وتكون جذعين أو ثلاثة صغيرة تتواصل بالأوردة الفقرية وتنتهي في الأوردة الشوكية السفلى أو في الجيوب الحجزية

والوريد الاجوف العلوي يقبل الدم الراجع الى القلب من جميع النصف العلوي للجسد . وهو جذع قصير طوله من قيراطين ونصف الى ثلاثة قيراط ومكوّن من اتحاد الوريدين اللاسم لها . يبدأ اسفل غضروف الضلع الاول على الجانب الايمن وينزل عمودياً الى ان يدخل التامور اعلى القلب بنحو قيراط ونصف وينتهي في الجزء العلوي من الاذنين اليمنى . وفي مسيره المذكور يكون قوساً قليل الانحناء تحديه متجه الى الجانب الايمن . مجاورته . من المقدم للنافه الصدرية التي تنفصله عن الغدة التيموسية والنص . ومن الموخر لجذر الرئة اليمنى . ومن جانبه الايمن للعصب الحجابي والبليورا . ومن جانبه الايسر للجزء الصاعد من الاورطي . ويقبل الوريد الفرد الكبير قبل دخوله التامور فاذا دخله صبّت فيه اوردة صغيرة من التامور والنصف . وليس لهذا الوريد صمامات

والوريدان الفردان يوصلان الوريد الاجوف العلوي بالسفلي . فالفرد الايمن اعظمها ويبدأ مقابل الفقرة الاولى القطنية او الثانية بان يقبل فرعاً من الاوردة القطنية اليمنى وتارة يكون هذا الفرع من الوريد الكلوي او الاجوف السفلي . ويدخل الصدر من الفتحة الاورطية في الحجاب الحاجز ويصعد على الجانب الايمن للعمود الفقري الى الفقرة الثالثة الظهرية فيتقوس هناك الى المقدم فوق جذر الرئة اليمنى وينتهي في الاجوف العلوي عند دخول هذا الوعاء الى التامور . وبينما يكون ماراً من الفتحة الاورطية للحجاب يكون موضعاً مع القناة الصدرية الى الجانب الايمن من الاورطي وفي الصدر يكون مستقراً على الشرايين بين الاضلاع الى الجانب الايمن من الاورطي والقناة الصدرية مغطى بالبليورا . فروعها . يقبل هذا الوريد تسعة او عشرة من الاوردة السفلى بين الاضلاع والفرد الصغير وبعض اوردة مرئية ومنصفيه وفقرية . وعند منتهاه يقبل الوريد الشعبي الايمن وقد يكون متصلاً بالوريد الايمن العلوي بين الاضلاع . والفرد الصغير الايسر يبدأ في الجهة القطنية بفرع من احد الاوردة القطنية او من الكلوي الايسر . وينقب الساق الايسر للحجاب الحاجز ويدخل الصدر ثم يصعد على الجانب الايسر للعمود الفقري الى ان يبلغ الفقرة السابعة او السادسة الظهرية فيصالب العمود وراء الاورطي والقناة الصدرية وينتهي في الوريد الفرد الايمن . ويقبل اربعة او خمسة من الاوردة السفلى بين الاضلاع وبعض اوردة مرئية ومنصفيه . ويوجد احياناً فرد اخر يقال له الفرد العلوي الايسر يتكون من فروع آتية من الاخيلية العليا بين الاضلاع ويصب في احد الفردين الاخرين

والاوردة الشعبية ترجع الدم من جوهر الرئتين . فاليمنى تنتهي بفرع يصب في الفرد الكبير عند منتهاه . واليسرى في الوريد الايسر العلوي بين الاضلاع

الشريان الالاسم له. والى جانبه اليمين البليورا حاجزة بينه وبين قمة الرئة. ويقبل عند زاوية اتحاده بالوريد تحت الترقوة الوريد الفقري اليمين والقناة الليمفاوية اليمنى والى الاسفل من ذلك يقبل الوريد الثديي الباطن اليمين والدرقي السفلي اليمين والوريد بين الاضلاع العلوي اليمين والوريد الالاسم له طوله نحو ثلاثة قراريط وهو اعظم من اليمين. يسير منحرفاً من الجانب الالاسم الى اليمين مقاطعاً للجزء العلوي والمقدم من الصدر ويتحد برفيقه من الجانب المخالف فيتكون منها الوريد الاجوف العلوي. مجاورته من المقدم للطرف القصي من الترقوة اليسرى والمنفصل القصي الترقوي الالاسم والقطعة الاولى من القص منفصلاً عنها بواسطة العضلة القصية اللامية والقصبة الدرقية والغدة التيموسية او بقيتها ومقدار من النسج الخلوي الرخو. ومن المؤخر يستقر على اصول الشرايين الثلاثة العظيمة الناشئة من قوس الاورطي. ويقبل الوريد الفقري الالاسم والدرقي السفلي الالاسم والثديي الباطن الالاسم والوريد بين الاضلاع العلوي الالاسم وقد يقبل ايضاً فروعاً تيموسية وتامورية. وليس للوريد بين الالاسم لها صمامات والوريدان الثدييان الباطنان مرافقان للشريان الثديي الباطن في سيره ويتبلان فروعاً تقابل الفروع الناشئة من الشريان المذكور ويتحدان في جذع واحد يصب في الوريد الالاسم له


والاوردة الدرقية السفلى قد تكون اثنان او ثلاثة او اربعة تنشأ من الضفيرة الواقعة على الجسم الدرقي وتتواصل بالوريد بين الدرقين العلوي والمتوسط. فالالاسم منها ينزل على مقدم القصبة وراء العضلة القصية الدرقية متواصلاً برفيقه من الجانب المخالف بواسطة فروع مستعرضة وينتهي في الوريد الالاسم له. واليمين منها موضوع قليلاً الى الجانب اليمين من الخط المتوسط ويصب في الوريد اليمين الالاسم له عند اتحاده بالاجوف العلوي. وهذه الاوردة تقبل فروعاً قصية وحجرية خلفية ولها صمامات عند مصبها في الوريد بين الالاسم لها

الوريدان العلويان بين الاضلاع يجتمعان الدم من الاخيلية العليا بين الاضلاع. فاليمين منهما اصغر حجماً من الالاسم وشبيهه بالشريان العلوي بين الاضلاع اذ يقبل الدم من الخلاء الاول او الاول والثاني. وينتهي في الوريد اليمين الالاسم له وقد ينحدر ويصب في الوريد الفرد الكبير. واما الالاسم فاعظم من اليمين وهو مكوّن من فروع آتية من الخلاتين او الثلاثة العليا بين الاضلاع ويصالب قوس الاورطي وينتهي في الوريد الالاسم له. ويصب فيه الوريد الشعبي الالاسم

تحت اللوح

والوريد تحت الترقوة امتداد الابطي . يمتد من المحافة الظاهرة للصلع الاول الى الطرف

شكل ١٨٩



الانسى للمنصل القصي الترقوي حيث يتحد بالوداجي الباطن
ويصير الوريد اللا اسم له . مجاورته من المقدم للترقوة والعضة
تحت الترقوة . ومن المؤخر للشريان تحت الترقوة منفصلاً عنه
الى الباطن بواسطة الاخعية المقدمة والعصب الحجابي . ومن الاسفل
يستتر على انخفاض في الصلع الاول وعلى البليورا . ومن الاعلى تغطيه
الغافة العنقية والجلد . ويصعد احياناً هذا الوريد في العنق الى
خط على مساحة واحدة مع الجزء الثالث للشريان تحت الترقوة
وقد شوهد مرتين ذاهباً مع هذا الوعاء وراء الاخعية المقدمة . وله
صام قبل انتهائه في الوريد اللا اسم له نحو قيراط الى الوحشية من
مصب الوداجي الظاهر . فروع . يقبل الوداجين الظاهر والمقدم
وفرعاً صغيراً من الراسي الى الوحشية من الاخعية والوداجي
الباطن اذا صار الى الانسية منها

والوريدان اللا اسم لهما جذعان عظيمان موضوعان على
جانبي اصل العنق اي واحد الى كل جانب . ويتكون كل واحد
منها من اتحاد الوداجي الباطن والوريد تحت الترقوة للجانب
الواقع هو فيه

فالوريد الايمن اللا اسم له وعاء قصير طوله نحو قيراط ونصف . يبدأ عند الطرف الانسي
للترقوة ويكاد يكون سيره عمودياً الى الاسفل ويتحد بالوريد الايسر اللا اسم له اسفل
غضروف الصلع الاول فيتكوّن منها الوريد الاجوف العلوي . وضعه الى الظاهر والوحشية من

شكل ١٨٩ اوردة الجذع والعنق ١ الوريد الاجوف العلوي ٢ الوريد اللا اسم له الايسر ٣ الوريد اللا اسم له
الايمن ٤ الوريد تحت الترقوة الايمن ٥ الوداجي الباطن ٦ الوداجي الظاهر ٧ الوداجي المقدم ٨ الوريد الاجوف
السفلي ٩ الوريد الحرقفي الظاهر ١٠ الحرقفي الباطن ١١ الحرقفيين المشتركين . والوريد الصغير الذي بينهما هو الجزية
المتوسط ١٢ و١٣ اوردة قطنية ١٤ المنوي الايمن ١٥ المنوي الايسر صائباً في الكلوي الايسر ١٥ الكلوي الايمن ١٦ جذع
الاوردة الكبدية ١٧ الفرد الاكبر الذي يبدأ من الاسفل من الاوردة القطنية ١٨ الفرد الاصغر الذي يبدأ أيضاً من الاوردة
القطنية ١٩ فرع استطرافي بينه وبين الكلوي الايسر ٢٠ مصب الفرد الاصغر في الاكبر ٢١ الوريد بين الاضلاع العلوي
الايسر المستطرق بين الفرد الاصغر من الاسفل والوريد اللا اسم له الايسر


والوريد المتوسط الراسي اصغر من المتوسط الباسليقي يذهب الى الوحشية في الميزاب الذي بين الباطحة الطويلة وذات الراسين ويتحد بالوريد الراسي . وفروع العصب الجلدي الوحشي تسير وراء هذا الوعاء

والوريد المتوسط الباسليقي يتجه منحرفاً الى الانسية في الميزاب الذي بين ذات الراسين والكتابة المستديرة للكعبرة ويتحد بالوريد الباسليقي . ويسير هذا الوريد الى مقدم الشريان العضدي منفصلاً عنه بامتداد ليفي مرسل من وتر ذات الراسين الى اللقافة التي تغطي العضلات القابضة في الساعد . وتسير خيوط من العصب الجلدي الانسي الى مقدم هذا الوعاء والى الخلف منه

واما الاوردة الغائرة للطرف العلوي فترافق الشرايين في سيرها وهي غالباً اثنان لكل شريان واحد الى كل جانب منه . ويتواصل بعضها ببعض بواسطة فروع قصيرة مستعرضة . فالاوردة بين العظمين ترافق الشرايين بين العظمين المقدم والخلفي . فالقدمة منها تبدأ عند مقدم الرسغ حيث تتواصل بالاوردة الغائرة الكعبرية والزندية . وفي الجزء العلوي من الساعد تقبل الاوردة بين العظام الخلفية وتنتهي في الوريد بين المرافقين للشريان الزندي . والاوردة الغائرة الراحية ترافق القوس الراحي الغائر مكونة من فروع مرافقة لتفاريح هذا الوعاء وتتواصل بالاوردة الراحية السطحية عند الجانب الانسي لليد . وتنتهي على الجانب الوحشي في الوريد بين المرافقين للشريان الكعبري . وعند الرسغ تقبل فرعاً راحياً من الابهام ويتحد بالاوردة الكعبرية الغائرة . وبعد مرافقتها للشريان الكعبري تنتهي في الاوردة المرافقة للشريان العضدي . والاوردة العضدية موضوعة واحداً الى كل جانب من الشريان العضدي وتقبل فروعاً مقابلة للفروع التي تنشأ من هذا الشريان . فاذا وصلت الى الحافة السفلي للابط تحدد بالوريد الباسليقي لتكون الوريد الابطي . وللاوردة الغائرة موصلات كثيرة بعضها ببعض وبالاوردة السطحية

والوريد الابطي عظيم الحجم ومكوّن من امتداد الوريد الباسليقي الى الاعلى . يبدأ عند الجزء السفلي للخلاء الابطي ويصعد متعاطم الحجم لانه يقبل فروعاً تقابل الفروع التي تنشأ من الشريان الابطي وينتهي تحت الترقوة عند الحافة الظاهرة للضلع الاول اذ يصير الوريد تحت الترقوة . وتغطيه الى المقدم العضلتان الصدريتان والغشاء الضلعي الغرابي ويستقر على الجانب الصدري للشريان الابطي . ويتحد به مقابل العضلة تحت اللوح وريد كبير مكوّن من اشتراك الوريد بين المرافقين للشريان العضدي . وعند منتهاه يقبل الوريد الراسي . وله زوج من الصمامات مقابل الحافة السفلي للعضلة تحت اللوح . ويوجد ايضاً صمامات في منتهى الوريد الراسي والوريد

والوريد الباسليقي عظيم الحجم مكون من اتحاد الوريدين الزنديين المقدم والخلفي و يصعد على الجانب الانسي للمرفق فيقبل الوريد المتوسط الباسليقي ثم يذهب الى الاعلى على الجانب الانسي للعضد وينقب للفاقة الغائرة و يصعد تابعا لسير الشريان العضدي و يصب في احد الوريدين المرافقين للشريان المذكور او في الوريد الابطي



والوريد الكعبري يبدأ من الوجه الظهري للابهام والسبابة والجانب الكعبري لليد بفروع تتواصل بوريد الخنصر. وهو وعاء عظيم يصعد على الجانب الكعبري للساعد ويقبل فروعاً كثيرة من وجهيه. وعند ثنية المرفق يقبل الوريد المتوسط الراسي فيصير الوريد الراسي

والوريد الراسي كان يُعرف عند اليونانيين والعرب باسم التيفال وهي كلمة يونانية معناها الراسي سموه بهذا الاسم لانهم كانوا يتوهمون ان فصدته نافع في اوجاع الراس. يصعد على الحافة الوحشية للعضلة ذات الراسين الى الثلث العلوي من العضد ثم يسير في الخلاء بين الصدرية الكبيرة والذالية مصحوباً بالفرع النازل من الشريان الصدري الاخرى وينتهي في الوريد الابطي اسفل الترقوة. وقد يكون هذا الوريد متصلاً بالوداجي الظاهر او بالوريد تحت الترقوة بواسطة فرع يمر منه الى الاعلى الى مقدم الترقوة

والوريد المتوسط يجمع الدم من الابنية السطحية في الوجه الراحي لليد والمخبط المتوسط للساعد متواصلاً بالوريدين الزندي المقدم والكعبري. وعند ثنية المرفق يقبل فرعاً استطرافياً من الاوردة الغائرة المصاحبة للشريان العضدي وينقسم الى قسمين هما الوريد المتوسط الراسي والوريد المتوسط الباسليقي اللذان ينفرجان وهما صاعدان

شكل ١٨٨ اوردة الساعد وثنية المرفق ١ الوريد الكعبري ٢ التيفال وهو الراسي ٣ الزندي المقدم ٤ الزندي الخلفي ٥ الجذع المكون من اتحادها ٦ الباسليقي الذي ينقب للفاقة الغائرة عند ٧ ٨ المتوسط ٩ فرع استطرافي بين الاوردة الغائرة للساعد والجزء العلوي للوريد المتوسط ١٠ المتوسط الراسي ١١ المتوسط الباسليقي ١٢ تحديق خفيف للفاقة الغائرة اعلى الشريان العضدي ١٣ زائدة من الفاقة المذكورة الناشئة من وتر العضلة ذات الراسين والفاصلة بين الوريد الباسليقي المتوسط والشريان العضدي ١٤ العصب الجذلي الوحشي الذي ينقب للفاقة الغائرة ثم ينقسم الى فرعين يسيران وراء الوريد المتوسط الراسي ١٥ العصب الجذلي الانسي الذي ينقسم الى فروع تدير الى مقدم الوريد المتوسط الباسليقي ١٦ العصب بين الاضلاع العضدي ١٧ العصب المغزلي الجذلي وهو فرع من المغزلي العضلي ٦

والجيب الحجري السفلي موضوع في الميزاب المكوّن من اتحاد الحافة السفلى للجزء الحجري من الصدغي بالتواقيع للمؤخري. يبتدئ في المقدم عند منتهى الجيب الكهفي ويصب الى المؤخر في الثقب الوداجي حيث يكون مع الجيب الجانبي بداية الوريد الوداجي الباطن. وشكل هذا الجيب نصف اسطواناني

والجيب المستعرض موضوع عرضاً على الجزء المقدم للتواقيع من العظم المؤخري وفائدته انه يوصل الجيبين الحجريين السفليين بالجيبين الكهفيين. وقد يوجد جيب مستعرض ثانٍ مقابل الثقب العظيم

والجيب الحجري العلوي موضوع على الحافة العليا للجزء الحجري من الصدغي في الجزء المقدم من الحافة المتصلة للغيمية. وهو صغير ضيق يوصل الجيب الكهفي بالجيب الجانبي من كل ناحية. ويقبل الوريد الخي الجانبي السفلي من الجزء السفلي للفص المتوسط والوريد الخي الجانبي المقدم من الحافة المقدمة للسنخ

في اوردة الطرف العلوي

تقسم هذه الاوردة الى سطحية وغائرة. فالاوردة السطحية موضوعة تحت الجلد رأساً بين طبقتي اللفافة السطحية. وتبتدئ في اليد ولا سيما على وجهها الظهري حيث تكوّن قوساً كاملاً او ناقصاً. والاوردة الغائرة تصاحب الشرايين فهي الاوردة المرافقة لها. ولهذه الاوردة سطحية كانت او غائرة صامات غير انها اكثر عدداً في الاوردة الغائرة منها في السطحية

والاوردة السطحية للطرف العلوي:

الوريد الزندي المقدم - الزندي الخلفي - الباسليقي - الكهبي - الراسي - المتوسط - الباسليقي المتوسط - الراسي المتوسط

الوريد الزندي المقدم يبدأ على الوجه المقدم للرسغ والجانب الزندي لليد ويصعد على الجانب الانسي للساعد الى ثنية المرفق وهناك يتحد بالزندي الخلفي فيتكوّن منهما الباسليقي ويتواصل بفروع من الوريد المتوسط الى المقدم وبالزندي الخلفي الى الخلف

والوريد الزندي الخلفي يبدأ على الوجه الخلفي للجانب الزندي من اليد ومن وريد الخنصر (وهو الاسليم) الواقع في الخلاء الرابع المشطي ويصعد على الوجه الخلفي للجانب الزندي من الساعد ويتحد بالزندي المقدم اسفل ثنية المرفق

السفلى الخفية والخفية


والجيبان الموخريان اصغر الجيوب الخودية وموضوعان في الحافة المتصلة للمنجل الخفي .
وهما في الغالب اثنان يتدثان باوردة صغيرة حول الحافة الخلفية للثقب العظيم وينتهيان في
مجتمع الجيوب

واما الجيوب التي عند قاعدة الجمجمة فهي :

الكهفيان - والحفي - والمخريان العلويان - والمخريان السفليان - والمستعرض

فالجيبان الكهفيان تسميا بذلك لسبب بنائهما الشبكي وهما عظيمان موضوعان على جانبي

شكل ١٨٧



السرغ التركي ممتدان من الفرجة التودية الى قمة الجزء المخري
للصدغي . ويقبلان عند المقدم الوريد العيني الآتي من الفرجة
التودية ويتواصلان عند المُوخِر بالجيبين المخريين واحدهما
بالاخر بواسطة الجيبين الحفقي والمستعرض . وعلى الجدار الانسي
لكلٍ منهما الشريان السباتي الباطن مصحوباً بالعصب
السادس وخيوط من الضفيرة السباتية وعلى جداره الوحشي
العصب الثالث والرابع والعصب العيني . ثم ان تجويف
هذين الجيبين اعظم في الموخر منه في المقدم ونقاطه خيوط
ليفية واوعية صغيرة . ويقبلان الاوردة الخفية المقدمة السفلى
ويتواصلان بالجيبين الجانبيين بواسطة الجيبين المخريين
العلوي والسفلي وبالوريد الوجهي بواسطة الوريد العيني

واما الوريد العيني فعظيم الحجم ويوصل الوريد الجهمي عند الزاوية الانسية للجاج بالجيب
الكهفي . سيره كسير الشريان العيني ويقبل فروعاً تقابل الفروع التي تنشأ من الشريان
المذكور . وهو جذع قصير غليظ يمر من الطرف الانسي للفرجة التودية وينتهي في الجيب الكهفي
والجيب الحفقي محيط بالجسم النخامي ويتصل من الجانبيين بالجيبين الكهفيين . نصفه الموخر
اعظم من نصفه المقدم . ويقبل اوردة من الجسم النخامي ومن الجوهر العظمي المجاورة ومن الام
الجافية

شكل ١٨٧ جيوب قاعدة الجمجمة ١ الوريدان العينيان ٢ الجيب الكهفي من الجانب الواحد ٣ الجيب الحفقي وقد
وضع الرمز مكان الجسم النخامي في السرج التركي ٤ الجيب المخري السفلي ٥ الجيب المستعرض ٦ الجيب المخري العلوي
٧ الوريد الوداجي الباطن ٨ الثقب العظيم في العظم الموخري ٩ الجيبان الموخريان ١٠ مجتمع هيروفيلوس ١١ و١١
الجيبان الجانبيان

شكل ١٨٦



ممتدة عرضاً على زاويتي السفلى واجسام صغيرة
بيضا بارزة يقال لها غدود باكيونيوس. ويقبل
هذا الجيب الاوردة المخية العليا واوردة كثيرة
من المزدوجة والامر الجافية والاوردة الجدارية
من السمحاق. ويسمى ملتقى الجيب الطولي العلوي
بالجيبين الجانبيين مجتمع الجيوب لانه يلتقي
هناك ستة جيوب وهي الجيب الطولي العلوي
والجيبان الجانبيان والجيبان المؤخريان والجيب
المستقيم وهو مجتمع هيروفيلوس

والجيب الطولي السفلي مضمّن في الجزء الخلفي للحافة السائبة من المنجل الخفي. شكله مستدير
وكلما مرّ الى الخلف تزايد حجمه الى ان ينتهي في الجيب المستقيم. ويقبل جملة اوردة من المنجل
الخفي واحياناً بعض اوردة من الوجه المسطح للنصفين الكرويين

والجيب المستقيم موضوع عند الخط الذي يلتقي فيه المنجل الخفي بالخمسة المخيخية. شكله مثلث
ويتزايد حجمه كلما سار الى الورا. وسيره بانحراف الى الاسفل والورا من منتهى الجيب الطولي
السفلي الى مجتمع الجيوب. ويقبل الجيب الطولي السفلي ووريدي جالينوس والاوردة المخية
المتوسطة السفلى والمخيخية العليا

والجيبان الجانبيان عظيم الحجم موضوعان في الحافة الملتصقة للثيمة المخيخية. يتدثان من
مجمع الجيوب ويذهبان افقياً الى الوحشية فاذا وصلا الى قاعدة الجزء الخجري للعظم الصدغي
انعكفا الى الاسفل والانسية حتى يبلغا الثقب الوداجي فينتهيان في الوريد الوداجي الباطن. وكل
من هذين الجيبين يستقر اولاً على الوجه الباطن للمؤخري ثم على الزاوية الخلفية السفلى للجداري
ثم على الجزء الخلمي للصدغي ثم اخيراً على المؤخري ايضاً. ويقبلان الدم من الجيب الطولي
العلوي والمستقيم والمؤخري ويتواصلان عند المقدم بالجيبين الخجريين العلوي والسفلي.
ويتواصلان ايضاً باوردة السمحاق بواسطة الوريد الخلمي والوريد الخلفي ويقبلان الاوردة

شكل ١٨٦ جيوب القسم العلوي والخلفي للجمجمة ١ الجيب الطولي العلوي ٢ و٢ اوردة دماغية صابة في الجيب المذكور
٣ المنجل الخفي ٤ الجيب الطولي السفلي ٥ الجيب المستقيم ٦ وريدي جالينوس ٧ مجتمع هيروفيلوس ٨ الجيبان الجانبيان
٩ منتهى الجيب الخجري السفلي من الجانب الواحد ١٠ انفخ الوريدين الوداجيين منابل الحفرتين الوداجيتين ١١ الوداجيان
الباطنان

تبدأ في الاجزاء الجانبية للصفين الكرويين وعند قاعدة الدماغ ويُخذ فتصير من ثلاثة الى خمسة اوردة تصب في الجيب الجانبي من الامام الى الخلف. والاوردة الختية المتوسطة السفلى عظيمة الحجم وتبدأ عند مقدم الوجه السفلي للسخ ومن تلافيف الفص الخلفي وتنتهي في الجيب المستقيم وراء وريدي جالينوس. واما الوريدان الختيان الغائران ويقال لهما وريدا جالينوس ياتي احدهما من البطين الايمن والاخر من البطين الايسر وكل منهما مكوّن من وريدين هما وريد الجسم المضلع والوريد المشيمي. يذهبان الى الخلف متوازيين مضمينين في الشفة المتوسطة وينفذان من الخ عند الفرجة العظيمة المستعرضة بين الوجه السفلي للجسم الصلب والاجسام الرباعية ويصبان في الجيب المستقيم. ووريد الجسم المضلع يبدأ في الميزاب الواقع بين الجسم المضلع والسرير البصري فيقبل فروعاً كثيرة منها ويتخذ بالوريد المشيمي وراء القائمة المقدمة للقبوة فيتكون منها وريد جالينوس. والوريد المشيمي يذهب على جميع طول الحافة الوحشية للصفيرة المشيمية ويتخذ بوريد الجسم المضلع عند الطرف المقدم للصفيرة المشيمية

والاوردة الختية شاغلة لوجه الختج ونقسم الى عليا وسفلى وجانبية. فالعليا تسير الى المقدم والانسية وتقاطع الزائدة الدودية العليا وتنتهي في الجيب المستقيم وبعضها يصب في وريدي جالينوس. والسفلى عظيمة الحجم تذهب عرضاً الى الوحشية وتنتهي بجذعين او ثلاثة في الجيبين الجانبيين. والجانبية تنتهي في الجيبين الخجريين العلويين

في جيوب الام الجافية

جيوب الام الجافية ميازيب وريدية شبيهة بالاوردة طبقتها الظاهرة مكوّنة من الام الجافية وطبقتها الباطنة امتداد الغشاء المصلي للاوردة. وهي اثنا عشر تقسم الى مجموعتين احدها الجيوب الواقعة في الجزء العلوي والمؤخر للجحمة والثاني الجيوب الواقعة في قاعدة الجحمة فالجيوب الواقعة في الجزء العلوي والمؤخر للجحمة هي :

الطولي العلوي - الطولي السفلي - المستقيم - الجيبان الجانبيان - الجيبان المؤخريان

الجيب الطولي العلوي شاغل لحافة المنجل الخي المتصلة. يتدنى عند عرف الديك ويذهب من المقدم الى المؤخر حافراً للوجه الباطن من العظم الجهمي والحافتين المتجاورتين للجداريين والنسم العلوي من الخط الصليبي للعظم المؤخري وينتهي منقسماً الى الجيبين الجانبيين. وهذا الجيب مثلث الشكل ضيق من المقدم آخذ في الاتساع عند مروره الى المؤخر. وتُشاهد على وجهه الانسي الثغرات الباطنة للاوردة الختية مغطاة باخلية ليفية وتُشاهد ايضاً اربطة ليفية

التوالمستعرض للحاملة وينزل بجانب الشريان الفقري في القناة المكوّنة من التوات المستعرضة للفقرات العنقية ثم يخرج من الثقب الذي في التوالمستعرض للفقرة السادسة العنقية وينتهي عند اصل العنق في الجزء المؤخر للوريد اللا اسملة بقرب منشئه. ولهذا الوريد عند مصيه صامان. وقد ينقسم في الجزء السفلي من مسيره الى فرعين احدهما يخرج مع الشريان الفقري عند الفقرة السادسة العنقية والاخر من الثقب الذي في العنقية السابعة. فروعها. يقبل هذا الوريد في سيره الوريد اللقي الخلفي وفروعاً عضلية من العضلات التي في الجهة الجانبية من العنق واوردة ظهريّة شوكية من مؤخر الجزء العنقي للعمود الشوكي والوريد بن العنقيين الصاعد والغائر

اوردة المزدوجة (الدبلوية)

الطبقة المزدوجة في العظام الخوذية محفورة في البالغين باقنية متعرجة تبطنها طبقة من الجواهر العظمي المندمج والاوردة الواقعة في الاقنية المذكورة عظيمة متسعة جدرانها رقيقة وفيها تمددات كالجيوب بمنزلة حواصل لاجتماع الدم. ولا تُشاهد هذه الاوردة الا برفع الطبقة الظاهرة للجحبية. ويُشاهد في سن الشيخوخة عند اتحاد الدوران الاوردة المذكورة تتواصل بعضها ببعض وتعاظم. وهي مستطرفة الى الاوردة السمائية والى جيوب الام الجافية في باطن الخوذة والى اوردة السيناك في ظاهرها. وتنقسم الى اربعة فروع جهمي يصب في الوريد فوق الحجاج. وصدغي مقدم يصب في احد الاوردة الصدغية الغائرة. وصدغي خلفي يصب في الجيب الجباني. وموخر يصب في الوريد المؤخري او في الجيب المؤخري

الأوردة الدماغية

تقسم هذه الاوردة الى مخية ومخينية

فالاوردة المخية رفيعة الجدران الى غاية ما يكون ولا شيء فيها من النسيج العضلي او الصامات. وتنقسم الى سطحية وغائرة. اما السطحية فمتفرعة على ظاهر الخ ومستقرة في الثلوم بين التلافيف التي بعض الفروع يقاطعها. وتقبل فروعاً من جوهر الخ وتنتهي في الجيوب وقد تسمت تبعاً لمواقعها. فالاوردة المخية العليا عددها سبعة او ثمانية من كل جانب تذهب الى المقدم والانسية نحو الفرجة الطولية العظيمة وهناك تقبل الاوردة المخية الانسية التي ترجع الدم من تلافيف الوجه المسطح للنصف الكروي الخالف. ثم تسير منحرفة الى المقدم وتغلف بغد من الغشاء العنكبوتي وتصب في الجيب الطولي العلوي في الجهة الخالفة لسير الدم. والاوردة المخية المقدم السفلى تبدأ على الوجه السفلي للفصين المقدمين من الخ وتنتهي في الجيبين الكهنيين. والاوردة المخية الجانبية السفلى

تواصلها بواسطة جذع مستعرض اعلى القص يقبل فروعاً من الاوردة الدرقية السفلى. ويتواصل
ايضاً بالوداجيين الظاهر والباطن. ولاصامات لهذا الوريد

والوريد الوداجي الباطن يجمع الدم من باطن الخوذة والاجزاء السطحية للوجه والعنق.
يبدأ عند الثقب الوداجي في قاعدة الجمجمة وهو مكوّن من اتحاد الجيب الجانبي بالجيب المحجري
السفلي. وهذا الوريد متمدّد عند منشئه فسموا التمدد المذكور جيب او خليج الوداجي الباطن. اما
سيره فانه ينزل على جانب العنق نزولاً عمودياً ويكون وضعه اولاً الى الجانب الوحشي من
الشريان السباتي الباطن ثم الى الجانب الوحشي من السباتي الاصلي فاذا انتهى الى اصل العنق
اتحد بالوريد تحت الترقوة وتكوّن منها الوريد اللا اسم له. ويكون في اول امره مستقراً على
العضلة المستقيمة الجانبية وموضوعاً الى الخلف والجانب الوحشي من السباتي الباطن والزوج
الثامن والتاسع من الاعصاب. ثم الى الاسفل من ذلك يصير الوريد والشريان على مساحة واحدة
والعصب اللساني البلعومي والعصب تحت اللسان يسيران بينهما الى المقدم والعصب الرئوي
المعدي ينحدر بينهما الى الخلف منها مضمناً معها في غمد واحد والعصب الشوكي الاضافي يتجه
منحرفاً الى الوحشية وراء الوريد. وعند اصل العنق يكون الوريد في الجانب الايمن مبتعداً قليلاً
عن الشريان واما في الجانب الايسر فيصالبه غالباً عند جزئه السفلي. وهذا الوريد عظيم الحجم
وانما يختلف حجمه في الاشخاص ويكون الايسر منها في الغالب الاصغر. وله صامان موضوعان
عند منتهاه او اعلى ذلك بنصف قيراط

فروعه. يقبل هذا الوريد في سيره الوريد الوجهي واللساني والبلعومي والدرقي العلوي والدرقي
المتوسط والمؤخري. وقد مرّ الكلام على الوجهي والمؤخري. اما الاوردة اللسانية فتبدأ على ظهر
اللسان وجانبيه ووجهه السفلي وتذهب الى الوراء تابعة لسير الشريان اللساني وفروعه وتنتهي في
الوداجي الباطن. والوريد البلعومي يبدأ من الضفيرة البلعومية عند مؤخر البلعوم وجانبيه ويقبل
فروعاً سحائية ووريد قديان والوريد التوتدي الحنكي وينتهي في الوداجي الباطن وقد يصب
في الوجهي او اللساني او الدرقي العلوي. والوريد الدرقي العلوي يبدأ في جوهر الغدة الدرقية وعلى
وجهها بفروع تقابل فروع الشريان الدرقي العلوي وينتهي في الجزء العلوي للوداجي الباطن.
والوريد الدرقي المتوسط يجمع الدم من الجزء السفلي للغدة الدرقية ثم يتحد به فروع من الخنجرية
والنصبة وينتهي في الجزء السفلي للوداجي الباطن

واما الوريد الفقري من اوردة العنق فيبدأ بفروع صغيرة عديدة من العضلات الغائرة
الواقعة في الجزء العلوي والمؤخر من العنق. ويذهب الى الوحشية ويدخل الثقب الكائن في

اوردة العنق

اوردة العنق تجمع الدم من الراس والوجه وهي:

الوداجي الظاهر - الوداجي الظاهر الخلفي - الوداجي المقدم - الوداجي الباطن - القروي

فالوريد الوداجي الظاهر يقبل معظم الدم الذي يرجع من ظاهر الحنونة والاجزاء الغائرة للوجه فانه امتداد الوريد الصدغي الفكي والاذني الخلفي. بداءته في جوهر الغدة النكفية على خط مساوٍ لزاوية الفك السفلي وتجه عمودياً الى الاسفل في العنق بحيث يدل على سيره خط ممتد من زاوية الفك السفلي الى منتصف الترقوة. ويصالب في سيره العضلة القصية الحلمية فاذا وصل الى حافتها الخلفية سار على خط موازٍ لها حتى مندغمها الترقوي وهناك يثقب اللفافة الغائرة وينتهي في الوريد تحت الترقوة الى الجانب الوحشي من الوداجي الباطن. وبينما يتجدر في العنق تفصله عن القصية الحلمية الطبقة المقدمة للفاقة العنقية الغائرة وتغطيه العضلة الجلدية واللفافة السطحية والجلد ويصالبه في نحو مركزه العصب العنقي السطحي ويصاحب نصفه العلوي العصب الاذني العظيم. ويختلف حجم هذا الوريد وقد يكون مزدوجاً وله زوجان من الصمامات زوج سفلي موضوع عند مصبه في الوريد تحت الترقوة وزوج علوي موضوع في الغالب اعلى الترقوة بنحو قيراط ونصف. وانما هذه الصمامات لاتمنع تدهق الدم او الاحتقان من الاسفل الى الاعلى. فروعها. هذا الوريد يقبل الوريد المؤخري والوداجي الظاهر الخلفي وعند منتهاه الوريد فوق اللوح والعنقي المستعرض. ويستطرق الى الوداجي المقدم ويقبل وهو في الغدة النكفية فرعاً كبيراً استطراقياً من الوداجي الباطن

والوريد الوداجي الظاهر الخلفي يرد الدم من الجلد والعضلات السطحية التي في اعلى العنق ومؤخره واقعاً بين الطحالية والمربعة المنخرقة. ينزل في مؤخر العنق ويصب في الوداجي الظاهر عند اسفل منتصفه

والوريد الوداجي المقدم يجمع الدم من الجلد والعضلات التي في منتصف الجهة المقدمة للعنق. سيره الى الاسفل بين الخط المتوسط والحافة المقدمة للقصية الحلمية. وعند الجزء السفلي للعنق يسير تحت العضلة المذكورة ويصب في الوريد تحت الترقوة بقرب منتهى الوداجي الظاهر. ويختلف هذا الوريد كثيراً في الحجم بحيث تكون نسبتة الى الوريد الوداجي الظاهر متخالفة. وكثيراً ما يكون وربان احدهما امين والاخر ايسر فيندر ان يكون واحداً فقط. واذا كانا اثنين

الوريد الصدغي يبدأ بصفيرة دقيقة على جانب الجمجمة وتمتها مستطرفة الى الوريد الجبهي من المقدم والوريد الذي على الجانب الخالف من الجهة المقابلة والوريد الاذني الخلفي والمؤخري من الخلف. فتتكوّن من هذه الشبكة فروع مقدّمة وخلفية لتحدّ اعلى القوس الزوجي فتصير الوريد الصدغي. ويتحدّ بالوريد المذكور وهو في هذه الجهة الوريد الصدغي المتوسط الذي يرجع الدم من جوهر العضلة الصدغية وينقب الفافاة عند الحافة العليا للقوس الزوجي. ثم ينزل الوريد الصدغي بين القناة السمعية الظاهرة والتوا للقي للفك ويدخل جواهر الغدة النكفية ويتحدّ بالوريد الفكي الباطن فيكوّنان جذعاً واحداً يقال له الصدغي الفكي. فروعُه. يقبل هذا الوريد في سيره بعض اوردة نكفية وفعراً اذنياً من مفصل الفك واوردة اذنية مقدّمة من الاذن الظاهرة والوريد الوجهي المستعرض من جانب الوجه

الوريد الفكي الباطن عظيم الحجم لانه يقبل فروعاً تقابل الفروع الشريانية الناشئة من الشريان الفكي الباطن وهي الوريد السمائي المتوسط والصدغي الغائر والجناحي والمضغي والفكي وبعض اوردة لهوية والسني السفلي. فهذه الفروع تكوّن صفيرة كبيرة يقال لها الصفيرة الجناحية موضوعة بين العضلة الصدغية والجناحية الوحشية ومستطرفة الى الوريد الوجهي والجيب الكهفي. ويسير جذع الوريد المذكور الى الورااء خلف عنق الفك السفلي ويتحدّ بالوريد الصدغي فيتكون منها الوريد الصدغي الفكي


الوريد الصدغي الفكي مكوّن من اتحاد سابقه نازل في جوهر الغدة النكفية بين فرع الفك والعضلة النقصية الحليمية منقسم الى فرعين يسير احدهما الى الانسية ليتحدّ بالوريد الوجهي والاخر امتداد الوداجي الظاهر. ويقبل عند منتهاه الوريد الاذني الخلفي

الوريد الاذني الخلفي يبدأ على جانب الراس بصفيرة متواصلة بفروع من الوريد الصدغي والمؤخري وينزل خلف الاذن الظاهرة فيقترب بالوريد الصدغي الفكي قبيل منتهى هذا الوعاء في الوداجي الظاهر. ويقبل الوريد الابري الحلمي وبعض فروع من مؤخر الاذن الظاهرة

الوريد المؤخري يبدأ عند مؤخر قمة الجمجمة بصفيرة كباقي الاوردة ويتبع سير الشريان المؤخري ويسير غائراً تحت عضلات مؤخر العنق وينتهي في الوداجي الباطن وقد ينتهي في الظاهر. وبينما يكون سائراً جزءاً التوا الحلمي يقبل الوريد الحلمي الذي يكوّن استطرافاً بينه وبين الجيب الجانبي

يقال له القوس الانفي وقد يتحدان في الاعلى فيصيران جذعاً واحداً ينقسم عند اصل الانف الى شعبتين هما الوريدان الزاويان اللذان يتباعدان من هناك ويسيران بجانب اصل الانف . وبينما يكون الوريد الجبهي منحدرًا على الجبهة يقبل الوريد فوق الحجاج . وتنتهي الاوردة الظهريّة للانف في القوس الانفي . ويقبل الوريد الزاوي في جانبه الانسي اوردة جناح الانف وفي جانبه الوحشي الاوردة الجفنية العليا . ويوجد استطراق بين هذا الوريد والوريد العيني فيتكوّن من ذلك نغم مهم بين الوعاء المذكور والجيب الكهفي

الوريد الوجهي يبدأ عند الزاوية الانسية للحجاج فهو امتداد الوريد الزاوي . ويسير منحرفاً الى الاسفل والوحشية تحت العضلة الزوجية الكبيرة وينزل على جانب المحافة المقدمة للعضلة المضغية ثم يقاطع جسم الفك السفلي مع الشريان الوجهي ويسير الى الوحشية والوراء فيتحد بفرع استطراقي من الوريد الصدغي الفكي ويصير جذعاً كبيراً أصاباً في الوداجي الباطن . واما الفروع التي يقبلها هذا الوريد وهو في الوجه فهي فروع استطراقية من الضفيرة الجناحية والوريد الجفني السفلي والوريدان الشفويان العلوي والسفلي والاوردة القمية والاوردة المضغية . واسفل الفك يقبل الوريد تحت الذقن واللمهوي السفلي الذي يرحم الدم من الضفيرة المحيطة باللوزة واللهاة



شكل ١٨٥

والوريد تحت الفك الذي يبدأ في الغدة تحت الفك والوريد الضفدعي

شكل ١٨٥ اوردة ظاهر الراس والوجه والعنق ١ العضلة القصية الترفوية الحمية ٢ الوريد الوجهي ٣ الوريد الصدغي الوجهي المستعرض ٤ الاذني الخلفي ٥ الفكي الباطن ٦ الوداجي الظاهر ٧ فروع الوداجي الظاهر الخلفي ٨ الوداجي المقدم ٩ الوريد فوق اللوح ١٠ الوداجي الباطن ١١ المورخي ١٢ مصب الوداجي الظاهر في الوريد تحت الترفوة

يكون صامان موضوعان الواحد مقابل الاخر ولا سيما في الاوردة الصغيرة او في الاجذاع الكبيرة عند اتحاد الفروع الصغيرة بها وقد تكون ثلاثة وقد لا يكون الا واحد فقط. ثم ان جدار الوريد اعلى كل قطعة صامية يتمدد فيصير على شكل جيب بحيث اذا حُققت او كانت ممتلئة كان شكلها معقداً. والصامات كثيرة في الاطراف ولا سيما في الطرفين السفليين حيث تحمل الاوردة الدم الى الاعلى مقاومةً لناموس الثقل. ولا وجود لها في الاوردة الصغيرة والاجوفين والوريد الكبدي والباقي والرحمي والكلوي والميضي والاوردة الدماغية والشوكية والرئوية والسري. ويوجد قليل منها احياناً في الوريدين الفردين والاوردة بين الاضلاع وللاوردة اوعية مغذية كالشرابين يقال لها اوعية الاوعية وانما لم يشاهد لها اعصاب في الغالب. والمعلم كوليكر يقول انه شاهدها في جيوب الام الجافية والاوردة الشوكية والاجوفين وغيرها تُقسم الاوردة الى ثلاثة مجاميع اولاً اوردة الراس والعنق والطرف العلوي والصدر التي تنتهي في الاجوف العلوي. ثانياً اوردة الطرف السفلي والحوض والبطن التي تنتهي في الاجوف السفلي ثالثاً الاوردة القلبية التي تصب رأساً في الاذين اليمنى للقلب

اوردة الراس والعنق

نقسم هذه الاوردة الى ثلاثة اقسام وهي اولاً اوردة ظاهر الرأس ثانياً اوردة العنق ثالثاً اوردة الطبقة المزدوجة وباطن الجمجمة

اوردة ظاهر الراس


الوجهي - الصدغي - الفكي الباطن - الصدغي الفكي - الاذني الخلفي - المؤخري

الوريد الوجهي يسير بانحراف مقاطعاً لجانب الوجه ويمتد من الزاوية الانسية للجاج الى الاسفل والوحشية الى الحافة المقدمة للعضلة المضغية. وهو واقع الى الجانب الوحشي من الشريان الوجهي واقل تعرجاً منه. يبدأ في الجهة الجبهية فيقال له حينئذٍ الوريد الجهمي. وعند الزاوية الانسية للعين يقال له الزاوي. ومن هذه النقطة الى منتهاهُ يقال له الوجهي فالوريد الجهمي يبدأ في الجزء المقدم للجمجمة بصفيرة ويرد به مستطرفة الى الفروع المقدمة للوريد الصدغي. فاذا اجتمعت فروعهُ في جذع واحد انحدر الجذع المذكور بجانب الخط المتوسط للجمجمة موازياً للوريد الجانب الخالف ثم يتحدان عند اصل الانف بواسطة جذع مستعرض

فالاوردة السطحية ويقال لها الجلدية موجودة بين طبقات اللفافة السطحية تحت الجلد. ووظيفتها ترجيع الدم من الابنية المذكورة وتنفم بالاوردة الغائرة بعد ثقبها للفاقة الغائرة والاوردة الغائرة ترافق الشرايين في سيرها وتكون غالباً مضممة معها في غمد واحد ففي الشرايين الصغيرة كالكهبري والزندي والعصدي والتصبي والشظوي تكون غالباً ازاوياً واحداً الى كل من جانبي الشريان فيقال لها الاوردة المرافقة. واما الشرايين العظيمة كالابطي وتحت الترقوة والمابضي والفخذي فيرافقها غالباً وريد واحد فقط. وانما في بعض اعضاء الجسد الاوردة الغائرة لاتصاحب الشرايين كالاوردة التي في باطن الحنجمة والاوردة الكبدية والاوردة الكبيرة التي ترجع الدم من النسيج العظمي

واما الجيوب فانها جلاول وريدية تختلف اختلافاً كبيراً عن الاوردة في بنائها وكيفية توزيعها. ولاتوجد الا في باطن الحنجمة مكونة من انفصال طبقات الام الجافية فتكون طبقتها الظاهرة من نسيج ليفي وطبقتها الباطنة من غشاء مصلي ممتد من الغشاء المصلي للاوردة الحقيقية وجدران الاوردة ارق من جدران الشرايين ومولفة من ثلاث طبقات باطنة ومتوسطة وظاهرة. فالطبقة الباطنة شبيهة البناء بالطبقة الباطنة في الشرايين فهي مولفة من كريات سطحية ونسيج رخو موصل. والطبقة المتوسطة رقيقة ويختلف بناؤها عن الطبقة المتوسطة للشرايين من

شكل ١٨٤



جهة ان النسيج المرن والعصلي اقل فيها والنسيج الرخو الموصل اكثر. والطبقة الظاهرة اسمك من الطبقتين السابقتين غالباً وكما زاد الوريد في الحجم زادت هذه الطبقة في السماكة. وهي شبيهة بالطبقة الظاهرة للشرايين الا انه في بعض الاوردة تمتاز عنها بان فيها اليافا عضلية كثيرة موضوعة طولاً واكثر الاوردة لها صمامات فائدتها منع نقهر الدم مكونة من انشاء الطبقة الباطنة والمتوسطة ومولفة من نسيج موصل

والياف مرنة. شكلها هلالى وتصل بجدار الوريد بواسطة حافتها المحدبة. واما حافتها المقعرة فسائبة ومشرفة نحو مجرى الدم الوريدي فتكون ممتدة على جدار الوريد ما دام الدم سائراً في مجراه الطبيعي فاذا نقهر امتلات الصمامات وتماست حوافها المتقابلة فيمتنع رجوع الدم الى الوراء. وفي الغالب

شكل ١٨٤ رسم صمامات الاوردة A قطعة وريد مشقوق طولاً ممدد بحيث يظهر زوجان من الصمامات على وجهه الباطن B قطعة اخرى يظهر فيها ماسة حوافي احد الصمامات عند الامتلاء. a السطح المقعر للصمام المشرف نحو القلب C قطعة وريد مقعري يظهر عليه انتفاخ مقابل وضع الصمام

الفصل الخامس

في الاوردة

الاوردة اوعية تحمل الدم من الشبكة الشعرية المنتشرة في اجزاء الجسد وترجمه الى القلب. وهي مؤلفة من مجموعتين احدهما المجموع الرئوي والثاني المجموع العام فالاوردة الرئوية تختلف عن بقية الاوردة في انها تتضمن دمًا شريانيًا تحمله من الرئتين الى الاذنين اليسرى من القلب. والاوردة العامة تحمل الدم من الجسد عموماً وترجع به الى الاذنين اليمنى للقلب. واما الوريد الباني فتابع للمجموع الوريدي العام ومختصر في التجويف البطني حيث يحمل الدم الوريدي من الاحشاء الهضمية الى الكبد في جذع واحد عظيم ثم يحمل الدم المذكور من الكبد الى الوريد الاجوف السفلي بواسطة الاوردة الكبدية

والاوردة كالشرايين موجودة في جميع انسجة الجسد الا ما ندر. تبدأ بصفائر دقيقة متصلة بالوعية الشعرية وتذهب من الصفائر المذكورة فروع اذا اتحدت صارت اجناعات سائرة نحو القلب نصب فيها فروع وريدية كبيرة فتغلظ كلما تقاربت اليه. وهي اغلظ واكثر عدداً من الشرايين ولذلك كان المجموع الوريدي اكثر اتساعاً جداً من المجموع الشرياني الا المجموع الرئوي فانه متساوٍ فيهما. ولما كانت المساحة الملتصقة من الفروع الوريدية اعظم منها في الاجزاء العظيمة كان المجموع الوريدي بمنزلة مخروط راسه عند القلب وقاعدته عند محيط الجسد. واما شكل الاوردة فليس اسطوانياً كالشرايين لانها اذا كانت فارغة هبطت جدرانها ويُشاهد في مدة سيرها اخناقات تدل على وجود صمامات في باطنها

وتتفهم الاوردة بعضها ببعض سواء في الاجزاء الكبيرة والفروع الصغيرة ولا سيما في الاماكن التي يكون فيها التعرض للدورة الوريدية مضرًا بالحياة كباطن الخوذة والحنق. وتتفهم المذكور كثير ايضاً في القناة الشوكية وبين الصفائر الوريدية التي في البطن والحوض

نقسم الاوردة الى ثلاثة مجاميع سطحية وغائرة وجيبية

للاخلية بين العظام الثلاثة الوحشية بين رؤوس العضلات الظهرية وتنفم بالفروع بين العظام الآتية من الشريان المشطي

والفروع الأصبعية أربعة تتوزع في الأصابع الثلاثة الوحشية والجانب الوحشي للأصبع الأول أي الذي يلي الإبهام. فالأول منها ينشأ من الجانب الوحشي للقوس الأخمصي ويتوزع في الجانب الوحشي للخنصر والثاني والثالث والرابع تذهب إلى المقدم في الاخلية المشطية فاذا وصلت إلى الشقوق التي بين الأصابع تشعب كل منها إلى فرعين يتوزعان في الجانبين المتقابلين من الأصابع. وعند التشعب المذكور يرسل كل من هذه الفروع الأصبعية فرعاً صغيراً إلى الأعلى يمر من الجزء المقدم للخلاء المشطي ويتفم بالفروع بين العظام الآتية من الشريان المشطي. ويقال لهذه الفروع الثلاثة المقدمة. فيرعى من الترتيب المذكوران الفروع التي تتوزع في الأصابع الثلاثة الوحشية ونصف الأصبع الأول الذي بعد الإبهام ناشئة من القوس الأخمصي وإن الفروع التي تتوزع في جانبي الإبهام والجانب الإنسي للأصبع الأول ناشئة من الشريان الظهرى للقدم

في الشريان الرئوي (شكل ١٦٧)

وظيفة هذا الشريان حمل الدم الوريدي من الجانب الأيمن للقلب إلى الرئتين. وهو وعاء قصير عريض طوله نحو قيراطين ناشئ من الجانب الأيسر لقاعدة البطن الأيمن أمام الأورطي الصاعد. وأما سيره فانه يصعد منحرفاً إلى الأعلى والخلف واليسار فاذا وصل إلى الوجه السفلي لقوس الأورطي انقسم إلى فرعين متساويي الحجم تقريباً وهما الشريان الرئوي الأيمن والأيسر. مجاورته معظم هذا الشريان مضمين مع الجزء الصاعد لقوس الأورطي في التامور ويحيط بهما غلاف زلاي ممتد إلى الأعلى من قاعدة القلب. ومن وراءه يستقر أولاً على الأورطي الصاعد ثم على مقدم الأذن اليمنى. وإلى كل من جانبي منشئه زائدة اذينية وشريان اكليبي. وإذا ارتفع إلى الأعلى صار إلى الجانب الأيسر من الأورطي الصاعد. ويتصل قبيل تشعبه بالوجه السفلي لقوس الأورطي بواسطة حبل ليفي قصير هو بقية وعاء خاص بالجيين يقال له القناة الشريانية

أما الشريان الرئوي الأيمن فاطول واغليظ من الأيسر يذهب أفقياً إلى الوحشية وراء الأورطي الصاعد والوريد الأجوف العلوي إلى جذر الرئة اليمنى فينقسم هناك إلى فرعين يتوزع السفلي منها وهو أكبرهما في الفص السفلي من الرئة ويرسل العلوي فرعاً إلى الفص المتوسط والشريان الرئوي الأيسر أقصر وأصغر قليلاً من الأيمن يسير أفقياً أمام الأورطي النازل والشعبة اليسرى للرئة إلى جذر الرئة اليسرى وهناك ينقسم إلى فرعين يتوزعان في الفصين للرئة المذكورة

والعقبى الانسي مولف من جملة فروع كبيرة تنشأ من القصبي الخلفي قبيل تشعبه وتوزع في الدهن والجلد الذي وراء وتر اكليس وحول العقب وفي العضلات التي على الجانب الانسي للاخصص متفهمة بالشريان الشظوي والكعي الانسي

والشريان الاخصي الانسي اصغر جداً من الوحشي يسير الى المقدم على الجانب الانسي للقدم . ويكون وضعه اولاً اعلى المبعدة للايهام ثم بينها وبين القابضة القصيرة للاصابع فيرسل فروعاً اليهما . فاذا وصل الى قاعدة العظم المشطي الاول ذهب على الحافة الانسية للايهام ونعم بفروعه الاصبعية

والشريان الاخصي الوحشي اعظم جداً من الانسي يسير الى الوحشية والمقدم فاذا وصل الى قاعدة العظم المشطي الخامس انعكف منحرفاً الى الانسية الى الخلاء شكل ١٨٢

الواقع بين قاعدتي المشطي الاول والثاني ونعم هناك بالفرع الاستطراقي من الشريان الظهري للقدم فاكمل القوس الاخصي . وعندما يكون هذا الشريان ماراً الى الوحشية يكون وضعه اولاً بين العقب والمبعدة للايهام ثم بين القابضة القصيرة للاصابع والقابضة الاضافية . وعندما يكون ماراً الى المقدم الى قاعدة الخنصر يكون وضعه سطحياً بين القابضة القصيرة للاصابع والمبعدة للخنصر لا تغطيه الا اللقافة الغائرة والجلد .

واما ما بقي من هذا الوعاء فغائر الوضع ممتداً من قاعدة مشطي الخنصر الى مؤخر الخلاء الاول بين العظمين ومكوناً للقوس الاخصي . وهذا القوس محدد الى المقدم ويستقر على العضلات بين العظام مقابل الاطراف الرسغية للعظام المشطية وتغطيه المقربة للايهام والوتار القابضة للاصابع والخراطينية

فروع القوس الاخصي . يرسل هذا القوس ما عدا فروعاً كثيرة للعضلات والجلد واللقافتين الفروع الآتية وهي :


اللقافة الخلفية - الاصبعية - اللقافة المقدمية

فاللقافة الخلفية ثلاثة فروع صغيرة تصعد من اخص القدم الى ظهره الى الجزء المؤخر

شكل ١٨٢ شرايين اخص القدم وقد قُطعت الطبقة الاولى وبعض الثانية من العضلات ١ الوجه السفلي لعظم العقب ٢ العضلة الاضافية ٣ وترا القابضتين الطويلتين ٤ وتر الشظوية الطويلة ٥ منتهى الشريان القصبي الخلفي ٦ الشريان الاخصي الانسي ٧ الاخصي الوحشي ٨ القوس الاخصي الذي يرسل اربعة فروع اصبعية تسير على العضلات بين العظام المشطية ويتماد ان ثلاثة منها تنقسم الى فروع جانبية للاصابع

الشريان الشظوي

شكل ١٨٢



هذا الشريان موضوع وضعاً غائراً على الجزء الخلفي من الجانب الشظوي للساق . ينشا من الشريان القضي الخلفي اسفل الحافة السفلى للعضلة المابضية بنحو قيراط ويسير منحرفاً الى الوحشية فاذا وصل الى الشظية نزل بجانب حافتها الانسية الى الثلث السفلي من الساق وارسل هناك الفرع الذي يقال له الشظوي المقدم . ثم يقاطع المفصل بين القصبية والشظية الى الجانب الوحشي من العقب فيتوزع في العضلات المجاورة وموخر الكعب ويتم بالكهبي الوحشي والرسغي والاخمصي الوحشي مجاورته . يستقر اولاً على القصبية الخلفية ثم في ميزاب واقع بين الرباط بين العظمين والعظم . ونظيره في جزئه العلوي النعلية وفي الاسفل القابضة الطويلة للابهام

والشريان الشظوي المقدم ينشأ من سابقه ويتقب الغشاء بين العظمين اعلى الكعب الوحشي بنحو قيراطين فينهد الى مقدم الساق وينحدر تحت الشظوية الثالثة الى الكعب الوحشي ويتوزع في مقدم الرسغ وجانبه الوحشي متفهماً بالكهبي الوحشي والرسغي والشريان المغذي للقصبية ينشا من القضي الخلفي بقرب اصله ويرسل بعض فروع عضلية ثم يدخل القناة الغذائية للعظم المذكور . وهو اعظم الشرايين المغذية للعظام في الجسد

والفروع العضلية تتوزع في النعلية والعضلات الغائرة الواقعة في موخر الساق والفرع الاستطراقي من القضي الخلفي الى الشظوي يذهب عرضاً على موخر القصبية تحت القابضة الطويلة للابهام

شكل ١٨٢ موخر الساق الذي يشاهد فيه الشريان المابضي والقضي الخلفي . وقد فُطعت التوأمية والاحصية والنعلية لاجل اظهار الشريان القضي الخلفي ١ الارتار الاربعة التي تكوّن الحد الانسي للحلاء المابضي ٢ وتر ذات الراسين الذي يكون حده الوحشي ٣ المابضية ٤ القابضة الطويلة للاصابع ٥ القصبية الخلفية ٦ الشظية والى اسفل الرم منشا القابضة الطويلة للابهام التي فُطعت لاجل كشف الشريان الشظوي ٧ الشظويتان الطويلة والتصيرة ٨ الجزء السفلي القابضة الطويلة للابهام مع وترها ٩ الشريان المابضي وفروعه المفصلية . الاثنان العلويان سائران اعلى راسي التوأمية والسفليان مجاوران للعضلة المابضية ١٠ الشريان القضي المقدم ماراً في الحلاء الذي بين راسي القصبية الخلفية ١١ الشريان القضي الخلفي ١٢ الوضع الشدي للاوتار والشريان وراء الكعب الانسي من الانسية الى الوحشية ١٣ الشريان الشظوي الذي ينقسم الى فرعين مقدم وخلفي ١٤ الشظوي الخلفي

الشق الكائن بين الابهام والاصبع الاول انقسم الى فرعين احدهما يذهب الى الانسية تحت وتر القابضة الطويلة للابهام ويتوزع في الحافة الانسية للابهام. والآخر يتشعب الى شعبتين تتوزعان في الجانبيين المتقابلين للابهام والاصبع الاول والاستطراقي يتجه الى الاسفل ويغوص في اخمص القدم بين راسي العضلة الظهرية الاولى بين العظام ويتفيم بمنتهى الشريان الاخمصي الوحشي ليكمل القوس الاخمصي. وعند ذلك يرسل فرعين اصبعين. احدهما يسير على الجانب الانسي للابهام من الجهة الاخمصية والآخر يذهب الى المقدم بجانب الخلاء الاول بين العظام ويتشعب شعبتين تذهبان الى الجانبيين المتقابلين للابهام والاصبع الاول على الوجه الاخمصي

الشريان القصي الخلفي

هذا الشريان عظيم الحجم يمتد من الحافة السفلى للعضلة المابضية منحرفاً الى الاسفل على الجانب القصي للساق الى الحفرة الواقعة بين الكعب الانسي والعقب حيث ينقسم تحت منشأ المبعدة للابهام الى الشريانين الاخمصيين الانسي والوحشي. وعند منشئه يكون وضعه مقابل الخلاء الواقع بين القصبه والشظية فاذا اخذ في النزول قارب الجانب الانسي للساق وصار وراء القصبه ثم اذا انتهى في الاسفل كان وضعه بين الكعب الانسي وحادبه العقب. مجاورته. يستقر اولاً على العضلة القصبية الخلفية ثم على القابضة الطويلة للاصابع ثم في الاسفل على القصبه والجزء المؤخر لمفصل الرسغ. وتغطيه المفافة بين العضلات التي تفصله في الاعلى عن التوامية والنعلية. وفي ثلثه السفلي هو اقرب الى السطحية فلا يغطيه الا الجلد والمفافة ويذهب على خط مواز لوتر اكليس. ويرافقه في مسيره وربدان والعصب القصي الخلفي الذي يكون موضوعاً الى الجانب الانسي من الشريان اولاً ولكنه يصالبه على بعد يسير من منشئه فيصير الى جانبه الوحشي مدة معظم سيره

واما الاوتار والاعوية الواقعة وراء الكعب الانسي فهوضوعة من الانسية الى الوحشية على هذا الترتيب وهي اولاً ان وتري القصبية الخلفية والقابضة الطويلة للاصابع واقعان في ميزاب واحد وراء الكعب الانسي اولها اقربها الى الانسية. والى الوحشية منها الشريان القصي الخلفي ووريد مرافق الى كل من جانبيه. والى الوحشية من الشريان العصب القصي الخلفي. وعلى بعد نحو نصف قيراط من العصب الى جهة العقب وتر القابضة الطويلة للابهام

والشريانان الكعبيان يتوزعان في مفصل الرسغ . اما الانسي منها فينشأ أعلى المفصل نحو قيراطين ويذهب تحت وتر القصية المقدمة الى الكعب الانسي حيث يتوزع متممًا بفروع من القصي الخلفي والاخصي الانسي . والكعبي الوحشي يسير تحت اوتار الباسطة الطويلة للاصابع والباسطة للابهام ويتوزع في الكعب الوحشي متممًا بالشريان الشظوي المقدم وبفروع صاعدة من الفرع الرسغي للشريان الظهري للقدم

الشريان الظهري للقدم

هذا الشريان امتداد القصي المقدم الذي ينتمي عند الرباط الخلفي للرسغ . يتجه الى المقدم على الجانب القصي للقدم الى الجزء الخلفي للخلاء الاول بين العظمين حيث ينقسم الى فرعين وهما الظهري للابهام والاستطراقي . مجاورته . يستقر هذا الشريان في سيره الى المقدم على الكعب والزورقي والاسفيني الانسي والاربطة التي تربطها ويغطيها الجلد واللفافة ويصالبه بقرب منتهاء الوتر الانسي من اوتار القابضة القصيرة للاصابع . والى جانبه القصي وتر الباسطة للابهام والى جانبه الشظوي الوتر الانسي من اوتار الباسطة الطويلة للاصابع . ويرافقه وريدان والعصب القصي المقدم الذي يكون الى جانبه الوحشي


فروعه : الرسغي - المشطي - الظهري للابهام - الاستطراقي

فالشريان الرسغي ينشا من الشريان الظهري للقدم حال مقاطعه للعظم الزورقي ويذهب الى الوحشية على شكل مقوس مستقرًا على عظام الرسغ ومغطى بالباسطة القصيرة للاصابع فيتوزع في العضلة المذكورة وفي مفاصل الرسغ ويتمم بفروع من الشريان المشطي والكعبي الوحشي والشظوي والاخصي الوحشي

والمشطي ينشا الى مقدم سابقه قليلاً ويتجه الى الوحشية الى الجزء الوحشي من القدم موضوعاً على قواعد العظام المشطية تحت اوتار الباسطة القصيرة وتممًا بالرسغي والاخصي الوحشي . ويرسل هذا الشريان ثلاثة فروع يقال لها بين العظام تسير الى المقدم على العضلات الثلاث الوحشية بين العظام فاذا انتهت الى الفرجات التي بين الاصابع انقسم كل منها الى فرعين جانبيين ظهرين يذهبان الى الاصبعين المتجاورين . وفي الجزء المؤخر من الاخالية بين العظام هذه الاوعية تقبل الفروع الثاقبة الخلفية من القوس الاخصي وعند الجزء المقدم من الاخالية المذكورة تأتيها الفروع الثاقبة المقدمة من الشرايين الاصبعية . ويرسل الشريان الوحشي بين العظام فرعاً يذهب الى الجانب الوحشي من الخنصر

والظهري للابهام يسير الى المقدم بجانب الحافة الوحشية للعظم المشطي الاول فاذا انتهى الى

شكل ١٨١



الجزء العلوي للرباط بين العظمين الى الجزء الغائر من مقدم الساق ثم ينزل على الوجه المقدم للرباط بين العظمين وللقصبة الى مقدم مفصل الرسغ حيث يكون وضعه اقرب الى السطحية ويصير هناك الشريان الظهري للقدم . فاذا رُسم خط من الوجه الانسي لراس الشظية الى نقطة متوسطة بين الكعبين كان ذلك موازياً لسير الشريان . مجاورته . في الثلثين العلويين من سيره يستقر على الرباط بين العظمين متصلاً به بواسطة اقواس رقيقة . وفي ثلثه السفلي يستقر على مقدم القصبة والرباط المقدم لمنصل الرسغ . وفي ثلثه العلوي يكون موضوعاً بين القصبية المقدمة والباسطة الطويلة للاصابع وفي ثلثه المتوسط بين القصبية المقدمة والباسطة للاصابع وفي ثلثه السفلي يصالبه وتر الباسطة للاصابع ويكون وضعه بين الوتر المذكور وبين الوتر الانسي من اوتار الباسطة الطويلة للاصابع . وتغطيه في ثلثيه العلويين العضلات الواقعة على جانبيه واللفافة الغائرة وفي ثلثه السفلي الجلد والرباط الخلفي واللفافة . ويصاحبه وريدان واحد من كل جانب . واما العصب القصي المقدم فيكون في اول سيره الى جانبه الوحشي وفي منتصف الساق يصير الى السطحية منه وفي ثلثه السفلي يرجع الى جانبه الوحشي

فروعه : القصي الراجع - الفروع العضلية - الكعبى الانسي - الكعبى الوحشي

فالفرع القصي الراجع ناشئ من القصي المقدم حال نفوذه من الخلاء بين العظمين ويصعد في العضلة القصبية المقدمة ويتفرع في مقدم وجانب مفصل الركبة متممماً بالفروع المفصليّة من الشريان المابضي

والفروع العضلية كثيرة تتوزع في العضلات الواقعة الى جانبي الشريان وبعضها يثقب اللفافة الغائرة ويتوزع في الجلد وبعضها ينفذ من الرباط بين العظمين ويتفم بالشريان القصي الخلفي والشريان الشظوي

شكل ١٨١ مقدم الساق والقدم ويصاحف في هذا الرسم الشريان القصي المقدم والظهري للقدم . وقد قُطعت العضلة القصبية المقدمة لاجل اظهار الشريان ١ وتر رباعية الرؤوس ٢ الرباط الرضفي عند ارتباطه بالحافة السفلى للرضفة ٣ القصبة ٤ الباسطة للاصابع ٥ الباسطة الطويلة للاصابع ٦ الشظويتان ٧ التوأمية والتعلبية ٨ الرباط الخلفي ٩ الشريان القصي المقدم ١٠ فرعه الراجع الذي يتفم بالشريانين المفصليين المابضي ١١ الكعبى الانسي ١٧ الكعبى الوحشي الذي يتفم بالشظوي المقدم المشار اليه برقم ١٢ ١٢ الشريان الظهري للقدم ١٤ الرسغي والمشطي اولها الى الاعلى وثانيها الى الاسفل الذي يرسل ثلاثة فروع بين العظام المنطية ١٥ الظهري للاصابع ١٦ الاستطرافي الذي يدوم من الظهري للقدم ويفوص الى الاخص

الوحشي - المفصلي السفلي الانسي

فالفرع العضلية تقسم الى عليا وسفلى. فالعليا اثنان او ثلاثة تنشأ من الجزء العلوي للشريان المأبضي وتوزع في المتسعة الوحشية والعضلات القوابض الخلفية للفخذ متفهمةً بالثاقب السفلي والفرع الانتهائية للشريان الغائر. والسفلى اثنان عظيمان يتوزعان في راسي التوأمية وفي الاخمصية وينشآن من الشريان المأبضي حذاء مفصل الركبة والفرع الجملدية تنشأ من المأبضي او من فروعها وتترل على الوجه الظاهر للتوأمية وتوزع في جلد بطن الساق

والفرعان المفصليان العلويان ينشآن من جانبي المأبضي وينعكفان حول عظم الفخذ اعلى عقدتيه الى مقدم مفصل الركبة. فالانسي منهما يمر تحت وتر المترية الكبيرة وينقسم الى فرعين يذهب احدهما الى المتسعة الانسية ويتفهم بالمتفهم الكبير والمفصلي الانسي السفلي والآخر يتفرع على وجه العظم الفخذي فيتوزع فيه وفي مفصل الركبة ويتفهم بالشريان المفصلي الوحشي العلوي. والفرع الوحشي يسير اعلى العقدة الوحشية تحت وتر ذات الراسين وينقسم الى فرعين. فالسطحي منهما يتوزع في المتسعة الوحشية ويتفهم بالفرع النازل للشريان المنعكف الوحشي. والغائر يتوزع في الجزء السفلي لعظم الفخذ ومفصل الركبة ويتفهم على شكل قوس بالمتفهم الكبير والمفرد المفصلي فرع صغير ينشأ من الشريان المأبضي مقابل ثنية الركبة ويثقب الرباط الخلفي ويتوزع في الاربطة والغشاء الزلالي الكائنة في باطن المفصل والفرعان المفصليان السفليان احدهما انسي والآخر وحشي ينشآن من المأبضي تحت التوأمية وينعكفان حول راس القصبية اسفل المفصل. فالانسي يسير اسفل الحدبة الانسية تحت الرباط الجانبي الانسي فاذا وصل الى حافته المقدمة صعد الى مقدم المفصل وجانبه الانسي ليتوزع في راس القصبية ومفصل الركبة. والوحشي يذهب الى الوحشية اعلى راس الشظية الى مقدم مفصل الركبة واقعاً في سيره تحت الراس الوحشي للتوأمية والرباط الجانبي الوحشي وتر ذات الراسين ثم ينقسم الى فروع تتفهم بشريان الجانبي الخالف وبالفرع المفصلي العلوي والفرع الراجع من الشريان القصي المقدم

الشريان القصي المقدم

يبدأ هذا الشريان عند تشعب المأبضي ابي عند الحافة السفلى للعضلة المابضية ويسير الى المقدم بين راسي العضلة القصبية الخلفية ثم من الثقب الواقع بين العظمين ابي القصبية والشظية عند

وتحدّه من الاعلى زاوية ملتقى عضلات مؤخر الفخذ ومن الاسفل ملتقى راسي التوامية. واما ارضه
فمكونة من الجزء السفلي للوجه الخلفي من جسم عظم الفخذ والرباط الخلفي لمفصل الركبة والطرف
العلوي للقصبية واللفافة المغطية للعضلة المابضية. وتكوّن قبوته اللفافة العريضة

ويتضمن هذا الخلاء الوعائين المابضيين وفروعها ونهاية الوريد الصافن الوحشي والعصبين
المابضيين الانسي والوحشي وفروعها والعصب الوركي الصغير والفرع المفصلي للعصب الساد
وبعض غدد لييفاوية صغيرة وكية وافرة من نسج دهني رخو

واما وضع هذه الاجزاء بالنظر الى نسبتها بعضها الى بعض فعلى الكيفية الاتية. وهي ان العصب
المابضي الانسي ينزل على الخط المتوسط للخلاء واقعاً الى الجهة السطحية وقليلاً الى الوحشية من
الوريد والشريان. والعصب المابضي الوحشي ينزل الى الجهة الوحشية من الخلاء مجانباً لوتر
ذات الراسين. وفي قعر الخلاء الوعائين المابضيين موضوعين على شكل ان الوريد واقع الى الجهة
السطحية وقليلاً الى الوحشية من الشريان ملتصق به بواسطة نسج خلوي كثيف وقد يكون الى
الجانب الانسي لا الوحشي من الشريان وقد يكون الوريد مزدوجاً فيكون وضع الشريان بينهما.
ويستقر الشريان المابضي على وجه العظم وفروعه المفصلية ذاهبة منه على زوايا قائمة. وينزل
على هذا الشريان الفرع المفصلي من العصب الساد ليتوزع في مفصل الركبة. وقد يوجد خيط
منصلي من العصب الوركي العظيم غائراً في الخلاء. واما الغدد اللييفاوية المابضية التي عددها
اربع او خمس فمحيطه بالشريان

واما الشريان المابضي (شكل ١٨٢) ففي سيره الى الاسفل من الفتحة التي في المقربة الكبيرة الى
الحافة السفلى للعضلة المابضية يستقر اولاً على الوجه الانسي لعظم الفخذ ثم على وجهه الخلفي. ويستقر
في منتصف سيره على الرباط الخلفي لمفصل الركبة وفي الاسفل على اللفافة التي تغطي العضلة
المابضية. والى السطحية تغطيه في الاعلى الغشائية النصف وفي منتصف سيره تغطيه كية من
الدهن التي تفصله عن اللفافة الغائرة والجلد وفي الاسفل تتجاوزه التوامية والاحصية والنعلية
والوريد المابضي والعصب المابضي الانسي. والوريد المابضي الملتصق بالشريان يكون الى
السطحية والوحشية منه الى قرب منتهاه وحينئذ يصاله ويكون الى جانبه الانسي. والعصب
المابضي واقع الى السطحية والوحشية اكثر من الوريد ولكنه يصاله اسفل المفصل فيصير الى
جانبه الانسي. والى جانبي الشريان العضلات التي تكوّن حدود الخلاء المابضي

وفروع الشريان المابضي هي:

العضلية - الجلدية - المنصلي العلوي الوحشي - المنصلي العلوي الانسي - المنفرد المفصلي - المنصلي السفلي

الوركي والمنعكف الانسي والثاقب المتوسط. والثاقب المتوسط أكبر من سابقه يثقب وتري المقربة
القصيرة والكبيرة وينقسم الى فروع صاعدة ونازلة تتوزع في العضلات الخلفية للفخذ وتتمم بالثاقب
العلوي والسفلي. ويرسَل في الغالب الشريان المغذي لعظم الفخذ من هذا الفرع. والثاقب السفلي
مُرْسَل اسفل المقربة القصيرة. يثقب المقربة الكبيرة ويتفرّع في العضلات الخلفية للفخذ
بالتاقبين من الاعلى وبالفرع الانتهائية للغائر من الاسفل

واما الفروع العضلية فتُرسل من الفخذي السطحي على طول سيره. عددها يختلف من اثنين
الى سبعة ومعظم توزعها في الخياطية والمتسعة الانسية

والشريان المتفهم الكبير ينشأ من الفخذي السطحي قبيل مروره من الفتحة الوترية التي في
المقربة الكبيرة وينقسم الى فرع سطحي وفرع غائر. فالسطحي يرافق العصب الصافن الطويل
تحت الخياطية ثم يثقب اللقافة العريضة ويتوزع في الجلد. والفرع الغائر ينزل في جوف المتسعة
الانسية موضوعاً الى مقدم وتر المقربة الكبيرة الى الجانب الانسي من الركبة وهناك يتمم
بالشريان المفصلي العلوي الانسي والفرع الراجع من الشريان القصي المقدم. وبذهب فرع من
هذا الوعاء الى الوحشية اعلى الوجه المفصلي لعظم الفخذ فيكون قوساً مع الشريان المفصلي الوحشي
العلوي تذهب منه فروع لمفصل الركبة

الشريان المأبضي (شكر ١٨٢)

يبدأ هذا الشريان حيث ينتهي الفخذي اي عند الفتحة الكائنة في المقربة الكبيرة. ويسير منحرفاً
الى الاسفل والوحشية وراء مفصل الركبة الى الحافة السفلي للعضلة المأبضية حيث ينقسم الى
الشريانين القصيين المقدم والخلفي. ففي جميع هذا السير يكون وضع الشريان المذكور في الخلاء
المأبضي

الخلاء المأبضي

هذا الخلاء شاغل للثلث السفلي من الفخذ والخمس العلوي من الساق ممتد من الفتحة الكائنة
في المقربة الكبيرة الى الحافة السفلي للعضلة المأبضية معين الشكل اكثر اتساعه عند مؤخر
مفصل الركبة واكثر غوره اعلى الطرف المفصلي لعظم الفخذ. تحده من الوحشية اعلى المفصل
ذات الرأسين واسفله الاخمصية الرفيعة والرأس الوحشي للتوامة. وتحده من الانسية اعلى
المفصل الغشائية النصف والوترية النصف والرقينة والخياطية واسفله الرأس الانسي للتوامة.

من الجزء الوحشي والخلفي للشريان الفخذي على مسافة قيراط الى قيراطين اسفل رباط پوپارت. ويكون وضعه في اول سيره الى الجانب الوحشي من الفخذي السطحي ثم يسير تحته وتحت الوريد الفخذي الى الجانب الانسي من عظم الفخذ وينتهي عند الثالث السفلي بفرع صغير يثقب المقربة الكبيرة ويتوزع في العضلات القابضة على مؤخر الفخذ متفهماً بفروع من الشريان المأبضي والثاقب السفلي. مجاورته. من الخلف يستقر اولاً على العضلة الحرقفية ثم على المقربتين القصيرة والكبيرة. والى المقدم يفصله عن الشريان الفخذي الوريد الفخذي والغائر من الاعلى والعضلة المقربة الطويلة من الاسفل. والى جانبه الوحشي يفصله عن عظم الفخذ مندغم العضلة المتسعة الانسية والشريان المنعكف الوحشي يتوزع في العضلات التي على مقدم الفخذ. ينشأ من الجانب الوحشي للشريان الفخذي الغائر ويذهب افقياً الى الوحشية بين اقسام العصب الفخذي المقدم تحت الخياطية والمستقيمة وينقسم الى فروع منها صاعدة ومنها مستعرضة ومنها نازلة. فالفروع الصاعدة تذهب الى الاعلى تحت الشادة لغد الفخذ الى الجانب الوحشي للورك متفهماً بالفروع الانتهاية للشريان الالوي والحرقفي المنعكف. والفروع النازلة ثلاثة واربعة تذهب الى الاسفل تحت المستقيمة فتتوزع في المتسعتين وتنضم بالفروع العليا المفصلة للشريان المأبضي. والفروع المستعرضة اصغرهما واقبلها عدداً تذهب الى الوحشية على العضلة الفخذية فتثقب المتسعة الوحشية وتنتف حول عظم الفخذ الى جزئه الخلفي اسفل المدور الكبير متفهماً في مؤخر الفخذ بالشريان المنعكف الانسي والوركي والثاقب العلوي

والشريان المنعكف الانسي اصغر من الوحشي. ينشأ من الجزء الانسي والخلفي للشريان الفخذي الغائر وينعكف حول الجزء الانسي لعظم الفخذ بين العضلة المشطية والصلبية. فاذا وصل الى وتر السادة الظاهرة ارسل فرعين احدهما صاعد يتوزع في العضلات المقربة والرقبة والسادة الظاهرة وتنضم بالشريان الساد والاخر نازل يسير تحت المقربة القصيرة فيتوزع فيها وفي المقربة الكبيرة. واما ما بقي من الشريان فانه يسير الى الخلف بين المربعة الفخذية والحافة العليا للمقربة الكبيرة وتنضم بالشريان الوركي والمنعكف الوحشي والثاقب العلوي. ويرسل هذا الفرع مقابل المنصل الوركي فرعاً منفصلاً يدخل المنصل تحت الرباط المستعرض

والشرايين الثاقبة غالباً ثلاثة سميت بذلك لانها تثقب اوتار المقربتين القصيرة والكبيرة لتصل الى مؤخر الفخذ فيرسل اولها اعلى المقربة القصيرة والثاني الى مقدمها والثالث اسفلها. فالثاقب العلوي يسير الى الوراء بين المشطية والمقربة القصيرة ويثقب المقربة الكبيرة بقرب الخط الششن وينقسم الى فروع تتوزع في المقربتين المذكورتين وذات الرأسين والالوية الكبيرة وتنضم بالشريان

فروع الشريان الفخذي

حافة الحوض والرباط المحفظي للورك ثم تنصله عن العضلة المشطية الاوعية الغائرة والوريد الفخذي ثم يستقر على المقربة الطويلة واخيراً يستقر على وتر المقربة الكبيرة منفصلاً عنها بواسطة الوريد الفخذي. ويجاور الى جانبه الانسي من الاعلى الوريد الفخذي والى الاسفل من ذلك المقربة الطويلة والحياطية. والى جانبه الوحشي تفصله المتسعة الانسية عن عظم الفخذ في الجزء السفلي من سيره. واما الوريد الفخذي فعند رباط يويارت ملاصق للشريان من جانبه الانسي منفصل عنه بمجاذر ليفي رقيق ثم في انحداره الى الاسفل يصير وراءه ثم الى الجانب الوحشي منه. والعصب الصافن الانسي موضوع الى الجانب الوحشي من الشريان في الثالث المتوسط تحت الصفاق المغطي لها خارج الغمد المحيط بالشريان والوريد الفخزيين. وتصاب مدم الغدد المذكورة اعصاب صغيرة جلدية

فروع الشريان الفخذي

الشراسيفي السطحي - الحرقفي المنعكف السطحي - الاستحيائي الظاهر السطحي - الاستحيائي الظاهر الغائر - الشريان الفخذي الغائر - الفروع العضلية - المنعم الكبير


فالشراسيفي السطحي ينشأ من الشريان الفخذي اسفل رباط يويارت بنحو نصف قيراط ويمر من الفتحة الصافية في اللقافة العريضة ويصعد الى البطن في اللقافة السطحية التي تغطي العضلة المنخرقة الظاهرة الى ان يبلغ الى قرب السرة. ويرسل فروءاً الى الغدد الأربية واللقافة السطحية والمجدل تنعم بفروع من الشراسيفي السفلي للحرقفي الظاهر والشراسيفي العلوي للثدي الباطن والحرقفي المنعكف السطحي اصغر الفروع الجلدية ينشأ بقرب سابقه وينقب اللقافة العريضة ثم يذهب الى الوحشية على خط مواز لرباط يويارت حتى العرف الحرقفي منتسماً الى فروع تتوزع في جلد الأربية واللقافة السطحية والغدد الأربية وتنعم بالحرقفي المنعكف (من الشريان الحرقفي الظاهر) والالوي (من الحرقفي الباطن) والمنعكف الوحشي (من الفخذي الغائر)

والاستحيائي الظاهر السطحي ويقال له العلوي ايضاً ينشأ من الجانب الانسي للشريان الفخذي بقرب الفرعين السابقين وينقب اللقافة العريضة عند الفتحة الصافية ويذهب الى الانسية مقاطعاً للجلد المنوي فيتوزع في الجلد على الجزء السفلي من البطن والتضيب والصفن في الذكور والشفرين في الاناث متفهماً بفروع من الاستحيائي الباطن

والاستحيائي الظاهر الغائر ويقال له السفلي ايضاً غائر الوضع اكثر من سابقه ويسير الى الانسية على العضلة المشطية مغطى باللقافة العريضة التي يتقها مقابل الفرع العاني. وتتوزع فروعه في جلد الصفن والعجان في الذكور وفي الشفر في الاناث متفهماً بالشريان العجاني السطحي والشريان الفخذي الغائر عظيم الحجم يقرب ان يكون كحجم الشريان الفخذي السطحي. منشأه

والوريد الفخذيان فيرسل الشريان وهو في هذا الخلاء فروعه الجلدية والفرع الغائر واما الوريد فانه يقبل الوريد الفخذي الغائر والصابن الانسي . ويستقر الشريان

شكل ١٨٠



في هذا الخلاء على الحافة الانسية للعضلة الصلية التي تفصله عن الرباط الخنفي للمفصل الوركى ويصالبه الى المقدم الفرع الفخذي من العصب التناسلي الفخذي والى المؤخر الفرع الذي يذهب الى العضلة المشطية من العصب الفخذي المقدم . واما الوريد الفخذي فموضوع الى الجانب الانسي من الشريان بين حافتي المشطية والصلية . والعصب الفخذي المقدم موضوع على بعد نحو نصف قيراط من الجانب الوحشي للشريان غائرآين الحرقفية والصلية . ثم ان الشريان والوريد الفخذيين مضمنان في غمد ليفي متين مكوّن من نسج ليفي ونسج خلوي وزائدة من اللفافة العريضة للفخذ واما تفصل هذين الوعائين الواحد عن الاخر حواجز ليفية رقيقة

وفي الثلث المتوسط للفخذ وضع هذا الشريان غائر اكثر من الثلث العلوي فيغطيه الجلد واللفافتان السطحية والغائرة والعضلة الخياطية ويكون مضمناً في قناة صفاقية (هي قناة هنتر) مؤلفة من رباط كثيف ليفي وممتدة عرضاً من العضلة المتسعة الانسية الى وترية المقربتين الطويلة والكبيرة . وفي هذا الجزء من سيره يكون وضعه في انخفاض

تحده من الوحشية العضلة المتسعة الانسية ومن الانسية المقربتان الطويلة والكبيرة . ويكون الوريد الفخذي في هذا الجزء من مسير الشريان الى جانبه الوحشي ملاصقاً له والى الوحشية و

الوريد العصب الصابن الانسي وهو الطويل

مجاورته . يستقر الشريان الفخذي من الاعلى الى الاسفل اولاً على العضلة الصلية التي تفصله عن

شكل ١٨٠ مقدم وانسي الفخذ مع الشريان الفخذي ١ الجزء السفلي لوتر الحرقفة الظاهرة الذي حافته السفلي تكون رباط بوبارت ٢ الخلفة البطنية الظاهرة ٣ والطرف العلوي والسفلي للخياطية وقد قطع ما بينها ٤ المستقيمة ٥ المتسعة الانسية ٦ الرضفة ٧ الحرقفية والصلية التي هي اقربها الى الشريان الفخذي ٨ المشطية ٩ المقربة الطويلة ١٠ قناة وترية (هي قناة هنتر) يمر فيها الشريان الفخذي ومكوّن من المقربة الكبيرة والمتسعة الانسية ١١ المقربة الكبيرة ١٢ الرقيقة ١٣ وتر التوتية النصف ١٤ الشريان الفخذي ١٥ الحرقفي المنعكف السطحي ذاهباً على مسير رباط بوبارت الى عرف الحرقفي ١٦ الشرايين السطحي ١٧ الشريانان الاستقباليان الظاهران السطحي والغائر ويقال لهما العلوي والسفلي ايضاً ١٧ الفخذي الغائر ١٨ المنعكف الوحشي الذي ينشأ من سابقه . واسفله الفروع الثلاثة . واما المنعكف الانسي الذي ينشأ من الفخذي الغائر ايضاً فيشار اليه عند رقم ٨ الى انسي الشريان الفخذي بعكفة صغيرة اسفل الاستقبالي الظاهر السفلي ١٩ المقدم الكبير الذي يتفرع على الركبة

والبريتون ويتفهم بالشرايين القطنية والشريان الحرقفي المنعكف وبعضها ينتقب وتر المنخرقة الظاهرة ويتوزع في الجلد متفهماً بفروع من الشراسيفي السطحي والشريان الحرقفي المنعكف ينشأ من الجانب الوحشي للحرقفي الظاهر جزاء الشريان الشراسيفي. ويصعد منحرفاً الى الوحشية وراء رباط پوپارت ويسير على الوجه الباطن للعرف الحرقفي الى نحو منتصفه وهناك ينتقب العضلة المستعرضة ويذهب الى الوراء بين هذه العضلة والمنخرقة الباطنة ليتفهم بالشريان الحرقفي القطني والشريان الالوي. ويرسل فرعاً كبيراً مقابل الشوكة العليا المقدمة للحرقفي يصعد بين المنخرقة الباطنة والمستعرضة ويتوزع فيها متفهماً بالشرايين الحرقفية القطنية والشراسيفي العلوي. ويرافق الحرقفي المنعكف ويريدان ينحدران ويصيران جذعاً واحداً يصلب الشريان الحرقفي الظاهر اعلى رباط پوپارت ويصب في الوريد الحرقفي الظاهر

الشريان الفخذي

هذا الشريان امتداد الحرقفي الظاهر. يبدأ تحت رباط پوپارت من نقطة متوسطة بين الشوكة المقدمة العليا للحرقفي والارتفاق العاني ثم ينزل في الجزء المقدم والجانب الانسي للفخذ وينتهي عند الفتحة الكائنة في المقربة الكبيرة عند ملتقى الثلث المتوسط بالثلث السفلي للفخذ حيث يصير الشريان المأبضي. فاذا رُسم خط ممتد من نقطة متوسطة بين الشوكة المقدمة العليا والارتفاق العاني الى الجانب الانسي للعقدة الانسية من عظم الفخذ كان ذلك الخط موازياً لمسير الشريان الفخذي. واما وضع هذا الشريان بالنسبة الى عظم الفخذ ففي الجزء العلوي من الفخذ يكون منحرفاً قليلاً الى الانسية عن راس العظم المذكور وفي الجزء السفلي من مسيره يكون وضعه على الجانب الانسي لجسم العظم وما بين هاتين النقطتين يكون منفصلاً عن العظم بمجلاء عظيم. وفي الثلث العلوي للفخذ هذا الشريان سطحي غاية ما يكون لا يغطيه الا الجلد والفدود الليمفاوية الأريية واللفافة السطحية واللفافة الغائرة واقع في خلاء مثلث يُقال له مثلث سكاريا

في مثلث سكاريا. هذا المثلث واقع تحت الانخفاض الظاهر الذي يُشاهد اسفل الثنية الأريية. رأسه مشرف الى الاسفل وجانبه الوحشي مكون من الخياطية وجانبه الانسي من المقربة الطويلة وقاعدته من رباط پوپارت. واما ارضه فتكونها من الوحشية الى الانسية الحرقفية والصلبية والمشطية والمقربة الطويلة وجزء صغير من المقربة القصيرة. والاعوية الفخذية تمتد من منتصف قاعدته الى رأسه فتقسمه الى قسمين متساوين تقريباً. والاعوية المذكورة هي الشريان

الشريان الحرقفي الظاهر (شكل ١٧٨)

هذا الشريان هو الوعاء الرئيسي الذي يتوزع في الطرف السفلي وهو اغلظ في البالغ من الحرقفي الباطن. يذهب منحرفاً الى الاسفل والوحشية على الحافة الانسية للعضلة الصليبية ممتداً من تشعب الحرقفي الاصلي الى القوس الفخذي فاذا خرج منه دخل الفخذ وصار الشريان الفخذي. ويدل على مسير هذا الشريان خط برسم من الجانب الايسر للسرة الى نقطة متوسطة بين الشوكة المتقدمة العليا للحرقفي والارتفاق العاني. مجاورته. الى المقدم للبريتون والنسيج الخلوي تحت البريتون والامعاء وطبقة رقيقة لنافية ناشئة من اللفافة الحرقفية محيطة بالشريان والوريد. وعند منشأه يصله احياناً الحالب. وعند منتهاه يسير عليه الشريان المنوي ويصله هناك فرع من العصب التناسلي الفخذي والوريد الحرقفي المنعكف. والقناة الناقلة تنحني الى الاسفل على جانبه الانسي. والى الخلف يجاور الوريد الحرقفي الظاهر الذي يصير الى الانسية منه عند القوس الفخذي واما من اليسار فالوريد الى الانسية منه على طول مسيره. والى الوحشية يستقر على العضلة الصليبية المنفصلة عنه باللفافة الحرقفية ويستقر عليها اذا قارب رباط يويارت. ويشاهد كثير من الاوعية والعقد الليمفاوية الى الجهة المقدمة والانسية منه

فروعه. يرسل هذا الشريان جملة فروع الى العضلة الصليبية والعقد الليمفاوية المجاورة ويرسل عند جزئه السفلي قرب القوس فرعين عظيمين هما الشراسيفي والحرقفي المنعكف فالشريان الشراسيفي ينشأ من مقدم الحرقفي الظاهر اعلى رباط يويارت وينزل اولاً الى ان يصل الى الرباط المذكور ثم يصعد منحرفاً الى الاعلى والانسية بين البريتون واللفافة المستعرضة الى حافة غمد المستقيمة البطنية فيثقب الغمد بقرب ثلثه السفلي ويصعد عمودياً الى الاعلى وراء المستقيمة وهناك ينقسم الى فروع كثيرة تتوزع في هذه العضلة وتنغم اعلى السرة بالفروع الانتهائية للشدي الباطن والشرايين بين الاضلاع السفلى. ويرافقه وربان يتخذان غالباً قبل وصولها الى الوريد الحرقفي الظاهر. وبينما يكون هذا الشريان صاعداً من رباط يويارت الى العضلة المستقيمة يكون وضعه وراء القناة الأربية الى الجانب الانسي للحلقة البطنية الباطنة واعلى الحلقة الفخذية. والقناة الناقلة في الذكور والرباط المستدير في الاناث يقاطعانه الى الورا

فروعه: المعلق الذي يصاحب الحبل المنوي ويتوزع في العضلة المعلقة للخصية متفهماً بالشريان المنوي. وفرع عاني يقاطع رباط يويارت ثم ينزل وراء العظم العاني الى الجانب الانسي للحلقة الفخذية ويتفهم بفروع من الشريان الساد. وفروع عضلية بعضها يتوزع في العضلات البطنية

المذكورة وبعضها يثقب منشأها الوتري ويتوزع في الجلد الذي يغطي الوجه الخلفي للعجز متممًا بالفروع الخلفية للشرايين العجزية

وفرعها الغائر يذهب بين الالوية المتوسطة والصغيرة وينقسم الى فرعين. فالعلوي منها يدوم تابعاً لسير الفرع الاصلي ويذهب على المحافة العليا للالوية الصغيرة الى الشوكة المقدمة العليا للعظم الحرقفي ويتفم بالحرقفي المنعكف والفروع الصاعدة من المنعكف الوحشي. والسفلي يقاطع الالوية الصغيرة بانحراف الى المدور الكبير فيتوزع في العضلات الالوية ويتفم بالمنعكف الوحشي. وبعض فروعها تثقب الالوية الصغيرة وتوزع في المفصل الوري

الشريان الحرقفي القطني (شكل ١٧٨)

يصعد هذا الشريان بعد ان ينشأ من الجذع الخلفي للحرقفي الباطن تحت العضلة الصليبية والوعية الحرقفية الظاهرة الى الجزء العلوي من الحفرة الحرقفية فينقسم هناك الى فرعين احدهما قطني والاخر حرقفي. فالفرع القطني يتوزع في العضلة الصليبية والقطنية المربعة متممًا بالشريان القطني الاخير ويرسل فرعاً صغيراً شوكةً من الثقب بين الفقرات الذي بين الفقرة القطنية الاخيرة والعجز الى القناة الشوكية فيتوزع في الحبل الشوكي واغشيته. والفرع الحرقفي ينزل ويتوزع في الحرقفية الباطنة مرسلًا فرعاً الى جوهر العظم وفروعاً اخر تذهب الى العرف الحرقفي وتوزع في العضلات الالوية والبطنية متممةً بالالوي والحرقفي المنعكف والمنعكف الوحشي والشراسيفي

الشرايين العجزية الجانبية (شكل ١٧٨)

هي غالباً اثنان من كل جانب احدهما علوي والاخر سفلي ومنشأها من الجذع الخلفي للحرقفي الباطن. فالعلوي منها كبير الحجم يسير الى الانسية وبعد ان يتفم بفروع من العجز المتوسط يدخل الثقب العجزى الاول او الثاني فيرسل فروعاً الى ما في باطن القناة العجزية ثم يخرج من الثقب العجزى الخلفي المقابل للذي دخل منه ويتوزع في الجلد والعضلات على ظهر العجز. والفرع السفلي يسير بانحراف على مقدم العضلة الهرمية والاعصاب العجزية الى الجانب الانسي للثقوب العجزية المقدمة فيتنزل على مقدم العجز ويتفم على مقدم العصعص بالعجزى المتوسط وبما يقابله من العجزية الجانبية. وفي مدة سيره يرسل فروعاً تدخل الثقوب العجزية المقدمة فيتوزع بعضها في العظام والاعشية المبطنة للقناة العجزية وبعضها يخرج من الثقوب الخلفية ويتوزع في العضلات والجلد على الوجه الظهري للعجز

وتوزع الفروع الى اعضاء التناسل

الشريان الوري

هو اعظم الفرعين الانتهاءين للجذع المقدم من الحرقفي الباطن يتوزع في العضلات الواقعة في مؤخر الحوض . واما سيره فانه ينزل الى الجزء السفلي للثقب العظيم العجزي الوري خلف الاستحيائي الباطن مستقراً على الضفيرة العصبية العجزية والعضلة الهرمية ثم يخرج من الحوض بين الهرمية والعصصية وينزل في الخلاء بين المدور الكبير والحذبة الوريكية مصحوباً بالاعصاب الوريكية ومغطى بالعضلة الالوية الكبيرة وينقسم الى فروع تتوزع في العضلات الغائرة عند مؤخر الورك


واما الفروع التي يرسلها هذا الشريان وهو في باطن الحوض فتذهب الى العضلة الهرمية والعصصية والرافعة للاست ويرسل بعض فروع باسورية لتوزع في المستقيم وقد تقوم مقام الباسوري المتوسط وفروعاً مثنائية الى قاعدة المثانة وعنقها والحويصلتين المنويتين والبروستاتا . والفروع التي يرسلها بعد خروجه من الحوض هي الفرع العصصي والفروع الالوية السفلى والفرع المرافق للعصب الوري والفروع العضلية والفروع المفصلية فالفرع العصصي يذهب الى الانسية وبنقب الرباط العظيم العجزي الوري ويتوزع في الالوية العظمية والجلد وابنية اخر على الوجه الخلفي للعصص والفروع الالوية السفلى ثلاثة او اربعة تتوزع في الالوية العظمية والفرع المرافق للعصب الوري وعاء دقيق يصاحب العصب الوري مسافة قصيرة ثم ينقبه ويذهب في جوهره الى الجزء السفلي من الفخذ

والفروع العضلية تتوزع في العضلات الواقعة في مؤخر الورك وتنفم بالشريان الالوي والمنعكف الانسي والوحشي والثاقب العلوي . والفروع المفصلية تتوزع في مفصلة المفصل الوري

الشريان الالوي

هو اعظم الفروع الناشئة من الحرقفي الباطن ويظهر انه امتداد الجذع الخلفي لهذا الوعاء الا انه قصير يخرج من الحوض اعلى الحافة العليا للعضلة الهرمية وينقسم حالاً الى فرعين احدهما سطحي والاخر غائر . ويرسل قبل خروجه من الحوض فروعاً عضلية للعضلة الحرقفية والهرمية والسادة الباطنة وفروعاً غذائياً يدخل العظم الحرقفي اما فرعه السطحي فيسير تحت الالوية الكبيرة وينقسم الى فروع كثيرة بعضها يتوزع في العضلة

خطر من القطع مدة العمل الجانبي في استخراج الحصاة من المثانة بحيث اذا قطع حصل من



شكل ١٧٩

ذلك نريف شديد مخيف. وتارة يكون هذا الشريان صغيراً جداً وقد يكون مفقوداً وقد يكون مزدوجاً. وتارة يكون منشأه من الاستحيائي الباطن قبل منشأه الاعنيادي فيقاطع العجان للوصول الى مؤخر البصلة وعند ذلك يعسر جداً تخلصه من القطع مدة العمل الجانبي لاستخراج الحصاة. وإنما اذا كان منشأه من فرع استحيائي اضافي سلم من غائلة الخطر مدة العمل المذكور نظراً الى وضعه المقدم

وشريان الجسم الاجوف احد الفرعين الانتهائيين للاستحيائي الباطن. ينشا من هذا الوعا وهو بين ساق القضيب والفرع العاني فيثقب الساق المذكور بانحراف ويسير الى المقدم في الجسم الاجوف بجانب الفاصل المشطي متوزعاً في الجسم المذكور

والشريان الظهري للقضيب يصعد بين الساق والارتفاق العاني ويتقب الرباط المعلق ثم يمر الى المقدم على ظهر القضيب الى القلفة حيث ينقسم الى فرعين يتوزعان في الحشفة والقلفة. ويكون موضوعاً وهو على ظهر القضيب تحت الجلد وموازياً للوريد الظهري ولرفيته من الجانب الاخر ويرسل فروعا للجلد والقعد الليفي للجسم الاجوف

واما الشريان الاستحيائي الباطن في الاناث فاصغر منه في الذكور ويتشابهان في المنشأ والسير

شكل ١٧٩ شرايين العجان. السطحية منها في الجانب الايمن والغائرة في الايسر ١ القضيب وقد قطع ساقه في الجانب الايسر ٢ المرعنان للبول المغلقتان القسم البصلي للجسم الاستحيائي ٣ الناصبة للقضيب منتشرة على ساقه اليمنى ٤ الاستحاطة بالعاصرة له ٥ فرعا الوركي والعاني ٦ الحديدة الوركية ٧ الرباط العجزوي الوركي الصغير مرتبطاً من طرفه الصغير بشوكة الوركي ٨ العضص ٩ الشريان الاستحيائي الباطن منعكفاً حول الشوكة الوركية وداخلاً العجان ١٠ الفروع الباسورية السفلى ١١ الشريان العجاني السطحي الذي يرسل فرعاً صغيراً هو العجاني المستعرض الموضوع على العضلة العجانية المستعرضة ١٢ الشريان المذكور الايسر مقطوعاً ١٣ الشريان البصلي ١٤ الفرعان الانتهائيان للاستحيائي الباطن. يشاهد احدهما وهو شريان الجسم الاجوف داخلاً الطرف المتطوع للساق. والثاني وهو الظهري للقضيب صاعداً الى ظهر هذا العضو

العضلة السادة الباطنة ويذهب الى فرع العظم الوركي مغطى باللفافة السادة وموضوعا على بعد نحو قيراط ونصف من حافة الحدبة الوركية. ثم يصعد الى المقدم والاعلى بجانب فرع العظم الوركي وينقب الطبقة الخلفية للفاقة العجانية الغائرة ويسير الى المقدم على الحافة الانسية للفرع النازل العاني ثم ينقب الطبقة المقدمة للفاقة العجانية الغائرة وينقسم الى فرعيه الانتهاءين وهما الشريان الظهري للفضيب وشريان الجسم الاجوف. واما مجاورته فانه يكون في اول سيره وهو داخل الحوض موضوعاً الى مقدم العضلة الهرمية والضمفيرة العصبية العجزية والى الجانب الوحشي من المستقيم. وعندما يقاطع الشوكة الوركية نطفيه الالوية العظيمة والرباط العظم العجزي الوركي. وعندما يدخل الحوض يكون وضعه الى الجانب الوحشي للحفرة الوركية المستقيمة مستقراً على وجه العضلة السادة الباطنة مضمناً في قناة ليفية مكوّنة من اللفافة السادة وزائدة من الرباط العظم العجزي الوركي. وترافقه في سيره الاوردة الاستحيائية والعصب الاستحيائي الباطن واما فروعها ففي داخل الحوض تنشأ منه جملة فروع صغيرة تتوزع في العضلات والاعصاب العجزية والاحشاء الكائنة ضمن التجويف المذكور. وفي العجان تنشأ منه الفروع الاتية:

الباسوري السفلي ويقال له الظاهر - العجاني السطحي - العجاني المستعرض - شريان البصلة - شريان الجسم الاجوف - الشريان الظهري للفضيب

فالباسوري الظاهر مؤلف من فرعين او ثلاثة تنشأ من الاستحيائي الباطن عند مروره اعلى الحدبة الوركية ويقاطع الحفرة الوركية المستقيمة وتتوزع في عضلات وجلد الاست والعجاني السطحي يتوزع في الصفن وفي عضلات العجان وجلده. ينشأ من الاستحيائي الباطن الى مقدم الفروع السابقة وينقب الحافة السفلى للفاقة العجانية الغائرة ويقاطع المستعرضة العجانية ويمر في الخلاء المثلث بين المسرعة البول والناصبة للفضيب فيرسل فروعاً لها ثم ينتهي متوزعاً في جلد الصفن. ويكون موضوعاً مدة سيره في العجان تحت اللفافة العجانية السطحية والعجاني المستعرض فرع صغير ينشأ من الاستحيائي الباطن او من العجاني السطحي حين مقاطعته للعضلة العجانية المستعرضة. وينقب الحافة السفلى للفاقة العجانية الغائرة ويذهب عرضاً الى الانسية على الوجه الجليدي للعجانية المستعرضة فيتوزع فيها وفي الابنية الكائنة بين الاست وبصلة المجرى

وشريان البصلة وعاء غليظ الا انه قصير جداً ينشأ من الاستحيائي الباطن بين طبقتي اللفافة العجانية الغائرة ويتجه انجماً يقرب ان يكون عرضياً والى الانسية فينقب ببصلة المجرى ويتوزع فيها. ويرسل فرعاً صغيراً الى غدة كوبر. وهذا الشريان عظيم الاهمية من وجه جراحي فانه في

الشريان الاستحيائي الباطن

والشريان المهبل شبيه بالثاني السفلي في الذكور. ينحدر على المهبل ويتوزع في غشائه المخاطي ويرسل فروعاً الى عنق المثانة والجزء المجاور من المستقيم

الشريان الساد منشأه غالباً من الجذع المتقدم المحرقفي الباطن وكثيراً ما يكون من الخلفي. يذهب الى المقدم اسفل حافة الحوض الى القناة التي في الحافة العليا للثقب الساد ثم ينفذ من التجويف الحوضي من الثقب المذكور وينقسم الى فرعين انسي ووحشي. وفي التجويف الحوضي يستقر هذا الشريان على اللقافة الحوضية تحت البريتون واسفل العصب الساد قليلاً. وبينما يكون ماراً في الثقب الساد يكون واقعا في قناة منحرفة مكونة من الفرع الاقني للعظم العاني الى الاعلى والحافة المقوسة للغشاء الساد الى الاسفل

واما فروع هذا الشريان وهو في الحوض فهي فرع حرقفي يذهب الى الحفرة الحرقفية ويتوزع في العظم والعضلة الحرقفية ويتفيم بالشريان الحرقفي القطني. وفرع مثالي يذهب الى الخلف ويتوزع في المثانة. وفرع عاني ينشأ من هذا الشريان قبيل خروجه من التجويف الحوضي ويصعد خلف العظم العاني متفهماً بفروع من الشريان الشراسيفي وبرقيقه من الجانب الاخر. ووضع هذا الفرع الى الجانب الانسي للعلقة الفخذية وهي البطنية الظاهرة. واما خارج الحوض فالشريان الساد ينقسم الى فرع انسي وفرع وحشي غائرين تحت العضلة السادة الظاهرة يحيطان للثقب الساد ويتفهمان الواحد منهما بالآخر عند الجزء السفلي للثقب المذكور وبفروع من الشريان المنعكف الباطن. اما الفرع الانسي فينعكف على الحافة الانسية للثقب الساد ويرسل فروعاً الى العضلتين السادتين والمشطية والمقربات والرقيقة ويتفيم بالفرع الوحشي وبالشريان المنعكف الباطن. والفرع الوحشي ينعكف حول الحافة الوحشية (الخلفية) للثقب الساد الى الخلاء الكائن بين منشأ التوأمية السفلى والمربعة الفخذية حيث يتفيم بالشريان الوركي. ويتوزع في العضلتين السادتين وحال سيره الى الورا يتفيم بالمنعكف الباطن ويرسل فرعاً الى المنصل الوركي من الشرم الكائن في الجزء السفلي للحق الحرقفي يتوزع في الرباط المستدبر حتى راس الفخذ

الشريان الاستحيائي الباطن

هذا الشريان احد الفرعين الانتهايين للجذع المقدم من الحرقفي الباطن وهو اصغر من الفرع الاخر اي الشريان الوركي ويتوزع في اعضاء التناسل الظاهرة. يتجه الى الاسفل والوحشية الى الحافة السفلى للثقب العظيم العجزي الوركي ويخرج من الحوض بين العضلة الهرمية والعصعصية ثم يقاطع الشوكة الوركية ويعود داخلاً الى الحوض من الثقب الصغير العجزي الوركي فينقطع

واما الاختلاف الواقع في هذا الشريان بين الزمان الذي قبل الولادة وبعدها فهو ان في الجنين يكون الحرقفي الباطن الذي يُقال له حينئذٍ الشريان الختلي اعظم من الحرقفي الظاهر بضعفين ويظهر انه امتداد الحرقفي الاصيلي . يتقدم اولاً الى المثانة ويصعد بجانبها الى قمتها مرسلًا اليها بعض فروع ثم يصعد على الوجه المُوخر للجدار المقدم البطني الى السرة فيلاقي رفيقته من الجانب الاخر ويخرجان سوياً من الفتحة السرية ويلتفنان حول الوريد السري فيتكون من الوريد والشريانين الحبل السري الذي يتفرع في المشيمة ويوصل الجنين بها. ويقال لهذا الشريان وهو داخل التجويف البطني الشريان الختلي فاذا خرج منه سُي الشريان السري. وعند الولادة حيث تبطل الدورة المشيمية يحف هذا الشريان من السرة الى قمة المثانة ويصير اخيراً جبلاً ليفياً لا مننذ فيه للدورة. وما بقي منه اي من قمة المثانة الى منشأه يصغر حجمه كثيراً الا قيراط ونصف من بدائه وفائدته حمل الدم الى المثانة فيقال له حينئذٍ الشريان المثاني العلوي

في فروع الحرقفي الباطن

من الجذع المقدم: المثاني العلوي - المثاني المتوسط - المثاني السفلي - الباسوري المتوسط - الساد - الاستحيائي الباطن - الوري - وفي الاثنى زيادة على ما تقدم الرحي والمهلي

ومن الجذع الختلي: الاوي - الحرقفي القضي - الفروع العجزية الجانبية

فالمثاني العلوي هو الجزء الذي يبقى مفتوحاً من الشريان الختلي في الجنين . يمتد الى جانب المثانة ويرسل فروعاً كثيرة الى جسمها وقعرها . ومن احد هذه الفروع يذهب فرع دقيق الى الزنابة الناقلة ويصاحبها في سيرها الى الخصية حيث يتفهم بالشريان المنوي. ويرسل فروعاً اخر الى الحالب


والمثاني المتوسط يكون في الغالب فرعاً من المثاني العلوي ويتوزع في قاعدة المثانة والوجه السفلي للحويصلتين المنويتين

والمثاني السفلي ينشأ من الجذع المقدم للحرقفي الباطن مشتركاً مع الباسوري المتوسط ويتوزع في قاعدة المثانة والغدة البروستاتا والحويصلتين المنويتين

والباسوري المتوسط ينشأ غالباً مشتركاً مع سابقه ويتوزع في المستقيم متفهماً بالباسوري العلوي السفلي

والشريان الرحي ينزل من الجذع المقدم للحرقفي الباطن الى عنق الرحم ثم يصعد متعرجاً على جانب الرحم بين طبقتي الرباط العريض فيرسل فروعاً لجوهره ويتفهم عند منتهاه بفرع من الشريان المبيضي. وتذهب منه فروع ايضاً الى المثانة والحالب

الى فرعيه . والى الموخر يفصله عن الفقرة القطنية الاخيرة الوريد الحرقفي الاصلي الايمن . والى



الجانب الوحشي منه الوريد الاجوف السفلي من الاعلى والعضلة الصليبية الكبيرة من الاسفل والحرقفي الاصلي الايسر مجاور الى المقدم للبريتون وفروع العصب السيمبانيوي والمستقيم والشريان الباسوري العلوي ويقاطعه عند تشعبه الحالب . والى الوراء منه والانسية الوريد الحرقفي الاصلي الايسر . والى جانبه الوحشي العضلة الصليبية الكبيرة فروعها . يذهب من الحرقفين الاصليين فروع صغيرة الى البريتون والعضلتين الصليبتين والحالبين والغشاء الخلوي المجاور . وقد تنشأ منها الشرايين الحرقفية القطنية او الكلوية

الشريان الحرقفي الباطن

يتوزع هذا الشريان في جدران الحوض واحشائه واعضاء التناسل والجانب الانسي الفخذ . وهو وعاء قصير غليظ اصغر من الحرقفي الظاهر طوله نحو قيراط ونصف منشأه عند تشعب الحرقفي الاصلي . يتجه الى الاسفل فاذا وصل الى الحافة العليا للثقب العظيم العجزي الوركي انقسم الى جذعين عظيمين مقدم وخلفي . ويمتد من طرف هذا الوعاء الى المثانة الشريان الخثلي الذي يكون عظيماً في الجنين ولا يبقى الا بعضه بعد الولادة كما سيأتي . واما مجاورة الحرقفي الباطن فمن المقدم للحالب الذي يفصله عن البريتون . ومن الموخر للوريد الحرقفي الباطن والعصب القطني العجزي والعضلة الهرمية . ومن جانبه الوحشي بقرب منشأه للعضلة الصليبية

شكل ١٧٨ الشرايين الحرقفية ١ الاورطي ٢ الشريان الحرقفي الاصلي الايسر ٣ الحرقفي الظاهر ٤ الشراسبي ٥ الحرقفي المنعكف ٦ الحرقفي الباطن ٧ جذعه المقدم ٨ جذعه الخلفي ٩ القسم الذي يبقى مفتوحاً من الشريان السري ١٠ المثاني العلوي الذي ينشأ منه ١١ الاستحيائي الباطن الذي يسير وراء ١٢ شوكة العظم الوركي والرباط العجزي الوركي الصغير ١٣ الباسوري المتوسط ١٤ الشريان الوركي نافذاً من باطن الحوص ١٦ الحرقفي القطني صاعداً لينضم بالحرقفي المنعكف ويكون فوساً على العرف الحرقفي ١٧ الشريان الساد ١٨ العجزي الجانبي ١٩ الاولى سائراً من الجزء العلوي للثقب العظيم العجزي الوركي ٢٠ العجزي المتوسط ٢١ الحرقفي الاصلي الايمن مقطوعاً ٢٢ الشريان الفخذي

الخلف بين التوات المستعرضة وتوزع في العضلات والجلد في الظهر متمماً برفيته من الجانب الاخر وبالفرع الخلفية للشرايين بين الاضلاع. واما الفرع الشوكي فيرسل اولاً فروعاً مصاحبة للاعصاب الى الام الجافية وذنوب الفرس تنضم بالفرع المقابلة لها ثم ينقسم الى فرعين يصعد احدهما على الوجه الخلفي لجسم الفقرة التي اعلاه والاخر ينزل على الوجه الخلفي لجسم الفقرة التي اسفله. وتنضم هذه الفروع بمثلها من الجانب الاخر فيتكوّن من التضمم المذكور اقواس شريانية على طول العمود الشوكي وراء اجسام الفقرات تتصل بعضها ببعض وبوعاء متوسطة طولي. ويذهب منها فروعاً تتوزع في السحماق والعظام المجاورة. والفرع البطنية تذهب الى الوحشية وراء العضلة القطنية المربعة وقد يكون الفرع السفلي الى مقدمها وتدوم سائرة بين العضلات البطنية وتنضم بفروع من الشراسيفي والثدي الباطن الى المقدم وبالشرايين بين الاضلاع الى الاعلى وبالشرايين الحرقفية القطنية والحرقفية المنعكفة من الاسفل

الشريان العجزي المتوسط (شكل ١٧٤)

هو وعاء صغير منشأه من الجزء الخلفي للاورطي عند تشعبه الى فرعيه الانتهايين. واما سيره فانه ينزل على الفقرة القطنية الاخيرة ثم على الخط المتوسط لمقدم العجز الى الجزء العلوي من العصعص حيث ينتهي متمماً بالشرايين العجزية الجانبية. وتذهب منه فروع بعضها يتوزع في الوجه الخلفي للمستقيم وبعضها يتضمم بالشرايين العجزية الجانبية ويدخل الثقوب العجزية المقدمة

الشريانان الحرقفيان الاصيلان

ينقسم الاورطي البطني الى الحرقفيين الاصيلين في الغالب على الجانب الايسر لجسم الفقرة القطنية الرابعة وذلك يقابل الجانب الايسر للسرة وهو على مساواة خط يرسم من اعلى العرف الحرقفي الواحد الى الاخر. وطول كل من الحرقفيين الاصيلين نحو قيراطين. ينفرجان عند منتهى الاورطي وينحدران الى الاسفل والوحشية الى حافة الحوض وينقسمان حينئذ الغضروف المتوسط بين الفقرة القطنية الاخيرة والعجز الى فرعين كبيرين هما الحرقفي الظاهر والحرقفي الباطن فيذهب الظاهر الى الطرف السفلي والباطن الى احشاء الحوض وجدرانه

اما الحرقفي الاصيلي الايمن فاغظ قليلاً من الايسر ومقاطعته لجسم الفقرة القطنية الاخيرة اشد انحرافاً. يغطيه البريتون والفئائي وفروع العصب السيمباتوي ويقاطعه الحالب عند انقسامه

فاذا وصلا الى حافة الحوض ذهب كل منهما الى مقدم الشريان المحرقفي الظاهر الواقع في جهته وصار سيره بعد ذلك مختلفاً في الذكور والاناث. اما في الذكور فيتجه الى الوحشية ويذهب الى الحلقبة البطنية الباطنة فيصير جزءاً من الحبل المنوي ويسير في القناة المنوية الى الخصية حيث يتعرج وينقسم الى فروع جملة بعضها يصاحب القناة الناقلة ويتوزع في البربخ متفهماً بشريان القناة الناقلة وبعضها يتوزع في جوهر الخصية. واما في الاناث فيقال للشريانين المنويين المبيضان وهما اقصر فيهن من الذكور ولا يخرجان من التجويف البطني. فاذا وصلا الى الحوض ذهب كل منهما بين صفيحتي الرباط العريض للرحم وتوزع في المبيض وذهب منه فرع او اثنان الى بوق فلوبيوس واخر الى جانب الرحم وفروع اخر تصاحب الرباط المستدبر في سيره في القناة الأربية

الشريانان المحجبان الحاجزيان (شكل ١٧٤)

ها وعاآن صغيران يمثلان كثيراً من جهة منشأها. فقد ينشأ كل منهما على حدته من مقدم الاورطي اسفل المحور البطني وقد ينشأ بجذع واحد من المحور المذكور او من الاورطي وقد ينشأ احدهما من الاورطي والاخر من احد الشريانين الكلويين. واما سيرهما فانهما ينفرجان عند ساقى الحجاب ويسيران بانحراف الى الاعلى والوحشية على وجهه السفلي. فاذا وصلا الى الجزء الخلفي من الوتر المركزي انقسم كل منهما الى فرعين انسي ووحشي. فالانسي يذهب الى مقدم الصدر ويتوزع في الحجاب متفهماً برفيقه من الجانب الاخر وبالعضلي الحجابي الذي هو فرع من الثديي الباطن. والوحشي يذهب نحو جانب الصدر ويتفم بالشرايين بين الاضلاع. ويرسل الفرع الانسي من الحجاب اليمين فروعاً صغيرة الى الوريد الاجوف السفلي والابسر بعض فروع الى المرئ. ويرسلان ايضاً فروعاً للمحفظتين والكبد الى اليمين والطحال الى اليسار

الشرايين القطنية (شكل ١٧٤)

هذه الشرايين شبيهة بالشرايين بين الاضلاع وعددها غالباً اربعة من كل جانب ناشئة من الجزء الخلفي للاورطي على زوايا قائمة. اتجه مسيرها الى الوحشية والخلف حول جوانب اجسام الفقرات القطنية وراء العصب السيمباتوي والعضلة الصليبية. ويغطي الشرايين اليمنى الوريد الاجوف السفلي والعلويين من كل جانب ساقا الحجاب. فاذا وصلت الى الخلاء بين التوات المستعرضة للفقرات انقسم كل منهما الى فرعين فرع ظهري وفرع بطني. فالفرع الظهري يرسل حالاً عقيب منشأه فرعاً شوكمياً يدخل القناة الشوكية. ثم يدوم الفرع الظهري سائراً الى

تتقوم مقامه ثلاثة اواربعة فروع صغيرة. والشريان الباسوري العلوي امتداد المساريقي السفلي يتزل الى الحوض بين طبقتي رباط المستقيم مقاطعاً في سيره للحالب والشريان الحرقفي الاصلي وينقسم حذاء منتصف العجز الى فرعين ينزلان على جانبي المستقيم وينقسمان الى فروع كثيرة صغيرة تتوزع فيه بين الطبقة المخاطية والطبقة العضلية الى قرب منهاه. ويتفهم بعضها ببعض وبفروع الباسوري المتوسط الناشئ من الحرقفي الباطن والباسوري السفلي الناشئ من الاستيمائي الباطن. ويجب على التلميذ الانتباه الى ان تشعب هذا الشريان يكون مقابل منتصف العظم العجزي وهو مسافة اربعة قراريط من الاست فلا يجوز شق المستقيم في الاعمال الجراحية الى ابعد من المسافة المذكورة في الجهة الخلفية حذراً من قطع الشريان المذكور

الشريانان فوق الكلية (شكل ١٧٤)

هذان الشريانان صغيران ينشآن من جانبي الاورطي مقابل الشريان المساريقي العلوي يذهبان بانحراف الى الاعلى والوحشية فاذا وصلا الى الوجه السفلي للمحفظتين فوق الكليتين توزعا فيهما وتنهما بفروع محفظية آتية من الشرايين الحجابية والكلبية. وهما صغيران في البالغ كبيران في الجنين


الشريانان الكليويان (شكل ١٧٤)

هما جذعان عظيمان ينشآن من جانبي الاورطي اسفل المساريقي العلوي. وكل منهما متجه الى الوحشية بحيث يكون زاوية مع الاورطي تقرب من القائمة. فاليمين منها يسير وراء الاجوف السفلي وهو اطول من الايسر نظراً الى انحراف الاورطي الى الجهة اليسرى في هذا المكان واليسر اعلى قليلاً من اليمين. وينقسم كل منهما قبل دخوله الكلية الى اربعة او خمسة فروع تتوزع في جوهرها موضوعة في الفرجة الكلبية بين الوريد الكلوي والحالب بحيث يكون غالباً الوريد الى المقدم والحالب الى المؤخر. ويرسلان فروعاً صغيرة الى المحفظتين فوق الكلية والحالب والغشاء الخلوي والعضلات المجاورة

الشريانان المنويان (شكل ١٧٤)

هذان الشريانان يتوزعان في المحصيتين في الذكور وفي المبيضين في الاناث. وهما وعان دقيقان طويلان ينشآن من مقدم الاورطي اسفل الشريانين الكليويين قليلاً. يتجه كل منهما بانحراف الى الوحشية والاسفل وراء البريتون فيصالب الحالب ويستقر على العضلة الصلية ويكون عند ذلك المنوي اليمين موضوعاً الى مقدم الوريد الاجوف السفلي واليسر وراء التعرج السيني للقولون.

قيراط او قيراطين . ينزل اولاً الى المحفرة الحرقفية اليسرى ثم الى الحوض فاذا دخل الحوض صار اسمه الشريان الباسوري العلوي . ويكون في اول امره ملاصقاً للجانب الايسر من الاورطي ثم يسير الى مقدم الشريان الحرقفي الاصيلي الايسر



شكل ١٧٧

فروعه: الفولوني الايسر - السيني - الباسوري العلوي

فالقولوني الايسر يسير وراء البريتون الى مقدم الكلية اليسرى فاذا وصل الى القولون النازل انقسم الى فرعين فرع صاعد يتفيم بالقولوني المتوسط وفرع نازل يتفيم بالشريان السيني فيتكوّن من ذلك قوسان تذهب منهما فروع الى القولون النازل . والفرع السيني ينزل بانحراف على العضلة الصديبية (بسواس) الى التعرج السيني للقولون فينقسم الى فروع تتوزع فيه متمماً الى الاعلى بالقولوني الايسر والى الاسفل بالشريان الباسوري العلوي . وقد يكون هذا الوعاء مفقوداً

شكل ١٧٧ فروع الشريان المساريقي السفلي ١ والشريان المساريقي العلوي والامعاء الدقيقة مقاربة الى الجانب الايمن
٢ الاعور وراثته ٣ القولون الصاعد ٤ القولون المستعرض مرفوعاً الى الاعلى ٥ القولون النازل ٦ التعرج السيني
٧ المستقيم ٨ الاورطي ٩ الشريان المساريقي السفلي ١٠ القولوني الايسر الذي يتفيم بالموسط ١١ القولوني المتوسط ١٢ و١٣
فروع سينية ١٤ الباسوري العلوي ١٥ القسم النازل للاتني اعشري

يذهب الى المقدم بين البنكرياس والجزء المستعرض للاثني عشري فيقاطع الجزء المذكور الى المقدم وينزل بين طبقتي المساريقا الى الحفرة الحرقفية اليمنى حيث ينهي وقد صغر حجمه جداً. ومدة سيره يكون قوساً تحد به مشرف الى المقدم والاسفل نحو اليسار وتقع مشرف الى الورا والاعلى نحو اليمين ويرافقه الوريد المساريقي العلوي وتحيط به الضفيرة المساريقية العليا العصبية
فروعه: البنكرياسي الاثنا عشري السفلي والاعوية المعوية الدقيقة واللفائفي الفولوني والفولوني الايمن والفولوني المتوسط

فالفرع البنكرياسي الاثنا عشري السفلي ينشأ من المساريقي العلوي اسفل البنكرياس ويتوزع في رأس البنكرياس والجزء المستعرض والجزء النازل من الاثني عشري متفهماً بالشريان البنكرياسي الاثني عشري. والاعوية المعوية الدقيقة تنشأ من الجانب المحذب للشريان المساريقي العلوي وعددها غالباً من اثني عشر الى خمسة عشر تنوع في الصائم واللفائفي. وتذهب متوازية بعضها لبعض بين طبقتي المساريقا وينقسم كل منها الى فرعين يتصلان بفرع مثلها على كل جانب فيتكون من ذلك اقواس تحدها مشرف نحو الامعاء. وتذهب من هذه الاقواس فروع تصل بمثلها وتكون اقواساً اخرى وهكذا الى ان يصير عدد الاقواس المتوالي اربعة او خمسة ويذهب من الاقواس الانتهاية فريعات عديدة مستقيمة تحيط بالمعاء وتتوزع بين طبقاته. والفرع اللفائفي الفولوني اخفض الفروع المرسله من الجانب المقعر للشريان المساريقي العلوي. ينزل بين طبقتي المساريقا الى الحفرة الحرقفية اليمنى حيث ينقسم الى فرعين يتفهم السفلي منها بالفروع السفلي للاعوية المعوية الدقيقة متوزعاً في منتهي اللفائفي والاعور وزائده والعلوي بالفولوني الايسر متوزعاً في بداءة الفولون. والفولوني الايمن ينشأ من الجانب المقعر للمساريقي العلوي عند نحو منتصفه ويذهب تحت البريتون الى منتصف الفولون الصاعد ثم ينقسم الى فرعين فرع نازل يتفهم باللفائفي الفولوني وفرع صاعد يتفهم بالفولوني المتوسط. ويتكون من هذين الفرعين قوسان تذهب منها فروع الى الفولون الصاعد. والفولوني المتوسط ينشأ من الجزء العلوي للجانب المقعر من المساريقي العلوي ويذهب الى المقدم وينقسم الى فرعين الايمن منها يتفهم بالفولوني الايمن والايسر بالفولوني الايسر فيتكون من ذلك قوسان تذهب فروع منها الى الفولون المستعرض


الشريان المساريقي السفلي

يتوزع هذا الشريان في الفولون النازل وفي التعرج السيني للفولون ومعظم المستقيم. وهو اصغر من المساريقي العلوي وينشأ من الجانب الايسر للاورطي اعلى تشعبه الى الحرقفيين الاصليين نحو

وجميع هذه الفروع يتمم بالفروع البنكرياسية من الشرايين البنكرياسية الاثني عشرية. والفروع
المعدية عددها من خمسة الى سبعة تنشأ من نهاية الشريان الطحالي او من فروعها الانتهاية
وتذهب من اليسار الى اليمين بين طبقتي التراب المعدي الطحالي وتتوزع في القوس الكبير للمعدة
متفصلاً بفروع من الشريان المعدي والشريان المعدي التري الايسر. والفرع المعدي التري
الايسر اعظم فروع الشريان الطحالي يذهب من اليسار الى اليمين على القوس الكبير للمعدة
بين طبقتي التراب الكبير ويتمم بالفرع المعدي التري الايمن. ويرسل مدة سيره جملة فروع
بعضها يصعد ويتوزع في الوجه المقدم والوجه المؤخر للمعدة وبعضها يتزل ويتوزع في التراب

الشريان المساريقي العلوي

هذا الشريان يتوزع في جميع طول المعاء الدقيق الأجزاء الاول من الاثني عشري ويتوزع
ايضاً في الاعور والقولون الصاعد والقولون المستعرض. وهو عاء عظيم ينشأ من مقدم الاورطي



شكل ١٧٦

على مسافة نحو ربع فيرط اسفل المحور البطني ومغطى عند منشئه بالوريد الطحالي والبنكرياس

شكل ١٧٦ سير وتوزيع الشريان المساريقي العلوي ١ القسم النازل للاثني عشري ٢ القسم المستعرض ٣ البنكرياس
٤ المعاء الصائم ٥ اللفائفي ٦ الاعور والزائدة الدودية ٧ القولون الصاعد ٨ القولون المستعرض ٩ القولون النازل
١٠ الشريان المساريقي العلوي ١١ القولوني المتوسط ١٢ الفرع الذي يتمم بالقولوني الايسر ١٣ البنكرياس الاثني عشرية
السفلي ١٤ القولوني الايمن ١٥ اللفائفي القولوني ١٦ و١٧ الاعوية الدقيقة المعوية

لها من الكبد مصاحبين لفروع وريد الباب والقناة الكبدية . وتجاور الشريان الكبدية مدة سيره بجانب الحافة اليمنى للثرب الاصغر القناة الصفراوية المشتركة والوريد الباي حيث تكون القناة الى يمين الشريان والوريد الى الخلف


واما فروع الشريان الكبدية فهي البوابي والمعدي الاثنا عشري والحوصلي فالفرع البوابي ينشأ من الكبدية اعلى البواب وينزل الى الطرف البوابي للمعدة ويذهب من اليمين الى اليسار على حافة القوس الاصغر للمعدة فيرسل فروعاً اليها ويتمم بالشريان المعدي والفرع المعدي الاثنا عشري فرع قصير غليظ ينزل وراء الاثني عشري بقرب البواب وينقسم عند الحافة السفلى للمعدة الى فرعين وهما المعدي الثري الايمن والبنكرياسي الاثنا عشري . وانما قبل تشعبه يرسل فرعين او ثلاثة الى الطرف البوابي للمعدة والبنكرياس . فالفرع المعدي الثري الايمن يذهب من اليمين الى اليسار على القوس الكبير للمعدة بين طبقتي الثرب الكبير متفهماً عند منتصف الحافة السفلى للمعدة بالفرع المعدي الثري الايسر من الشريان الطحالي . ويرسل هذا الوعاء فروعاً عديدة بعضها يصعد ليتوزع في الوجهين المقدم والمؤخر للمعدة وبعضها ينزل ليتوزع في الثرب الكبير . والفرع البنكرياسي الاثنا عشري ينزل بين الحافتين المتجاورتين للاثني عشري والبنكرياس فيتوزع فيها ويتمم بالفرع السفلي البنكرياسي الاثني عشري من الشريان المسارقي العلوي . والفرع الحوصلي وهو المراري ينشأ غالباً من الكبدية الايمن ويذهب الى الاعلى والمقدم على عنق الحوصلة المرارية وينقسم الى فرعين يتشعب احدهما على وجهها السائب والاخر بينها وبين جوهر الكبد

واما الشريان الطحالي فاغلاظ الفروع الثلاثة للسحور البطني في البالغ وهو كثير التعرج في سيره . يذهب افقياً الى الجانب الايسر وراء الحافة العليا للبنكرياس مصحوباً بالوريد الطحالي الذي يكون اسفله . فاذا وصل الى قرب الطحال انقسم الى فروع بعضها يذهب الى فرجه ويتوزع في بنائه وبعضها يتوزع في الطرف العظيم للمعدة

فروعها : البنكرياسية الصغيرة والبنكرياسية الكبيرة والمعدي والمعدي الثري الايسر فالبنكرياسية فروع صغيرة عديدة ناشئة من الشريان الطحالي عند مروره وراء الحافة العليا للبنكرياس تتوزع في الجزء المتوسط والجزء الايسر لهذه الغدة . ومن هذه الفروع فرع كبير يقال له البنكرياسي الكبير ينشأ من الشريان الطحالي بقرب الطرف الايسر للبنكرياس ويذهب من اليسار الى اليمين بقرب الوجه السفلي للغدة المذكورة تابعاً لسير القناة البنكرياسية .

اتجاهه الى المقدم واقسامه ثلاثة فروع كبيرة وهي المعدي والكبدي والطحالي. وقد ينشأ منه احد الشريانين الحجابيين. مجاورته يغطيه الثرثب الصغير. والى جانبه الايمن العقدة الهلالية اليمنى وفص سبجيلوس والى الجانب الايسر العقدة الهلالية اليسرى والطرف الفؤادي للمعدة. والى الاسفل يستقر على الحافة العليا للبنكرياس.

فالشريان المعدي اصغر الفروع الثلاثة الناشئة من المحور البطني يذهب الى الاعلى والى الجانب الايسر الى الفتحة الفؤادية للمعدة ويرسل فروعاً تتوزع في المريء وتنفم بالشرايين المرئية الاورطية واخرى الى الطرف الفؤادي للمعدة متممة بفروع من الشريان الطحالي ثم يسير من اليسار الى اليمين على حافة القوس الصغير للمعدة حتى البواب بين طبقتي الثرب الصغير حيث ينتهي متفصلاً بالفرع البوابي للشريان الكبدي




شكل ١٧٥

والشريان الكبدي متوسط الحجم بين الشريان المعدي والشريان الطحالي في البالغ واعظم منها في الجنين يصعد الى الجانب الايمن بين طبقتي الثرب الصغير الى مقدم ثقب وينسلو فاذا وصل الى الفرجة المستعرضة للكبد انقسم الى فرعين ايمن وايسر يتوزعان في الفصين المقابلين

شكل ١٧٥ فروع المحور البطني ١ الكبد ٢ فرجة المستعرضة ٣ الحوصلة المرارية ٤ المعدة ٥ المريء ٦ البواب ٧ القسم النازل للاثني عشري ٨ قسمة المستعرض ٩ البنكرياس ١٠ الطحال ١١ الاورطي ١٢ المحور البطني ١٣ الشريان المعدي ١٤ الكبدي ١٥ فرعه البوابي ١٦ المعدي الاثنا عشري ١٧ المعدي الثربى الايمن ١٨ البنكرياسي الاثنا عشريه متفصلاً بالبنكرياسي الاثني عشري السفلي ١٩ انقسام الشريان الكبدي الى ايمن وايسر ومن الايمن ينشأ الفرع الحوصلي ٢٠ الطحالي المشار اليه بخطوط منقطه لانه يسير خلف المعدة الى الطحال ٢١ المعدي الثربى الايسر متفصلاً بالايمن على القوس الكبير للمعدة ٢٢ البنكرياسي الكبير ٢٣ الاوعية النضيرة التي تذهب الى الطرف الكبير للمعدة وتنفم بالمعدي ٢٤ الماساريقي العلوي الذي ينفذ بين البنكرياس والاثني عشري

فروع الاورطي البطني

نقسم فروع الاورطي البطني الى مجموعتين وهما اولاً الفروع المتوزعة في الاحشاء وثانياً الفروع



شكل ١٧٤

التي تنوزع في جدران البطن

فالفروع المحشوية هي اولاً المحور البطني المؤلف من المعدي والكبدي والطحالي ثم المساريقي العلوي والمساريقي السفلي والشريانان اعلى الكلية والكليويان والمنويان والفروع الجدارية هي الحجابيان والقطنية والعجزي المتوسط

المحور البطني

هو جذع قصير غليظ طوله نحو نصف قيراط ينشأ من الاورطي مقابل حافة الحجاب الحاجز.

شكل ١٧٤ الاورطي البطني وفروعه ١ الشريانان الحجابيان ٢ المحور البطني ٣ الشريان المعدي ٤ الكبدي منقسماً الى فرع ايمن وفرع ايسر ٥ الطحالي سائراً نحو الوحشية الى الطحال ٦ الشريان اعلى الكلية الايمن ٧ الكليوي الايمن وهو اطول من الايسر ٨ الشرايين القطنية ٩ المساريقي العلوي ١٠ المنويان ١١ المساريقي السفلي ١٢ العجزي المتوسط ١٣ الحرقفيان الاصليان ١٤ الحرقفي الباطن الايمن ١٥ الحرقفي الظاهر ١٦ الشراسفي ١٧ الحرقفي المنعكف ١٨ الشريان الغذني منقسماً الى السطحي والغائر

الأورطي البطني

فرع مقدم وفرع خلفي. فالفرع المقدم يذهب الى الوحشية مستقراً أولاً على العضلات الباطنة بين الاضلاع ومغطى الى المقدم باللبورا وصفاق رقيق ثم يسير بين الطبقة الباطنة والطبقة الظاهرة من العضلات بين الاضلاع ويصعد بانحراف الى الحافة السفلى للضلع الذي اعلاه. وينقسم عند زاوية العظم المذكور الى فرعين فيسير اكبرهما في الميزاب الذي على الحافة السفلى للضلع الاعلى ويسير اصغرها على الحافة العليا للضلع الاسفل فيتوزعان في العضلات بين الاضلاع ويتمهان بالفروع المقدمة بين الاضلاع للثدي الباطن والفروع الصدرية للشريان الابطي. ويتمم الفرع الاول من الفروع المذكورة بالشريان العلوي بين الاضلاع. والثلاثة الاخيرة منها تذهب بين العضلات البطنية وتنفم بالشرايين المحرقية الى المقدم والشريان الحجابي والشرايين القطنية. ويرافق كلاً من هذه الفروع وريد وعصب الوريد من الاعلى والعصب من الاسفل الآتي في الاخيلية العليا حيث يكون العصب اولاً الى اعلى الشريان. وتُحفظ هذه الشرايين من الضغط مدة عمل العضلات بين الاضلاع بواسطة اقواس ليفية مرتبطة عند طرفيها بالضلع. والفرع الخلفي ويقال له الظهري ايضاً يذهب الى الخلف الى الجانب الانسي من الرباط الضلعي المستعرض المقدم وينقسم الى فرع شوكي يتوزع في الفقرات والحبل الشوكي واغشيتيه وفرع عضلي يتوزع في عضلات الظهر والجسد

الأورطي البطني

يبدأ الأورطي البطني عند الفتحة الأورطية للحجاب الحاجز الى مقدم جسم الفقرة الظهرية الأخيرة ويخترق قليلاً الى اليسار وينزل على الجانب الأيسر للعمود الفقري وينتهي على الجانب الأيسر لجسم الفقرة القطنية الرابعة حيث ينقسم الى الشريانين المحرقين الأصليين. واذ يكون مستقراً على اجسام الفقرات يكون محمداً الى المقدم واكثر التحدب حذاء الفقرة القطنية الثالثة اعلى السرة قليلاً وإلى جانبها الأيسر. مجاورته يغطيه الثرب الصغير والمعدة التي وراءها المحور البطني والصفيرة الشمسية ويغطيه اسفل الثرب والمعدة الوريد الطحالي والبانكر ياس والوريد الكلوي الأيسر والجزء المشتعرض للثاني عشري والمساريقا والصفيرة الأورطية. والى الخلف تفصله عن عن الفقرات القطنية الواردة القطنية اليسرى والحاصل الكيلوسي والقناة الصدرية. والى جانبه الأيمن الوريد الاجوف السفلي والوريد الفرد والقناة الصدرية والعقدة الهلالية اليمنى. والى الجانب الأيسر العصب السيمبانوي والعقدة الهلالية اليسرى

الايسر من العمود الفقري ثم يتقارب من الخط المتوسط ثم في نهاية سيره يكون وضعه الى مقدم العمود . ولما كان اتجاه هذا الوعاء عائداً الى العمود الذي يستقر عليه كان مقعراً الى المقدم في الجهة الظهرية واذ كانت الفروع المرسله منه صغيرة لم يؤثر ذلك في حجمه الا قليلاً جداً . وهو واقع في الجزء المؤخر من المنصف الخلفي . مجاورته الى المقدم من الاعلى الى الاسفل للشريان الرئوي الايسر والشعبة اليسرى والتامور والمريء . والى الخلف للعمود الفقري والوريد الفرد الصغير . والى الجانب الايمن للوريد الفرد الكبير والقناة الصدرية . والى الجانب الايسر للبليورا اليسرى والرئة . واما المريء مع الاعصاب التي تصاحبه فموضوع الى الجانب الايمن من الأورطي في الاعلى والى مقدمه في منتصف مسيره والى الايسر والمقدم في جزئه السفلي

فروعه: التامورية - الشعبية - المرئية - المنصفية الخلفية - بين الاضلاع

فالفرع التامورية قليلة العدد صغيرة الحجم غير منتظمة في منشأها تتوزع في التامور والفرع الشعبية هي الاوعية الغذائية للرئتين . وتختلف في العدد والحجم والمنشأ وانما على الاغلب ينشأ فرع على الجانب الايمن من الفرع الأورطي الاول بين الاضلاع او من جذع مشترك بينه وبين الفرع الشعبي الايسر من مقدم الأورطي الصدري . واما على الجانب الايسر فهي في الغالب اثنان ينشأان الواحد اسفل الاخر من الأورطي الصدري . وتذهب هذه الفروع الى مؤخر الشعب المقابلة لها وترافقها في سيرها وانقسامها فتتوزع فيها وفي النسيج الخلوي للرئتين والغدد الشعبية والمريء

والشرايين المرئية عددها في الغالب نحو اربعة او خمسة تنشأ من مقدم الأورطي وتنزل بانحراف الى المريء فتتوزع فيه وتنغم في الاعلى بالفرع المرئية للدرقى السفلي وفي الاسفل بالفرع الصاعدة من الحجابي الحاجزي والمعدي

والفروع المنصفية الخلفية اوعية عديدة صغيرة تتوزع في الغدد والنسيج الخلوي للحجاب المنصفي والشرايين بين الاضلاع تنشأ من مؤخر الأورطي . وعددها في الغالب نحو عشرة على كل جانب واحد لكل خلاء بين الاضلاع الاول واحياناً الثاني من الاخلية فانه يتوزع فيه العلوي بين الاضلاع وهو فرع من الشريان تحت الترقوة . وهذه الشرايين اطول في الجانب الايمن منها في الايسر نظراً الى وضع الأورطي على الجانب الايسر من العمود الفقري وتذهب الى الوحشية مقاطعةً لاجسام الفقرات الى الاخلية بين الاضلاع فتغطيها البليورا والمريء والقناة الصدرية والعصب السيمبانوي والوريد الفرد الاكبر . واما الشرايين التي على الجانب الايسر فتمر تحت الوريد العلوي بين الاضلاع والوريد الفرد الاصغر والسيمبانوي . وينقسم كل منها الى فرعين

فيرسل فروعاً اليهما. ثم ينزل الى مؤخر الرسغ ويتمم بمنتهى الفرع المتقدم بين العظمين وبالفرع
الرسغية الخلفية للشريان الزندي والشريان الكعبري. ويرسل هذا الشريان بقرب منشئه الفرع
الراجع الخلفي بين العظمين وهو فرع كبير يصعد الى الخلاء بين العقدة الوحشية والنتوء المرفقي
تحت العضلة المرفقية والباطحة القصيرة ويتمم بفرع من الغائر العلوي وبالشريان الزندي
الراجع الخلفي

والفروع العضلية تتوزع في العضلات الواقعة على الجانب الزندي للساعد

والفروع الرسغية تذهب الى مفصل الرسغ وهي اثنان فرع مقدم وفرع خلفي فالفرع
المقدم وعاءٌ صغير يقاطع مقدم الرسغ تحت اوتار القابضة الغائرة ويتمم بفرع مثله من الشريان
الكعبري. والفرع الخلفي ينشأ على العظم البسلي وينعكف الى الخلف تحت وتر القابضة الزندية
للرسغ. ويرسل فرعاً يقاطع الوجه الظهري للرسغ تحت الاوتار الباسطة ويتمم بفرع مثله من
الشريان الكعبري فيتكوّن من ذلك القوس الرسغي الخلفي. ثم يستمر نازلاً بجانب مشطي الخنصر
مكوناً لفرعه الظهري

والفرع الغائر وهو الاستطراقي ينشأ عند بداية القوس الراجي ويذهب غائراً الى الباطن
بين المبعدة للخنصر والقابضة القصيرة له عند منشئها ويتمم بالطرف الانتهائي للشريان الكعبري
فيكمل بذلك القوس الراجي الغائر

والفروع الاصبعية اربعة ترسل من الجزء المحدّب للقوس الراجي السطحي الى الجانب الزندي
من الخنصر وإلى الجوانب المتقابلة من البنصر والوسطي والسبابة. واما الجانب الكعبري من
السبابة والابهام فتاتيها فروع من الشريان الكعبري. واذا وصلت هذه الفروع الى نحو منتصف
السلامية الاخيرة توصل الفرعان لكل اصبع على شكل قوس تذهب من تحديده فروع الى
اصل الظفر

الأورطي النازل

يقسم الأورطي النازل الى قسمين قسم صدري وقسم بطني تبعاً للتجويفين العظيمين اللذين
يسير فيهما

فالأورطي الصدري (شكل ١٦٧) يبدأ عند الحافة السفلى للفقرة الظهرية الثالثة الى
اليسار وينتهي عند الفتحة الأورطية في الحجاب الحاجز. وهو موضوع في بداية سيره الى الجانب

الأصابع وتغمره نحو عضلات الإبهام . والقوس المذكور تغطي العضلة الراحية القصيرة واللفافة الراحية والجلد ويستقر على الرباط الخلفي وعضلات الخنصر ووتار العضلة القابضة السطحية للأصابع وفروع العصبين المتوسط والزندي

وأما فروع الشريان الزندي فتقسم إلى ثلاثة مجاميع تبعاً للجزء الذي تنشأ منه وهي

في الساعد : الزندي الراجع المقدم - الزندي الراجع الخلفي - الشريان بين العظمين - الفروع العضلية

في الرسغ : الرسغي المقدم - الرسغي الخلفي

في اليد : الفرع الغائر وهو الاستطراق - الفروع الأصعية

فالشريان الزندي الراجع المقدم ينشأ أسفل ثنية المرفق ويذهب إلى الأعلى والانسية بين العضدية المتقدمة والكتابة المستديرة فيتوزع فيها ويتفهم عند مقدم العقدة الانسية بالمتفهم الكبير والغائر السفلي

والزندي الراجع الخلفي اعظم جداً من سابقه وينشأ أسفله . يتجه إلى الخلف والانسية تحت القابضة السطحية ويصعد وراء العقدة الانسية للعضد . ومدة سيره بين العقدة المذكورة والتور المرفقي يكون واقفاً تحت القابضة الزندية للرسغ صاعداً بين رأسها تحت العصب الزندي . ويتوزع في العضلات المجاورة والمفصل المرفقي ويتفهم بالغائر السفلي والمتفهم الكبير والشريان الراجع بين العظمين

والشريان بين العظمين جذع قصير غليظ طوله نحو قيراط ينشأ أسفل حذبة الكعبرة ويذهب إلى الخلف إلى الحافة العليا للغشاء بين العظمين حيث ينقسم إلى فرعين فرع مقدم وفرع خلفي . فالفرع المقدم بين العظمين ينزل في الساعد على الوجه المقدم للغشاء بين العظمين متصلاً به بواسطة قوس صفائي رقيق . ويصاحبه في سيره الفرع بين العظمين للعصب المتوسط وتعلوه الحافتان المجاورتان له من القابضة الغائرة للأصابع والقابضة الطويلة للإبهام ويرسل فروعاً عضلية وهو في هذه الجهة وشریاناً غنائماً لكل من الكعبرة والزند . وعند الحافة العليا للكتابة المربعة ينزل منه فرع إلى مقدم العضلة المذكورة ويتفهم بفروع ناشئة من الرسغي المقدم والقوس الراجحي الغائر . وأما الفرع الأصلي فيسير وراء الكتابة المربعة ويتفهم الغشاء بين العظمين وينزل إلى مؤخر الرسغ ويتفهم بالفروع الرسغية الخلفية للشريان الكعبري والشريان الزندي . ويرسل الفرع المقدم بين العظمين فرعاً طويلاً دقيقاً وقد يكون غليظاً يصاحب العصب المتوسط . والفرع الخلفي بين العظمين يذهب إلى الخلف في الخلاء بين الرباط المنحرف والحافة العليا للغشاء بين العظمين وينزل إلى مؤخر الساعد بين الطبقة السطحية والطبقة الغائرة من العضلات

ينقسم الى فرعين يذهبان على جانبي الوجه الراحي للابهام ويكونان قوساً على الوجه السفلي
للسلامية الاخيرة تذهب منه فريعات للجلد والغشاء الخلوي للابهام

والسبائي الكعبري ينشأ بقرب سابقه وينزل بين المبعدة للسبابة والمقربة للابهام ويذهب
على الجانب الكعبري للسبابة ويتفم عند طرفها بالشريان الاصبعي المجانب له الناشئ من القوس
السطحي الراحي. ويتفم ايضاً عند المحافة السفلى للمقربة للابهام بالابهامي الرئيسي مرسلأ فرعاً
استطراقياً للقوس السطحي

والفروع الثاقبة ثلاثة تسير الى الخلف بين رؤوس العضلات الثلاث الاخيرة الظهرية بين
العظام وتتفم بالشرايين الظهرية بين العظام

والراحية بين العظام ثلاثة او اربعة فروع ناشئة من القوس الراحي الغائر تسير الى المتمد
على العضلات بين العظام وتتفم عند شقوق الاصابع بالفروع الاصبعية من القوس السطحي

الشريان الزندي

هو اكبر فرعي الشريان العضدي. يبدأ اسفل ثنية المرفق ويقاطع الجانب الانسي للساعد
بانحراف الى بداية نصفه السفلي ثم يذهب على خط مستقيم بجانب الحافة الانسية للساعد. فاذا
وصل الى الرسغ قاطع الرباط الحلقي الى الجانب الكعبري للعظم البسلي وذهب عرضاً في راحة
اليد مكوناً للقوس السطحي الراحي الذي ينتهي متمماً بالفرع الراحي السطحي من الشريان الكعبري
مجاورته في الساعد. نصفه العلوي غائر الوضع تغطيه جميع العضلات القوابض السطحية الا

القابضة الزندية للرسغ. ويصالبه العصب المتوسط عند نحو قيراط من منشئه فيكون العصب
الى الانسية منه اولاً ثم الى الوحشية. ويستقر على العضدية المقدمة والقابضة الغائرة للاصابع.
ونصفه السفلي في الساعد موضوع على العضلة القابضة الغائرة للاصابع يغطيه الجلد واللفافة
السطحية والغائرة واقع بين القابضة الزندية للرسغ والقابضة السطحية للاصابع. ويرافقه وريدان
واحد من كل جانب ويكون العصب الزندي واقعاً الى جانبه الانسي في ثنيته السفليين

وفي الرسغ الشريان الزندي مغطى بالجلد واللفافة ومستقرأ على الرباط الحلقي المتمد. والى
جانبه الانسي العظم البسلي والعصب الزندي

وفي راحة اليد يقال لامتداد الشريان الزندي القوس الراحي السطحي. يسير بانحراف الى
الوحشية الى الخلاء الواقع بين كرة الابهام والسبابة ويتفم هناك بالسطحي الراحي من الشريان
الكعبري ويفرع من السبائي الكعبري فيتم القوس الراحي السطحي الذي تمد به مشرف نحو

والتابضة القصيرة للإبهام ويصاحبه الفرع الغائر الناشئ من العصب الزندي
 وأما فروع الشريان الكعبري فتقسم الى ثلاثة مجاميع تبعاً لاقسامه الثلاثة وهي :
 في الساعد: الكعبري الراجع - الفروع العضلية - الراجي السطحي - الرسغي المقدم
 في الرسغ : الرسغي الخلفي - المشطي - الظهران الإبهاميان - الظهرى السبائي
 في اليد : الرئيسي الإبهامي - السبائي الكعبري - الثاقبة - الراحية بين العظام
 فالفرع الكعبري الراجع ينشأ اسفل المرفق ويصعد بين فروع العصب العضلي المغزلي
 موضوعاً على الباطحة القصيرة ثم بين الباطحة الطويلة والعضدية المقدمة فيتوزع في العضلات
 المذكورة والمفصل المرفقي ويتفيم بالفروع الانتهائية للغائر العلوي
 والفروع العضلية تتوزع في العضلات الواقعة على الجانب الكعبري للساعد
 والراجي السطحي ينشأ من الشريان الكعبري قبيل انعكاف هذا الوعاء حول الرسغ ويذهب
 الى المقدم ماراً بين عضلات الإبهام التي يرسل فرعاً إليها ويتفيم بالطرف الانتهائي للشريان
 الزندي مكماً القوس الراجي السطحي . وكثيراً ما يكون صغيراً جداً وينتهي في عضلات الإبهام
 والفروع الرسغية تتوزع في مفاصل الرسغ . والرسغي المقدم وعاء صغير ينشأ من الشريان
 الكعبري بقرب الحافة السفلى للكابة المربعة ويذهب الى الانسية الى مقدم الكعبرة ويتفيم بالفرع
 الرسغي المقدم للشريان الزندي فيتكوّن من ذلك قوس تذهب منه فروع الى مفاصل الرسغ
 والرسغي الخلفي فرع صغير ينشأ من الشريان الكعبري تحت الاوتار الباسطة للإبهام
 ويقاطع الرسغ عرضاً الى الحافة الانسية لليد ويتفيم بالفرع الرسغي الخلفي للشريان الزندي .
 ويرسل فروعاً الى الاعلى تتفيم بنهاية الشريان المقدم بين العظمين وفرعين الى الاسفل يذهبان
 الى الخلاء الثالث والرابع بين العظام
 والفرع المشطي منشأه تحت اوتار البواسط يذهب الى المقدم على العضلة الثانية الظهرية
 بين العظام ويتوزع في الجانبين المتجاورين من السبابة والوسطى
 والظهران الإبهاميان فرعان صغيران يذهبان على الوجه الظهرى للإبهام . ويكون
 منشأهما تارة منفصلاً وتارة مشتركاً عند قاعدة العظم المشطي الاول
 والظهرى السبائي فرع صغير أيضاً يذهب على الجانب الكعبري لظهر السبابة ويرسل
 فروعاً للمعدة للسبابة (وهي العضلة الاولى الظهرية بين العظام)
 والإبهامي الرئيسي ينشأ من الشريان الكعبري عند انعكافه الى باطن اليد . وينزل بين
 المعدة للسبابة والمقربة للإبهام على الجانب الزندي لمشطي الإبهام الى قاعدة السلامية الاولى حيث

موضوعاً الى الجانب الانسي لجسم العظم المذكور في الاعلى والى مقدمه في الاسفل . وهو سطحي في جميع سيره يغطيه الجلد واللفافة السطحية والغائرة وانما تعلقه قليلاً

شكل ١٧٢



الباطحة الطويلة في جزئه العلوي . وفي مسيره الى الاسفل يكون موضوعاً على وتر ذات الراسين والباطحة القصيرة والكابة المستديرة للكعبرة والمنشأ الكعبري للقابضة السطحية للاصابع والقابضة الطويلة للابهام والكابة المربعة والطرف السفلي للكعبرة . وفي الثلث العلوي من سيره يكون وضعه بين الباطحة الطويلة والكابة المستديرة للكعبرة وفي ثلثيه السفليين بين وتر الباطحة الطويلة وتر القابضة الكعبرية للرسغ . واما العصب الكعبري فواقع الى الجانب الوحشي من هذا الشريان في ثلثه المتوسط . وبعض خيوط من العصب العضلي الجلدي ثقب اللفافة الغائرة وتصاحب الجزء السفلي من الشريان عند انعكافه حول الرسغ . ويصاحبه ويريدان مرافقان في كل سيره . واما مجاورته في الرسغ فعندما ينعكف حول الجانب الوحشي للرسغ من التواليري الى الخلاء الاول بين العظام يكون مستقراً على الرباط الجانبي الوحشي مغطى بالاونار الباسطة للابهام والاوردة تحت الجلد وبعض خيوط من العصب الكعبري والجلد . ويرافقه عند ذلك ويريدان وخط من العصب العضلي

الجلدي . ومجاورته في اليد انه يمر من الطرف العلوي للخلاء الاول بين العظام بين راسي المبعة للسبابة مقاطعاً للراحة الى قاعدة مشطي الخنصر فيتفهم بالفرع الاستطراقي من الشريان الزندي مكوناً بذلك القوس الراجي الغائر . ويكون عند ذلك موضوعاً على الاطراف الرسغية للعظام المشطية والعضلات بين العظام مغطى بالاونار القابضة للاصابع والخراطينية وعضلات الخنصر

شكل ١٧٢ شرايين الساعد ١ الجزء السفلي لذات الراسين ٢ العقدة الانسية لعظم العصد . والى الاسفل من الرقم منشا الكابة المستديرة للكعبرة والقابضة الكعبرية للرسغ مقطوع ٣ الجزء الغائر للكابة المستديرة ٤ الباطحة الطويلة ٥ القابضة الطويلة للابهام ٦ الكابة المربعة ٧ القابضة الغائرة للاصابع ٨ القابضة الزندية للرسغ ٩ الرباط الخلفي والاونار سائرة اسفله الى راحة اليد . وقد وُضع الرقم على وتر الراجية الطويلة المقطوع ١٠ الشريان العضدي ١١ التنعم الكبير متفهماً من الاعلى بالغائر السفلي ومن الاسفل بالزندي الراجع المقدم ١٢ الشريان الكعبري ١٣ الكعبري الراجع متفهماً بالغائر العلوي ١٤ الراجي السطحي ١٥ الشريان الزندي ١٦ القوس الراجي السطحي الذي يرسل فروعاً اصبعية الى ثلاث اصابع ونصف ١٧ الابهامي الرئيسي والكعبري السبائي ١٨ الزندي الراجع الخلفي ١٩ الشريان بين العظمين المقدم ٢٠ الشريان بين العظمين الخلفي نافذاً الى الخلف من الغشاء بين العظمين

حيث يتفم بالفرع الراجع بين العظمين وعلى الجانب الانسي للعضد بالزندى الراجع الخلفي وبالمتفم الكبير والغائر السفلي

والشريان الغذائى لجسم العضد ينشأ من الشريان العضدي نحو منتصف العضد. يذهب الى الاسفل ويدخل القناة الغذائية للعظم المذكور بقرب مندغم العضلة الغرايبة العضدية والغائر السفلي صغير منشأه من العضدي اسفل منتصف العضد بقليل. يثقب الفاصل الانسي بين العضلات وينزل على وجه الراس الانسي لثلاثية الرؤوس الى الخلاء بين العقدة الانسية والتوالمرفقي مصحوباً بالعصب الزندي وينتهي متمهماً بالشريان الزندي الراجع الخلفي والمتفم الكبير

والمتمفم الكبير ينشأ من العضدي نحو قيراطين اعلى المفصل المرفقي. ويذهب عرضاً الى الانسية على العضدية المقدمة ثم يثقب الفاصل الانسي بين العضلات وينعكف حول الجزء الخلفي للعضد بين ثلاثية الرؤوس والعظم فيكون قوساً اعلى الحفرة المرفقية بواسطة اتحاده بالفرع المفصلي الخلفي من الغائر العلوي. وبينما يكون هذا الوعاء سائراً على العضدية المقدمة يرسل فرعاً صغيراً بين العقدة الانسية والتوالمرفقي يتفم بالغائر السفلي والشريان الزندي الراجع الخلفي. وتذهب منه فروع اخرى أيضاً بعضها يصعد وتجد بالغائر السفلي وبعضها ينزل الى مقدم العقدة الانسية ليتفم بالشريان الزندي الراجع المقدم

والفروع العضلية ثلاثة او اربعة كبيرة تتوزع في العضلات الواقعة في مسير الشريان العضدي وهي الغرايبة العضدية وذات الراسين والعضدية المقدمة

الشريان الكبير

يظهر هذا الشريان من اتجاهه انه امتداد العضدي مع انه اصغر حجماً من الشريان الزندي. يبدأ عند تشعب العضدي اسفل ثنية المرفق ويذهب على الجانب الكبير للساعد الى الرسغ ثم ينعكف الى الخلف حول الجانب الوحشي للرسغ تحت الاوتار الباسطة للابهام ثم يتجه الى المقدم ويمر بين راسي العضلة الاولى الظهرية بين العظام وينفذ الى راحة اليد. ثم يقاطع العظام المشطية ذاهباً الى المحافة الزندية لليد ومكوناً للقوس الراحي الغائر وعند نهايته يتفم بالفرع الغائر للشريان الزندي. ولذلك نسف مجاورة هذا الشريان الى ثلاثة اقسام وهي مقدم الساعد وموخر الرسغ واليد

اما مجاورته في الساعد فانه ممتد بين عنق الكعبرة والجزء المقدم للتو الابري فيكون

عنه بواسطة اللفافة. ومن المُوختر ينفصل عن الجانب الانسي للعضد من الاعلى بواسطة الراس الطويل والرأس الانسي لثلاثية الرؤوس وإنما يتوسط بينه وبينها العصب العضلي المغزلي والشريان الغائر العلوي. ويفصله عن مقدم العظم من الاسفل مندغم الغرابية العضدية والعضدية المقدمة. ومن جانبه الوحشي مجاور لبداية العصب المتوسط والعضلة الغرابية العضدية وذات الراسين اللتين تغطيانه قليلاً. ومن جانبه الانسي مجاور للعصيين الجلدي الانسي والزندي الى نصفه العلوي والعصب المتوسط الى نصفه السفلي. ويصاحبه ويريدان هما الوريدان المرافقان ملتصقين به

في ثنية المرفق. اذا وصل الشريان العضدي الى ثنية المرفق غار في خلاء مثلث قاعدته مشرفة الى الاعلى نحو العضد وتحده جانبه الوحشي الباطحة الطويلة وجانبه الانسي الكعابة المستديرة للكعبرة وتكون ارضه العضدية المقدمة والباطحة القصيرة. فهذا الخلاء يتضمن الشريان العضدي ووريديه المرافقين له والشريانين الكعبري والزندي والعصيين المتوسط والعضلي المغزلي ووتر ذات الراسين. ويشغل الشريان العضدي الخط المتوسط للخلاء المذكور وينقسم مقابل التو المتقاري للزند الى فرعين كعبري وزندي. ويغطيه من المقدم الجلد واللفافة السطحية والوريد الباسليقي المتوسط وإنما يفصل الوريد عن ملاصقة الشريان بواسطة لفافة ذات الراسين. ومن الخلف يستقر على العضدية المقدمة التي تفصله عن مفصل المرفق. والعصب المتوسط واقع الى الجانب الانسي من الشريان وإنما يفصله عنه في الاسفل خلاء مسافته نحو نصف قيراط. واما وتر ذات الراسين فالى الجانب الوحشي من الخلاء والى الوحشية من الوتر العصب العضلي المغزلي مستقرًا على الباطحة القصيرة وتجب بعضه الباطحة الطويلة واما فروع الشريان العضدي فهي:

الغائر العلوي - الشريان الغدائي - الغائر السفلي - المنغم الكبير - العضدية

فالغائر العلوي منشأه من الجزء الخلفي والانسي للعضدي مقابل الحافة السفلى للمستديرة الكبيرة. يذهب الى الخلف الى الخلاء بين الراس الوحشي والرأس الانسي لثلاثية الرؤوس مصحوباً بالعصب العضلي المغزلي ثم يعكف حول الجزء الخلفي لجسم العضد في الميزاب المغزلي بين ثلاثية الرؤوس والعظم وينحدر على الجانب الوحشي للعضد الى الخلاء بين العضدية المقدمة والباطحة الطويلة حتى المرفق حيث يتفهم بالفرع الراجع من الشريان الكعبري. ويتوزع في الذالية والغرابية العضدية والثلاثية الرؤوس ويرسل فرعاً وهو في الميزاب يقال له الشريان المفصلي الخلفي الذي ينزل عمودياً بين ثلاثية الرؤوس والعظم الى الجزء الخلفي من المفصل المرفقي

اللوح والشريان فوق اللوح. والفرع تحت الشوكة وهو الظهري اللوحي الذي ينعكف حول الحافة الابطية اي الوحشية للوح بين المستديرة الصغيرة والعظم ويدخل الحفرة تحت الشوكة ويتنم بالشريان فوق اللوح وبالشريان اللوحي الخلفي. والفرع المتوسط الذي يدوم نازلاً بجانب الحافة الابطية للوح بين العضلتين المستديرتين الكبيرة والصغيرة فاذا وصل الى الوجه الظهري للزاوية السفلى من هذا العظم تنم بالشريان فوق اللوح

والشريانان المنعكفان يلتفان حول عنق العضد. اما المنعكف الخلفي منها فأكبرها. ينشأ من الجزء الخلفي للشريان الابطي مقابل الحافة السفلي للعضلة تحت اللوح ويذهب الى الخلف مع الوريد والعصب المنعكفين في الخلاء المربع الذي تحده المستديرتان الكبيرة والصغيرة والراس اللوحي لثلاثية الرؤوس والعضد ثم ينعكف حول عنق هذا العظم ويتوزع في العضلة الذالية ومفصل الكتف متفهماً بالمنعكف المقدم والشريان فوق اللوح والصدرى الاخرى. والمنعكف المقدم اصغر جداً من سابقه وينشأ أسفله من الجزء الوحشي للشريان الابطي ويذهب افقياً الى الوحشية تحت العضلة الغرابية العضدية والراس القصير لذات الراسين مستقراً على الجزء المقدم لعنق العضد. فاذا وصل الى ميزاب ذات الراسين ارسل فرعاً صاعداً يصعد بجانبه ليتوزع في راس العضد ومفصل الكتف. ثم يتجه الى الوحشية تحت العضلة الذالية فيتوزع فيها ويتنم بالمنعكف الخلفي والصدرى الاخرى

الشريان العضدي

يبدأ هذا الشريان عند الحافة السفلى لوتر المستديرة الكبيرة ويذهب الى الاسفل على الجانب الانسي والمقدم للعضد وينتهي اسفل ثنية المرفق نحو نصف قيراط حيث ينقسم الى الشريان الكعبري والشريان الزندي. ويدل على سير هذا الوعاء خط يرسم في الظاهر من الجانب الوحشي للخلاء الابطي بين ثنيات الابط الى نقطة متوسطة بين عقدتي العضد فيكون ذلك عبارة عن الانخفاض الواقع بجانب الحافة الانسية للعضلة الغرابية العضدية وذات الراسين. ويكون هذا الشريان واقعاً في الجزء العلوي من سيره الى الجهة الانسية من العضد وفي الاسفل الى مقدمه

مجاورته. هذا الشريان سطحي في جميع طوله ويغطيه من المقدم الجلد واللفافة السطحية والغائرة. وتصله لفاقة ذات الراسين عن الوريد الباسليتي المتوسط حذاء المرفق. ويصالبه العصب المتوسط عند مركزه. والوريد الباسليتي واقع عليه في النصف السفلي من مسيره وانما ينفصل

واما فروع الشريان الابطي فهي:

من القسم الاول: الصدري العلوي والصدري الاخري
من القسم الثاني: الصدري الطويل والصدري الجناحي
من القسم الثالث: الشريان تحت اللوح والمنعكف المقدم والمنعكف الخلفي

فالصدري العلوي شريان صغير منشأه من الشريان الابطي اما رأساً او من جذع مشترك بينه وبين الشريان الصدري الاخري . يتجه الى المقدم والانسية بجانب الحافة العليا للعضلة الصدرية الصغيرة ويسير بينها وبين الصدرية العظيمة الى جانب الصدر فيتوزع فيها وفي جدار الصدر متفهماً بالثدي الباطن والشريان بين الاضلاع

والصدري الاخري جذع قصير ينشأ من مقدم الشريان الابطي ويتجه الى المقدم فاذا وصل الى الحافة العليا للصدرية الصغيرة انقسم الى فروع منها صدرية ومنها اخريّة ومنها نازلة . فالفروع الصدرية اثنان او ثلاثة تتوزع في المسننة الكبيرة والصدريتين متفهماً بالفروع بين الاضلاع للثدي الباطن . والفروع الاخرية تتجه الى الوحشية نحو الاخرم فتتوزع في العضلة الذالية وتنفم على وجه الاخرم بالشريان فوق اللوح والشريان المنعكف الخلفي . والفرع النازل يسير بين الصدرية الكبيرة والذالية مصاحباً للوريد الرأسي ومتوزعاً في العضلتين المذكورتين

والصدري الطويل (وهو الثدي الظاهر) يذهب الى الاسفل والانسية حذاء الحافة السفلى للصدرية الصغيرة الى جانب الصدر فيتوزع في المسننة الكبيرة والعضلتين الصدريتين ويرسل فروعاً مقاطعة للابط الى الغدد الابطية والعضلة تحت اللوح ويتفم بالثدي الباطن والشرايين بين الاضلاع

والصدري الجناحي فريع يذهب الى الغدد والتنسج الخلوي في الابط . وكثيراً ما يكون مفقوداً فتقوم مقامه فروع من بعض الشرايين الصدرية

والشريان تحت اللوح اعظم فروع الشريان الابطي . ينشأ مقابل الحافة السفلى للعضلة تحت اللوح ويذهب الى الاسفل والخلف بجانب حافتها السفلى حتى اذا وصل الى الزاوية السفلى للوح تفم بالشريان اللوحي الخلفي وهو فرع من الشريان تحت الترقوة . ويرسل فروعاً الى العضلة تحت اللوح والمسننة الكبيرة والمستدبرة الكبيرة والظهرية العريضة ويرسل ايضاً فرعاً كبيراً على مسافة قيراط او قيراط ونصف من منشئه يقال له الظهرية اللوحي ينبغي الانتباه له . فانه منعكف حول الحافة السفلى للوح وينقسم الى ثلاثة فروع وهي الفرع تحت اللوح الذي يدخل الحفرة تحت اللوح فيتوزع في الوجه الباطن للعضلة تحت اللوح ويتفم بالشريان تحت

كان اعلى العضلة الصدرية الصغيرة والثاني ما كان وراءها والثالث ما كان اسفلهما

شكل ١٧٢



فالقسم الاول من الشريان الابطي مجاوراً الى المقدم للجزء الترقوي من الصدرية الكبيرة والغشاء الضلعي الغرابي والوريد الراسي . والى الموخز للخلاء الاول بين الاضلاع والسن الاول للمسننة الكبيرة والعصب الصدري الخلفي . والى جانبه الوحشي للضفيرة العضدية . والى جانبه الانسي اي

الصدري للوريد الابطي

والقسم الثاني من الشريان الابطي واقع تحت الصدرية الصغيرة . وتغطيه من المقدم العضلتان الصدريتان ومن الموخز ينفصل عن العضلة تحت اللوح بخلاء خلوي . والى الجانب الانسي ملاصق للوريد الابطي . واما الضفيرة العضدية فتحيط الشريان وتفصله عن الملاصقة التامة للوريد والعضلات المجاورة

والقسم الثالث من الشريان الابطي واقع اسفل

الصدرية الصغيرة . وهو مجاور من المقدم للحافة السفلى من الصدرية الكبيرة الى الاعلى ولا يغطيه من الاسفل الا الجلد واللفافة . ومن الموخز للجزء السفلي من العضلة تحت اللوح وتري الظهرية العريضة والمستديرة الكبيرة . والى جانبه الوحشي للعضلة الغرابية العضدية . والى جانبه الانسي اي الصدري للوريد الابطي . واما مجاورة الضفيرة العصبية العضدية للشريان في قسمه الثالث فهي ان الى جانبه الوحشي العصب المتوسط والعصب العضلي الجليدي . والى جانبه الانسي العصب الزندي والجليدي الانسي والجليدي الانسي الاصغر . والى الخلف العضلي المغزلي والمنعكف الآن المنعكف لا يمتد الى ابعد من الحافة السفلى للعضلة تحت اللوح

شكل ١٧٢ الشريان الابطي والعضدي مع فروعها ١ العضلة الذالية ٢ ذات الراسين ٣ الزائدة الوترية التي ترسل من وتر ذات الراسين الى اللبنة الغائرة للساعد . والزائدة المذكورة تفصل الوريد الباسلق المتوسط عن الشريان العضدي ٤ الحافة الوحشية للعضدية المقدمة ٥ الباطحة الطويلة ٦ الغرابية العضدية ٧ القسم المتوسط لثلاثية الروس ٨ راسها الانسي ٩ الشريان الابطي ١٠ الشريان العضدي . والنقطة السوداء تدل على الحد الفاصل بين الشريانيين ١١ الشريان الصدري الاخرى منقسماً الى اقسامه الثلاثة . والرقم موضوع على التور الغرابي ١٢ الصدري العلوي والصدري الطويل ١٣ العضلة للمسننة الكبيرة ١٤ الشريان تحت اللوح ١٥ الغائر العلوي ١٦ الغائر السفلي ١٧ الخنم الكبير منقسماً من الاسفل بالزندي الراجع المقدم ١٨ منتهى الغائر العلوي منقسماً بالكعبري الراجع في الخلاء الذي بين العضدية المقدمة والباطحة الطويلة

الفرع الصدري الطويل على الحافة المقدمة للابط . والاوعية والاعصاب تحت اللوح الى الجهة المؤخرية ملاصقة للحافة السفلى من العضلة تحت اللوح . وينعكس حول الحافة المذكورة هذه العضلة الشريان والوريد الظهران اللوحيان . وتُشاهد نحو الطرف الوحشي لهذه العضلة الاوعية والعصب المنعكفة الخلفية متجهة الى الخلف الى الكنف

واما في الجانب الانسي وهو الصدري فلا يوجد وعاء كبير وإنما تقاطع جزءه العلوي بعض فروع صغيرة من الشريان الصدري العلوي . غير أنه يوجد هناك بعض اعصاب معتبرة وهي الصدري الخلفي الذي يقال له ايضاً التنفسي الظاهر نازلاً على وجه المسننة الكبيرة ومتوزعاً فيها والاعصاب بين الاضلاع العضدية التي تثقب الجزء العلوي والمقدم من الجدار وترّ عرضاً في الخلاء الابطي الى الجانب الانسي للعضد

وعلاً التجويف الابطي مقدار من النسج الخلوي الرخو وعدد عظيم من الشرايين والاوردة وإنما جميعها صغيرة ومن عشر الى اثني عشرة غدة ليمفاوية أكثرها موضوع على الجانب الصدري وفي الجزء الخلفي والسفلي لهذا الخلاء

ويجب على التلميذ الانتباه الشديد الى مجاورة الاوعية والاعصاب الواقعة في الاجزاء المختلفة للابط لانه كثيراً ما يُدعى الجراح الى قطع غدد مصابة او استخراج سلعة من هذه الجهة فيجب عليه في العمل ان يحترس جداً اذا وصل الى ناحية الجدار الوحشي ورأس الخلاء فانه هناك تكون الاوعية في خطر من الاذى . وفي جهة الجدار المؤخري يجب ان يتوقى الاوعية تحت اللوح والظهرية اللوحية والمنعكفة الخلفية وفي الجدار المقدم الفروع الصدرية . وإنما الى الجهة الانسية اي الصدرية لانوجد اوعية معتبرة وهناك تكون في الغالب السلع التي يقتضي استخراجها

الشريان الابطي

هو امتداد الشريان تحت الترقوة يبدأ عند الحافة السفلى للضلع الاول وينتهي عند الحافة السفلى لوترى الظهرية العريضة والمستديرة الكبيرة فيصير هناك الشريان العضدي . ويختلف اتجاهه بحسب وضع العضو فمتى كان العضد موضوعاً بجانب الصدر كان الشريان منحنيّاً انحناءً خفيفاً بحيث يكون التحديب مشرفاً الى الاعلى والوحشية . ومتى كان موضوعاً على زاوية قائمة بالنسبة الى الجذع قرب الشريان من الاستقامة فاذا رُفِع الى اكثر من ذلك انحنى الشريان وصار التقعير مشرفاً الى الاعلى . ثم ان وضع الشريان في بداية سيره غائر جداً وعند نهايته يصير سطحياً لا يغطيه الا الجلد واللفافة . وقد يُقسَم هذا الوعاء تسهيلاً لوصفه الى ثلاثة اقسام الاول ما

والفرع العنقي الغائر ينشا في الغالب من الشريان العلوي بين الاضلاع وهو مشابه للفرع الخلفي من الشريان الاورطي بين الاضلاع. يتجه الى الخلف بين التواء المستعرض للفقرة السابعة العنقية والضلوع الاول ثم يصعد الى الجزء الخلفي من العنق بين العضلة المضاعفة والشوكية النصف حتى المحور فيتوزع فيهما وفي العضلات المجاورة لهما ويتفهم بالشريان الرئيسي العنقي للموخرى وبفروع تسير الى الوحشية من الشريان الفقري

التشريح الجراحي للابط

الابط خلاء مخروطي الشكل واقع بين الجزء العلوي والجانبى للصدر والجانب الانسي للعضد عند جزئه الاعلى

حدوده. راس المخروط المذكور مشرف الى الاعلى نحو اصل العنق يكونه الخلاء الواقع بين الضلع الاول الى الانسية والحافة العليا للوح الى الوحشية والترقوة وعضلتها الى المقدم. وقاعدته مشرفة الى الاسفل يكونها الجلد وطبقة سميقة لفافية. وتمتد القاعدة المذكورة بين الحافة السفلى للصدرية الكبيرة من المقدم والحافة السفلى للظهرية العريضة من الخاف وهي عريضة في الجهة الانسية عند الصدر وضيقة ومستدقة في الجهة الوحشية عند العضد. وتكون الحد المقدم للابط الصدريتان الكبيرة والصغيرة اما الكبيرة فتغطي جميع الجدار المقدم للابط والصغيرة جزءه المركزي فقط. وتكون حده الخلفي الذي ينزل الى الاسفل اكثر من الحد المقدم العضلة تحت اللوح من الاعلى والمستديرة الكبيرة والظهرية العريضة من الاسفل. والى الجانب الانسي الاضلاع الاربعة الاول والاخلية الواقعة بينها وبعض المسنة الكبيرة. والى الجانب الوحشي حيث يجتمع الجدار المقدم والجدار الخلفي الخلاء ضيق يحك العظم العضدي والعضلة الغرابية العضدية وذات الراسين

فحواه. في هذا الخلاء الاوعية الابطية والصفيرة العصبية العضدية وفروعها وبعض فروع الاعصاب بين الاضلاع وكثير من الغدد الليمفاوية. وجميعها يرتبط بعضها ببعض بواسطة مادة دهنية ونسيج خلوي رخو

فالشريان والوريد الابطيان والصفيرة العصبية العضدية تمتد بانحراف على الجدار الوحشي للخلاء الابطي من رأسه الى قاعدته ووضعها اقرب كثيراً الى الجدار المقدم منه الى الجدار الموخر. وموقع الوريد الى الانسية اي الى الجهة الصدرية من الشريان وبحجة بالكلية عن النظر. والى مقدم الخلاء الابطي الفروع الصدرية للشريان الابطي ملاصقة للعضلتين الصدريتين ويسير

والفروع المنصفية اوعية صغيرة تتوزع في النسيج الخلوي الواقع في الحجاب المنصف المقدم وفي بقايا الغدة التيموسية

والفروع التامورية تتوزع في الجزء العلوي للتامور ومنها ما يذهب الى القصية المثلثة والفروع المقدمة بين الاضلاع تتوزع في الاخلية بين الاضلاع الخمسة او الستة العليا. فيسير كل منها الى الوحشية وينقسم على مسافة قريبة من منشئه الى فرعين يذهبان بجانب الحافتين المتقابلتين لكل ضلعين ويتجهان بالشرايين بين الاضلاع الناشئة من الاورطي الصدري. ويكون وضعها في اول الامر بين البليورا والعضلات الباطنة بين الاضلاع ثم بين الطبقتين لهذه العضلات. وتتوزع في العضلات بين الاضلاع والعضلة الصدرية وفي الغدة الثديية

والشرايين المقدمة او الثاقبة تنشأ من الشريان الثديي الباطن وتذهب الى المقدم في الاخلية بين الاضلاع الخمسة او الستة العليا ثم تنحني الى الوحشية وتتوزع في الصدرية الكبيرة والجلد. والثلاثة العليا منها تتوزع في الغدة الثديية فتكون عظيمة في النساء مدة الارضاع

والشريان العضلي الحجابي يتجه بانحراف الى الاسفل والوحشية وراء غضاريف الاضلاع الكاذبة ثم يثقب الحجاب الحاجز عند الضلع الثامن او التاسع وينتهي وقد صغر حجمه جداً مقابل الخلاء الاخير بين الاضلاع. ويرسل فروعاً الى الاخلية التي يسير فيها وهو منحدر الى الاسفل وفروعاً الى الحجاب الحاجز والعضلات البطنية

والشريان الشراسيفي العلوي ينزل وراء العضلة المستقيمة البطنية ويثقب غدها وينقسم الى فروع تتوزع فيها وتنغم بالشريان الشراسيفي الناشئ من الحرقفي الظاهر. وفي بعض الاحوال يثقب غمد العضلة المستقيمة ويتوزع في عضلات البطن والجلد

الشريان العلوي بين الاضلاع

منشأه من الجزء العلوي والخلفي للشريان تحت الرقوة خلف الاخمية المقدمة في الجانب الايمن والى الجهة الانسية من هذه العضلة في الجانب الايسر. يتجه الى الخلف ويرسل الفرع العنقي العائر ثم ينزل وراء البليورا الى مقدم عنقي الضلعين الاولين ويتغم بالشريان الاول بين الاضلاع الآتي من الاورطي. في الخلاء الاول بين الاضلاع يرسل فرعاً يتوزع كالشرايين الاورطية بين الاضلاع. والفرع الذي يذهب الى الخلاء الثاني يتحد في الغالب بفرع من الشريان الاورطي الاول بين الاضلاع. وكل من هذه الفروع يرسل فرعاً الى العضلات الشوكية الخلفية وفروعاً يعمر من الثقب بين الفقرات الى الحبل الشوكي واغشيته

من هذا الشريان ايضاً فروع الى مفصل الكنف

الشريان العنقي المستعرض

يذهب هذا الشريان الى الوحشية معارضاً للجزء العلوي من المثلث تحت الترقوة ومتى وصل الى الحافة المقدمة للمربعة المخرفة انقسم تحتها الى فرعين وهما العنقي السطحي واللوح الخلفي . ومدة سيره في العنق يسير الى مقدم العضلات الاخمعية والصفيرة العضدية التي يمر احياناً بين اقسامها وتغطيه العضلة الجلدية والقصية الحلمية والكتفية اللامية والمربعة المخرفة اما فرعه العنقي السطحي فانه يصعد تحت الحافة المقدمة للمربعة المخرفة فيرسل فروعاً اليها والى العضلات والغدد المجاورة لها في العنق

والفرع اللوح الخلفي امتداد العنقي المستعرض يسير تحت الرافعة لزاوية اللوح الى الزاوية العليا للوح وينزل بجانب الحافة الخلفية للوح حتى الزاوية السفلى حيث يتفرع تحت اللوح من الشريان الابطي . وتغطيه مدة سيره الميعنتان فيرسل فروعاً اليها والى الظهرية العريضة والمربعة المخرفة متمماً بالشريانيين فوق اللوح وتحت اللوح وبالفرع الخلفية لبعض الشرايين بين الاضلاع

الشريان الثديي الباطن (شكل ١٧٠)

منشأه من الوجه السفلي للجزء الاول من الشريان تحت الترقوة مقابل المحور الدرقي . واما سيره فانه ينزل خلف الترقوة الى الوجه الباطن للجدار المقدم من الصدر مستقراً على الغضاريف الضلعية على بعد يسير من حافة القص . فاذا وصل الى الحلاء الواقع بين الغضروف السادس والسابع انقسم الى فرعين وهما العضلي الحجابي والشراسيفي العلوي . واما مجاورته فعند منشئه يغطيه الوريدان الوداجي الباطن وتحت الترقوة ويصالبه العصب الحجابي . وفي الجزء العلوي من الصدر يستقر على الغضاريف الضلعية والعضلات الباطنة بين الاضلاع الى المقدم وتغطيه البلبورا الى الخلف . وفي الجزء السفلي من الصدر تفصله العضلة المثلثة القصية عن البلبورا .

وبراقفه وريدان ينحدران في الجزء العلوي من الصدر فيصيران جذعاً واحداً

فروعه : الحجابي العلوي - المنصفية - التامورية - القصية - الفروع المقدمة بين

الاضلاع - الناقبة - العضلي الحجابي - الشراسيفي العلوي

فالحجابي العلوي فرع طويل دقيق يصاحب العصب الحجابي بين البلبورا والتامورا الى انجاب الحاجز حيث يتوزع متمماً بالشرايين الاخرى الحجابية الآتية من الثديي الباطن والاورطي البطني

الشريان الدرقي السفلي

يذهب هذا الشريان الى الاعلى ذاهباً متعرجاً خلف غمد السباتي الاصلي وخلف السيمبانوني.
تستقر عليه الغدة العنقية المتوسطة ويتوزع في الوجه السفلي للجسم الدرقي متفهماً بالدرقي العلوي
وبرقيقه من الجانب المقابل

فروعه: الحجري والقصبية والمرئية والعنقي الصاعد
فالفرع الحجري يصعد على القصبية الى الجزء الخلفي من الحنجرة ويتوزع في العضلات
والغشاء المخاطي هناك


والفروع القصبية تتوزع على ظاهر القصبية متممةً في الاسفل بالشرايين الشعبية
والفروع المرئية تتوزع في المريء

والعنقي الصاعد فرع صغير ينشأ من الدرقي السفلي عند مرور هذا الوعاء خلف السباتي
الاصلي ويصعد في العنق في الحلاء بين الاخعية المقدمة والمستقيمة المقدمة الكبيرة. ويرسل فروعاً
الى عضلات العنق تتواصل بفروع من الشريان الفقري. ويرسل ايضاً فرعاً او اثنين يذهبان
من الثقب بين الفقرات بجانب الاعصاب العنقية ويتوزعان في اجسام الفقرات والحبل الشوكي
واغشيتيه

الشريان فوق اللوح

هذا الشريان اصغر من العنقي المستعرض وسيره بانحراف من الانسية الى الوحشية معارضاً
لاصل العنق. يستقر اولاً على الجزء السفلي للاخعية المقدمة وتغطيه حينئذ العضلة القصبية الحلمية.
ثم يصلب الشريان تحت الترقوة ويذهب متجهاً الى الوحشية خلف العظم الترقوي والعضلة
تحت الترقوة على خط مواز لها واسفل البطن الخلفي للكفنية اللامية فاذا وصل الى الحافة العليا
للوح ذهب اعلى الرباط المستعرض للوح الى الحفرة فوق الشوكة وجاور العظم. وعند ذلك
يتفرع بين العظم والعضلة فوق الشوكة التي تذهب اكثر فروعها اليها ويرسل فرعاً استطراقياً
يصلب عنق اللوح فيصل الى الحفرة تحت الشوكة حيث يتفم بالفرع الظهري للشريان تحت
اللوح. ويرسل هذا الشريان فروعاً الى القصبية الحلمية والعضلات المجاورة وفرعاً يقال له فوق
الآخرم يثقب العضلة المربعة المنحرفة ويتوزع في الوجه الجلدي للجهة الاخرمية متفهماً بالشريان
الآخرمي الصدري. وعند مصالبة هذا الشريان للشرم فوق اللوح يفعد منه فرع الى الحفرة تحت
اللوح يتفرع تحت العضلة تحت اللوح ويتفم بالشريان الخلفي والشريان تحت اللوح. وتذهب

وعند منشأها برسلان فروعاً كثيرة تدخل الخلاء المثقوب الخلفي ويقبلان الشريانين الاستطراقيين الخلفيين من السباتي الباطن. وبرزلان أيضاً فرعاً هو المشيمي الخلفي الذي يتوزع في الشقة المتوسطة والضميرة المشيمية داخلاً الى باطن الدماغ تحت الحافة الخلفية للجسم الصلب



شكل ١٧١

وامادائرة وبلليس فعبارة عن النغم العجيب الواقع بين فروع السباتي الباطن وفروع الفقري عند قاعدة الدماغ. ويكوّنهما من المقدم الشريانان الخيانيان المقدمان والشريان الاستطراقي المقدم ومن كل جانب جذع السباتي الباطن والاستطراقي الخلفي. ومن الخلف الخي الخلفي ورأس القاعدي. فيحدث من النغم المذكور دوام الدورة الدموية ولو تعطل فرع او أكثر من الفروع التي تتعلق بها.

المحور الدرقي (شكل ١٧٠)

هو جذع قصير غليظ ناشئ من الجزء المقدم للقسم الاول من الشريان تحت الترقوة حذاء الجانب الانسي للاخيمية المقدمة وينقسم بقرب منشئه الى ثلاثة فروع الدرقي السفلي وفوق اللوح والعنقي المستعرض

شكل ١٧١ دائرة ولس ١ الشريانان الفقريان ٢ الشوكي المقدم ٣ الشوكي الخلفي ٤ السباتي الخلفي ٥ الخي الخلفي السفلي ٦ القاعدي وفروعه المستعرضة ٧ الخي العلوي ٨ الخي الخلفي ٩ الاستطراقي الخلفي للسباتي الباطن ١٠ السباتي الباطن وتعريجه ضمن الجعجة ١١ العيني مقطوعاً ١٢ الخي المتوسط ١٣ الخيانيان المقدمان اللذان يتصلان بواسطة الاستطراقي المقدم وهو رقم ١٤

واحد مقدم متوسط يمتد الى الجزء السفلي من الحبل الشوكي. واما وضع هذا الوعاء فتحتم الامر الحنونة بجانب الفرجة المتوسطة المقدمة. ويتوزع في الام الحنونة وجوهر الحبل ويرسل فروعاً من جزئه السفلي الى ذنب الفرس

والشوكي الخلفي ينشا من الفقري وهو بجانب الخناق المستطيل ويذهب الى الوراء الى الجهة الخلفية من الحبل الشوكي ثم ينحدر بجانب الحبل المذكور وراء الاصول الخلفية للاعصاب الشوكية وتأتيه فروع صغيرة من الثقوب بين الفقرات فيستطيل الى الجزء السفلي من الحبل حتى ذنب الفرس. ويذهب من هنا الفرع عند منشئه فريع صاعد ينتهي في البطن الرابع

والشريان الخيخي السفلي اعظم الفروع الناشئة من الشريان الفقري يدور الى الخلف حول الجزء العلوي للخناق المستطيل ماراً بين منشأ العصب الشوكي الاضائي والرئوي المعدي الى الوجه السفلي للخيخ فينقسم هناك الى فرعين. فرع انسي يدوم ذاهباً الى الوراء حتى الشرم بين النصفين الكرويين للخيخ. وفرع وحشي يتوزع في الوجه السفلي للخيخ الى حافته الوحشية حيث تنفم بالخيخي العلوي. وتذهب فروع من هذا الشريان الى الضفيرة المشيمية في البطن الرابع

الشريان القاعدي

سُمِّي بهذا الاسم لسبب وضعه عند قاعدة الجمجمة. وهو جذع مفرد مكون من اتحاد الشريانيين الفقريين يمتد من الحافة الخلفية الى الحافة المقدمة لجسر فارولويوس وهناك ينقسم الى فرعيه الانتهايين وهما الشريانا الخيخان الخلفيان. واما فروعهُ من كل جانب فهي المستعرضة والخيخي المقدم والخيخي العلوي والخيخي الخلفي

فالفروع المستعرضة تذهب الى جسر فارولويوس والاجزاء المجاورة له. وواحد منها يصاحب العصب السعبي الى القناة السمعية الباطنة. واخر يسير على ساق الخيخ ويتوزع في الحافة المقدمة للوجه السفلي من الخيخ يقال له الخيخي المقدم

والشريانا الخيخان العلويان ينشآن عند منتهى القاعدي ويلتفآن حول ساق الخ بقرب العصب الرابع فاذا وصلا الى الوجه العلوي من الخيخ انقسما الى فروع تذهب الى الام الحنونة وتغطي وجوها وتنفم بالخيخي السفلي. ويذهب منها فروع ايضاً لاجزاء اخر في الدماغ والشريانا الخيخان الخلفيان هما الفرعان الانتهايين للشريان القاعدي واكبر من سابقيهما وينفصلان عنها عند منشئهما بواسطة العصبين الثالثين. ويلتفآن حول ساق الخ ثم يذهبان ويتوزعان في الوجه السفلي للعصين الخلفيين من الخ متفهمين بالشريانيين الخيخان المقدم والمتوسط

عميق على وجه قوسها الخلفي ويثقب الرباط المؤخري الحاملي والام الجافية ويدخل الحنجمة من الثقب العظيم. ثم يسير الى مقدم النخاع المستطيل ويتحد برفيقه من الجانب الاخر عند الحافة السفلى لجسر فاروليوس فيتكون من ذلك الاتحاد الشريان القاعدي. يجاورته. هذا الشريان موضوع عند منشئه وراء الوريد الوداجي الباطن والشريان الدرقي السفلي. ويقرب العمود الشوكي موقعه بين العنقية الطويلة والاخعية المقدمة وتكون القناة الصدرية الى مقدمه في الجانب الايسر. ومدة سيره في ثقب التوات المستعرضة تصاحبه ضفيرة عصبية ناشئة من السيمبانوي ويكون وضعه حينئذ بين الوريد الفقري من المقدم والاعصاب العنقية التي تبرز من الثقوب بين الفقرات من الخلف. وبينما يكون منعكفاً حول التوا المفصلي للحاملة يتضمنه خلافاً مثلث مكون من المستقيمة الخلفية الصغيرة والمنحرفتين العليا والسفلى وتغطيه المستقيمة الخلفية الكبيرة والمضاعفة. واما داخل الحنجمة وهو يدور حول النخاع المستطيل يكون وضعه بين العصب تحت اللسان والاصل المقدم للعصب تحت المؤخري

فروع ٤٥. تقسم فروعها الى قسمين عنقية وخوذية

فالفرع العنقية الشوكية الجانبية والعضلية

والفروع الخوذية السحائي الخلفي والشوكي المقدم والشوكي الخلفي والمخني السفلي

فالفرع الشوكية الجانبية تدخل القناة الشوكية من الثقوب بين الفقرات. وينقسم كل منها الى فرعين احدهما يذهب محاذياً لاصول الاعصاب ويتوزع في النخاع الشوكي واغشيته متفهماً بالشرايين الشوكية الاخر. والثاني يتوزع في الوجه الخلفي لاجسام الفقرات

والفروع العضلية تذهب الى العضلات الغائرة في العنق حيث ينعكف الشريان الفقري

حول التوا المفصلي للحاملة وتنفهم بالشريان المؤخري والشريان العنقي الغائر

والسحائي الخلفي فرع صغير او فريعان ناشئان من الشريان الفقري مقابل الثقب العظيم

ذاهبان بين العظم والام الجافية في الحفرتين المخيخيتين ويتوزعان في منجل المخيخ

والشوكي المقدم فريع اكبر من الشوكي الخلفي ينشأ عند منتهى الشريان الفقري ويتحد

برفيقه من الجانب الاخر الى مقدم النخاع المستطيل فيصيران جذعاً واحداً ينزل قليلاً الى مقدم

النخاع الشوكي ويتحد بفروع صغيرة داخله الى القناة الشوكية من بعض الثقوب بين الفقرات

منشأها من الشريان الفقري والشريان العنقي الصاعد في العنق ومن الشريان بين الاضلاع

في الجهة الظهرية ومن الشرايين القطنية والحرقفية القطنية والعجزية الجانبية في الجزء السفلي


العمود الشوكي. ويتم الاتحاد المذكور بواسطة فروع صاعدة وفروع نازلة ينتهي جميعها في شريان

الظاهر الذي يصب فيه الوريد فوق اللوح والوريد المستعرض. واما الوريد تحت الترقوة فواقع اسفل الشريان وخلف العظم الترقوي. ومن الخلف يستقر على العضلة الاخمعية المتوسطة. والى الاعلى والوحشية منه الضفيرة العضدية والعضلة الكتفية اللامية. ومن الاسفل يستقر على الوجه العلوي للضلع الاول

في فروع الشريان تحت الترقوة

هي اربعة ثلاثة منها تنشأ من الجزء الاول لهذا الشريان وهي الفقري والتدي الباطن والمحور

شكل ١٧.



الدريقي وواحد من الجزء الثاني وهو الشريان العلوي بين الاضلاع. فالفقري ينشأ من الجزء العلوي والخلفي والمحور الدريقي من الجزء المقدم والتدي الباطن من الجزء السفلي وجميعها من الجزء الاول من الشريان. واما الشريان العلوي بين الاضلاع فتنشأ من الاعلى والخلف للجزء الثاني من الشريان على الجانب الايمن. واما على الجانب الايسر ففي الغالب ينشأ الشريان العلوي بين الاضلاع من الجزء الاول عند الوجه الباطن للاخمعية المقدمة. وعلى كلا الجانبين تنشأ الفروع الثلاثة الاول على قرب بعضها من بعض عند الحافة الانسية للاخمعية المقدمة. وفي اكثر الاحوال تكون المسافة الواقعة بين منشأ الشريان ومنشأ فرعه الاول من نصف قيراط الى قيراط واحد

الشريان الفقري

هذا الشريان يكون في الغالب اول فروع الشريان تحت الترقوة واعظها. ينشأ من الجهة العليا والخلفية للجزء الاول من الشريان المذكور ويذهب الى الاعلى ويدخل من الثقب الواقع في التواء المستعرض للفقرة العنقية السادسة ثم يصعد في ثقب التواء المستعرض لجميع الفقرات التي اعلاها. فاذا وصل الى اعلى الحافة العليا للعمود مال الى الوحشية والاعلى ودخل ثقب التواء المستعرض للحاملة. ثم ينعكف الى الخلف وراء نتوها المنفصلي ويذهب في ميزاب

شكل ١٧. فروع الشريان تحت الترقوة الايمن ١ الشريان اللاسم له ٢ السباتي الايمن ٣ الجزء الاول للشريان تحت الترقوة ٤ الجزء الثاني ٥ الجزء الثالث ٦ الشريان الفقري ٧ الدريقي السفلي ٨ المحور الدريقي ٩ العنقي الصاعد وهو فرع من الدريقي السفلي تبعاً للثقب ١٠ العنقي الفائر وهو فرع من العلوي بين الاضلاع في المتن ١١ العنقي المستعرض ١٢ الشريان فوق اللوح ١٣ التدي الباطن ١٤ العلوي بين الاضلاع

الجزء الأول من الشريان الأيسر تحت الترقوة

ينشأ من طرف الجزء المستعرض من قوس الأورطي مقابل الفقرة الثانية الظهرية ويصعد إلى الحافة الباطنة للضلع الأول خلف مندغم العضلة الأخرعية المقدمة. فيكون هذا الشريان أطول من الأيمن ووضعه أكثر غوراً في التجويف الصدري واتجاهه يقرب من العمودية إلى الأعلى غير متقوس كاتجاه رفيقه من الجانب الأيمن. وأما مجاورته فمن الأمام للبلبورا والرئة اليسرى والعصب الرئوي المعدي والعصب الحجابي والفروع القلبية والشريان السباتي الأيسر والوريدين الوداجي الباطن واللاسم له وتغطيه القصية الدرقية والقصية اللامية والقصية الحلمية. ومن الخلف للمريء والقناة الصدرية والعقدة العنقية السفلى للسيمبوتوي والطويلة العنقية والعمود الفقري. وإلى جانبه الأيسر المريء والقصبة والقناة الصدرية وإلى جانبه الوحشي البلبورا ولما كان الجزء الثاني والثالث متشابهين بالكلية في كلا الشريانيين كان الكلام عليهما واحداً فإقال في الجانب الواحد يصح على الجانب الآخر

الجزء الثاني من الشريان تحت الترقوة

هذا الجزء واقع بين الأخرعيتين المقدمة والمتوسطة وهو قصير جداً ويكون الجزء الأعلى من القوس الذي يرسمه هذا الوعاء في سيره. مجاورته. يغطيه من المقدم الجلد والعضلة الجلدية والقصية الحلمية واللفافة العنقية والعصب الحجابي الذي تنصله عن الشريان الأخرعية المقدمة. ومن الخلف مجاور للأخرعية المتوسطة. ومن الأعلى للضفيرة العضدية. ومن الأسفل للبلبورا. وأما الوريد تحت الترقوة فواقع إلى الأسفل والمقدم من الشريان ويتوسط بينه وبين الشريان الأخرعية المقدمة

الجزء الثالث من الشريان تحت الترقوة

هذا الجزء يذهب من الحافة الوحشية للأخرعية المقدمة إلى الأسفل والوحشية فإذا وصل إلى الحافة الظاهرة للضلع الأول صار الشريان الأبطي. وهو أقرب الأجزاء الثلاثة من الشريان إلى الظاهر وواقع في خلاء مثلث قاعدته إلى المقدم تكوّن بها الأخرعية المقدمة وتكوّن جانبه من الأعلى الكنتية اللامية ومن الأسفل العظم الترقوي. مجاورته. من المقدم يغطيه الجلد واللفافة السطحية والعضلة الجلدية واللفافة الغائرة والعظم الترقوي والعضلة تحت الترقوة والشريان والوريد فوق اللوح. وتنزل عمودياً إلى مقدم الشريان الفروع الترقوية النازلة من الضفيرة العنقية والعصب الناهب إلى العضلة تحت الترقوة. ويصالبه عند طرفه الأيسر الوريد الوداجي

الشريان الى الحافة الظاهرة من الضلع الاول الشريان تحت الترقوة . ومن هناك الى الحافة السفلى للابطال الابطي . ومن هناك الى ثنية المرفق العضدي . فاذا وصل الى الجزء المذكور انقسم الى فرعين كعبري وزندي وذلك طبقاً لما يحدث في الطرف السفلي

الشريانان تحت الترقوة

ينشأ الشريان تحت الترقوة على الجانب الايمن من الشريان الاالا اسم له مقابل المفصل القصي الترقوي الايمن وعلى الجانب الايسر من قوس الاورطي . فينتج من ذلك ان هذين الشريانين يختلفان في الجزء الاول من سيرها نظراً الى الطول والاتجاه والمجاورة للاجزاء القريبة . وبناءً على ذلك قسموا كلاً منهما الى ثلاثة اجزاء . فالجزء الاول على الجانب الايمن يصعد بانحراف الى الوحشية من منشأ هذا الشريان الى الحافة الانسية للعضلة الاشمعية المقدمة . واما على الجانب الايسر فيصعد عمودياً الى الحافة الانسية للعضلة المذكورة . والجزء الثاني يذهب الى الوحشية تحت الاشمعية المقدمة . والجزء الثالث يذهب من حافتها الوحشية تحت العظم الترقوي الى الحافة السفلى او الظاهرة للضلع الاول فيصير هناك الشريان الابطي . ولما كان الجزآن الاولان من هذين الوعائين يختلفان كثيراً في سيرها ومجاورتها للاجزاء القريبة وجب ان يوصف كل منهما على حدة . واما الجزآن الثانيان والثالثان فمتشابهان بالكلية على الجانبين

الجزء الاول من الشريان الايمن تحت الترقوة

ينشأ من الشريان الاالا اسم له مقابل المفصل القصي الترقوي الايمن ويذهب الى الاعلى والوحشية معارضاً لاصل العنق وينتهي عند الحافة الانسية للعضلة الاشمعية المقدمة . وفي هذا الجزء من سيره يصعد قليلاً اعلى الترقوة وانما هذا الارتفاع اعلى العظم المذكور يختلف كثيراً بحيث لا يقع تحت قياس دائم . ويغطيه من المقدم الجلد واللفافة السطحية والعضلة الجلدية واللفافة الغائرة والمنشأ الترقوي للقصبة الحلمية والقصبة اللامية والقصبة الدرقية وطبقة اخرى من اللفافة الغائرة . ويصالبة الوريدان الوداجي الباطن والفكري والعصب الرئوي المعدي والفروع القلبية للسيمباتوي والعصب الحجابي . وتحيط هذا الشريان من الاسفل البللورا واما من الخلف فيفصله نسج خلوي عن العضلة الطويلة العنقية والنتو المستعرض للفقرة العنقية السابعة والسيمباتوي . ويلتف حول جزئه السفلي والخلفي العصب الحنجري الراجع . واما الوريد تحت الترقوة فواقع اسفل الشريان تحت الترقوة خلف العظم الترقوي

فالخي المقدم ينشأ من السباتي الباطن عند الطرف الانسي لفرجة سيلفيوس ويسير الى المقدم في الفرجة الطويلة بين الفصين المقدمين للسخ فاذا بعد قليلاً عن منشئه ذهب منه جذع قصير اوصله برفيقه من الجانب الاخر يقال له الفرع الاستطراقي المقدم. ثم يذهب الشريانان الخيان المقدمان واحد على كل جانب من الجسم الصلب (المندمل) الى ان يصل الى حافته المقدمة فينكفان على وجهه العلوي الى جزئه الخلفي وهناك يتفهمان بالفروع الخفية الخفية. ويذهب فروع من الشريانين المذكورين الى الاعصاب الشمية والبصرية والوجه السفلي للفصين المقدمين والبطين الثالث والخلاء المثقوب المقدم والجسم الصلب والوجه الانسي للفصين الكرويين

والشريان الاستطراقي المقدم فرع قصير طوله نحو خطين متوسط الحجم يوصل الشريانين الخيين المقدمين الواحد بالآخر ممتداً عرضاً على الفرجه الطويلة. وقد يحدث عدم وجود هذا الشريان فيكون الشريانان متحدين في جذع واحد ثم ينقسمان. وقد يوجد منقسماً الى شطرين والشريان الخي المتوسط اعظم فروع السباتي الباطن يمر بانحراف الى الوحشية في فرجة سيلفيوس ثم ينقسم وهو في الفرجة المذكورة الى ثلاثة فروع. فرع مقدم يتوزع في الام الحنوننة المحيطة بوجه الفص المقدم. وخلفي يذهب الى الفص المتوسط. ومتوسط يذهب الى الفص الصغير عند الطرف الوحشي لفرجة سيلفيوس. ويرسل هذا الشريان عند منشئه فروعاً صغيرة كثيرة تذهب الى الجسم المخطط

والشريان الاستطراقي الخلفي ينشأ من الجزء الخلفي للسباتي الباطن ويذهب مستقيماً الى الخلف ويتفهم بالخي الخلفي الذي هو فرع من الشريان القاعدي. ويختلف هذا الشريان كثيراً في الحجم

والمشيمي المقدم فرع صغير دائم الوجود ينشأ من الجزء الخلفي للسباتي الباطن بقرب منشئه سابقه ويذهب الى الخلف والوحشية ويدخل القرن النازل للبطين الجانبي تحت حرف الفص المتوسط للسخ وينتهي في الضفيرة المشيمية

شرايين الطرف العلوي

الشريان الذي يذهب الى الطرف العلوي يبقى جذعاً واحداً من منشئه الى المرفق وانما قسموه الى اقسام وسموها باسماء تابعة للجهات التي يسير فيها. فسموا الجزء الذي يمتد من منشأ

عند الزاوية الوحشية للحجاج والسفلي بالفرع الحجاجي للشريان تحت الحجاج عند الجهة الانسية للجفن. ويذهب فرع من هذا التفرع الى القناة الانفية يتوزع في غشائها المخاطي حتى الصاخ السفلي والشريان الجبهي احد الفرعين الانتهاءين للشريان العيني يمر من الحجاج عند زاويته الانسية الى الجهة ويتوزع هناك في العضلات والمجلد والسحقاق متمماً بالشريان فوق الحجاج والشريان الانفي هو الفرع الاخر الانتهاءي للشريان العيني ينفذ من الحجاج اعلى الوتر العيني ويرسل فريعاً الى الكيس الدمعي ثم ينقسم الى فرعين احدهما يتفرع بالشريان الزاوي والاخر يذهب على ظهر الانف ويتوزع في جميع سطحه ويتفرع برفيته من الجانب الاخر

والشرايين الهدية تقسم الى ثلاثة مجاميع قصيرة وطويلة ومقدمة. فالشرايين الهدية القصيرة من اثني عشر الى خمسة عشر تنشأ من الشريان العيني او بعض فروعها وتحيط العصب البصري وهي ذاهبة الى المقدم الى الجزء الخلفي من المقلة ثم تنقب الطبقة الصلبة حول مدخل العصب المذكور وتتوزع في الطبقة المشيمية والزوائد الهدية. والشرايين الهدية الطويلة اثنان يتقنان الجزء الخلفي من الطبقة الصلبة كالشرايين القصيرة ويذهبان على جانبي المقلة بين الصلبة والمشيمية الى الرباط الهدبي حيث ينقسم كل منهما الى فرعين يكونان حلقة شريانية حول محيط القرنية يذهب منها فروع مشععة في جوهر القرنية الى حافتها السائبة فيتكون منها هناك حلقة ثانية شريانية اي حول حافتها الخدقية. والشرايين الهدية المقدمة ناشئة من الفروع العضلية وتنقب الصلبة على مسافة قريبة من القرنية وتنتهي في الحلقة الشريانية الكبيرة الواقعة حول محيط القرنية

والشريان الشبكي المركزي احد الفروع الصغيرة للشريان العيني. منشأه بقرب الثقب البصري ويتقرب العصب البصري بانحراف ويذهب الى المقدم في مركز جوهره الى الشبكية فتتوزع فروعها فيها متقدمة الى الزوائد الهدية. وفي الجفن البشري يمر فريع منه الى المقدم مخترقاً الرطوبة الزجاجية الى الوجه الخلفي لمحفظة البلورية

والفروع العضلية اثنان علوي وسفلي يتوزعان في عضلات المقلة. فالعلوي اصغرهما اذا وجد توزع في الرافعة للجفن والمستقيمة العليا والمنخرقة العليا. والسفلي اكثر وجوداً من سابقه يذهب الى المقدم بين العصب البصري والمستقيمة السفلى ويتوزع في المستقيمتين الوحشيتين والسفلى والمنخرقة السفلى ومنه تنشأ اكثر الشرايين الهدية المقدمة

واما الفروع الخمية للسباتي الباطن فهي الخي المقدم والخي المتوسط والاستطراقي الخلفي والمشيمي المقدم

فالدمعي اول الفروع واعظما. منشأه من الشريان العيني بقرب الثقب البصري وكثيراً ما ينشأ منه قبل دخول هذا الشريان الى الحجاج. ويصاحب العصب الدمعي في سيره بجانب الحافة العليا للعضلة المستقيمة الوحشية ويتوزع في الغدة الدمعية. وتنفذ فروعته الانتهائية من الغدة المذكورة وتوزع في الجفن والملتحم العلويين متفهماً بالشرايين الجفنية. ويرسل الفرع الدمعي فرعين وجنيين. احدهما يذهب من ثقب في العظم الوجني فينفذ في الحفرة الصدغية ويتفهم بالشرايين الصدغية الغائرة. والاخر يظهر على الخد ويتفهم بالشريان الوجهي المستعرض. ويرسل ايضاً فرعاً الى الخلف من الفرجة الوندية الى الام الجافية يتفهم بفرع من الشريان السحائي المتوسط. تنبيه. قد ينشأ الشريان الدمعي من بعض الفروع المقدمة للشريان السحائي المتوسط

والشريان فوق الحجاج اعظم الفروع الناشئة من الشريان العيني. ينشأ من الشريان المذكور اعلى العصب البصري ويصعد الى ان يرتفع على جميع عضلات الحجاج ثم يسير الى المقدم مع العصب الجبهي بين السحاق والعضلة الرافعة للجفن العلوي وينفذ من الثقب فوق الحجاج وينقسم الى فرعين سطحي وغائر يتوزعان في عضلات الجبهة وجلدها وسحاقها متفهمين بالصدغي والفرع الزاوي للوجهي وشريان الجانب المقابل. ويرسل فروعاً وهو في الحجاج الى المستقيمة العليا والرافعة للجفن وفرعاً الى الانسية يذهب الى الاجزاء الكائنة في الزاوية الانسية للعين. ثم في مروره من الشرم اعلى الحجاج كثيراً ما يرسل فرعاً الى الطبقة المتوسطة للخوذة التي يقال لها المزدوجة

والفروع المصفوية اثنان خلفي ومقدم. فالخلفي اصغرهما يمر من الثقب المصفوي الخلفي ويرسل فروعاً الى الاخيلية المصفوية الخلفية فاذا دخل الى باطن الخوذة ارسل فرعاً سحائياً يذهب الى الام الجافية المجاورة له وفروعاً انفية تنزل الى الانف من الثقوب الكائنة في الصفيحة الغربية متفهمه بفروع الوندي الفكي. واما الشريان المصفوي المقدم يصاحب العصب الانفي فيدخلان الثقب المصفوي المقدم ويرسل فروعاً الى الاخيلية المصفوية المقدمة والى الجيب الجبهي فاذا دخل الى باطن الخوذة انقسم الى فرع سحائي يتوزع في الام الجافية المجاورة وفرع انفي ينزل الى الانف من ثقب في الصفيحة الغربية

والشرايين الجفنية اثنان علوي وسفلي ينشآن من الشريان العيني مقابل بكرة العضلة المنخرقة العليا ومجيطان الجفنين بقرب حافتها السائبة مكونين قوسين علوي وسفلي واقعين بين المحيطة الجفنية والغضروفين الجفنيين. ويتفهم الجفني العلوي بالفرع الحجاجي للشريان الصدغي

والعيني فموضوعة على الجدار الوحشي للجيب المذكور ويفصلها عن تجويفه الغشاء المبطن
والقسم الخفي يبدأ عندما يخفي الشريان الى الاعلى عند الجانب الانسي للنتو السريري المقدم.
فيثقب الام الجافية المحددة للجيب ويدخل غمداً من العنكبوتية . وهذا القسم من السباتي الباطن
واقع الى الجانب الوحشي من العصب البصري عند الطرف الانسي لفرجة سيلفيوس والعصب
الثالث الى الوحشية منه

واما الفروع المرسله من السباتي الباطن فهي :

من القسم العنقي : لا يخرج فرع

من القسم الحجري : الطبي

من القسم الكهفي : الشرايين المخزنية - السحائي المقدم - العيني

من القسم الخفي : الخفي المقدم - الخفي المتوسط - الاستطراقي الخفي - المشبي المقدم

الشريان الطبي فرعي يدخل التجويف الطبي من ثقب دقيق في القناة السباتية ويتنم

بالفرع الطبي للشريان الفكي الباطن والشريان الابري الحلي

والشرايين المخزنية فروع كثيرة صغيرة ناشئة من السباتي الباطن وهو في الكهف الحبي

وتتوزع في الجسم الخامي وفي عقدة كاسيريوس وفي جدران الجيب الكهفي والجيب الحجري السفلي.

ومن هذه الفروع فرع يذهب الى الام الجافية يقال له السحائي المقدم ويتنم بالسحائي المتوسط

الشريان العيني

منشأ هذا الشريان من السباتي الباطن حال خروجه من الجيب الكهفي الى الجانب الانسي

للتو السريري المقدم. ويدخل الحجاج من الثقب البصري اسفل العصب البصري والى الوحشية

منه ثم يسير الى الاعلى والى الجانب الانسي من العصب المذكور فيصل الى الجدار الانسي للحجاج

ثم يذهب افقياً الى المقدم تحت الحافة السفلى للعضلة المنخرقة العليا ويمر الى الزاوية الانسية للعين

وهناك ينقسم الى فرعين انتهائيين وهما الجهمي والانفي. واما فروع هذا الشريان فكثيرة وقسموها

الى مجموعين حجاجي تتوزع فروع في الحجاج والاجزاء المحيطة به وعيني تذهب فروع الى عضلات

العين والمقلة

اما فروع المجموع الحجاجي فهي: الدمعي وفوق الحجاج والمصفوي الخفي والمصفوي المقدم

والجفنيان والجهمي والانفي

وفروع المجموع العيني العضلية - والهدبية - والشبكي المركزي

الشريان السباتي الباطن

يبدأ هذا الشريان عند انقسام السباتي الاصيلي مقابل الحافة العليا للغضروف الدرقي و يصعد عمودياً الى مقدم التواء المستعرضة للفقرات الثلث العنقية العليا الى ان يصل الى الثقب السباتي الكائن في الجزء الخجري للصدغي فيذهب في القناة السباتية الى المقدم والانسية ثم يصعد قليلاً بجانب السرج التركي وينحني الى الاعلى حذاء التواء السريري المقدم وهناك يثقب الام الجافية وينقسم الى فروع الانتهائية. ويتوزع هذا الشريان في الجزء المقدم من الدماغ وفي العين وتوابعها. وجمعه في البالغين كحجم السباتي الظاهر واكبر منه في الاولاد. وهو كثير التعرج في سيره وفائدة ذلك على ما يُظن مقاومة السيل الدموي وتخفيف سرعته. وباعتبار سيره ومجاورته قد قسموه الى اربعة اقسام عنقي وخجري وكهفي ونخي

فالقسم العنقي سطحي الوضع في اول الامر وواقع حينئذ في المثلث السباتي العلوي على مساحة واحدة مع السباتي الظاهر ولكن الى الجهة الخلفية منه . تغطيه حافة القصية المحمية ثم العضلة الجلدية واللفافة الغائرة والجلد. ثم يمر تحت الغدة التنكفية ويصالبه عند ذلك العصب تحت اللسان والعضلتان ذات البطنين والابرية اللامية والشريانان السباتي الظاهر والمؤخري . ثم اذا ذهب الى الاعلى من ذلك فصلته عن السباتي الظاهر العضلتان الابرية اللسانية والابرية البلعومية والعصب اللساني البلعومي والفرع البلعومي من العصب العاشر وهو الرئوي المعدي . مجاورته من الخلف للمستقيمة المقدمة الكبيرة والعقدة العنقية العليا للسيمباتوي والعصب الخجري العلوي . ومن الوحشية للوريد الوداجي الباطن والعصب الرئوي المعدي . ومن الانسية للبلعوم واللوزة والشريان البلعومي الصاعد

والقسم الخجري يبدأ عند دخول السباتي الباطن في القناة السباتية للجزء الخجري من الصدغي . فيصعد في القناة قليلاً ثم ينحني الى المقدم والانسية ثم يصعد عند خروجه منها ليدخل الى باطن الجحفة . ويكون الشريان في هذه القناة واقعاً في اول الامر الى مقدم الطلبة منفصلاً عنها بصفيحة عظمية رقيقة تكون غر بالية مدة الشباب وكثيراً ما تمتص في الشيخوخة . وتفصله عن الجدار العظمي زائدة من الام الجافية وتحيط به خيوط من الضفيرة السباتية

والقسم الكهفي يبدأ عند خروج الشريان من القناة السباتية . فيصعد اولاً الى التواء السريري الخلفي ثم يمر الى الانسية بجانب جسم العظم الوندي واقعاً على الجدار الوحشي للجيب الكهفي ومجاوراً من الوحشية للعصب السادس ومغطى بالغشاء المبطن للجيب . واما العصب الثالث والرابع

الخلا المثلث الخلفي للعنق

تحدّه من الامام القصية الحلمية ومن الخلف الحافة المقدمة المربعة المنخرقة . قاعدته مكوّنة من الحافة العليا للترقوة ورأسه من قفا الراس . ويقاطع هذا الخلا البطن الخلفي للكنتية اللامية نحو قيراط اعلى الترقوة فيقسمه الى مثلثين غير متساويين مثلث علوي يقال له المُوخري ومثلث سفلي يقال له تحت الترقوة

فالمثلث المُوخري اكبر المثلثين الخلفيين وتحدّه من الامام القصية الحلمية ومن الخلف المربعة المنخرقة ومن الاسفل الكنتية اللامية . وتكوّن ارضه من الاعلى الى الاسفل العضلة الطحالية والرافعة لزاوية اللوح والاخمعتان المتوسطة والسفلى . ويغطيه الجلد واللفافة السطحية والغائرة ومن الاسفل العضلة الجلدية . وتصلبه من الاعلى الفروع الصاعدة من الضفيرة العنقية . والعصب الشوكي الاضافي ينفذ من القصية الحلمية ويذهب في الخلا المذكور عرضاً بانحراف الى الوجه السفلي للمربعة المنخرقة . ومن الاسفل تصلبه الفروع النازلة من الضفيرة العنقية والشريان والوريد العنقيان المستعرضان . ويشاهد ايضاً فيه سلسلة من الغدد الليمفاوية ذاهبة على الحافة الخلفية للقصية الحلمية من التواخلي الى اصل العنق

والمثلث تحت الترقوة اصغر المثلثين الخلفيين يحدّه من الاعلى البطن الخلفي للكنتية اللامية ومن الاسفل الترقوة . قاعدته الى الامام تكونها القصية الحلمية . ويغطيه الجلد واللفافة السطحية واللفافة الغائرة وتصلبه الفروع النازلة من الضفيرة العنقية . واعلى مساواة الترقوة يعني الجزء الثالث من الشريان تحت الترقوة الى الوحشية والاسفل عند الحافة الوحشية للاخمية المقدمة وينحدر على الضلع الاول الى الابط وقد يبلغ علو هذا الشريان فوق الترقوة قيراطاً ونصفاً وقد يمر الى مقدم الاخمية المقدمة او ينقب الياف هذه العضلة وينفذ منها . واما الوريد تحت الترقوة فواقع تحت الترقوة بحيث لا يشاهد في الغالب في هذا الخلا ولكنه يصعد احياناً الى علو الشريان بل قد شوهد نادراً ماراً معه خلف الاخمية المقدمة . والضفيرة العضدية العصبية واقعة اعلى الشريان وقريبة منه . وتقاطع الاوعية فوق اللوح عرضاً الحافة الترقوية لهذا الخلا وتقاطع الاوعية العنقية المستعرضة زاوية العليا . والوريد الوداجي الظاهر ينحدر عمودياً خلف الحافة الخلفية للقصية الحلمية ويصب في الوريد تحت الترقوة وانما قبل وصوله اليه يقبل الاوردة العنقية المستعرضة والاوردة فوق اللوح ووريداً صغيراً آتياً من الراسي . ويشاهد ايضاً في نحو مركز هذا الخلا العصب الصغير الذاهب الى الوريد تحت الترقوة

الى الانسية والاعلى ثم المؤخري الذي يتجه الى الخلف ثم البلعومي الصاعد الذي يذهب الى الاعلى الى الجانب الانسي من السباتي الباطن . واما الاوردة التي تشاهد في هذا المثلث فهي الوداجي الباطن الواقع على الجانب الوحشي من السباتي الاصلي والباطن واوردة تقابل الفروع الشريانية المذكورة آنفاً وهي الوريد الدرقي العلوي والسباتي والوجي والبلعومي الصاعد وحيثاً المؤخري وجميعها يصاحب الشرايين المقابلة لها ويصب في الوداجي الباطن . ويشاهد على مقدم غمد السباتي الاصلي العصب التاسع النازل . واما العصب تحت اللسان الذي العصب النازل فرع منه فيقاطع السباتيين من الاعلى وينعكف حول الشريان المؤخري عند منشئه . وضمن الغد بين الشريان والوريد وخلفها العصب الرئوي المعدي ووراء الغمد العصب السيمباتوي . والى الجانب الوحشي من هذه الوعية يسير العصب الشوكي الاضافي مسافةً ثم يقب القصية الحلية . والى الجانب الانسي من السباتي الباطن اسفل العظم اللامي يشاهد العصب الخنجري العلوي والى الاسفل من ذلك العصب الخنجري الظاهر . ويشاهد ايضاً في الجزء الانسي من هذا المثلث الجزء العلوي من الخجرة والبلعوم

والمثلث تحت الفك واقع تحت جسم الفك تحده من الاعلى الحافة السفلى لجسم الفك والغدة النكفية والتو الحلبي ومن الخلف البطن الخلفي لذات البطنين والعضلة الابرية اللامية ومن الامام الخط المتوسط للعنق . ويكون ارض هذا الخلاء البطن المقدم لذات البطنين والعضلة الضرسية اللامية واللامية المسانية . ويغطي الجلد واللفافة السطحية والعضلة الجلدية واللفافة الغائرة التي يتفرع بينها فروع من العصب الوجي وخيوط صاعدة من العصب العنقي السطحي . ويتضمن هذا الخلاء في جزئه المقدم الغدة تحت الفك التي يغوص فيها الشريان والوريد الوجهيان وفروعها الغدية وتمت هذه الغدة على الوجه الظاهر للعضلة الضرسية اللامية الشريان تحت الذقن والشريان والعصب الضرسيان اللاميان . واما الجزء الخلفي لهذا الخلاء فيفصله عن الجزء المقدم الرباط الابرية الفكي وهو يتضمن الشريان السباتي الظاهر صاعداً غائراً في الغدة النكفية . والشريان المذكور واقع هنا الى مقدم السباتي الباطن واقرب منه الى السطحية ويصاليه العصب الوجي . ويرسل مدة سيره في هذا الخلاء الفرع الاذني الخلفي والصدغي والفكي الباطن . واما السباتي الباطن والوداجي الباطن والعصب الرئوي المعدي ففي هذا الخلاء ايضاً لانها واقعة الى الجهة الباطنة من السباتي الظاهر وتفصلها عنه العضلتان الابرية اللسانية والابرية البلعومية والعصب اللساني البلعومي

الحلمية. واما قاعدته فالى الاعلى ومكوّنة من الحافة السفلى لجسم الفك وخط ممتد من زاوية الذك الى التتو الحلمي ورأسه في الاسفل يكوّنه النقص. وهذا الخلاء يغطيه الجلد واللفافة السطحية والعضلة الجلدية واللفافة الغائرة وتصل به فروع من العصب الوجهي والاعصاب العنقية السطحية. وينقسم الى ثلاثة مثلثات صغيرة بواسطة العضلة ذات البطنين من الاعلى والبطن المقدم للكنتية اللامية من الاسفل تُسمى هذه المثلثات الثلاثة من الاسفل الى الاعلى المثلث السباتي السفلي والمثلث السباتي العلوي والمثلث تحت الفك

فالمثلث السباتي السفلي يحدّه من الامام الخط المتوسط للعنق ومن الخلف الحافة المقدمة للقصبة الحلمية ومن الاعلى البطن المقدم للكنتية اللامية. ويغطيه الجلد واللفافة السطحية والعضلة الجلدية واللفافة الغائرة ويشاهد الفرع النازل للعصب العنقي السطحي متفرعاً بينها. وتحت هذه الابنية القصبة اللامية والقصبة الدرقية اللتان مع الحافة المقدمة للقصبة الحلمية تغطيان الجزء السفلي للسباتي الاصلي. ويحيط هذا الشريان والوريد الوداجي الباطن والعصب الرئوي المعدي غمد واحد فيكون اذ ذاك الوريد واقعاً الى الجانب الوحشي من الشريان في الناحية اليمنى للعنق وتجاوزاً اياه او مصالباً له في الناحية اليسرى واما موقع العصب فبين الشريان والوريد وخلفها. والى مقدم الغمد بعض فريعات نازلة من عروة الاتصال بين العصب التاسع النازل والتاسع الاستطراقي. ووراء الغمد الشريان الدرقي السفلي والعصب الخنجري الرابع والعصب السيمباني. والى الانسية منه القصبة والغدة والغدة الدرقية البارزة في الاناث اكثر منها في الذكور والجزء السفلي من الحجر. وقد يربط السباتي الاصلي في الجزء العلوي من هذا المثلث تحت العضلة الكنتية اللامية

والمثلث السباتي العلوي يحدّه من الخلف القصبة الحلمية ومن الاسفل البطن المقدم للكنتية اللامية ومن الاعلى البطن الخلفي لذات البطنين. ويكوّن ارضه بعض الدرقية اللامية واللامية اللسانية والعاصرتان للبلعوم السفلي والوسطي. وتغطيه الاجزاء التي تغطي المثلث السفلي الا انه تتفرع بينها فروع من العصب الوجهي والاعصاب العنقية السطحية. ويتضمن هذا الخلاء الجزء العلوي من السباتي الاصلي الذي ينقسم مقابل الحافة العليا للغضروف الدرقي الى سباتي ظاهر وسباتي باطن الا ان هذه الاوعية تتجه عن النظر الحافة المقدمة للقصبة الحلمية التي تتجاوزها. والسباتيان الظاهر والباطن واقعان الواحد بجانب الاخر وانما الظاهر منها اقرب الى الجهة المقدمة. ويشاهد ايضاً في هذا المثلث بعض فروع السباتي الظاهري اولاً الدرقي العلوي الذي يتجه الى الانسية والاسفل ثم اللساني الذي يذهب الى الانسية ثم الوجهي الذي يذهب

الانسي من الحافة السخية للحنك الصلب وتوزع في اللثة والغشاء المخاطي للحنك والغدد الحنكية. ويرسل فروعاً وهو في القناة الحنكية الخلفية تنزل في القنوات الحنكية الاضافية وتوزع في المهابة متممةً بالشريان اللهوي الصاعد. وينتهي من المقدم بوعاء صغير يصعد في القناة الحنكية المقدمة ويتمم بشريان الفاصل الانفي وهو فرع من الشريان الوتدي الحنكي وفرع فديان يمر الى الخلف في قناة فديان مع عصب فديان. ويتوزع في الجزء العلوي من البلعوم وبوق اوستاكيوس ويرسل فروعاً الى الطبلة والفرع الجناحي الحنكي فريع صغير جداً يمر الى الخلف في القناة الجناحية الحنكية مع العصب البلعومي ويتوزع في الجزء العلوي من البلعوم وبوق اوستاكيوس والفرع الانفي ويقال له الوتدي الحنكي ايضاً يمر من الثقب الوتدي الحنكي الى تجويف الانف عند الجهة الخلفية للصاخ العلوي وينقسم الى فرعين احدهما انسي وهو شريان الفاصل الانفي يسير بانحراف الى الاسفل والمقدم على الفاصل المذكور ويتوزع في الغشاء المخاطي متمماً بالفرع الصاعد من الحنكي النازل والفروع الوحشية تتوزع في الغشاء المخاطي المبطن لجدار الانف والكف والاخلية المصفوية والوتدية

التشريح الجراحي لمثلثات العنق

اذا اريد النظر الى الشرايين العظيمة الكائنة في العنق وفروعها ومجاوراتها من حيث العمليات الجراحية على وجه كلي بالنسبة الى الجهات المختلفة من العنق الواقعة هي فيها يُسند الرأس بان توضع قرمة تحت قفء العنق ويحوّل الوجه الى الجانب المخالف للجانب الذي يراد النظر اليه. فيشاهد حينئذ ان شكل جانب العنق يقرب من المستطيل تحده من الاعلى الحافة السفلي لجسم الفك وخط وهي ممتد من زاوية الفك الى التواحلي ومن الاسفل الحافة العليا البارزة للترقوة ومن المقدم الخط المتوسط في العنق ومن الخلف الحافة المقدمة للعضلة المربعة المنحرفة. وينقسم هذا الخلاء الى مثلثين كبيرين بواسطة العضلة القصية الحليمية التي تسير بانحراف على العنق من القص والترقوة في الاسفل الى التواحلي في الاعلى. فيقال للمثلث الواقع الى مقدم هذه العضلة المثلث المقدم وللواقع خلفها المثلث الخلفي

الخلاء المثلث المقدم للعنق

يحد هذا المثلث من الامام خط ممتد من الذقن الى القص ومن الخلف الحافة المقدمة للقصية

فالفرعان الصدغيان الغائران اثنان هما مقدم وخلفي يتوزع احدهما في الجهة المقدمة من الحفرة الصدغية والثاني في جهتها الخلفية. فيصعدان بين العضلة الصدغية والسحاق ويتوزعان في العضلة المذكورة ويتفهماً بياقي الشرايين الصدغية. والفرع المقدم يرسل فريعات صغيرة تنقب العظم الوجني وتنفم بالدمعي

والفروع الجناحية غير منتظمة العدد والمنشأ تتوزع في العضلتين الجناحيتين والفرع المضغي فريع يذهب الى الظاهر اعلى الشرم السيني للفك السفلي ويتوزع في الوجه الباطن للعضلة المضغية ثم يتفم بالفروع المضغية للشريان الوجهي والشريان الوجهي المستعرض والفرع الفسي فريع يذهب منحرفاً الى المقدم بين الجناحية الانسية وفرع الفك ويتوزع في الوجه الظاهر للعضلة المبوقة متفهماً بفروع من الشريان الوجهي

فروع الجزء الثالث من الشريان الفكي الباطن وهو الجزء الوتدي الفكي

السنخي - تحت الحجاج - الحنكي الخافي - فدان - الجناحي الحنكي - الانفي


فالسنخي ناشئ من فرع مشترك بينه وبين الشريان تحت الحجاج. والفرع المذكور ينشأ من الفكي الباطن عند دخوله الى الحفرة الوتدية الفكية. واما السنخي فانه ينزل على حدة الفك العلوي وينقسم الى فروع كثيرة اكبرها السني العلوي الذي تدخل فريعاته من الثقوب الكائنة في التوا السنخي وتذهب الى الاضراس. وبعض فريعاته تنفذ من العظم وتتوزع في الغشاء المبطن للكف وبعضها يسير الى المقدم ويذهب الى اللثة

والفرع تحت الحجاج ينشأ من الاصل المشترك بينه وبين سابقه ويدخل القناة تحت الحجاج ويخرج من ثقب تحت الحجاج الى الوجه تحت الرافعة للشفة العليا. غير انه وهو في القناة المذكورة يرسل فروعاً تصعد الى الحجاج فتتوزع في المستقيمة السفلى والمنحرفة السفلى والغدة الدمعية. ويرسل فروعاً اخر تنزل في اقبية في العظم وتتوزع في الغشاء المخاطي المبطن للكف وبعضها يذهب الى الاسنان المقدمة للفك العلوي. واما في الوجه فانه يرسل فروعاً الى الكيس الدمعي والزاوية الانسية للحجاج تنفم بالشريان الوجهي والفرع الانفي للشريان العيني ويرسل فروعاً اخر تنزل تحت الرافعة للشفة العليا وتنفم بالفروع الآتية من الشريان الوجهي المستعرض والفرع الفسي

والفروع الاربعة الباقية منشأها جميعها من الفكي الباطن وهو في الحفرة الوتدية الفكية وهي: الحنكي الخافي ويقال له النازل ايضاً لانه ينزل في القناة الحنكية الخلفية مع الفروع الحنكية الخلفية الناشئة من عقدة ميكل فاذا نفذ من الثقب الحنكي الخلفي تقدم في ميزاب على الجانب

الجافية والحوذة. وفروع هذا الشريان تذهب الى الام الجافية وإنما أكثرها الى العظام وتنفم بشرايين الجانب المقابل وبالسمائين المقدم والخلفي.

شكل ١٦٩



وتذهب منه فروع لعقدة العصب الخامس والعصب الوجي وللحجاج والحفرة الصدغية حيث تنفم بفروع الشرايين الصدغية الغائرة

والسمائي الصغير ينشأ أحياناً من سابقه. يدخل الججمة من الثقب البيضي ويتوزع في عقدة كاسيربوس والام الجافية. وإنما قبل دخوله الى الججمة يرسل فرعاً للحفرة الانفية واللاهة

والسني السفلي ينحدر مع العصب السني الى الثقب الواقع في الوجه الباطن لفرع الفك فيذهب ان في القناة السنية في جوهر العظم الى ان يصلا مقابل الضرس ذي الحدين فينقسم الشريان الى فرعين احدهما يدوم في سيره الى المقدم تحت الاسنان القواطع الى ان يصل الى الارتناق الذقني فينقسم برفيقه من الجانب الاخر. والفرع الاخر ويقال له الذقني يخرج مع العصب من الثقب الذقني ويتوزع في الابنية التي تتألف منها الذقن وينفم بالشريان تحت الذقن والشفوي السفلي والاكليبي السفلي. ويرسل هذا الشريان اي السني السفلي عند دخوله في الثقب فرعاً يقال له الضرسي اللامي يذهب في الميزاب الضرسي اللامي ويتوزع في الوجه السفلي للعضلة الضرسية اللامية ويرسل مدة سيره في جوهر العظم فريعات تغيب في جوهر العظم وفروعاً للاسنان تدخل من الثقوب التي في اصولها وتصعد وتتوزع في لب الاسنان

فروع الجزء الثاني من الشريان الفكي الباطن وهو الجزء الجناحي

الصدغيان الغائران - الجناحية - المضغي - الفكي

تنوزع هذه الفروع بحسب اسمائها في عضلات الجهة الفكية

شكل ١٦٩ الشريان الفكي الباطن ١ الشريان السباتي الظاهر ٢ و٤ فرعاه الانتهاءان ٤ الجزء الفكي للشريان الفكي الباطن والسهم حده ٥ جزؤه الثاني وهو الجناحي ومجده السهمان ٦ جزؤه الثالث وهو الوددي الفكي . اما فروع الجزء الفكي فهي ٧ الطلبي ٨ السمائي المتوسط وهو الكبير ٩ السمائي الصغير ١٠ السني السفلي وجميعها ينفذ من ثنوب عظيمة. وفروع الجزء الثاني وهو الجناحي جميعها عضلية تنوزع فتوزع الصاعدة في العضلة الصدغية والنازلة في الجناحيين والمضغية والمبوقة. وفروع الجزء الثالث وهو الوددي الفكي هي ١١ السني وهو السني العلوي ١٢ الفرع تحت الحجاج ١٣ الحنكي الخلفي ١٤ الوددي الحنكي وهو الانفي ١٥ الجناحي الحنكي ١٦ فرع فديان * انعكاف الجزء الثالث نحو الباطن ليدخل الحفرة الوددية الفكية . وجميع فروع هذا الجزء ينفذ من ثنوب عظيمة

الشريان الفكي الباطن

هو اعظم الفرعين الانتهائيين للسباني الظاهر وينشأ منه على زاوية قائمة سائراً الى الوجه الباطن لعنق التتوالقي من الفك السفلي فيتوزع في الابنية الغائرة للوجه. وهو غائص عند منشئه في جوهر الغدة النكفية واقعاً على خط مساوٍ للطرف السفلي من فص الاذن. ويُقسم سيره الى ثلاثة اجزاء فكي وجناحي ووتدي فكي

ففي الجزء الاول من سيره وهو الفكي يرافقياً الى المقدم والباطن بين فرع الفك والرباط الجانبي الانسي فيكون موقع الشريان هنا موازياً للعصب الاذني الصدغي مقاطعاً للعصب السني السفلي وموضوعاً تحت الجزء الضيق للعضلة الجناحية الوحشية وفي جزئه الثاني وهو الجناحي يصعد بانحراف الى الامام والاعلى على الوجه الظاهر للجناحية الوحشية مغطى بفرع الفك السفلي والجزء السفلي للعضلة الصدغية وفي جزئه الثالث وهو الوتدي الفكي يقترب من الفك العلوي ويدخل الحفرة الوتدية الفكية بين الزائدين اللتين تنشأ بهما الجناحية الوحشية وهناك يجاور عقدة ميكل ويرسل فروعهُ الانتهائية

وفروع هذا الشريان تقسم الى ثلاثة مجاميع تبعاً لاجزائه الثلاثة

فروع الجزء الاول من الشريان الفكي الباطن وهو الجزء الفكي

الطبي - السحائي المتوسط - السحائي الصغير - السني السفلي

فالفرع الطبي يذهب الى الاعلى خلف مفصل الفك السفلي ويدخل الطلبة من فرجة كلاسير يوس ويرسل فروعاً للعضلة الراحية للطلبة ويتوزع في الغشاء الطبي متفهماً بالشريان الاربي الحلي وشريان فديان

والسحائي المتوسط اكبر الفروع التي تذهب الى الام الجافية. منشأه من الفكي الباطن بين الرباط الجانبي الانسي وعنق الفك ويصعد عمودياً الى الثقب الشوكي في التتوالقي للشوكي للعظم الوتدي فاذا دخل الى باطن الخوذة انقسم الى فرعين مقدم وخلفي. فالمتقدم وهو اكبرها يقطع الجناح العظيم للوتدي ويصل الى الميزاب الواقع عند الزاوية المقدمة السفلي للعظم الجداري ثم ينقسم الى فروع تفرق بين الام الجافية والوجه الباطن للخوذة فيذهب بعضها الى الاعلى على العظم الجداري الى ان يصل الى القمة وبعضها الى الخلف الى العظم المؤخري. واما الفرع الخلفي فيقطع الجزء القشري الصدغي وينقسم على الوجه الباطن للعظم الجداري الى فروع تذهب الى الجزء الخلفي من الام

مستقراً على العاصرة العليا ويرسل فروعاً الى اللهاة وبوق اوستاكيوس واللوزة والفروع السحائية عديدة صغيرة تمر من ثقب في قاعدة الجمجمة وتوزع في الام الجافية. منها السحائي الخلفي الذي ينفذ الى الباطن من الثقب المهزق الخلفي

الشريان الصدغي

هو اصغر الفرعين الانتهائين للسبائي الظاهر ويظهر من اتجاهه كأنه امتداد الشريان المذكور. مبدؤه في جوهر الغدة النكفية في الخلاء الواقع بين عنق التوالقسي للفك السفلي والفناة السمعية الظاهرة. فاذا قاطع اصل القوس الزوجي صعد نحو قيراطين تحت الجلد وانقسم الى فرعين مقدم وخلفي

فالصدغي المقدم يعني الى المقدم فوق الجبهة ويتوزع في الجلد والعضلات والسحاق الواقعة في هذه الجهة ويتفيم بالشريان فوق الحجاج والجبهي. اتجاهه فريعاته من الامام الى الخلف والصدغي الخلفي اعظم من المقدم يعني الى الاعلى والخلف بجانب الراس واقعاً اعلى اللفافة الصدغية ومتفهماً برفيقه من الجانب الاخر والاذني الخلفي والمؤخري

وتغطي الشريان الصدغي عند مقاطعه لاصل القوس الزوجي العضلة الاذنية المقدمة ولفافة كثيفة مرسله من الغدة النكفية. ويصالبه غالباً ويريد او اثنان وتصاحبه فروع من العصب الوجهي والعصب الصدغي الاذني. ويرسل فروعاً صغيرة الى الغدة النكفية ومنفصل الفك والعضلة المضغية. واما فروعه الكبيرة فهي: الوجهي المستعرض والصدغي المتوسط والاذني المقدم فالوجهي المستعرض ينشأ من الشريان الصدغي قبل خروجه من الغدة النكفية ويذهب الى المقدم في جوهرها ثم يقاطع الوجه عرضاً بين قناة سينيو والحافة السفلى للقوس الزوجي وينقسم على جانب الوجه الى فروع كثيرة تتوزع في الغدة النكفية والعضلة المضغية والجلد متفهماً بالشريان الوجهي والشريان تحت الحجاج. ويستقر هذا الوعاء على العضلة المضغية ويصاحبه فرع او اثنان من العصب الوجهي

والصدغي المتوسط منشأه اعلى القوس الزوجي. وينقب اللفافة الصدغية ويتوزع في العضلة الصدغية متفهماً بالفروع الصدغية الغائرة للفكي الباطن. ويرسل احياناً فرعاً حجاً-جياً يتوزع في المحيطة الجفنية ويتفيم بالفروع الدمعية والجنسية للشريان العيني والفروع الاذنية المقدمة تتوزع في الجزء المقدم للاذن الظاهرة وبعض الفناة الظاهرة متفهماً بفروع من الشريان الاذني الخلفي

بالفكري والفرع الغائر العنقي للشريان بين الاضلاع العلوي . وتم بواسطة هذا التفهم بين الاوعية المذكورة على نوع خاص الدورة الثانوية التي تقوم مقام الدورة الاصلية عتیب ربط الشريان السباتي او تحت الترقوة

وما عدا ذلك يرسل الشريان المؤخري فريعات لفناء الخوذة . وهي متعرجة السير وواقعة بين الجلد والعضلة المؤخرية الجبهية فتتوزع في الاجزاء المجاورة وتنفم بثلمها من الجانب الاخر والاذني الخلفي والصدغي

الشريان الاذني الخلفي

هو شريان صغير ناشئ من السباتي الظاهر اعلى العضلة ذات البطنين والابرية اللامية مقابل طرف التتوالبري . ويصعد تحت الغدة النكفية الى التلم الواقع بين غضروف الاذن والتتوالخلي فاذا تجاوزه انقسم الى فرعين مقدم يمر الى الامام ويتفم بالقسم الخلفي للصدغي وخلفي يتواصل بالشريان المؤخري . الا أنه قبل وصول الشريان المذكور الى التتوالخلي يصل اليه العصب السابع من الظاهر ويمر تحته الشوكي الاضافي وهو العصب الحادي عشر فروعه اثنان ما عدا فريعات صغيرة يرسلها لذات البطنين والابرية اللامية والنصية الحلمية والغدة النكفية . وهما الابري الحلي والاذني

فالابري الحلي يدخل من الثقب الابري الحلي ويتوزع في الطلبة والاخلية الحلمية والفنوات الهلالية . والفرع الاذني يتوزع في الجزء الخلفي لغضروف الاذن

الشريان البلعومي الصاعد

هو اصغر فروع السباتي الظاهر طويل دقيق غائر الوضع في العنق تحت باقي الفروع وتحت العضلة الابرية البلعومية . منشأه من الجزء الخلفي للسباتي الظاهر عند مبدأه ويصعد في العنق بين السباتي الباطن وجانب البلعوم مستقراً على الراسية المقدمة المستقيمة الكبيرة الى الوجه السفلي لقاعدة الجمجمة . تنقسم فروعه الى ثلاثة اقسام ظاهرة وبلعومية وسحائية فالفروع الظاهرة فروع كثيرة صغيرة تتوزع في العضلتين المستقيمتين المتدمتين وفي العصب السيمباتوي وتحت اللسان والرئوي المعدي وفي الغدد الليمفاوية العنقية وتنفم بالشريان الصاعد العنقي

والفروع البلعومية ثلاثة او اربعة . يصعد منها اثنان ويتوزعان في العاصرتين الوسطى والسفلى والابرية البلعومية وفي الغشاء المخاطي المبطن لها . واكبر الفروع البلعومية يذهب الى الانسية

والأكليبي العلوي أكبر من سابقه وأكثر تعرجاً. يسير على حافة الشفة العليا بين الغشاء المخاطي والمحيطة الشفوية ويتنم برفيقه من الجانب الآخر. ويتوزع في الشفة العليا ويرسل فرعاً للفواصل الأنفي وفرعاً آخر لجناح الأنف والآنفي الجانبي ينشأ من الوجهي وهو صاعد بجانب الأنف ويتوزع في جناح الأنف وظهره متمماً برفيقه والفرع الأنفي للشريان العيني وشريان الفواصل وتحت الحجاج والزواوي نهاية جذع الشريان الوجهي. يصعد إلى الزاوية الأنسية للحجاج مصحوباً بوريد كبير يقال له الزاوي أيضاً ويرسل فروعاً إلى الخد تنم بشريان تحت الحجاج وفروعاً آخر للكيس الدمعي والمحيطة الجفنية تنم بالفرع الأنفي للشريان العيني

الشريان المؤخري

منشأه من الجزء الخلفي للسباتي الظاهر مقابل منشأ الشريان الوجهي بقرب المحافة السفلى لذات البطنين. ويغطيه عند منشأه البطن الخلفي لذات البطنين والأبرية اللامية وبعض الغدة النكفية ويبلغ عليه من الخلف إلى المقدم عصب تحت اللسان. فاذا سار إلى الأعلى قاطع السباتي الباطن والوداجي الباطن والعصب الرئوي المعدي والعصب الشوكي الإضافي. ثم يصعد إلى الخلاء بين التو المستعرض للحاملة والتو الحلمي للصدغي ويمر في الميزاب الواقع في الجهة الخلفية للتو الحلمي مغطياً حينئذٍ بالقصبة الحلمية والطحالية وذات البطنين والقفوية الحلمية. ثم يصعد عمودياً ويتقب المربعة المنخرقة ويسير سيراً متعرجاً إلى قمة الرأس حيث ينقسم إلى فروع كثيرة

فروعه: العضلية - الأذني - السحائي السفلي - العنقي الرئيسي

فالفرع العضلية تتوزع في ذات البطنين والأبرية اللامية والقصبة الحلمية والطحالية والقفوية الحلمية. والفرع الذي يذهب إلى القصبة الحلمية كبير الحجم والفرع الأذني يذهب إلى الجزء الخلفي للأذن الظاهرة والسحائي السفلي يصعد إلى الأعلى محاذياً للوريد الوداجي الباطن ويدخل إلى باطن الجمجمة من الثقب المهزق الخلفي ويتوزع في الأم الجافية في الحفرة الخلفية والعنقي الرئيسي فرع كبير ينزل على الجانب الخلفي للعنق وينقسم إلى فرعين سطحي وغائر. فالسطحي يذهب تحت الطحالية ويرسل فروعاً تثقب هذه العضلة وتتوزع في المربعة المنخرقة وتنم بالشريان العنقي السطحي. والغائر يمر بين المضاعفة والشوكية النصف العنقية ويتنم

فالفروع العنقية هي اللهوي السفلي او الصاعد واللوزي وتحت الفك وتحت الذقن. والفروع الوجهية العضلية والشفوي السفلي والاكليبي السفلي والاكليبي العلوي والانفي الجانبي والزوي

فاللهوي السفلي او الصاعد سار الى الاعلى بين الابرية اللسانية والابرية البلعومية الى الجانب الوحشي من البلعوم ويرسل فروعاً الى هاتين العضلتين واللوزة وقناة اوستاكيوس ثم ينقسم بقرب الرافعة للهامة الى فرعين. احدهما يتبع سير الشادة للهامة ويتفرق في الهامة والغدد اللهوية. والاخر يمر الى اللوزة ويتفرق فيها متفماً بالشريان اللوزي

والفرع اللوزي يمر الى الاعلى على جانب البلعوم ثم يتقبب العاصرة العليا ويتفرع في جوهر اللوزة واصل اللسان

والفرع تحت الفك مؤلف من ثلاثة او اربعة فروع كبيرة تتفرق في الغدة تحت الفك. وبعضها يتجاوز الى العضلات المجاورة والغدد الليمفاوية والجلد

والفرع تحت الذقن اعظم الفروع العنقية ينشأ من الشريان الوجهي عند خروجه من الغدة تحت الفك ويسير الى المقدم على العضلة الضرسية الالامية اسفل جسم الفك وتحت ذات البطنين ثم يرسل فروعاً الى العضلات المرتبطة بالفك متفماً بالشريان تحت اللسان. فاذا وصل الى الارتفاع الذقني انقسم الى فرع سطحي وفرع غائر. فالاول يدور حول الذقن ويمر بين الجلد والخافضة للشفة السفلى فيرسل فروعاً اليهما ويتفم بالشريان الشفوي السفلي. والفرع الغائر يمر بين العضلة المذكورة والعظم فيرسل فروعاً الى الشفة ويتفم بالشريان الشفوي السفلي والشريان الذقني

والفروع العضلية تتفرق في الجناحية الانسية والمضغية والمبوقة والشفوي السفلي يمر تحت الخافضة لزاوية الفم ليتفرق في عضلات وجلد الشفة السفلى متفماً بالاكليبي السفلي والفرع تحت الذقن من الشريان الوجهي وبالفرع الذقني من الشريان السني السفلي

والاكليبي السفلي ناشئ من الشريان الوجهي بقرب زاوية الفم. يذهب الى الاعلى والباطن تحت الخافضة لزاوية الفم ثم يتقبب العضلة المحيطة الشفوية ويسير سيراً متعرجاً على حافة الشفة السفلى بين العضلة المذكورة والغشاء المخاطي متفماً برفيقه من الجانب الاخر. وهذا الشريان يتوزع في الغدد الشفوية والغشاء المخاطي وعضلات الشفة السفلى ويتفم بالشفوي السفلي والفرع الذقني للسني السفلي

برقيقه من الجانب الآخر

والظهري اللساني ناشئ من الشريان اللساني تحت العضلة اللامية اللسانية يصعد الى ظهر اللسان ويتفرق في غشائه المخاطي واللوزة واللهاة ولسان المزمار ويتفهم برقيقه من الجانب الآخر

وتحت اللسان فرع من شعبي الشريان اللساني ينشأ عند الحافة المقدمة للامية اللسانية ويسير الى المقدم والوحشية تحت الضرسية اللامية الى الغدة تحت اللسان فيتفرق في جوهرها ويرسل فروعاً للضرسية اللامية والعضلات المجاورة والغشاء المخاطي للحم واللثة والصفدي امتداد الشريان اللساني يسير على الوجه السفلي للسان مستقراً على العضلة اللسانية ولا يغطيه الا الغشاء المخاطي للحم . وهو واقع الى الجانب الوحشي من الذقنية اللامية اللسانية ويصاحبه العصب الذوقى فاذا وصل الى طرف اللسان تفهم برقيقه من الجانب الآخر

الشريان الوجهي

منشأه اعلى الشريان اللساني ويصعد بانحراف الى المقدم والاعلى تحت جسم الفك السفلي الى الغدة تحت الفك فيغوص فيها ويقال لهذا الجزء من سيره الجزء العنقي . ثم ينحني الى الاعلى على جسم الفك عند الزاوية المقدمة السفلى للعضلة المضغية ويصعد الى المقدم والاعلى ويقاطع الحنك الى ان يصل الى زاوية الفم ثم يمر بجانب الانف وينتهي عند الزاوية الانسية للعين فيقال له عند ذلك الشريان الزاوي . وهذا الوعاء في العنق والوجه كثير التعرج لموافقة حركات البلعوم في الازرداد وحركات الفك والشفتين والوجه . مجاورته في العنق منشأه سطحي لا يغطيه الا الجلد والعضلة الجذبية واللحافة ثم يمر تحت ذات البطنين والابرية اللامية والغدة تحت الفك . وفي الوجه هو سطحي مدة سيره على جسم الفك السفلي لا تغطيه الا العضلة الجذبية تجس هناك ضرباته واضحا ويمكن ضغطه على العظم بكل سهولة . واما سيره في الوجه فتحت الجلد ودهن الحنك وعند زاوية الفم تغطيه العضلة الجذبية والزوجيتان . ويستقر على المبوقة والرافعة لزاوية الفم والرافعة للشفة العليا ولجناح الانف . ويصاحبه في جميع سيره الوريد الوجهي الا انه ليس متعرجا كما لشريان وفي الوجه مبتعد عنه . وتصلبه فروع العصب الوجهي واما العصب تحت الحجاج فواقع تحته

فروعه . تنقسم فروع الشريان الوجهي الى قسمين . الناشئة منه تحت الفك ويقال لها العنقية والناشئة منه في الوجه ويقال لها الوجهية

يتفرع في العضلات المرتبطة بهذا العظم ثم يكون قوساً يتفهمه مع الفرع المقابل له من الجانب الآخر

والفرع السطحي النازل (وهو القضي الحلقي) ينحدر الى الاسفل والوحشية مقاطعاً لغدد السباتي الاصيلي فيتفرق في القصبة الحلمية والعضلات المجاورة والجلد. ويجب ذكر موقع هذا الفرع في ربط السباتي الاصيلي

والخنجري العلوي اكبر من سابقه يصاحب العصب الخنجري العلوي تحت العضلة الدرقية اللامية ثم يثقب الغشاء الدرقي اللامي ويتفرق في العضلات والغشاء المخاطي والغدد التي للخنجرة واللسان المزمار ثم يتفهم مع رفيقه من الجانب الآخر والحلقي الدرقي (هو الخنجري السفلي) فرع صغير يمر عرضاً على الغشاء الحلقي الدرقي ويتواصل مع الفرع المقابل له من الجانب الآخر. ويجب ذكر موقع هذا الفرع في عملية فتح الخنجرة فان الجراح قد يترك من التزيف الدموي الذي يحصل منه مدة العمل

الشريان اللساني

منشأه من السباتي الظاهر بين الدرقي العلوي والوجهي. سيره بانحراف الى الاعلى والباطن الى ان يصل الى القرن العظيم للعظم اللامي ثم يمر افقياً الى المقدم على خط مواز للقرن المذكور ثم يصعد عمودياً الى الوجه السفلي للسان فاذا وصل الى هناك انعكف الى المقدم وسار في الوجه السفلي للسان الى طرفه فيقال له حينئذ الفرع الضفدعي. مجاورته. جزءه الاول وهو المنحرف سطحي واقع في الخلاء الثلث المذكور انفاً مستقر على العاصرة المتوسطة للبلعوم تغطيه العضلة الجلدية ولقافة العنق. وجزءه الثاني وهو الافقي مستقر على العاصرة المتوسطة ايضاً يغطيه اولاً وتر ذات البطنين والابرية البلعومية ثم اللامية اللسانية التي تفصله عن العصب تحت اللسان. وجزءه الثالث وهو الصاعد واقع بين اللامية اللسانية والذقنية اللامية اللسانية. وجزءه الرابع وهو الانتهائي الذي يقال له الضفدعي سار في الوجه السفلي للسان الى طرفه لا يغطيه الا الغشاء المخاطي مستقر على العضلة اللسانية الى الجانب الوحشي من الذقنية اللامية اللسانية. والعصب تحت اللسان سيره يقرب ان يكون موازياً للشريان اللساني الا انه تتوسط بينهما اللامية اللسانية في الجزء الثاني للشريان المذكور

فروعه: اللامي والظهري اللساني وتحت اللسان والضفدعي

فالفرع اللامي يمر على الحافة العليا للعظم اللامي ويتفرق في العضلات المرتبطة به ويتفهم

مجاورته. من الانسية للعظم اللامي وجدار البلعوم وفرع الفك الذي يفصله عنه جزء من الغدة النكفية. ومن الورا عند منشأه للعصب المخجري العلوي وعند اعلاه تفصله عن السباتي الباطن الابرية اللسانية والابرية البلعومية والعصب اللساني البلعومي وبعض الغدة النكفية


فروعه. ينشأ من الشريان السباتي الظاهر ثمانية فروع تقسم الى اربعة اقسام تسهيلاً للحفظ

وهي :	مقدمة	خلفية	صاعدة	انتهائية
الدرقي العلوي	الموخري	البلعومي الصاعد	الصدغي	الفكي الباطن
اللساني	الاذني الخلفي			
الوجهي				

تنبيه الجدول السابق صحيح في اكثر الاجساد لا في جميعها فانه قد يحصل اختلاف كثير نظراً الى عدد الفروع ومنشأها وسيرها. وانما الاغلب كما ذكر

الشريان الدرقي العلوي

شكل ١٦٨



منشأه من السباتي الظاهر اسفل القرن

العظيم للعظم اللامي. وهو في اول سيره سطحي لا يغطيه الا الجلد واللفافة والعضلة الجلدية واقع في الخلاء المثلث الذي تحده القصبة الحليمية وذات البطنين والكتفية اللامية. ثم يصعد قليلاً الى الاعلى والانسية ويخفي الى الاسفل والامام على شكل قوس متعرج ماراً تحت الكتفية اللامية والقصبة اللامية والقصبة الدرقية فيصل الى الجزء العلوي للغدة الدرقية ويرسل فروعاً كثيرة لوجهها الظاهر ويتفهم مع رفيقه من الجانب الاخر ومع الشريان الدرقي السفلي. وما عدا الفروع الناشئة منه للعضلات ولجوهر الغدة تنشأ منه

الفروع الآتية : اللامي - الفرع السطحي النازل - المخجري العلوي - الخلفي الدرقي

فالفرع اللامي صغير يسير على الحافة السفلى للعظم اللامي تحت العضلة الدرقية اللامية

شكل ١٦٨ الشرايين السباتية مع فروع السباتي الظاهر ١ السباتي الاصلي ٢ السباتي الظاهر ٣ السباتي الباطن ٤ الثقب السباتي الكائن في التسم المخجري للعظم الصدغي ٥ الشريان الدرقي العلوي ٦ اللساني ٧ الوجهي ٨ الشريان القصي الخلمي وهو في المنن السطحي النازل للدرقي العلوي ٩ الموخري ١٠ الاذني الخلفي ١٢ الفكي الباطن ١٣ الصدغي ١٤ البلعومي الصاعد

وهو واقع هناك في خلاء مثلث تحدّه من الخلف القصبة الحلمية ومن الاعلى البطن الخلفي لذات البطنين ومن الاسفل البطن المقدم للكنتية اللامية. وعند جزئه العلوي المذكور يصالبه الشريان القضي الحلمي والوريد الوجهي واللساني والدرقي العلوي التي تصب في الوداجي الباطن. ويشاهد العصب التاسع النازل منحدرًا على مقدم غده والفروع الاتية الى العصب المذكور من الاعصاب العنقية التي تصالب الغد من الوحشية الى الانسية. وقد يكون احيانًا العصب التاسع النازل داخلًا ضمن الغد. ويصالبه نحو مركزه الوريد الدرقي المتوسط وعند اسفله الوريد الوداجي المقدم. والى الخلف يستقر السباتي الاصلي على الجزء العنقي للعمود الفقري اولاً على العضلة الطويلة العنقية ثم على المستقيمة المقدمة الكبيرة التي يتوسط بينها وبينه العصب السيمباتوي. ويمر وراءه عند جزئه السفلي العصب الخنجري الراجع والشريان الدرقي السفلي. والى الانسية يجاور القصبة والغدة الدرقية الا انه يتوسط بينهما الشريان الدرقي السفلي والعصب الخنجري الراجع. والى الاعلى من ذلك مجاور للخجرة والبلعوم. والى الوحشية موضوع بجواره الوريد الوداجي الباطن والعصب الرئوي المعدي

وفي الجزء السفلي لعنق الوريد الوداجي الباطن متباعد عن السباتي الاصلي في الجانب الايمن. وانما في الجانب الايسر يقترب وكثيراً ما يصالبه في جزئه السفلي. فيجب ذكر هذا الامر المهم في الاعمال الجراحية التي تتعلق بالجزء السفلي للشريان السباتي الاصلي الايسر

الشريان السباتي الظاهر

ينشأ الشريان السباتي الظاهر من السباتي الاصلي وذلك مقابل الحافة العليا للعضروف الدرقي ويصعد منحنيًا قليلاً الى الاعلى والامام ثم يميل الى الخلف الى ان يصل الى الخلاء الواقع بين عنق التواقي للفق السفلي والقناة السمعية الظاهرة حيث ينقسم الى الشريان الصدغي والشريان الفكي الباطن. وهذا الشريان يصغر حجمه وهو صاعد نظراً الى عدد الفروع الناشئة منه والى حجمها. وفي مبدئه يكون اقرب الى السطحية والى الخط المتوسط من السباتي الباطن واقعاً في الخلاء المثلث الذي تحدّه من الخلف العضلة القصبة الحلمية ومن الاسفل الكنتية اللامية ومن الاعلى البطن الخلفي لذات البطنين والابرية اللامية. ويغطي الجلد والعضلة الجلدية واللحافة الغائرة والحافة المقدمة للقصبة الحلمية ويصالبه اولاً العصب تحت اللسان والوريد اللساني والوريد الوجهي ثم تصالبه ذات البطنين والابرية اللامية. ثم يدخل في جوهر الغدة النكفية حيث يكون واقعاً تحت العصب الوجهي ومجتمع الوريد الصدغي والوريد الفكي الباطن.

الشريانان السباتيان الاصيليان ويقال لهما المشتركان ايضاً

وضع السباتيين الاصيليين في العنق يقرب ان يكون واحداً ولكنهما يختلفان في الوضع والمجاورة عند منشأهما . فالسباتي الايمن منشأه من الشريان اللا اسم له خلف المفصل القصي الترقوي واما الايسر فينشأ من الجزء العلوي للقوس فيكون اطول وأكثر غوراً في الصدر من الايمن . ولذلك نشرح اولاً شرحاً خاصاً بسير ومجاورة ما توسط من السباتي الايسر بين قوس الاورطي والمفصل القصي الترقوي الايسر . فاذا تجاوزا المفصل المذكور صار الوصف شاملاً لاثنيهما يسير السباتي الايسر داخل الصدر منحرفاً الى الوحشية من قوس الاورطي الى اصل العنق . فتصله الى الامام عن القطعة الاولى للقص العضلة القصية اللامية والقصية الدرقية والوريد اللا اسم له الايسر وبقايا الغدة التيموسية . ومن الحلف يستقر على القصبة والمريء والقناة الصدرية . والى الانسية مجاور للشريان اللا اسم له . والى الوحشية للعصب الرئوي المعدي والشريان تحت الترقوة الايسر

واما في العنق فسير السباتيين واحد . فيخرج كل منهما من الجانب الخاص به من العنق وراء المفصل القصي الترقوي ويسير الى الاعلى بانحراف الى ان يصل الى مساواة الحافة العليا للعضروف الدرقي فينقسم الى سباتي ظاهر وسباتي باطن سميًا بذلك لان احدهما يتفرق في الاجزاء الظاهرة للرأس والوجه والاخر في الاجزاء الباطنة للثغرة . ويعرف سير هذا الشريان من الظاهر اذا رسم خط وهي ممتد من الاسفل من الطرف القصي للترقوة الى الاعلى الى نقطة متوسطة بين زاوية الفك والتو الحلمي

يفصل السباتيين الاصيليين في الجزء السفلي للعنق خلاص صغير هو عبارة عن مساحة القصبة . وانما لما كان صعودهما بانحراف الى الوحشية توسط بينهما الجسم الدرقي والحنجرة والبلعوم فتباعدا . واما عند السباتي الاصيلي فنشأه من اللقافة العنقية الغائرة وهو محيط بالشريان المذكور والوريد الوداجي الباطن الواقع الى الوحشية منه والعصب الرئوي المعدي الواقع بينهما وخلفهما . فاذا فتح الغد شوهد لكل منهما غلاف ليفي خاص به

مجاورتهما . هذا الشريان غائر جداً في الجزء السفلي للعنق تغطيه اللقافة السطحية والعضلة الجلدية واللقافة الغائرة والقصبة الحلمية والقصبة اللامية والقصبة الدرقية . وفي الجزء المقابل للعضروف الحلقية تغطيه الكتفية اللامية . وانما في الجزء العلوي من سيره اي عند نهايته فهو اقرب الى السطحية لا يغطيه الا الجلد واللقافة السطحية والعضلة الجلدية واللقافة الغائرة والحافة الانسية للقصبة الحلمية .

فروع قوس الأورطي

يُرسل من قوس الأورطي خمسة فروع اثنان صغيران من الجزء الصاعد وهما الأكليلي الأيمن والأكليلي الأيسر وثلاثة عظيمة من الجزء المستعرض وهي الشريان اللا اسم له والسباتي الأيسر وتحت الترقوة الأيسر

الشريانان الأكليليان

وظيفة هذين الشريانيين حمل الدم الى جوهر القلب وهما اثنان ايمن وايسر. منشأها عند بداية الأورطي اعلى الحافة السائبة للصمامات الهلالية


فالشريان الأكليلي الأيمن قدره نحو ريشة الديك. منشأه اعلى الصمام الهلالي الأيمن بين الشريان الرئوي وزائدة الأذين اليمنى. ويمر الى الامام الى الجانب الأيمن من القلب في الميزاب الواقع بين الأذين اليمنى والبطين الأيمن ثم يعكف حول الحافة اليمنى للقلب ويسير على وجهه الخلفي وينقسم الى فرعين يتفهماً بالاكليلي الأيسر. ويرسل هذا الشريان فروعاً الى البطينين والفاصل والأذين اليمنى والشريان الرئوي

والشريان الأكليلي الأيسر اصغر من سابقه. منشأه اعلى الصمام الهلالي الأيسر واعلى قليلاً من منشأ الأكليلي الأيمن. يمر الى الامام بين الشريان الرئوي وزائدة الأذين اليسرى ثم ينزل بانحراف وينقسم الى فرعين يتفهماً بالاكليلي الأيمن ويرسل هذا الشريان فروعاً الى الأذين اليسرى وزائدتها والى البطينين والشريان الرئوي والى جدران اصل الأورطي الخارج هومنه

الشريان اللا اسم له

هو اعظم الفروع الناشئة من قوس الأورطي. منشأه من بداية الجزء المستعرض امام السباتي الأيسر ويصعد بانحراف الى الحافة العليا للفصل القضي الترقوي الأيمن وهناك ينقسم الى السباتي الأيمن والشريان تحت الترقوة. طوله من قيراط ونصف الى قيراطين. مجاورته من الامام تفصله عن النطقة الاولى من القص العضلة القصية اللامية والقصية الدرقية وبقايا الغدة التيموسية والوريد اللا اسم له الأيسر والوريد الدرقي السفلي الأيمن اللذان يصلان اصله. ومن الخلف يستقر على القصبة التي يصلها بانحراف. ومن جانبه الأيمن الوريد اللا اسم له الأيمن والعصب الرئوي المعدي الأيمن والبلبورا. ومن الجانب الأيسر بقايا الغدة التيموسية ومنشأ الشريان السباتي الأيسر

شكل ١٦٧



الظهرية للخلف. فتكون حافته العليا أسفل الحافة العليا للقص نحو قيراط عادة. مجاورته. وجهه المقدم تغطيه البليورا اليسرى والرئة اليسرى ويصالبه الى اليسار العصب الرئوي المعدي الايسر والعصب الحجابي الايسر والفروع القلبية للسيمبانوني ووجهه الخلفي يستقر على القصبة اعلى تشعبها وعلى الضفيرة القلبية العظيمة والمريء والقناة الصدرية والعصب الحنجري الراجع الايسر. وحافته العليا مجاورة للوريد اللا اسم له الايسر ويرسل منها الشريان اللا اسم له والسباتي الايسر وتحت الترقوة الايسر. ومن حافته السفلى لتشعب الشريان الرئوي وبقايا القناة الشريانية. ويلتف عليه من الامام الى الخلف العصب الحنجري الراجع الايسر وتمت اسفله الشعبة اليسرى من القصبة

والجزء النازل للقوس اتجاهه باستقامة الى الاسفل ويميل على الجانب الايسر لجسم الفقرة الثالثة الظهرية فاذا وصل الى حافته السفلى صار الأورطي الصدري. مجاورته. وجهه المقدم تغطيه البليورا وجذر الرئة اليسرى. ومن الخلف يستقر على الجانب الايسر لجسم الفقرة الظهرية الثالثة. وإلى جانبه اليمين المريء والقناة الصدرية. ومن الجانب الايسر تغطيه البليورا تنبيه. يختلف موقع القوس بحسب حركات التنفس فانه ينحدر اذا انحدر الحجاب في الشبهق ويصعد اذا صعد الحجاب في الزفير

شكل ١٦٧ الأوعية الكبيرة الراقعة عند قاعدة القلب وجذر الرئتين ١ و٢ قوس الأورطي ١ جزءه الصاعد ٢ جزءه المستعرض ٣ الأورطي الصدري ٤ الشريان اللا اسم له ٥ السباتي الاصلي اليمين ٦ السباتيان الظاهر والباطن ٧ الشريان تحت الترقوة اليمين ٨ الشريان الأبطي حدوده الخيطان المستعرضان ٩ الشريان العضدي ١٠ العصب الرئوي المعدي اليمين سائراً بجانب الشريان السباتي الاصلي الى مقدم الشريان تحت الترقوة خلف جذر الرئة اليمين ١١ السباتي الاصلي الايسر وإلى الوحشية منه العصب الرئوي المعدي الايسر الذي يصالب قوس الأورطي ١٢ الشريان تحت الترقوة الايسر الذي في سيره يصير أولاً الأبطي ثم العضدي ١٣ جذع الشريان الرئوي الذي يتصل بتغير قوس الأورطي بواسطة جبل ليفي هو بقية القناة الشريانية ١٤ الشريان الرئوي الايسر ١٥ الرئوي اليمين ١٦ القصبة ١٧ شعبتها اليمين ١٨ اليسرى ١٩ و١٩ الأوردة الرئوية ٢٠ الشرايين الشعبية ٢١ الشرايين بين الاضلاع . واما الفروع التي على مقدم الأورطي الصدري اعلى واسفل رقم ٢ فهي التامورية والمرئية

الجزء العلوي للبطين الايسر ويصعد قليلاً ثم ينحني على شكل قوس للجهة الخلفية الى اليسار وينزل في التجويف الصدري على الجانب الايسر للعمود الفقري ويمر من الفتحة الاورطية التي في الحجاب الحاجز ثم يدخل التجويف البطني وينتهي مقابل الفقرة الرابعة القطنية حيث ينقسم الى الحرقفيين الاصليين . ولذلك يقسم الى ثلاثة اقسام وهي قوس الاورطي والاورطي الصدري والاورطي البطني

قوس الاورطي

يمتد هذا القوس من منشأ الشريان اي من الجزء العلوي للبطين الايسر الى الحافة السفلى لجسم الفقرة الثالثة الظهرية. فيصعد اولاً خلف القص بانحراف الى الاعلى والامام لناحية اليمين مقابل الحافة العليا للغضروف الضلعي الثاني اليمين. ثم يتجه عرضاً من اليمين الى اليسار ومن الامام الى الخلف فيصل الى الجانب الايسر للفقرة الثانية الظهرية. ثم ينزل على الجانب الايسر لجسم الفقرة الثالثة الظهرية فاذا وصل الى حافتها السفلى صار الاورطي الصدري. ولذلك قسموا القوس الى ثلاثة اجزاء صاعد ومستعرض ونازل . واما انحناء القوس فتتدببه متجه الى الاعلى واليمين وتغيره الى الجهة المخالفة

فالجزء الصاعد طوله نحو قيراطين ومنشأه من الجزء العلوي للبطين الايسر الى مقدم الفتحة الاذينية البطينية اليسرى مقابل منتصف القص على خط متنازلاً لاتصاله بالغضروف الضلعي الثالث. يتجه بانحراف الى الاعلى على موازاة محور القلب اي الى اليمين ويصعد الى ما يقابل الحافة العليا للغضروف الضلعي الثاني. وضعة نحو ربع قيراط وراء الوجه الخلفي للقص. وهو اعلى منشئه منتفخ قليلاً من ثلاث جهات تسمى جيوب الاورطي موضوعة فيها الى الوجه الباطن من الشريان الصمامات الهلالية الثلاثة. وهذا الجزء مضمّن في تجويف التامور ومحيطه والشريان الرئوي غشاء مصلي ممتد من الوجه الظاهر للقلب. مجاورته. يغطي منشأ الشريان الرئوي والزائده الاذنية اليمنى ويفصله في الاعلى عن القص التامور ونسج خلوي وبقايا الغدة التيموسية. ومن الخلف يستقر على الاوعية الرئوية اليمنى وعلى جذر الرئة اليمنى. ومن اليمين مجاور للوريد الاجوف العلوي والاذين اليمنى. ومن اليسار للشريان الرئوي

والجزء المستعرض للقوس يبدأ عند المفصل الضلعي القصي الثاني على الجانب الايمن ويمر من اليمين الى اليسار ومن الامام الى الخلف فيصل الى الجانب الايسر من الفقرة الثانية

ويحيط بالشرايين في سيرها غلاف رقيق خلوي ليفي يقال له الغمد مكوّن في الغالب من استطالة اللفائف الغائرة في الاطراف . وفي اعلى النخّذ من انحدار اللفافة المستعرضة البطنية والمحرفية . وفي العنق من اللفافة الغائرة . وفي الاكثر يكون الغمد محيطاً بالاوردة المرافقة للشريان وقد يحيط بعصب ايضاً . وبعض الشرايين كالتي ضمن الجمجمة لا غمد لها . ويوصل الغمد بالشريان نسيج خلوي

وجميع الشرايين العظيمة لها اوعية دموية كبقية اعضاء الجسد يقال لها اوعية الاوعية منشأها من شريان او فرع مبتعد عن نقطة توزيعها . وتفرع الاوعية المذكورة في النسيج الخلوي الذي يوصل الغمد بالشريان ثم تتوزع في الطبقة الظاهرة والمتوسطة وعلى قول البعض في الباطنة ايضاً . وللشرايين اوردة ايضاً تعود بالدم الى الاوردة المرافقة لها . ولها اعصاب ناشئة من السيمبانوني في الاكثر وبعضها من المجموع الدماغي الشوكي

وتنتهي الفروع الشريانية الصغيرة بشبكة من الاوعية منتشرة في كل الانسجة الا النسيج الكهفي في اعضاء التناسل والمشيمة الرحمية . وهي دقيقة جداً تُسمى لذلك بالاعوية

شكل ١٦٦



الشعرية متوسطة الوضع بين الشرايين الانتهاية والاوردة الابتدائية قطرها واحد في كل تشعباتها يقرب من $\frac{1}{3}$ من القطر اصغرها ما كان في الدماغ والغشاء المخاطي المعوي واعظها ما كان في الجلد . وكلما كانت هذه الشبكة خشكة كان الجزء الواقعة هي فيه وعائياً كالرئتين والكبد والطبقة المشيمية في العين . وفي الاكثر يزيد تقاربها او ينقص تبعاً لوظيفة العضو فانه كلما كان كثير العمل احتاج الى مقدار عظيم من الدم فتتقارب في الغدد والاعشمية المخاطية وتتباعد في العظام والاربطة التي عملها قليل بالنسبة الى غيرها وتكاد لا توجد في الاوتار والغضاريف

التي لا تقبل الا تغييراً قليلاً في جوهرها بعد تكوينها . واما جدران هذه الاوعية فمؤلفة من غشاء واحد رقيق شفاف

في الاورطي


هو الجذع الاصلي الذي تنبث منه جميع الشرايين التي تتعلق بالدورة العامة . ينشا من

شكل ١٦٦ تحويل شريان دقيق الى اوعية شعرية . من الدماغ . ١ شريان دقيق ٢ نقطة تحويل الشريان الى وعاء شعري ٣ و٤ وعاء شعري غليظ ٤ و٤ وعاء شعري دقيق . وفي باطن الاوعية المذكورة النوى العضلية

على زاوية منفرجة والتظنية على زاوية قائمة والمنويين على زاوية حادة . وإذا تفرعت الشرايين توصلت بعضها ببعض بواسطة اوعية صغيرة مارة بينها سواء بين الجذوع العظيمة والفروع الصغيرة . ويسمى هذا التواصل بالتفهم . ويكثر التفهم في الدماغ حيث يحتاج الى حرية كاملة في الدورة وفي البطن وحول المفاصل . وهو معتبر عند الجراحين لانهم اذا ربطوا شرياناً دامت الدورة بواسطة تفهم الفروع التي اعلى الربط بالفروع التي اسفله


واما سير الشرايين فيكون غالباً مستقيماً وقد يكون متعرجاً في مواطن معلومة كالشريان الوجهي والشريانين الشفويين لموافقة حركات هذه الاجزاء . وكذلك الشرايين الرحمية لموافقة عظم هذا العضو مدة الحمل والسباتي الباطن والفكري قبل دخولها الى الحنجمة لمعارضة القوة الاندفاعية التي للسيل الدموي

الشرايين كثيرة البناء متينة مرنة اذا قُطعت بقيت على هيئتها الاسطوانية



ولأن كانت فارغة . وهي مؤلفة من ثلاث طبقات باطنة ومتوسطة وظاهرة . فالطبقة الباطنة ارق الطبقات الثلاث ومؤلفة في الغالب من طبقتين . فالباطنة منهما مؤلفة من كريات مغزلية سطحية لها نوى مستديرة او مستطيلة . والثانية غشاء شفاف لالون له لامع فيه ثقب كثيرة رقيق في الشرايين الصغيرة غليظ في الكبيرة . ويفصل هذه الطبقة عن المتوسطة غشاء كثيف

شكل ١٦٥



وقد يكون رقيقاً فيه ثقب كثيرة . والطبقة المتوسطة اعلاظ من سابقتها مكونة من الياف موضوعة عرضاً منها عضلية ومنها مرنة ومن نسيج موصل . وهذه الطبقة غليظة جداً في الشرايين العظيمة لونها اصفر ومرنة جداً وكلما تفرعت الشرايين وصغرت رقت ومال لونها الى الاحمر الى ان تغيب بالكلية . وفي الشرايين الصغيرة لا يوجد من هذه الطبقة الا الياف العضلية . والطبقة الظاهرة ويقال لها الخلوية ايضاً اعلاظ الطبقات الثلاث ومؤلفة من نسيج موصل والياف مرنة . غير انها رقيقة في الشرايين العظيمة غليظة في المتوسطة الحجم . وبعض الشرايين طبقاتها رقيقة جداً بالنسبة الى حجمها وعلى الخصوص ما كان موضوعاً منها ضمن الحنجمة والقناة الشوكية

شكل ١٦٤ كريات سطحية من الطبقة الباطنة للاوعية الدموية a و b من وريد c من شريان مكبر ٢٥٠ قطراً

شكل ١٦٥ الياف عضلية من الطبقة المتوسطة للشريان ١ ليفة من الشريان المابضي ٢ ليفة من احد فروع التصبي المتقدم

قطر نصف خط a نواة اللبقة b ليفة صارت شفافة بواسطة غمسها في الخل . مكبر ٢٥٠ قطراً

الفصل الرابع

في الشرايين

الشرايين اوعية اسطوانية قنوية وظيفتها حمل الدم من بطني القلب الى كل جزء من الجسد خلافاً للمذهب القدماء الذين كانوا يزعمون انها حاكمة للروح الحيواني. فكان جالينوس اول من ابطل هذا المذهب وقال بل هي تحمل الدم ايضاً في الجسد الحي ولأن وجدت خالية منه بعد الموت

فالشريان الرئوي الناشئ من البطين الايمن يحمل الدم الوريدي رأساً الى الرئتين ومن هناك يرجع الدم بواسطة الاوردة الرئوية الى الاذنين اليسري. وتسمى هذه الدورة بالصغرى او الرئوية. والشريان العظيم الناشئ من البطين الايسر وهو الاورطي يحمل دمًا شريانيًا الى جميع الجسد ومن هناك تحمله الاوردة وترجع به الى الجانب الايمن للقلب. وتسمى هذه الدورة بالكبرى او العامة. وتتشعب الشرايين كتشعب الشجرة الى اغصان كثيرة تزيد عددًا وتستدق جرمًا كلما ابتعدت عن الجذع الاصيلي. وهي متوزعة في كل اجزاء الجسد الحيواني الا الشعر والاطفار والبشرة والغضاريف والقرنية وواقعة على الغالب في المواطن المحمية كجهة الانشاء في الاطراف وليس انقسام الشرايين على نوع واحد. فانه تارة ينقسم جذع قصير الى جملة فروع منبثة من نقطة واحدة كما يشاهد في المحور البطني والمحور الدرقي. وتارة تنفرع من الجذع الاصيلي فروع واحد بعد الاخر وهو باق اعظم منها كما يشاهد في شرايين الاطراف. وانما يكون الانقسام عادة زوجياً كما تنقسم الاورطي الى الحرقفيين الاصيليين وانقسام السباتي الى ظاهر وباطن وتتشأ الفروع من الشرايين على زوايا مختلفة كمنشأ الشرايين العليا بين الاضلاع من الاورطي

الاولى والثانية من العصب الاخمصى الانسي . واعصاب المبعدة للخنصر والقابضة الاضافية



شكل ١٦٣



شكل ١٦٢

والخراطينية الثالثة والرابعة والمقربة للابهام والقابضة القصيرة للخنصر والمستعرضة القديمة
وجميع الظهرية بين العظام من العصب الاخمصى الوحشي

شكل ١٦٢ العضلات الظهرية بين العظام ١ العضلة الاولى وهي مبعدة للاصبع الاول عن الخط الوهمي المذكور في المتن نحو
الانسية من الخط المتوسط للجسد ٢ العضلة الثانية المبعدة نحو الوحشية ٣ العضلة الثالثة المبعدة للاصبع الثاني نحو الوحشية
٤ العضلة الرابعة المبعدة للاصبع الثالث نحو الوحشية

شكل ١٦٣ العضلات الاخمصية بين العظام ١ العضلة الاولى المقربة للاصبع الثاني نحو الخط الوهمي المذكور في المتن ومن
الجهة الانسية باعتبار الخط المتوسط للجسد ٢ العضلة الثانية المقربة للاصبع الثالث ٣ العضلة الثالثة المقربة للاصبع الرابع ومن
الانسي

المشطي الثالث والرابع ومن غمد وتر الشظوية الطويلة وتندغم مع الراس الوحشي للقبضة القصيرة للابهام في الجانِب الوحشي لقاعدة السلامية الاولى من الابهام والقبضة القصيرة للخنصر موضوعة على مشطي الخنصر. منشأها من قاعدة المشطي المذكور ومن غمد الشظوية الطويلة. وتندغم وترها في قاعدة السلامية الاولى للخنصر على جانبها الوحشي. مجاورتها. من الظاهر للقاعدة الاخمصية وتر المبعدة للخنصر. ومن الباطن للمشطي الخامس والمستعرضة القدمية حزمة عضلية ضيقة مسطحة ممتدة عرضاً على رؤوس العظام المشطية. منشأها من الوجه السفلي لراس المشطي الخامس ومن الرباط المستعرض المشطي. وتندغم في الوجه الوحشي للسلامية الاولى للابهام وتختلط اليافها بوتر المقربة للابهام. مجاورتها. من وجهها السفلي اي الظاهر لوتر الفوايض الطويلة والقصيرة والعضلات الخراطينية. ومن وجهها العلوي اي الغائر للعضلات بين العظام


العضلات بين العظام

العضلات بين العظام في القدم شبيهة بالتي في اليد وتنقسم الى مجموعتين ظهري واخصي فالعضلات الظهرية بين العظام اربع موضوعة بين العظام المشطية شكلها ريشي مزدوج. منشأ كل واحدة منها براسين من الجانبيين المتجاورين للعظمين المشطيين الواقعة هي بينهما وتندغم وترها بقاعدة السلامية الاولى وبصفاق الباسطة المشتركة. ويمر من الخلاء الزاوي الواقع في الطرف الخلفي لكل عضلة الشريان الثاقب الى ظهر القدم الا العضلة الاولى فانه يمر منها الفرع الاستطراقي من الشريان الظهري للقدم. وتندغم العضلة الاولى بالجانِب الانسي للاصابع الاولى والثلاثة الباقية بالجوانب الوحشية للاصابع الاولى والثانية والثالثة. وجميعها مبعدات للاصابع عن خط وهي ممتد طولاً في مركز الاصبع الاولى

والعضلات الاخمصية بين العظام ثلاث موضوعة تحت العظام المشطية وما بينها. وجميعها عضلات مفردة ترتبط بعظم واحد مشطي. منشأها من القاعدة والجانِب الانسي لجسم المشطي الثالث والرابع والخامس وتندغم في الجانِب الانسي لقاعدة السلاميات الاول وفي صفاق الباسطة المشتركة. وجميع هذه العضلات مقربات للاصابع نحو الخط الوهمي الممتد طولاً في مركز الاصبع الاولى

اعصاب المبعدة للابهام والقبضة القصيرة للاصابع والقبضة القصيرة للابهام والخراطينية

الانسية وتنتهي بوتر يمر الى الامام على الجانب الانسي لاحدى الاصابع ويندغم بقاعدة السلامية



شكل ١٦١



شكل ١٦٠

الثانية لتلك الاصبع

الطبقة الثالثة

القاضة النصيرة للابهام - المفرة للابهام - القاضة القصيرة للخنصر - المستعرضة القدمية

القاضة القصيرة للابهام تنشأ بزائدة وترية مستدقة من الحافة الانسية للعظم المكعب ومن الجزء المجاور له من الاسفيني الوحشي. وتنقسم من المقدم الى جزئين يندغان في الجانب الانسي والجانب الوحشي لقاعدة السلامية الاولى من الابهام. ويتضمن كل وتر منها عظماً سمسبياً. ويحفظ الرأس الانسي لهذه العضلة بالمعدة للابهام والرأس الوحشي بالمقربة له. ويستقر وتر القاضة الطويلة للابهام في ميزاب بينهما. مجاورتها. من الظاهر للمعدة للابهام ولوتر القاضة الطويلة للابهام واللفافة الاخمية. ومن الباطن لوتر الشظوية الطويلة ومشطي الابهام. ومن حافتها الانسية للمعدة للابهام.

والمقربة للابهام عضلة غليظة تمر بانحراف معارضة للندم. منشأها من الاطراف الرسغية

شكل ١٦٠ عضلات الاخص الغائرة ١ وتر القاضة الطويلة للابهام ٢ وتر القاضة الطويلة للاصابع ٣ و٢ القاضة الاضافية ٤ و٤ و٤ و٤ الخراطيبية ٥ وتر من اوتار القاضة القصيرة للاصابع ٦ القاضة النصيرة للابهام ٧ القاضة النصيرة للخنصر

شكل ١٦١ عضلات الطبقة الثالثة وبعض الثانية لاخص القدم ١ اللفافة الاخمية مقطوعة ٢ القاضة الاضافية ٣ وتر القاضة الطويلة للاصابع ٤ وتر القاضة الطويلة للابهام ٥ وتر القاضة النصيرة للابهام ٦ المقربة له ٧ القاضة النصيرة للخنصر ٨ المستعرضة القدمية ٩ عضلات بين العظام ١٠ وتر الشظوية الطويلة

شكل ١٥٩



شق طولي مقابل منتصف السلامية الاولى فتنفذ من الشقوق المذكورة
اوتار القابضة الطويلة للاصابع ثم تتحد الفسخان ثم تنقسمان وتندغمان
بجانبى السلامية الثانية. مجاورتها. من الظاهر للفاقة الاخرى. ومن
الباطن للقابضة الاضافية والعضلات الخراطيمية واوتار القابضة الطويلة
للاصابع والعصب والوعية الاخرى الوحشية

والمعدة للخنصر ممتدة على الجانب الوحشي للقدم. لها منشأ
عريض من الحدبة الوحشية للعقب ومن الوجه السفلي للعقب امام
الحدبتين ومن الفاقة الاخرى والفاصل بينها وبين القابضة القصيرة
للاصابع. تنتهي بوتر يندغم مع وتر القابضة القصيرة للخنصر في الجانب
الوحشي لقاعدة السلامية الاولى من الخنصر. مجاورتها. من الظاهر للفاقة
الاخرى. ومن الباطن للقابضة الاضافية والقابضة القصيرة للخنصر
والرباط الاخرى الطويل والشظوية الطويلة. والى جانبها الانسي العصب والوعية الاخرى
الوحشية

الطبقة الثانية

الخراطيمية

القابضة الاضافية

تنشأ القابضة الاضافية براسين. فالانسي وهو الاكبر يرتبط بالوجه الانسي المتفرع
للعقب وبالرباط العقبي الزورقي والراس الوحشي مسطح وتري يرتبط بالوجه السفلي للعقب
الى مقدم الحدبة الوحشية وبالرباط الاخرى الطويل. وتتحد الراسان على زاوية حادة
وبندغان في الحافة الوحشية وفي الوجه العلوي والسفلي لوتر القابضة الطويلة للاصابع. مجاورتها.
من الظاهر لعضلات الطبقة السطحية التي تنفصل عنها بواسطة الوعية والاعصاب الاخرى
الوحشية. ومن الباطن للعقب والرباط الطويل العقبي المربعي

والخراطيمية اربع عضلات صغيرة اضافية لاوتار القابضة الطويلة للاصابع. منشأها من
اوتار العضلة المذكورة عند زاوية انقسامها من الوتر الاصيلي. كل عضلة منها تنشأ من وترين الآ

شكل ١٥٩ عضلات الطبقة الاولى لاختص القدم ١ عظم العقب ٢ الفاقة الاخرى منطوغة عرضاً لاجل اظهار عضلات
الطبقة الاولى ٣ المعدة للاصابع ٤ المعدة للخنصر ٥ القابضة القصيرة للاصابع ٦ وتر القابضة الطويلة للاصابع ٧ و٧ عضلات
خراطيمية. وتناهد في الاصبع الاول والثاني اوتار القابضة الطويلة للاصابع نافذة الى المتمد بين شقوق اوتار القابضة القصيرة على
نقى القابضتين السطحية والغائرة لاصابع اليد كما مر

عضلات الجهة الظهرية

في هذه الجهة عضلة واحدة فقط وهي

الباسطة القصيرة للاصابع (شكل ١٥٦) وهذه العضلة رقيقة عريضة منشأها من الجانِب الوحشي للعقب الى مقدم ميزاب الشظوية القصيرة ومن الرباط الكعبي العقبى ومن الجزء الافقي للرباط الحلقى المقدم. تنبج بانحراف على ظهر القدم وتنتهي باربعة اوتار. فإ - نسي منها وهو اكبرها يندغم في السلامية الاولى للايهام والثلاثة الباقية تندغم في الجوانب الوحشية لاوتار الباسطة الطويلة الخاصة بالاصبع الثاني والثالث والرابع. مجاورتها. من الظاهر للنافة القدم واوتار الباسطة الطويلة للاصابع والباسطة للايهام. ومن الباطن للعظام الرسغية والمشطية والعضلات الظهرية بين العظام اعصابها من القصي المقدم

عملها. هي معينة للباسطة الطويلة فتبسط الابهام والاصابع الثلاثة الانسية ولكنها لا تفعل وحدها الا على الابهام. ونظراً لانحراف اليافها تقاوم انحراف الباسطة الطويلة فتستوي حركة الاصابع

الجهة الاخصية

نقسم عضلات هذه الجهة الى ثلاث طبقات اولى وثانية وثالثة

الطبقة الاولى

المبعدة للايهام - القابضة القصيرة للاصابع - المبعدة للخنصر

المبعدة للايهام ممتدة على الحافة الانسية للقدم. منشأها من الحدبة الانسية على الوجه السفلي للعقب ومن الرباط الحلقى الانسي ومن النفاة الاخصية ومن الفاصل بينها وبين القابضة القصيرة للاصابع. تنتهي اليافها بوتر يندغم مع الوتر الانسي للقابضة القصيرة للايهام في الجانِب الانسي لقاعدة السلامية الاولى من الابهام. مجاورتها. من الظاهر للنافة الاخصية. ومن الباطن للقابضة القصيرة للايهام والقابضة الاضافية واوتار القابضة الطويلة للاصابع والقابضة الطويلة للايهام والقصبيتين المقدمة والخلفية والوعية والاعصاب الاخصية ومفاصل الرسغ والقابضة القصيرة للاصابع واقعة على الخط المتوسط في اخمص القدم ملتصقة بالنافة الاخصية. منشأها بزائدة ضيقة وترية من الحدبة الانسية للعقب ومن الجزء المركزي للنافة الاخصية ومن الفاصل بين العضلات. تنبج الى الامام وتنقسم الى اربعة اوتار في كل وتر منها

العظم على العضلة المذكورة. فاذا ثبت ارتباطها من الاسفل سندتا الساق على القدم

في عضلات ولفائف القدم

يقال للاربطة الليفية التي تربط الاوتار المارة الى القدم من امام المفصل الكعبي ومن خلفه الاربطة الخلفية. وهي ثلاثة مقدم وانسي ووحشي. فالرباط الخلفي المقدم (شكل ١٥٦) مؤلف من قسمين قسم علوي وهو عمودي الاتجاه وقسم سفلي وهو افقي. فالقسم العمودي مرتبط من الوحشية بالطرف السفلي للشظية ومن الانسية بالقصبة وهو امتداد لنافة الساق من الاعلى. يتضمن غمدين احدهما انسي لوتر القصيبة المقدمة والاخر وحشي لاوتار الباسطة الطويلة للاصابع والشظوية الثالثة. ويمر تحت هذا الرباط وتر الباسطة للابهام والاعوية والعصب القصيبة المقدمة. والقسم الافقي يرتبط من الوحشية بالوجه العلوي للعقب ومن الانسية بالكعب الانسي والنافة الاخضية ويتضمن ثلاثة اغدة الانسي منها لوتر القصيبة المقدمة والذي يليه لوتر الباسطة للابهام والوحشي للباسطة المشتركة للاصابع والشظوية الثالثة. ويمر تحت هذا الرباط العصب والاعوية القصيبة المقدمة. والرباط الخلفي الانسي يمتد من الكعب الانسي من الاعلى الى الحافة الانسية للعقب من الاسفل فيجول الممازيب العظمية الواقعة في هذه الجهة الى قنوات تمر منها اوتار القوابض والاعوية الى الاخمص. وهذه القنوات ثلاث يمر فيها من الانسية الى الوحشية اولاً وتر القصيبة الخلفية ثانياً وتر القابضة الطويلة للاصابع ثم العصب والاعوية القصيبة الخلفية التي تمر في خلاء واسع تحت الرباط وثالثاً وتر القابضة الطويلة للابهام. والرباط الخلفي الوحشي يمتد من طرف الكعب الوحشي الى الوجه الظاهر للعقب ويربط وتر الشظويتين الطويلة والقصيرة تحت الكعب الوحشي

والنافة الاخضية اكثر جميع الاغشية الليفية مؤلفة من الياف بيضاء لماعة لؤلؤية. تنقسم الى قسم مركزي وقسمين جانبيين. فالقسم المركزي يرتبط بالحذبة الانسية للعقب خلف منشأ القابضة القصيرة للاصابع وينقسم مقابل المشطي المتوسط الى خمسة اقسام قسم لكل اصبع. وينقسم كل من هذه الاقسام الخمسة مقابل المفاصل المشطية السلامية الى فسخين تندغان بجانبي العظام المشطية. ويمر بين الفسخين اوتار القوابض الى الاصابع. وهذا القسم المركزي متصل بالقسمين الجانبيين ويرسل فواصل متينة بين العضلات. والقسمان الجانبيان ارق من القسم المركزي ويغطيان جانبي القدم

اخص القدم الى الانسية فتضاد الشظوية الطويلة التي تجذبها الى الوحشية. والقابضة الطويلة للاصابع والقابضة الطويلة للايهاام نقبضان السلاميات فاذا دام عملها بسطنا القدم على الساق. وتعينان التوأمية والنعلية في بسط القدم كما في المشي او الوقوف على راس القدم. فاذا ثبت ارتباط هذه العضلات في القدم اعانت في حفظ الهيئة الانتصابية اذ انها تسند القصة والشظية عمودياً على الرسغ

الجهة الشظوية

الشظوية الطويلة - الشظوية القصيرة

الشظوية الطويلة موضوعة في الجزء العلوي للجانب الوحشي من الساق وهي اقرب الى السطحية من القصيرة. منشأها من راس الشظية والثلاثين العلويين للوجه الوحشي من جسم الشظية ومن اللفافة الغائرة ومن الفاصل بين العضلات. وتنتهي بوتر طويل يسير خلف الكعب الوحشي في ميزاب مشترك بينه وبين الشظوية القصيرة ثم ينعكس من الميزاب المذكور بانحراف الى المقدم فاذا وصل الى الجانب الوحشي من العظم المكعب دخل في الميزاب الواقع على وجهه السفلي ومرّاً بانحراف في اخص القدم واندمج في الجانب الوحشي لقاء مشطي الايهاام. مجاورتها. من الظاهر للنفافة والجلد. ومن الباطن للشظية والشظوية القصيرة والعقب والمكعب. ومن حافتها المقدمة تنفصل عن الباسطة الطويلة للاصابع بواسطة فاصل بين العضلات. ومن حافتها الخلفية يفصلها مثل ذلك عن النعلية من الاعلى والقابضة الطويلة للايهاام من الاسفل

والشظوية القصيرة واقعة تحت الطويلة وهي اقصر واصغر منها. منشأها من الثلث المتوسط للوجه الوحشي من جسم الشظية الى الانسية من الطويلة ومن الحافة المقدمة والحافة الخلفية لهذا العظم ومن الفاصل بين العضلات. توجه اليافها عمودياً الى الاسفل وتنتهي بوتر يسير في الميزاب الذي تسير فيه الطويلة خلف الكعب الوحشي ثم يذهب على الجانب الوحشي للعقب اعلى وتر سابقتها ويندمج في الوجه الظهري لقاء مشطي الخنصر. مجاورتها. من الظاهر للشظوية الطويلة ولفافة الساق والقدم. ومن الباطن للشظية والجانب الوحشي للعقب

اعصاب هاتين العضلتين من الفرع العضلي الجلدي للعصب المأبضي الوحشي عملها. تشتركان مع القصبية الخلفية في بسط القدم على الساق فتضادان مثل القصبية المقدمة والشظوية الثالثة اللتين نقبضان القدم. والشظوية الطويلة تجذب الاخص الى الوحشية ويشاهد ذلك في اعلى درجة اذا انكسر الجزء السفلي من الشظية حيث لا يقاوم هذا

والتابضة الطويلة للأصابع ثم في ميزاب آخر على الطرف الخلفي للكعب ثم في ميزاب ثالث تحت حدة العقب فيصل إلى اخمص القدم ويندغم في قاعة السلامة الأخيرة للإبهام. مجاورتها. من الظاهر للنعلية ووتر اكيللس. ومن الباطن للشظية والتصيبة الخلفية والأوعية الشظوية ومفصل الرسغ. ومن حافتها الوحشية للعضلات الشظوية. ومن حافتها الأسيية للتصيبة الخلفية والتابضة الطويلة للأصابع

والتابضة الطويلة للأصابع موضوعة على الجانب القصي للساق. منشأها من الوجه الخلفي لجسم النصب أسفل الخط المنحرف وبعض الألياف من الفاصل بين العضلات. وتنتهي الألياف بوتر يسير على الوجه الخلفي لهذه العضلة. ويسير هذا الوتر خلف الكعب الأنسي في ميزاب مشترك بينه وبين التصيبة الخلفية ثم تحت قوس العقب إلى اخمص القدم حيث ينقسم إلى أربعة أوتار تندغم في قواعد السلاميات الأخيرة للأصابع الأربعة. وكل وتر منها يمر من شق في وتر القابضة القصيرة للأصابع مقابل منتصف السلاميات الأولى. مجاورتها في الساق. من الظاهر للنعلية والأوعية والعصب التصيبة الخلفية. ومن الباطن للتصبية والتصيبة الخلفية. وفي القدم تغطيها المعدة للإبهام والقابضة القصيرة للأصابع وتسير تحت القابضة الطويلة للإبهام

والتصيبة الخلفية واقعة بين العضلتين السابقتين وهي أشد غوراً من جميع عضلات الساق. تبدأ من الأعلى بزائدين مستدقتين يفصلهما خلافاً زاوياً تسير منه الأوعية التصيبة المقدمة إلى مقدم الساق. منشأها من الوجه الخلفي للغشاء بين العظمين على جميع طولها الأجزء السفلي ومن الوجه الخلفي لجسم النصب إلى الوحشية من القابضة الطويلة للأصابع ومن الثلثين العلويين للوجه الأنسي من جسم الشظية. وتسير هذه العضلة في الربع الأسفل للساق إلى مقدم القابضة الطويلة للأصابع وتنتهي بوتر يمر مع وتر العضلة المذكورة في ميزاب واحد وراء الكعب الأنسي ثم على الرباط الجانبي الأنسي ثم تحت المفصل الكعبي الزورقي ويندغم بحدة الزورقي وبالأسفني الأنسي. ويتضمن وتر هذه العضلة عظاماً تسمى مجاورتها. من الظاهر للنعلية والقابضة الطويلة للأصابع والأوعية والعصب التصيبة الخلفية والأوعية الشظوية. ومن الباطن للغشاء بين العظمين والتصبية والشظية ومفصل الرسغ

أعصاب هذا المجموع من العصب القصي الخلفي الأمامية فإن عصبها من المابضي الأنسي عملها. المأبضية تعين في قبض الساق على الفخذ. فإذا كان منقبضاً قد تدبر النصبية إلى الأنسية. والتصيبة الخلفية بأسطة للرسغ على الساق فإذا اشتركت مع التصيبة المقدمة ادارت

السابتين وبسير الى الحافة الانسية لوتر اكيلس ويندغم في الجزء الخلفي للعقب
اعصاب هذه العضلات من العصب الانسي المابضي


اعمال هذه العضلات في الوقوف والمشي والركض والقفز. ففي المشي ترفع العقب وترفع معه جميع الجسد عن الارض واذ يكون الجسد محمولاً على الطرف الاخر تحمل الباسطة الرباعية الرجل المرتفعة الى الامام وهكذا على التعاقب. وفي الوقوف يثبت ارتباط العلية من الاسفل فتسند الساق على القدم وتمنع سقوط الجسد الى الامام. والتوأمية اذا عملت من الاسفل قبضت الفخذ على القصبه

عضلات الطبقة الغائرة

المأبضية - الفابضة الطويلة للابهام - الفابضة الطويلة للاصابع - القصبية الخلفية


شکل ١٥٨ المابضية عضلة رقيقة مسطحة مثلثة تتكوّن منها ارض الخلاء المابضي ويغطيها انبساط وتري ممتد من الغشائية النصف. منشأها بوتر عريض متين طوله نحو قيراط من انخفاض عميق على الجانب الوحشي للعقدة الوحشية من الفخذ ومن الرباط الخلفي لمفصل الركبة. وتندغم في الثلثين الانسيين للوجه المثلث اعلى الخط المنحرف الواقع في الوجه الخلفي لجسم القصبه. مجاورتها. من الظاهر للفاقة الساق التي تفصلها عن التوأمية والاحصية والوعية المابضية والعصب المابضي الانسي. ومن الباطن للمفصل القصي الشظوي العلوي وللجهة الخلفية من القصبه

والقابضة الطويلة للابهام موضوعة على الجانب الشظوي للساق وهي اكبر ما بقي من عضلات هذه الجهة واقربها الى السطحية. منشأها من الثلثين السفليين للوجه الخلفي من جسم الشظية ومن الجزء السفلي للغشاء بين العظمين ومن الفواصل العضلية. توجه اليافها بانحراف الى الاسفل والخلف وتنتهي بوتر يمتد على طول جميع الوجه الخلفي لهذه العضلة تقريباً. ويمر هذا الوتر في ميزاب على الوجه الخلفي للقصبه الى الوحشية من وتر القصبية الخلفية



شکل ١٥٨ العضلات الغائرة لمؤخر الساق ١ عظم الفخذ ٢ الرباط الخلفي ٣ وتر الغشائية النصف منقسماً الى ثلاث فسخ ٤ الرباط الجانبي الانسي ٥ الرباط الجانبي الوحشي ٦ العضلة المابضية ٧ الفابضة الطويلة للاصابع ٨ القصبية الخلفية ٩ الفابضة الطويلة للابهام ١٠ الشظوية الطويلة ١١ الشظوية القصيرة ١٢ وتر اكيلس مقطوعاً بقرب اندغامه ١٣ وترا القصبية الخلفية والفاضة الطويلة للاصابع وبينها الوعية والعصب سائرة اسفل الرباط الخلفي الانسي للرسغ

شكل ١٥٧



والنعلية والاحمسية والاوعية المأبضية والعصب المأبضي الانسي ويفصل وتر الراس الانسي عن العقدة الانسية كيس زلاي قد يتصل تجويفه بتجويف مفصل الركبة . وتر الراس الوحشي يتضمن غضروفًا او عظامًا سميًا . وقد يوجد مثل ذلك في وتر الراس الانسي

والنعلية^(١) عضلة عريضة مسطحة على هيئة النعل موضوعة تحت سابقتها . منشأها باللياف وترية من الجزء الخلفي لراس الشظية ومن النصف العلوي للوجه الخلفي من جسم العظم المذكور ومن الخط المنحرف للقصبة ومن الثلث المتوسط لحافتها الانسية . وتنشأ بعض اللياف ايضاً من قوس وتري موضوع بين المنشأ القصي والمنشأ الشظوي هذه العضلة تسير تحت القوس المذكور الاوعية والعصب القصبية الخلفية . تنجه الليافها الى الخلف وترتبط بصفاق يغطي الوجه الخلفي لهذه العضلة . ثم يغلف الصفاق ويضيق ويحد بوتر التوامية فيتكوّن من ذلك الاتحاد وتراكيلس . مجاورتها . من الظاهر للتوامية والاحمسية . ومن الباطن للناضضة الطويلة للاصابع والناضضة الطويلة للاصابع والنصيبة الخلفية والاوعية والعصب القصبية الخلفية

وتتراكيلس مكون من وتري التوامية والنعلية وهو اغلظ واقوى اوزار الجسد طولة نحو ستة قراريط . يبدأ نحو منتصف الساق ويقبل اليفافاً لحمية الى قرب طرفه السفلي ثم يضيق ويندغم في الجزء السفلي للحدبة الخلفية من العقب وانما يتوسط بينه وبين الجزء العلوي من الحدبة كيس زلاي . وتغطي هذا الوتر اللفافة والجلد ويفصله عن العضلات الغائرة والاوعية خلائ كبير مشغول بنسج خلوي دهني . والى جانبه الوحشي والى السطحية منه الوريد الصافن الوحشي

والاحمسية عضلة دقيقة جداً موضوعة بين التوامية والنعلية وتمتاز بطول وترها ودقته . منشأها من الجزء السفلي للشعبة الوحشية من الخط الحشن ومن الرباط الخلفي لمفصل الركبة . لها بطن صغير مغزلي طولة نحو قيراطين ينتهي بوتر طويل دقيق يسير منحرفاً بين العضلتين

شكل ١٥٧ العضلات السطحية لمؤخر الساق ١ وتر ذات الراسين الذي يكون الحد الوحشي للحلاء المأبضي ٢ اوتار الحياطية والرفيقة والغشائية النصف والوترية النصف التي تكون الحد الانسي ٣ الحلاء المأبضي ٤ التوامية ٥ وه النعلية ٦ وتراكيلس ٧ الحدبة الخلفية العقب ٨ وترا الشظويتين الطويلة والقصيرة سائرين وراء الكعب الوحشي ٩ وترا النصيبة الخلفية والناضضة الطويلة للاصابع سائرين وراء الكعب الانسي الى القدم

(١) النعلية - الكلمة الاصلية تقدم نعا من السمك والنعل . قد اخترا الثاني لعمه . - نود كلمة معروفة للاول .

اعصاب هذه العضلات من العصب القضي المقدم عملها . القصية المقدمة والشظوية الثالثة قابضتان للرسغ على الساق . والقصية المقدمة ترفع الحافة الانسية للقدم . والشظوية الثالثة تعين الشظوية الطويلة والقصيرة في جذب الحافة الوحشية للقدم الى الاعلى والاخص الى الوحشية . والباسطة الطويلة للاصابع والباسطة للابهام تبسطان سلاميات الاصابع والابهام فاذا دام عملها قبضت الرسغ على الساق . فاذا ثبت ارتباط هذه العضلات من الاسفل في حالة الانتصاب ثبتت عظمي الساق في الجهة العمودية وسندت مفصل الرسغ

الجهة الخلفية للساق

نقسم عضلات هذه الجهة الى طبقتين سطحية وغائرة . فالطبقة السطحية مؤلفة من كتلة لحمية شديدة الفعل تُسمى ببطن الساق . وهي غليظة في الانسان ومميزة لهيئة مجموعته العضلي فانها تتعلق بوضعه الانتصابي وبالطريقة الخاصة به في المشي


عضلات الطبقة السطحية

التوامية - النعلية - الاخضية

التوامية^(١) اقرب هذه العضلات الى السطحية ومنها يتكون معظم بطن الساق . منشأها براسين يرتبطان بعقدتي الفخذ بواسطة وترين متينين مسطحين . فالراس الانسي اكبرها يرتبط بانخفاض في الجزء العلوي والخلفي للعقدة الانسية والراس الوحشي يرتبط بالجزء العلوي والخلفي للعقدة الوحشية اعلى منشأ المابضية . وينشأ أيضاً ببعض الياف وترية ولحمية من الخطين الصاعدين من العقدتين الى الخط الخشن . وكل من هذين الوترين ينبسط ويصير صفاقاً يغطي الوجه الخلفي للفخذ التي تتعلق بها من العضلة . وتنشأ من الوجه المقدم لهدين الصفاقين الياف لحمية فالالياف الواقعة في الخط المتوسط التي تقابل الالياف الاضافية الناشئة من شعبي الخط الخشن تتخذ على زاوية في قيد وترى على الخط المتوسط من الاسفل . وما بقي من الالياف يجمع في الوجه الخلفي لصفاق يغطي مقدم العضلة . وهذا الصفاق يضيق اولاً ثم يتخذ بوتر النعلية فيتكون من الاتحاد المذكور وتر اكيللس . مجاورتها . من الظاهر لفافة الساق التي تفصلها عن الوريد الصافن الوحشي والعصب الصافن الوحشي . ومن الباطن للرباط الخلفي لمنصل الركبة والمابضية

(١) التوامية الساقية: هذه تسمية البيوس وقد اصطلح المشرحون الان على تسميتها البطنية الساقية لانها تكون بطن الساق . واعل اصحاب المدرسة المصرية انكروا على هذه التسمية لها فيها من التشويش بين البطن الاصلي وبطن الساق فاختاروا الكلمة التي وضعها البيوس ولذلك قدنا بعناهم في ذلك

شكل ١٥٦



الطويلة للاصابع. منشأها من الربيعين المتوسطين للوجه المقدم اي الانسي للشظية الى الانسية من منشأ الباسطة الطويلة للاصابع ومن الغشاء بين العظمين. تنجه اليافها الى الاسفل وتنتهي بوتر يمر من طبقة خاصة به من الرباط الخلفي ويندغم بقاعدة السلامى الاخيرة للاصابع. مجاورتها من حافتها المقدمة للفاقة الغائرة والرباط الخلفي المقدم. ومن حافتها الخلفية للغشاء بين العظمين والشظية والقصبة ومفصل الكعب والباسطة القصيرة للاصابع. ومن جانبها الوحشي للباسطة الطويلة للاصابع من الاعلى والوعية الظهرية للقدم والعصب القصي المقدم من الاسفل. ومن جانبها الانسي للقصية المقدمة والوعية القصية المقدمة من الاعلى والباسطة الطويلة للاصابع عضلة مستطيلة مسطحة نصف ريشية وضعها الى الوحشية من سابقتها. منشأها من الحدبة الوحشية للقصبة ومن الارباع الثلاثة العليا للوجه المقدم اي الانسي من جسم الشظية ومن الغشاء بين العظمين ومن الفاصل بين العضلات. تنتهي بثلاثة اوتار تدمج وتر الشظوية الثالثة من قناة للرباط الخلفي وتسير على ظهر القدم ثم ينقسم الوتر الانسي الى وترين فتصير اربعة اوتار تنبسط وتندغم في السلاميات الشواني والثالث للاصابع الاربعة. مجاورتها. من وجهها المقدم للفاقة الغائرة والرباط الخلفي. ومن وجهها الخلفي للشظية والغشاء بين العظمين ومفصل الرسغ والباسطة القصيرة للاصابع. ومن جانبها الانسي للقصية المقدمة والباسطة للاصابع والوعية والعصب القصية المقدمة. ومن جانبها الوحشي للشظويتين الطويلة والقصيرة والشظوية الثالثة قد تُعد جزءاً من الباسطة الطويلة. للاصابع لانها تكاد تكون دائماً مختلطة بها. منشأها من الربع السفلي للوجه الانسي من الشظية ومن الجزء السفلي للغشاء بين العظمين ومن الفاصل العضلي بينها وبين الشظوية القصيرة ويمر وترها من الرباط الخلفي مع اوتار الباسطة الطويلة للاصابع ويندغم بالوجه الظهري لقاعدة مشطي الخنصر. وقد لا توجد

شكل ١٥٦ عضلات مقدم الساق ١ رباعية الرؤوس التي تندغم في الرضفة والرقم موضع على وتر المستقيمة والى كل من جانبي وتر المستقيمين ٢ الوجه القصي المغلج بالجلد فقط ٣ القصية المقدمة ٤ الباسطة الطويلة للاصابع ٥ الباسطة الخاصة بالاصابع ٦ الشظوية الثالثة ٧ الشظوية الطويلة ٨ الشظوية القصيرة ٩ و١٠ حافتا النعالية ١٠ بعض البطن الانسي للنعالية ١١ الباسطة القصيرة للاصابع. الوتر الذي الى مقدم الرقم وتر الشظوية الثالثة والذي الى الخلف منه وتر الشظوية للقصيرة ١٢ و١٣ الرباط الخلفي المقدم

عضلات الساق ولفائفه

لفافة الساق محيطة به من كل جهة إلا الوجه الانسي للقصبة. وهي امتداد اللفافة العريضة من الأعلى والأربطة الحلقية للرسغ من الأسفل ونقبيل انبساطاً من وتر ذات الرأسين إلى الوحشية ومن أوتار الخياطية والرقيقة والوترية النصف إلى الانسية. وتختلط من المقدم بالسحاق الذي يغطي القصبة والشظية. وترتبط بوجهها الباطن إلى مقدم وأعلى الساق القصبية المقدمة والباسطة الطويلة للأصابع. وترسل من وجهها الباطن زوائد منها ما يحيط بكل عظمة على حدتها ومنها ما يحيط بالشظويات الثلاث ومنها ما يفصل بين العضلات السطحية والغائرة في الجهة الخلفية القصبية الشظوية

عضلات الساق

نقسم هذه العضلات إلى ثلاثة أقسام - الجهة المقدمة والجهة الخلفية والجهة الوحشية

عضلات الجهة المقدمة (القصبية الشظوية)

القصبية المقدمة - الباسطة للإبهام - الباسطة الطويلة للأصابع - الشظوية الثالثة

القصبية المقدمة غليظة لحمية في الأعلى وترية في الأسفل وضعها إلى الجانب الوحشي للقصبة. منشأها من الحدبة الوحشية للقصبة ومن الثلثين الوحشيين للوجه الوحشي من جسم القصبة ومن الجزء المجاور من الغشاء بين العظمين ومن اللفافة الغائرة للساق. تنجها إليها عمودياً إلى الأسفل وتنتهي بوتر ظاهر على الوجه المقدم لهذه العظمة في الثلث السفلي للساق. ثم يمر الوتر المذكور من الفتحة الانسية للرباط الحلقى المقدم ويندغم في الوجه الانسي والسفلي للعظم الاسفني الانسي وفي قاعدة مشطي الإبهام. مجاورتها. من وجهها المقدم لللفافة الغائرة والرباط الحلقى. ومن وجهها الخلفي للغشاء بين العظمين والقصبة ومفصل الكعب والجهة الانسية للرسغ. ومن وجهها الانسي للقصبة. ومن وجهها الوحشي للباسطة الطويلة للأصابع والباسطة للإبهام. والأوعية والعصب القصبية المقدمة واقعة بينها وبين الباسطة للإبهام أعلى الرسغ

والباسطة للإبهام عظمة رقيقة مسطحة مستطيلة وضعها بين القصبية المقدمة والباسطة

والوترية النصف لها وتر طويل جداً موضوعة في الجهة الخلفية والانسية من الفخذ .
 منشأها من الحدبة الوركية بوتر مشترك بينها وبين الرأس الطويل لذات الرأسين . وتنشأ أيضاً
 من صفاق يوصل الوجهين المتجاورين لهاتين العضلتين الى مسافة قيراطين او ثلاثة من منشأها .
 وهي عضلة مغزلية الشكل تتجه الى الاسفل والانسية وتنتهي اسفل منتصف الفخذ بوتر طويل
 مستدير واقع الى الجانب الانسي من الخلاء المابضي ثم ينحني حول الحدبة الانسية للقصبة ويندغم
 في الجزء العلوي للوجه الانسي من العظم المذكور تحت مندغم الخياطية واسفل مندغم الرقيقة
 حيث تختلط بها . مجاورتها . من الظاهر للالوية الكبيرة واللفافة العريضة . ومن الباطن للغشائية
 النصف والمقربة الكبيرة والرأس الانسي للتوأمية والرباط الجانبي الانسي لمفصل الركبة

والغشائية النصف سُميت بهذا الاسم لوجود انبساط غشائي على وجهها المقدم ووجهها الخلفي
 الخلفي . وضعها في الجهة الخلفية والانسية للفخذ . منشأها بوتر غليظ من الجزء العلوي والوحشي
 للحدبة الوركية اعلى والى الوحشية من منشأ وتر ذات الرأسين والوترية النصف . وتندغم في الجزء
 الانسي والخلفي للحدبة الانسية من القصبة تحت الرباط الجانبي الانسي . وينبسط وتر هذه العضلة
 عند منشأها فيغطي بعضه وجهها المقدم وبعضه وجهها الخلفي . وينقسم وترها عند طرفها السفلي
 الى ثلاثة اقسام . يندغم القسم المتوسط في الجزء الخلفي للحدبة الانسية من القصبة ويرسل زائدة
 لتغطي العضلة المابضية . والقسم الانسي افقي الاتجاه يذهب تحت الرباط الجانبي الانسي ويندغم
 في ثلم على الجانب الانسي للحدبة الانسية المذكورة . والقسم الخلفي يذهب الى الاعلى والخلف ويندغم
 في الجزء الخلفي للعقدة الوحشية من عظم الفخذ ومنه يتكوّن معظم الرباط الخلفي لمفصل الركبة .
 واعلم ان اوتار العضلتين السابقتين والرقيقة والخياطية تكوّن الحد الانسي للخلاء المابضي .
 مجاورتها . من الظاهر للوترية النصف وذات الرأسين واللفافة العريضة . ومن الباطن للاوعية
 المابضية والمقربة الكبيرة والرأس الانسي للتوأمية الذي يفصلها عنه كيس زلاي . ومن حافتها
 الانسية للرقيقة . ومن حافتها الوحشية للعصب الوركي العظيم ولفرعه المابضي الانسي

اعصاب عضلات هذه الجهة من العصب الوركي العظيم


عملها . هذه العضلات تقبض الساق على الفخذ . واذا كانت الركبة منقبضة انقباضاً غير
 كامل ادارت ذات الرأسين الساق قليلاً الى الوحشية واعانت الغشائية النصف المشطية في
 تدوير الساق الى الانسية . فاذا ثبت ارتباط هذه العضلات من الاسفل سددت الحوض على
 رأس الفخذ او جذبه الى الخلف كما في الاقنساس

من الضفيرة العجزية. والسادة الظاهرة من العصب الساد عملها. الالويّات الثلاث اذا ثبت ارتباطها الحوضي ابعدت الفخذ. والالوية الكبيرة والاليف الخلفية للالوية المتوسطة تدبر الفخذ الى الوحشية. والاليف المقدمة للالوية المتوسطة وللالوية الصغيرة تدبره الى الانسية. فاذا ثبت ارتباطها الفخذي فعلت على الحوض وسندته وجميع الجذع على راس الفخذ وعلى الخصوص اذا وقف الانسان على ساق واحد. واذا كان الجذع منحنيًا الى الامام كانت الالويّات معينة لذات الراسين والوترية النصف والغشائية النصف في اعادته الى حالة الانتصاب. والعضلات الست الباقية من هذا المجموع تدبر الفخذ الى الوحشية ونعين ايضًا في ابعاد الفخذ

الجهة الخلفية للفخذ

ذات الراسين - الوترية النصف - الغشائية النصف

شكل ١٥٥



ذات الراسين عضلة كبيرة طويلة موضوعة في الجهة الخلفية والوحشية للفخذ. منشأها برأسين. فالراس الطويل ينشأ بوتر مشترك بينه وبين الوترية النصف من اثر في الجزء العلوي والخلفي للحدبة الوركية. والراس القصير ويقال له الفخذي من الشفة الوحشية للخط الحشن بين المقربة الكبيرة والمتسعة الوحشية اسفل مندغم الالوية الكبيرة بنحو قيراطين الى اعلى العقدة الوحشية بنحو قيراطين ايضًا. وينشأ ايضًا من الفاضل الوحشي بين العضلات. ويتكوّن من الياف الراس الطويل بطن لحمي ينحدر الى الاسفل وقليلًا الى الوحشية وينتهي بصفاق يغطي الوجه الخلفي لهذه العضلة ويقبل الياف الراس القصير. ثم يضيّق هذا الصفاق. ويصير وترًا ويندغم بالجانب الوحشي لرأس الشظية فيكوّن الحافة الوحشية للتلاء المابضي. مجاورتها. من الظاهر للالوية الكبيرة من الاعلى وللنافة العريضة والمجلد فيما بقي من مسافتها. ومن الباطن للوترية النصف والمقربة الكبيرة والمتسعة الوحشية والعصب العظيم الوركي والشريان والوريد المأبضيين. وقرب مندغمها للرأس الوحشي من التوامية والاخصمية

شكل ١٥٥ عضلات مؤخر الفخذ والجهة الالوية ١ الالوية المتوسطة ٢ الالوية الكبيرة ٣ المتسعة الوحشية مغطاة بالنفاة العريضة ٤ الراس الطويل لذات الراسين ٥ الراس القصير ٦ الوترية النصف ٧ والغشائية النصف ٨ الرقيقة ٩ بعض الحافة الانسية للمقربة الكبيرة ١٠ حافة الحياطية ١١ الخلاء المابضي ١٢ راسا التوامية

للجدار المقدم من الحوض . ومن وجهها الخلفي للفاقة الحوضية والسادة اللتين تفصلانها عن الرافعة للاست وبقاطعها الاوعية والعصب الاستحيائية الباطنة . وخارج الحوض يغطيها العصب الوركي العظيم والالوية الكبيرة وتستقر على الجزء الخلفي للمفصل الوركي

والتوامية العليا اصغر من السفلى هي حزمة عضلية صغيرة منشأها من الوجه الظاهر لشوكة العظم الوركي وتسير افقياً الى الوحشية ثم تخاطب بالجزء العلوي لوتر السادة الباطنة الذي يندغم في الحافة العليا للمدور الكبير . وقد لا توجد . مجاورتها من وجهها الظاهر للالوية العظيمة والاعوية والاعصاب الوركية . ومن الباطن للرباط المحفظي . ومن حافتها العليا للحافة السفلى من الهرمية . ومن حافتها السفلى لوتر السادة الباطنة

والتوامية السفلى تنشأ من الجزء العلوي للحافة الوحشية من الحدة الوركية وتسير افقياً الى الوحشية وتختلط بوتر السادة الباطنة الذي يندغم بالحافة العليا للمدور الكبير . مجاورتها . من الظاهر للالوية الكبيرة والاعوية والاعصاب الوركية . ومن الباطن تغطي الرباط المحفظي . ومن حافتها العليا لوتر السادة الباطنة . ومن حافتها السفلى لوتر السادة الظاهرة والمربعة الفخذية والمربعة الفخذية عضلة قصيرة مسطحة مربعة الشكل ومنه اسمها موضوعة بين التوامية السفلى والحافة العليا للمقربة الكبيرة . منشأها من الحافة الوحشية للحدبة الوركية ونجها افقياً الى الوحشية وتندغم في الجزء العلوي للخط المربع على الوجه الخلفي للمدور الكبير . مجاورتها . من وجهها الخلفي للالوية الكبيرة والاعوية والاعصاب الوركية . ومن وجهها المقدم لوتر السادة الظاهرة والمدور الصغير . ومن حافتها العليا للتوامية السفلى . ومن حافتها السفلى تفصلها عن المربعة الكبيرة فروع الاعوية المنعكفة الباطنة

والسادة الظاهرة عضلة مسطحة مثلثة الشكل تغطي الوجه الظاهر للجدار المقدم من الحوض . منشأها من حافة العظم المحيطة بالوجه الظاهر للثقب الساد ومن الغشاء الساد ومن الوتر القوسي . نجها الى الوحشية والخلفية وتنتهي بوتر يصاب الجزء الخلفي للمفصل الوركي ويندغم بالحفرة الاصبعية الواقعة في الوجه الانسي للمدور الكبير . مجاورتها من وجهها المقدم للصليبية والحرقفية والمشطية والمقربة الطويلة والمقربة القصيرة والرقبة والى الوحشية من كل ذلك لعنق الفخذ والرباط المحفظي . ومن وجهها الخلفي للغشاء الساد والمربعة الفخذية

اعصابها . الالوية الكبيرة من العصب الالوي السفلي ومن فرع من الصغيرة العجزية . والالوية المتوسطة والصغيرة من الالوي العلوي . والهرمية والتواميتان والسادة الباطنة والمربعة الفخذية

شكل ١٥٤



والهرمية عضلة مسطحة هرمية الشكل موضوعة على خطٍ موازٍ للحافة السفلي من الالوية الصغيرة . منشأها من مقدم العجز بثلاث زوائد لحمية ترتبط بالخطوط المتوسطة بين الثقوب العجزية المقدمة وبالميازيب التي تذهب من الثقوب المذكورة . وبعض الياف تنشأ من حافة الثقب العظيم والرباط العظيم العجزيين الوريكين . وتر هذه العضلة من الثقب العظيم العجزى الوريكي سادة جزءه العلوي وتندغم بوتر مستدير في الحافة العليا للمدور العظيم . ويكون هذا الوتر في الغالب مختلطاً بوتر السادة الباطنة . مجاورتها من وجهها المقدم داخل الحوض للمستقيم والصفيرة العجزية والاعوية الحرقفية الباطنة . وخارج

الحوض للعظم اللا اسم له والرباط الخنفي . ومن وجهها الخلفي داخل الحوض للعجز . وخارج الحوض للالوية العظمية . ومن حافتها العليا للالوية المتوسطة وإنما تنفصل عنها بواسطة الاعوية والعصب الالوية . ومن حافتها السفلي للتوأمية العليا وإنما تأتي من الحوض وتسير في الخلاء الواقع بينها الاعوية والاعصاب الوريكية والاعوية والعصب الاستحيائية الباطنة والعصب الساد الباطن السادة الباطنة كسابقتها بعضها موضوع داخل التجويف الحوضي وبعضها في الجهة الخلفية للمفصل الوريكي . منشأها من الوجه الباطن للجدار المقدم والوحشي من الحوض اذ ترتبط بحافة العظم حول الوجه الباطن لمحيط الثقب الساد . وتنشأ ايضاً من الوجه الباطن للغشاء الساد ومن القوس الوتري الذي يكمل القناة لمرور الاعوية والعصب السادة . تسج اليافها الى الخلف والاسفل وتنتهي باربعة او خمسة اربطة وترية على وجهها الباطن ثم تنعكس على الوجه الانسي للحدبة الوريكية وتخرج من الشرم الصغير العجزى الوريكي ثم لتحد الاربطة الوترية وتصير وترًا واحدًا مسطحًا يسير اقريباً الى الوحشية ويختلط بالتوأمتين ويندغم في الحافة العليا للمدور الكبير الى مقدم الهرمية . مجاورتها داخل الحوض . من وجهها المقدم للغشاء الساد والوجه الباطن

شكل ١٥٤ العضلات العائرة للجهة الالوية ١ العظم الحرقفي ٢ العظم الوريكي ٣ الرباطان العجزيان الخلفيان ٤ الحدبة الوريكية ٥ الرباط العجزى الوريكي الكبير وهو الخلفي ٦ الرباط العجزى الوريكي الصغير وهو المقدم ٧ المدور الكبير ٨ الالوية الصغيرة ٩ الهرمية ١٠ التوأمية العليا ١١ السادة الباطنة خارجة من الثقب العجزى الوريكي الصغير ١٢ التوأمية السفلي ١٣ المربعة الخنذية ١٤ المقربة الكبيرة ١٥ المتسعة الوحشية ١٦ ذات الراسين ١٧ الرقيقة ١٨ الوترية النصف

المحرفي . نجه اليافها الى الاسفل والوحشية وتندغم العليا منها بطبقة غليظة وترية في اللفافة العريضة على الجانب الوحشي من الفخذ والسفلى بالخط الذي ينحدر من المدور الكبير الى الخط الحشن بين المتسعة الوحشية والمقربة الكبيرة . ويوجد في الغالب ثلاثة اكياس زلاية تفصلها عن المدور الكبير وحدبة الوركي والمتسعة الوحشية . مجاورتها . من الظاهر للفاقة رقيقة تفصلها عن غشاء خلوي وطبقة دهنية والجلد . ومن الباطن من الاعلى الى الاسفل للمحرفي والعجز والعصص والرباط العظيم العجزي الوركي وبعض الالوية المتوسطة والهرمية والتوأميتين والسادة الباطنة والمربعة الفخذية وحدبة الوركي والمدور الكبير ومنشأ ذات الراسين والوترية النصف والغشائية النصف والمقربة الكبيرة . وتُشاهد الاوعية الالوية وعصبها خارجة من الحوض اعلى الهرمية والاعوية والاعصاب الوركية والاستحيائية وعصب السادة الباطنة اسفلها . وحافتها العليا رقيقة تتصل بالالوية المتوسطة بواسطة اللفافة العريضة . وحافتها السفلى سائبة وبارزة تكون ثنية الالوية وتُشرف على العجان

والالوية المتوسطة (شكل ١٥٥) عضلة عريضة غليظة مشععة موضوعة على الوجه الظاهر للحوض . ثلثها الخلفي تغطي الالوية الكبيرة . وثلاثها المقدمان تغطيها اللفافة العريضة التي تفصلها عن الجلد . منشأها من الوجه الظاهر للعظم المحرفي بين الخطين المنحنيين العلوي والمتوسط ومن اللفافة العريضة التي تغطي جزءها المقدم . تجتمع اليافها في وترتين مسطحين يندغم في الخط المنحرف الذي يقاطع الوجه الوحشي للمدور الكبير . ويفصل هذا الوتر عن المدور الى مقدم اندغامه كيس زلاي . مجاورتها . من الظاهر للالوية الكبيرة من الخلف وللشادة لغد الفخذ واللفافة الغائرة من الامام . ومن الباطن للالوية الصغيرة والاعوية الالوية والعصب الالوي . حافتها المقدمة تختلط بالالوية الكبيرة وحافتها الخلفية موضوعة على خط مواز للعضلة الهرمية وانما توسط بينهما الاعوية الالوية

والالوية الصغيرة موضوعة تحت سابقتها شكلها مثلث ومنشأها من الوجه الظاهر للعظم المحرفي بين الخط المتوسط والخط السفلي المنحنيين ومن حافة الشرم العظيم العجزي الوركي . تجتمع الالياف وتنتهي بوتر يندغم في اثر على الحافة المقدمة للمدور العظيم ويفصل الوتر المذكور عن المدور كيس زلاي . مجاورتها . من الظاهر للالوية المتوسطة والاعوية والعصب الالوية . ومن الباطن للمحرفي والوتر المنعكس للمستقيمة الفخذية والرباط المحفظي للفصل الوركي . وحافتها المقدمة مختلطة بالالوية المتوسطة

اعلى العقدة الانسية للفخذ ويرتبط بواسطة انبساط ليفي في الخط الذي يصعد من الحدة المذكورة الى الخط الحشن وهو الشعبة الانسية للخط المذكور. ويوجد بين الجزء الانسي والجزء الوحشي لهذه العضلة خلاء زاوي وتري من المقدم لحمي من الخلف لمرور الاوعية الفخذية الى الخلاء المأبضي وفي الجزء الوحشي اربعة ثقب يمر من الثلاثة العليا منها الشرايين الثلاثة العليا الثاقبة ويمر من الرابع الشريان الغائر. مجاورتها. من وجهها المقدم للمشطية والمقربة القصيرة والمقربة الطويلة والوعية الفخذية. ومن وجهها الخلفي للعصب العظيم الوركي والالوية الكبيرة وذات الراسين الفخذية والوترية النصف والغشائية النصف. ومن حافتها العليا وهي القصيرة وضعها مواز للمربعة الفخذية. ومن حافتها الانسية وهي الطويلة للرقيقة والخياطية واللفافة العريضة. ومن حافتها الوحشية وهي المندغمة تندغم بالعظم الفخذي كما سبق

اعصاب عضلات هذا المجموع من العصب الساد. غير ان المشطية تقبل فروعاً اضافية من الساد الاضافي والفخذي المقدم. والمقربة الكبيرة تقبل فرعاً اضافياً من الوركي العظيم عملها. المشطية والمقربات الثلاث تقرب الفخذ بقوة عظيمة واكثر استعمالها في ركوب الخيل اذ يضم جانب الفرس بين الركبتين بواسطة عمل هذه العضلات. ولما كان اندغامها في الخط الحشن منحرفاً ادارت الفخذ الى الوحشية فاعانت العضلات المديرة الوحشية. واذا كان الفخذ مبعداً جذبته الى الانسية حاملة اياه بالتصالب فوق الفخذ الاخر. والمشطية والمقربة القصيرة والمقربة الطويلة تعين الصلية والحرقفية في قبض الفخذ على الحوض. وفي المشي تعين في جذب العضو الخلفي اي الطرف السفلي الى الامام. والرقيقة تعين الخياطية في قبض الساق وجذبه الى الانسية وتقرب الفخذ ايضاً. واذا ثبت الطرفان السفليان قد تعمل هذه العضلات من الاسفل على الحوض فتحفظ الجسد منتصباً. فاذا دام عملها قبضت الحوض الى الامام على الفخذ

الجهة الالوية

الالوية الكبيرة - الالوية المتوسطة - الالوية الصغيرة - الهرمية - التوامية العليا - السادة الباطنة - التوامية السفلى - السادة الظاهرة - المربعة الفخذية

الالوية الكبيرة (شكل ١٥٥) اقرب هذه العضلات الى السطحية. وهي كتلة لحمية عريضة غليظة شكلها مربع يتكون منها بروز الآلية وهي ما يتميز به المجموع العضلي في الانسان اذ انها تتعلق باستطاعته ان يحفظ الجذع منتصباً. ولذلك كان بناؤها من الياف غليظة مجموعة في حزم كبيرة تفصلها اخلية غائرة. منشأها من الخط المنحني العلوي للحرقفي وما يجاوره الى العرف ومن الوجه الخلفي للقطعة الاخيرة من العجز ومن جانب العصعص ومن الرباطين العجزي الوركي والعجزي

الفخذية والوريد الصافن الانسي. ومن وجهها الخلفي للمفصل الوريكي. والمقربة القصيرة والسادة الظاهرة والاوعية والعصب السادة متوسطة بينها وبين المفصل المذكور. ومن حافتها الوحشية للصلبية وانما يفصلها نسج خلوي يستقر عليه الشريان الفخذي. ومن حافتها الانسية لحافة المقربة الطويلة

والمقربة الطويلة اوجه المقربات الى السطحية وهي مسطحة مثلثة الشكل واقعة على مساحة واحدة مع المشطية وقد تكون مختلطة بها. منشأها بوتر مسطح ضيق من مقدم العظم العاني عند زاوية اتصال العرف العاني بالارتفاق ثم تنتشر وتصير بطناً لحمياً عريضاً يتجه الى الاسفل والخلف والوحشية ويندغم بصفاق في الثلث المتوسط للخط الحشن بين المتسعة الانسية والمقربة الكبيرة. مجاورتها. من وجهها المقدم للفافة العريضة وعند مندغمها للشريان والوريد الفخذيين. ومن وجهها الخلفي للمقربة القصيرة والكبيرة والفروع المقدمة للاوعية السادة وعند مندغمها للشريان والوريد الغائرين. ومن حافتها الوحشية للمشطية. ومن حافتها الانسية للرقيقة

والمقربة القصيرة موضوعة تحت السابقتين شكلها يقرب من المثلث. منشأها من الوجه الظاهر للفرع النازل من العظم العاني بين الرقيقة والسادة الظاهرة. نتجه اليافها الى الخلف والوحشية والاسفل وتندغم بصفاق في الجزء العلوي من الخط الحشن خلف المشطية والجزء العلوي للمقربة الطويلة. مجاورتها. من وجهها المقدم للمشطية والمقربة الطويلة والفروع المقدمة للاوعية السادة والعصب الساد. ومن وجهها الخلفي للمقربة الكبيرة والفروع الخلفية للاوعية السادة والعصب الساد. ومن حافتها الوحشية للسادة الظاهرة والوتر المشترك للصلبية والخرقمية. ومن حافتها الانسية للرقيقة والمقربة الكبيرة. وهذه العضلة يثقبها عند مندغمها الفرع المتوسط الناقب للشريان الغائر

والمقربة الكبيرة عضلة عظيمة مثلثة الشكل تفصل بين العضلات الانسية والعضلات الخلفية للفخذ. منشأها من جزء صغير من الفرع النازل للعظم العاني ومن الفرع الصاعد للعظم الوريكي ومن الحافة الوحشية والوجه السفلي لحدبة الوريكي. فالالياف التي تنشأ من فرع العاني قصيرة جداً اقبية الاتجاه وتندغم بالخط الذي يمتد من المدور الكبير الى الخط الحشن الى الانسية من الالوية الكبيرة. والتي من فرع الوريكي نتجه الى الاسفل والوحشية وتندغم بصفاق عريض في جميع طول الخط الحشن وفي الجزء العلوي لشعبته الانسية من الاسفل. والتي من حدبة الوريكي تنحدر عمودياً الى الاسفل وتنتهي عند الثلث السفلي للفخذ بوتر مستدير يندغم في الحدبة التي

عضلات الجهة الانسية للفخذ

يتمد من مفصل الركبة خلف الرضفة الى الاعلى. وقد تكون هذه العضلة مختلطة بالفخذية اعصاب الشادة لغد الفخذ من العصب الالوي العلوي. وما بقي من عضلات هذه الجهة من العصب المقدم للفخذ

عملها. الشادة لغد الفخذ شادة للفاقة العريضة. فاذا ادامت عملها ادارت الفخذ الى الانسية نظراً الى انحراف اتجاه اليافها. واذا عملت من الاسفل وكان الجسد منتصباً ثبتت الحوض على راس الفخذ. والخياطية تقبض الساق على الفخذ فاذا ادامت عملها قبضت الفخذ على الحوض جاذبة الطرف السفلي الى الانسية فيصالب الطرف الاخر كما يفعل الخياط ومنه اسمها. واذا عملت من ارتباطها السفلي قبضت الحوض على الفخذ. والباسطة الرباعية الرؤوس تبسط الساق على الفخذ. فاذا ثبتت ارتباطها في الساق عملت على عظم الفخذ وسندته منتصباً على راس القصبه فحلت جميع ثقل الجسد. والمستقيمة تعين الصليبية والحرقفية في حمل الحوض والجذع على الفخذ او في حنيه الى الجهة المقدمة

الجهة الانسية للفخذ

الرقبة - المشطية - المقربة الطويلة - المقربة القصيرة - المقربة الكبيرة

الرقبة اقرب هذه العضلات الى السطحية وهي رقيقة مسطحة عريضة من الاعلى ضيقة ومستدقة من الاسفل. منشأها بصفاق رقيق عرضه قيراطان او ثلاثة من الحافة الباطنة لفرع العظم العاني وفرع الوري. تنج اليافها عمودياً الى الاسفل وتنتهي بوتر مستدير يمر خلف العقدة الانسية للفخذ ثم ينحني حول الحدبة الانسية للقصبه ويتفرطح ويندغم في الجزء العلوي للوجه الانسي من جسم القصبه تحت الحدبة وتحت مندغم الخياطية واعلى الوترية النصف. ويفصل هذا الوتر عن الرباط الجانبي الانسي كيس زلاي. مجاورتها. من الظاهر للفاقة العريضة والخياطية من الاسفل. ويقاطعها عند جزئها السفلي الوريد الصافن الانسي مستقراً على ظاهر الفاقة العريضة. ومن الباطن للمقربات الثلاث والرباط الجانبي الانسي لمفصل الركبة وانما يفصلها عنه كيس مخاطي

والمشطية عضلة مسطحة مربعة الزوايا موضوعة في الجزء المقدم للجهة العليا والانسية من الفخذ. منشأها من الحنط الحرقفي المشطي ومن الوجه العظمي الواقع بين الارتفاع المشطي وشوكة العاني. تنج اليافها الى الاسفل والخلف والوحشية وتندغم بنحط يتمد من المدور الصغير الى الحنط الحشن. مجاورتها. من وجهها المقدم للجزء العاني من الفاقة العريضة الذي يفصلها عن الاوعية

عريض غليظ يشغل الثلثين السفليين لوجهها الباطن ثم يضيق ويصير وترًا مسطحًا يندغم بالرضفة مع المتسعيتين والفخذية . مجاورتها . من الظاهر للالياف المقدمة من الالوية المتوسطة والشادة لغد الفخذ والخياطية والصلبية والحرقفية ومن ثلاثة ارباعها السفلى للنافة العريضة . ومن الباطن لمفصل الورك والاوعية الظاهرة المنعكفة والفخذية والمتسعيتين

والمتسعة الوحشية اعظم العضلات الاربع . منشأها بصفاق عريض يرتبط بالحافة المقدمة للمدور الكبير ويحيط افي على وجهه الظاهر ويحيط بمتد من المدور الكبير الى الخط الخشن ويجمع طول الشفة الوحشية للخط الخشن . وهذا الصفاق يغطي الثلاثة الارباع العليا للعضلة المذكورة ومن وجهه الباطن ينشأ كثير من اليافها التي ترتبط بصفاق متين موضوع في الوجه الباطن لهذه العضلة عند جزئها السفلي ثم يضيق ويصير وترًا مسطحًا يندغم بالجزء الوحشي للحافة العليا من الرضفة مختلطًا بالوتر العظيم الباسط . مجاورتها . من الظاهر للمستقيمة والشادة لغد الفخذ والنافة العريضة والالوية العظيمة التي يفصلها عنها كيس زلالي . ومن الباطن للفخذية وانما يتوسط بينهما بعض فروع الشريان المنعكف الوحشي والعصب الفخذي المقدم


والمتسعة الانسية والفخذية تُعدان عضلة واحدة اذ لا يمكن فصل الواحدة عن الاخرى . وانما اصطلاحوا على تسمية جزءها المقدم الفخذية وجزءها الانسي الانسية . منشأها بصفاق يرتبط بالجزء السفلي للخط الذي يمتد من الجانب الانسي لعنق الفخذ الى الخط الخشن . وتنشأ ايضاً من جميع طول الشفة الانسية للخط الخشن . ومن الفاصل الانسي بين العضلات ومن الوجوه الانسية والمقدمة والوحشية لجسم الفخذ . وتجمع الالياف وتصير صفاقاً عريضاً يضيق اولاً ثم يندغم في الرضفة . مجاورتها . من الظاهر للصلبية والحرقفية والمستقيمة والخياطية والمشطية والمقربات والنافة العريضة والاوعية الفخذية والعصب الصافن . ومن الباطن لعظم الفخذ وتحت الفخذية والغشاء الزلالي لمفصل الركبة

وانتار هذه العضلات الاربع تتحد في الجزء السفلي للفخذ وتصير وترًا واحدًا متيناً يندغم بالجزء العلوي للرضفة . والاصح من ذلك ان تعتبر الرضفة كعظم سمائي متولد ضمن وتر رباعية الرؤوس وان الرباط الرضفي الذي يمتد من الرضفة الى حذبة القصبه انما هو امتداد هذا الوتر . ويفصل هذا الوتر عن الجزء العلوي من الحذبة المذكورة كيس زلالي

والعضلة تحت الفخذية صغيرة تكون في الغالب ممتازة عن العضلة السطحية . منشأها من الوجه المقدم للجزء السفلي من جسم الفخذ وتندغم في الجزء العلوي للجراب الزلالي الذي

لان حافتها الانسية هي الدليل الاعظم لرباط هذا الوعاء. ففي الثلث العلوي للفخذ تكون الساق الوحشي لخلاء مثلث ساقه الانسي حافة المقربة الطويلة وساقه العلوي رباط شكل ١٥٢

يويارت وهو قاعدة المثلث المذكور ويسير الشريان الفخذي في مركز هذا الخلاء من قاعدته الى راسه. وفي الثلث المتوسط للفخذ يسير الشريان الفخذي اولاً بجانب الحافة الانسية ثم تحت هذه العضلة. مجاورتها. من الظاهر للفاقة العريضة والجلد. ومن الباطن للحرقفية والصلبية والمستقيمة والمتسعة الانسية والعصب الفخذي المقدم وغمد الاوعية الفخذية والمقربة الطويلة والمقربة الكبيرة والرقيقة والعصب الصافن الطويل والرباط الجانبي الانسي لمفصل الركبة



والباسطة الرباعية الرؤوس تشتمل على العضلات الاربع الباقية الواقعة في مقدم الفخذ وجانبيه فهي بالحقيقة كرووس تنتهي جميعها بوتر واحد يندغم بالقصبة. فالراس الذي يشغل وسط الفخذ يقال له المستقيمة الفخذية. والراس الذي يشغل الجانب الوحشي للفخذ المتسعة الوحشية. والذي يشغل الجانب الانسي المتسعة الانسية. والذي يشغل مقدم الفخذ الفخذية. وانما الراسان الاخيران مختلطان بحيث يتكون منها عضلة واحدة ولذلك سمي المعلم كروفيلديه هذه العضلة ثلاثية الرؤوس.

وفيها مشابهة عجيبة لثلاثية الرؤوس العضدية فان راسها المتوسط طويل يرتبط بالحرقفي كالراس الطويل للعضدية الذي يرتبط باللوح وراسها الانسي والوحشي يرتبطان بحجم الفخذ كما ان الراسين الانسي والوحشي لثلاثية الرؤوس العضدية يرتبطان بحجم العضد. هذا ووظيفتها واحدة فانها باسطان

فالمستقيمة الفخذية موضوعة في وسط الجهة المقدمة للفخذ والياها مرتبة على الشكل الريشي المزدوج. منشأها بوترين احدهما مستقيم يرتبط بالتوا الشوكي المقدم السفلي للحرقفي. والثاني مسطح منحني الى الوحشية يرتبط بميزاب اعلى شفة الحق الحرقفي فهو الوتر المنعكس للمستقيمة. ويتحد الوتران على زاوية حادة ومن انبساطها تنشأ الالياف العضلية. وتنتهي هذه العضلة بصفاق

شكل ١٥٢ عضلات مقدم الفخذ ١ عرف العظم الحرقفي ٢ تنوه الشوكي المقدم العلوي ٣ الالوية المتوسطة ٤ النادة لغمد الفخذ وشاهد مندغها من الاسفل في اللفاقة العريضة ٥ الحياطة ٦ المستقيمة ٧ المتسعة الوحشية ٨ المتسعة الانسية ٩ الرضفة ١٠ الحرقفية الباطنة ١١ الصلبة الكبيرة ١٢ المشطية ١٣ المقربة الطويلة ١٤ بعض المقربة الكبيرة ١٥ الرقيقة

والوريد الصافن الانسي. فالطبقة السطحية امتداد البطنية والباطنة امتداد من رباط بويارت. وهذه الطبقة الباطنة من اللفافة السطحية ملتصقة باللفافة الغائرة ومثقوبة ثقوباً كثيرة لمرور اوعية دموية وليمفاوية فتسمت لذلك باللفافة الغربالية

واللفافة الغائرة للفخذ موضوعة تحت اللفافة السطحية وتسمى باللفافة العريضة. وهي غليظة في الجزء العلوي والوحشي للفخذ حيث ياتيها انبساط ليفي من الالوية العظيمة وحيث تندغم بين طبقاتها الشادة لغمد الفخذ وحول الركبة حيث تاتيها انبساطات ليفية من اوتار العضلات المارة عليها هناك ارتباطها من الاعلى برباط بويارت والعرف الحرقفي. ومن الخلف بحافة العجز والعصعص. ومن الانسية بالقوس العاني والخط المشطي. ومن الاسفل بالاجزاء البارزة حول الركبة كالعقدتين للفخذ وحدبتي القصبية وراس الشظية. وترسل هذه اللفافة زوائد تفصل بين عضلات هذه الجهة. وفي الأربية اسفل رباط بويارت يُشاهد فيها ثقب كبير يضي الشكل يمر منه الوريد الصافن الانسي. وهذا الثقب مكوّن من الجزء الحرقفي لهذه اللفافة الذي يسير الى مُدَمِّم الاوعية الفخذية والجزء العاني الذي يسير الى الخلف منها

والشادة لغمد الفخذ عضلة قصيرة مسطحة موضوعة على الجانب العلوي والوحشي للفخذ. منشأها من الجزء المقدم للشفة الظاهرة من العرف الحرقفي ومن الوجه الظاهر للنتو الشوكي المقدم العلوي بين الالوية المتوسطة والخياطية. تنجّه بانحراف الى الاسفل وقليلاً الى الخلف وتندغم باللفافة العريضة في منتهى الربع الاول للجانب الوحشي من الفخذ. مجاورتها. من الظاهر لللفافة العريضة والجلد. ومن الباطن للالوية المتوسطة والمستقيمة الفخذية والمتسعة الوحشية والفروع الصاعدة للشريان المعكف الوحشي. ومن حافتها المقدمة للخياطية التي يفصلها عنها من الاسفل خلاء مثلث تُشاهد فيه المستقيمة الفخذية. ومن حافتها الخلفية للالوية المتوسطة

والخياطية اطول عضلات الجسد مسطحة ضيقة. منشأها بالياض وترية من النتو الشوكي المقدم العلوي للترقي ومن النصف العلوي للشرم الذي اسفله. تنجّه بانحراف الى الاسفل معارضة للجزء العلوي والمقدم من الفخذ من الجانب الوحشي الى الجانب الانسي ثم تتحد رعمودياً الى الجانب الانسي من الركبة ذاهبة خلف العقدة الانسية لعظم الفخذ وتنتهي بوتر ينحني بانحراف الى المقدم وينبسط فيصير صفاقاً ثم يندغم في الجزء العلوي للوجه الانسي من جسم القصبية. وهذا الانبساط يغطي مندغم الرقيقة والوترية النصف ويرسل زائدة تخالط بالرباط المحفظي لمفصل الركبة وزائدة اخرى تخالط بلفافة انسي الساق. ويجب الانتباه الكلي الى مجاورة هذه العضلة للشريان الفخذي

بالاعصاب الشوكية والغدد القطنية التي الوريد الاجوف عن يمينها والاورطي عن يسارها .
واما في الفخذ فجاورتها من المقدم للنافقة العريضة ومن الخلف للرباط المحفظي الوريكي . ومن
حافتها الانسية للعضلة المشطية والشريان الفخذي . ومن حافتها الوحشية للعصب الفخذي
والعضلة الحرقفية

والصلبية الصغيرة عضلة طويلة دقيقة موضوعة الى مقدم سابقتها . منشأها من جانب
جسمي الفقرة الظهرية الاخيرة والقطنية الاولى ومن الغضروف المتوسط بينهما . تنتهي بوتر طويل
مسطح يندغم في الارتفاع الحرقفي المشطي . وهذه العضلة نادرة الوجود تُشاهد في جنه واحدة
من عشرين على ما حققه المعلم نيل . مجاورتها تستقر على الصليبية الكبيرة ويغطيها البريتون
والحرقفية عضلة مسطحة مشععة شاغلة لجميع الحفرة الحرقفية الباطنة . منشأها من الحفرة
الحرقفية والشفة الباطنة للعرف الحرقفي . والى الخلف من الرباط الحرقفي القطني وقاعدة العجز .
والى المقدم من الشوكتين المقدمتين العليا والسفلى للعظم الحرقفي ومن الشرم الفاصل بينهما .
تجتمع اليافها وتندغم بالجانب الوحشي لوتر الصليبية وبعضها يتزل ويندغم بالخط المنحرف الذي
يمتد من المدور الصغير الى الخط الحشن . مجاورتها في باطن الحوض . من وجهها المقدم للنافقة
الحرقفية التي تفصلها عن البريتون والعصب الجلدي الوحشي . ومن اليمين للاعور . ومن اليسار
للتعريج السيني للقولون . ومن وجهها الخلفي للحفرة الحرقفية . ومن حافتها الانسية للصليبية الكبيرة
والعصب الفخذي المقدم . ومجاورتها في الفخذ من وجهها المقدم للنافقة العريضة والمستقيمة والخياطية
والى الخلف للرباط المحفظي الوريكي

اعصاب الصليبتين من الفروع المقدمة للاعصاب القطنية . والحرقفية من الفخذي المقدم
عملها . اذا عملت الصليبية والحرقفية من الاعلى قبضتا الفخذ على الحوض وادارتا عظم الفخذ الى
الوحشية نظراً الى كون مندغمها في الجهة الانسية والخلفية لهذا العظم . فاذا اتبنت الفخذ وعملت من
الاسفل جذبتنا الجزء السفلي من العمود والحوض الى الامام . وتعيينان في حفظ الجسد منتصباً وفي
رفع الجذع اذا كان الجسد مستلقياً على الظهر

الجهة الفخذية المقدمة

الشادة لغمد الفخذ - الخياطية - المستقيمة - المنسعة الوحشية - المنسعة الانسية - الفخذية - تحت الفخذية

اللفافة السطحية للفخذ محيطة بجميع الطرف السفلي بخللها مواد دهنية ويمكن فصلها الى طبقتين
او اكثر . وتوجد بين طبقاتها الاعوية والاعصاب السطحية وفي الأريية العند الأريية السطحية

ومنشأها ومنشأ الباطنيين من العقدة الوحشية او من الجانب الكعبري للمساعد . والعقدة الانسية ابرز من الوحشية ترتبط بها الفوايض والكابتان والعقدة الوحشية اقصر من الانسية ترتبطها اليواسط والباطنجان

عضلات ولفائف الطرف السفلي

الجهة الحرقفية

الصلبية الكبيرة - الصلبية الصغيرة - الحرقفية

اللفافة الحرقفية طبقة صفاقية تبطن الجهة الخلفية للتجويف البطني وتحيط بالعضلة الصلبية والحرقفية الى جميع مسافتهما . وهي رقيقة من الاعلى غليظة عند القوس النخذي . تقسم الى قسمين قسم منها يحيط الصلبية وقسم يحيط الحرقفية . فاذا حصل تجمعات صديدية من تسويس بعض الفقرات السفلى نفذ الصديد الى غمد الصلبية وانحدر معها الى الاسفل تحت رباط يويارت وتجمع في اصل النخذ حيث تندغم العضلة المذكورة وخرج هناك من الجلد بدون ان يشق البريتون او يس الاوعية النخذية الا انه يفعل على العضلة المذكورة فتمنى شيئاً فشيئاً

والصلبية الكبيرة (بسواس) عضلة طويلة مغزلية الشكل موضوعة على جانب الجهة القطنية للعمود الفقري وعلى حافة الحوض . منشأها من جانب اجسام الفقرة الظهرية الاخيرة وجميع الفقرات القطنية ومن الغضاريف بين الفقرات ومن مقدم قواعد التتوات المستعرضة للفقرات المذكورة . وتتصل هذه العضلة باجسام الفقرات بواسطة خمس فسح ترتبط كل فسحة منها بالحافة السفلى للقرة وبالحافة العليا للقرة التي اسفلها وبالغضروف الواقع بين الفقرتين . وتتصل الفسح بعضها ببعض بواسطة اقواس وترية تسير من تحتها الشرايين القطنية وفروع من العصب السيمبانوي فتحفظها من الانضغاط مدة عمل هذه العضلة . ومن هذا المنشأ نجه اليافها الى الاسفل معارضة لحافة الحوض وتصغر في الحجم وتسير تحت رباط يويارت وتنتهي بوتر قبل الياف الحرقفية ويندغم بالمحور الصغير لعظم النخذ . مجاورتها في الجهة القطنية . من وجهها المقدم الموضوع خلف البريتون للرباط القوسي الانسي والكلية والصلبية الصغيرة والوعية الكلوية والحالب والوعية المنوية والعصب التناسلي النخذي والقولون وعند حافتها الحوضية للشريان والوريد الحرقفيين الاصليين والظاهرين . ومن وجهها الخلفي للتتوات المستعرضة للفقرات القطنية والمربعة القطنية . واما الضفيرة القطنية فواقعة في الجزء الخلفي من جوهر العضلة . ومن جانبها الانسي لاجسام الفقرات القطنية والشرايين القطنية والعقد السيمبانوية وفروعها المتواصلة

كل وتر منها بصفاق عريض يندغم بالانبساط الوتري من الباسطة المشتركة للاصابع الذي يغطي الوجه الظهري لكل اصبع

والعضلات الراحية بين العظام ثلاث موضوعة على الوجه الراجي للعظام المشطية الثاني والرابع والخامس والى جانبها . تنشأ من العظم المشطي وتندغم بجانب قاعدة السلامي الاولى وبالصفاق المنبسط من وتر الباسطة المشتركة لذلك الاصبع الذي تنشأ منه . فالاولى للسبابة والثانية للبنصر والثالثة للخنصر . وليس للوسطى منها عضلة راحية

والعضلات الظهرية بين العظام اربعة شاغلة للاخلية الموجودة بين العظام المشطية وهي اكبر من الراحية شكلها ريشي مزدوج . منشأها برأسين من الجانبين المتجاورين للعظام المشطية وتندغم بقاعدة السلاميات الاول وبصفاق وتر الباسطة المشتركة للاصابع . وبين الرأسين لهذه العضلات خلاء ضيقٌ مثلث الشكل يمر منه فرع شرياني من القوس الغائر الراجي . فتندغم الاولى بالسبابة والثانية والثالثة بالوسطى والرابعة بالبنصر . وليس للخنصر منها عضلة ظهرية اعصاب الخراطيتين الوحشيتين من المتوسط وما بقي من عضلات هذا المجموع من

الزندي

عملها . الظهرية بين العظام تبعد الاصابع عن خط وهي يسير طولاً في مركز الوسطى . والراحية بين العظام تقربها الى الخط المذكور

تنبيه . قد يتسهل للتلميذ حفظ عضلات الساعد واليد اذا قُسمت الى ثلاثة اقسام وهي اولاً العضلات التي تفعل على اليد ثانياً التي تفعل على مجموع الاصابع ثالثاً التي تفعل على اصابع مفردة
١ فالعضلات التي تفعل على اليد عشرة تقسم الى ثلاث قوايض وثلاث بواسط وكأثرين وبالحنين . فالقوايض ثلاث القابضة الكعبية للرسغ والراحية الطويلة والقابضة الزندية للرسغ . والبواسط ثلاث الباسطة الكعبية الطويلة للرسغ والباسطة الكعبية القصيرة للرسغ والباسطة الزندية للرسغ . والكابتان الكابة المستديرة للكعبية والكابة المربعة . والباطختان الباطخة الطويلة للكعبية والباطخة القصيرة للكعبية
٢ والعضلات التي تفعل على مجموع الاصابع ثلاث قابضتان وباسطة وهي القابضة السطحية للاصابع والقابضة الغائرة للاصابع والباسطة المشتركة للاصابع

٣ والعضلات التي تفعل على اصابع مفردة تقسم الى ثلاثة اقسام ١ التي تفعل على الابهام ٢ التي تفعل على السبابة ٣ التي تفعل على الخنصر . فالتى تفعل على الابهام ثمانية ثلاث قوايض القابضة لمشطي الابهام (المقاومة للابهام) والقابضة الطويلة للابهام والقابضة القصيرة له وثلاث بواسط الباسطة لمشطي الابهام والباسطة الاولى والباسطة الثانية للابهام ومقربة واحدة ومبعدة واحدة . والتي تفعل على السبابة واحدة هي الباسطة للسبابة . والتي تفعل على الخنصر اربع قابضة وباسطة ومقربة (مقاومة) ومبعدة . هذا وان القوايض والكابتين وضعهما على مقدم الساعد ومنشأها من العقدة الانسية او من الجانب الزندي للساعد . وان البواسط وضعها في الجهة الخلفية من الساعد

والمبعدة للخنصر موضوعة على المحافة الزندية لراحة اليد . منشأها من العظم البسلي ومن انبساط الوتر القابضة الزندية للرسغ . تنتهي بوتر مسطح يندغم بالجانب الزندي لقاعدة سلامي الخنصر الأولى


والقابضة القصيرة للخنصر تنشأ من رأس التو الكلاي للعظم الكلاي ومن الوجه المقدم للرباط الحلقى وتندغم بقاعدة السلامي الأولى للخنصر مع سابقتها . وحيثما لا توجد والمقاومة للخنصر شكلها مثلث موضوعة تحت العضلات السابقة . منشأها من التو الكلاي للعظم الكلاي وما يجاوره من الرباط الحلقى . توجه اليافها الى الاسفل والانسية وتندغم بجميع المحافة الزندية لمشطي الخنصر

اعصاب جميع عضلات هذا المجموع من العصب الزندي عملها يُعرف من اسمائها . الراحية القصيرة تجعد الجلد على الجانب الانسي لراحة اليد


عضلات الجهة الراحية المتوسطة

المخراطينية الراحية بين العظام الظهرية بين العظام

العضلات المخراطينية اربع حزم لحمية صغيرة اضافية للقابضة الغائرة للاصابع . منشأها



شكل ١٥٢




شكل ١٥١

من اوتار القابضة الغائرة للاصابع وتسير الى الجانب الكعبري من الاصابع المقابلة لها وينتهي

شكل ١٥١ العضلات الراحية بين العظام ١ العضلة الراحية بين العظام الاولى وفي المقربة للسبابة ٢ العضلة الراحية الثانية وفي المقربة للبصر ٣ العضلة الراحية الثالثة وفي المقربة للخنصر

شكل ١٥٢ العضلات الظهرية بين العظام ١ العضلة الظهرية بين العظام الاولى وفي المبعدة السبابة ٢ و٣ العضلتان الظهريتان الثانية والثالثة وهما المبعدتان للوسطى ٤ العضلة الظهرية الرابعة وفي المبعدة للبصر

المربع المنحرف والثلاثين الوحشيين للرباط الحلقى. والقسم الغائر منشأه شكل ١٥٠



من الشبيه بالمربع والعظم الكبير وقاعدة المشطي الثالث. وهذان القسمان يتحدان ثم ينقسمان الى قسمين ايضاً بندغان بجاني قاعدة السلامى الاولى للايهام فيتحد القسم الوحشى بالمبعدة للايهام والانسي بالمقربة له. يتولد عظم سمسالي في كل وتر منها مقابل المفصل المشطي السلامى. مجاورتها. من الظاهر للفاقة الراحية. ومن الباطن للمقربة للايهام ولوتر القابضة الكعبية للرسغ. ومن الوحشية للمقاومة للايهام. ومن الانسية لوتر القابضة الطويلة للايهام

والمقربة للايهام اعنى هذه العضلات وضعاً. شكلها مثلث ومنشأها من الوجه الراجى لمشطي السبابة. تتجه اليافها الى الوحشية وتندغم بالجانب الزندي لقاعدة السلامى الاولى من الايهام. مجاورتها. من الظاهر للقابضة القصيرة للايهام واوتار القابضة الغائرة والعضلات الخراطينية. ومن الباطن تغطي الخلائىن الاولين بين العظمين اللذين تنفصل عنهما بواسطة صفاق متين اعصاب المبعدة والمقاومة والراس الوحشى للقابضة القصيرة للايهام من العصب المتوسط. والراس الانسي للقابضة القصيرة والمقربة من العصب الزندي عملها يعرف من اسمائها

عضلات الخنصر

الراحية القصيرة - المبعدة للخنصر - القابضة القصيرة للخنصر - المقاومة للخنصر

الراحية القصيرة عضلة رقيقة مربعة الجوانب موضوعة تحت الجلد الى الجانب الزندي من اليد. منشأها من الرباط الحلقى والفاقة الراحية. تتجه اليافها افقياً الى الانسية وتندغم بالجلد على الحافة الانسية لراحة اليد

شكل ١٥٠ عضلات اليد ١ الرباط الحلقى ٢ منشأه وندغم المبعدة للايهام وقد قُطع جزءها المتوسط ٣ القابضة لمشطي الايهام وهي المقاومة له ٤ القسم السطحي للقابضة القصيرة للايهام ٥ قسمها الغائر ٦ المقربة للايهام ٧ و٧ عضلات خراطينية ناشئة من اوتار القابضة الغائرة للاصابع. واما القابضة السطحية فقد قطعت ٨ احد اوتار القابضة الغائرة ماراً بين فئحتي وتر القابضة السطحية ليندغم في السلامية الاخيرة ٩ وتر القابضة الطويلة للايهام ماراً بين قسمي القابضة القصيرة له الى السلامية الاخيرة ١٠ المبعدة للخنصر ١١ القابضة القصيرة للخنصر ١٢ العظم السبلي ١٣ الظهريه الاولى من العضلات بين العظام وهي المبعدة للسبابة

واللفافة الراحية غمد عامٌ محيط بعضلات اليد مؤلفة من قسم مركزي وقسمين جانبيين. فالقسم المركزي يشغل وسط الراحة شكلةً مثلث متين يثبت اوتار هذه الجهة. وهو ضيق من الاعلى يرتبط بالحافة السفلى للرباط الحلقي ويقبل انبساط وتر الراحية الطويلة. ومن الاسفل عريض منبسط وينقسم مقابل رؤوس العظام المشطية الى اربع فسخ للاصابع الاربعة. وهذه اللفافة ملتصقة بالجلد بواسطة حزم ليفية وتنشأ من حافتها الانسية الراحية القصيرة وتغطي القوس الراجي السطحي اوتار العضلات القوابض وفروع العصب المتوسط والعصب الزندي. والقسمان الجانبيان لهذه اللفافة طبقتان رقيقتان ليفيتان تغطيان في الجانب الكعبري عضلات الابهام وفي الجانب الزندي عضلات الخنصر وهما امتداد القسم المركزي من جهة واللفافة الظهيرية من جهة اخرى

عضلات اليد

تقسم عضلات اليد الى ثلاثة مجاميع اولاً عضلات الابهام التي تشغل الجانب الكعبري ثانياً عضلات الخنصر التي تشغل الجانب الزندي ثالثاً عضلات وسط الراحة والاخلية بين العظام

عضلات الابهام

المبعدة للابهام - المقاومة للابهام - القابضة القصيرة للابهام - المفربة للابهام

المبعدة للابهام عضلة رقيقة مسطحة وضعها تحت الجلد. منشأها من الخط الذي على العظم المربع المنحرف ومن الرباط الحلقي. تنجى الى الوحشية والاسفل وتندغم بوتر مسطح في الجانب الكعبري لقاعدة السلامى الاولى من الابهام. مجاورتها. من الظاهر لللفافة الراحية. ومن الباطن للمقاومة للابهام. ومن حافتها الانسية للقابضة القصيرة للابهام

والمقاومة للابهام صغيرة مثلثة موضوعة تحت سابقتها. منشأها من الوجه الراجي للمربع المنحرف والرباط الحلقي. تنجى الى الاسفل والوحشية وتندغم بجميع طول الجانب الكعبري للابهام. مجاورتها. من الظاهر للمبعدة للابهام. ومن الباطن للفصل الواقع بين المربع المنحرف والمشطي. ومن حافتها الانسية للقابضة القصيرة للابهام

والقابضة القصيرة للابهام موضوعة تحت العضلتين السابقتين واكبر منهما. تاليفها من قسمين يمر بينهما وتر القابضة الطويلة للابهام. فالقسم المقدم اقرب الى السطحية منشأه من العظم

عضلات اليد ولفائفها

منشأها من الوجه الخلفي للكعبرة اسفل منشأ سابقتها ومن الغشاء بين العظمين . مسيرها مصاحب
لسابقتها وتندغم بقاعدة السلامية الاولى للابهام

والباسطة الثانية للابهام اكبر كثيراً من سابقتها وتغطي منشأها . تنشأ من الوجه الخلفي
للزند اسفل منشأ الباسطة لمشطي الابهام ومن الغشاء بين العظمين وتنتهي بوتر يسير من
الرباط الخلفي موضوع في ميزاب على الوجه الخلفي للطرف السفلي من الكعبرة ويندغم بقاعدة
السلامي الاخيرة للابهام

والباسطة للسبابة عضلة ضيقة مستطيلة موضوعة الى الجانب الانسي من سابقتها على
خط موازي لها . منشأها من الوجه الخلفي لجسم الزند اسفل منشأ الباسطة الثانية للابهام ومن الغشاء
بين العظمين . يصاحب وترها الباسطة المشتركة للاصابع فيمران في قناة واحدة من الرباط
الخلفي ثم وتر هذه العضلة الذي يختص بالسبابة ثم يندغم في السلامي الثانية والثالثة للسبابة
اعصاب الباطحة الطويلة والباسطة الكعبرية الطويلة للرسغ والمرفقية من العصب العضلي
المغزلي . وما بقي من عضلات الجهة الكعبرية والجهة الخلفية للساعد من العصب الخلفي بين
العظمين

اعمال هذه العضلات تعرف من اسمائها وسياتي الكلام عليها ايضاً

عضلات اليد ولفائفها

الرباط الخلفي المقدم رباط متين ليفي يتقوس على الرسغ ويجول الميزاب العميق المكوّن
من الوجه المقدم للرسغ الى قناة تمر منها اوتار القوايض للاصابع والعصب المتوسط ويقاطع سطح
الرباط وترّ الراحية الطويلة والشريان والعصب الزنديان . ارتباطه من الانسية بالعظم البسلي
وبالتو الكلاي للعظم الكلاي ومن الوحشية بالزورقي والمربع المنحرف . وهو امتداد لفافة الساعد من
الاعلى واللفافة الراحية من الاسفل ويندغم باعلاه وتر القابضة الزندية للرسغ وتنشأ من حافته
السفلى العضلات الصغيرة للابهام والمخنصر . والرباط الخلفي الخلفي ممتد عرضاً على الوجه الخلفي
للرسغ وهو امتداد لفافة الساعد . ارتباطه من الانسية بالزند والهرمي والبسلي وبالفافة الراحية
ومن الوحشية بالكعبرة . وفيه ستة ثقوب يبطن كل واحد منها غشاء زلاي خاص به . وترّ من
هذه الثقوب اوتار البواسط

الرباط الخلفي ويندغم في قاعدة مشطي الخنصر
والمرقئية عضلة صغيرة مثلثة وضعها خلف المفصل المرفقي واسفله ويظهر انها امتداد الراس
الوحيثي لثلاثية الرؤوس. منشأها بوتر خاص بها من الجزء الخلفي للعقدة الوحشية من العضد.
وتندغم في جانب التتو المرفقي وفي الثلث العلوي للوجه الخلفي من جسم الزند


الجهة الخلفية للساعد

الطبقة الغائرة

الباطحة القصيرة - الباسطة لمشطي الابهام - الباسطة الاولى للابهام - الباسطة الثانية للابهام - الباسطة للسبابة

الباطحة القصيرة عضلة اسطوانية الشكل تنحني حول الثلث العلوي

شكل ١٤٩




للكعبرة. منشأها من العقدة الوحشية للعضد ومن الرباط الوحيثي الجانبي
والرباط المحيط الكعبري ومن خط منحرف في الزند يمتد الى الاسفل من
الطرف الخلفي للحفرة السينية الصغيرة. اليافها العليا تحيط عنق الكعبرة
وتندغم في الجهة الخلفية لوجهها الانسي. واليافها المتوسطة تندغم بالحافة
الوحشية لحدة ذات الرأسين. واليافها السفلى بالخط المنحرف الى مندغم
الكتابة المستديرة. مجاورتها. من الظاهر للعضلات الباطحة والبواسط
السطحية والوعية والعصب الكعبرية. ومن الباطن للمفصل المرفقي والغشاء
بين العظمين والكعبرة

والباسطة لمشطي الابهام موضوعة تحت الباطحة القصيرة وقد
تخلط بها وهي اعظم البواسط الغائرة جرماً ووجهها الى الوحشية. منشأها
من الوجه الخلفي للزند اسفل مندغم المرفقية ومن الغشاء بين العظمين
ومن الثلث المتوسط للوجه الخلفي للكعبرة. توجه الى الاسفل والوحشية وتنتهي
بوتر يسير في الميزاب الوحيثي للتتو الابري الكعبري مع وتر الباسطة الاولى
للابهام ويندغم بقاعدة العظم المشطي للابهام

والباسطة الاولى للابهام اصغر عضلات هذه الجهة وضعها الى الجانب الانسي من سابقتها.

شكل ١٤٩ عضلات الطبقة الغائرة للجهة الخلفية من الساعد. ١ العضد ٢ التتو المرفقي ٣ الزند ٤ المرقئية ٥ الباطحة
القصيرة ٦ الباسطة لمشطي الابهام ٧ الباسطة الاولى للابهام ٨ الباسطة الثانية للابهام ٩ الباسطة للسبابة ١٠ العضلة الاولى
من العضلات الظاهرية بين العظام

ينقسم وترها في ظهر اليد الى قسمين ثم يختلطان عند مفصل المشطي السلامي بوتر من اوتار
الباسطة المشتركة ويندغم بالسلامية الثانية والثالثة للخنصر



شكل ١٤٨



شكل ١٤٧

والباسطة الزندية للرسغ اقرب العضلات الواقعة على الجانب الزندي للسطحية .
منشأها من العقدة الوحشية من الوتر المشترك ومن الثلث المتوسط للحافة الخلفية من الزند اسفل
مندغم المرفقية ومن لفافة الساعد . وتنتمي بوتر يسير في ميزاب خلف التواء ابري للزند ثم من

شكل ١٤٧ عضلات الطبقة السطحية لليئة الخافية من الساعد ١ ذات الراسين ٢ العضدية المقدمة ٣ الطرف السفلي
لثلاثية الرؤوس المندغم في التواء المرفقي ٤ الباسطة الطويلة ٥ الباسطة الكعبية الطويلة للرسغ ٦ الباسطة الكعبية القصيرة
للرسغ ٧ وترها تين العضلتين اللذان يندغان في مشطي السبابة والوسطى ٨ الباسطة المشتركة للاصابع ٩ الباسطة للخنصر
١٠ الباسطة الزندية للرسغ ١١ المرفقية ١٢ القابضة الزندية للرسغ ١٣ الباسطة لمشطي الابهام والباسطة الاولى للابهام يتجاورتين
١٤ وتر الباسطة الثانية للابهام مقاطعاً لوتري الباسطتين الكعبريتين للرسغ ١٥ الرباط الخلفي الخفي . وتساعد اوتار الباسطة
المشتركة على ظهر اليد والاصابع

شكل ١٤٨ كيفية اندغام الاوتار بواسطة للاصابع ١ مشطي الوسطى ٢ الوتر الباسط الذي يتشراولاً على هيئة صفاق
ثم ينقسم الى ثلاث فسخ فسخة متوسطة وفتحتان جانبيتان ٣ الفسخة المتوسطة التي تندغم في قاعدة السلامية الثانية ٤ الفتحتان
الجانبيتان اللتان تندغان في قاعدة السلامية الثالثة ٥ وه عضلمان من العضلات الظهيرية بين العظام . ويناهد شكلها الريشي
المزدوج ٦ و٦ وتندغان بجانب صفاق وتر الباسطة المشتركة ٧ المخراطينية الثانية مندغمة بجانب الوتر الباسط

تنتهي اليافها عند الثالث العلوي للساعد بوتر مسطح يسير بجانب الحافة الوحشية للكعبرة تحت اوتار البواسط للابهام ثم في ميزاب مشترك بينها وبين القصيرة بهذا الاسم وراء التوالا بري ويندغم في الجانب الكعبري لقاعدة مشطي السبابة . مجاورتها . من الظاهر للباطحة الطويلة ولقافة الساعد . ومن جانبها الوحشي تقاطعها اوتار بواسط الابهام . ومن الباطن لمنفصل المرفق والقصيرة بهذا الاسم والجزء الخلفي للرسغ

والباسطة الكعبرية القصيرة للرسغ اقصر واغلاظ من سابقتها وموضوعة تحنها . منشأها بوتر مشترك بينها وبين ثلاث عضلات اخر بواسط من العقدة الوحشية للعضد ومن الرباط الجانبي الوحشي لمنفصل المرفق ومن صفاق متين يغطي وجهها السطحي ومن الفاصل بين العضلات . تنتهي اليافها نحو منتصف الساعد بوتر مسطح ملتصق بوتر سابقتها ومصاحب له في الميزاب الواقع على الوجه الخلفي للكعبرة ثم يسير تحت الرباط الخلفي ويندغم في الوجه الكعبري لقاعدة مشطي السبابة بقرب سابقتها . مجاورتها . من الظاهر للطويلة بهذا الاسم وتقاطعها اوتار بواسط الابهام . ومن الباطن للباطحة القصيرة ووتر الكاوية المستديرة والرسغ . ومن حافتها الزندية للباسطة المشتركة للاصابع

الجهة الخلفية للساعد

الطبقة السطحية

الباسطة المشتركة للاصابع - الباسطة للخنصر - الباسطة الزندية للرسغ - المرفقية

الباسطة المشتركة للاصابع موضوعة في الجهة الخلفية للساعد . منشأها من العقدة الوحشية من الوتر المشترك ومن الفاصل بين العضلات . وتنقسم اسفل منتصف الساعد الى ثلاثة اوتار تمر مع باسطة السبابة من طبقة في الرباط الخلفي ثم ينقسم الانسي منها الى فسخين وتندغم الاربعة الاوتار بالسلاميات الثلاث لجميع الاصابع . مجاورتها . من الظاهر للقافة الساعد واليد والرباط الخلفي الخلفي والجلد . ومن الباطن للباطحة القصيرة والبواسط للابهام والسبابة والاوعية والعصب الخلفية بين العظمين والرسغ والعظام المشطية والسلاميات . ومن حافتها الكعبرية للباسطة الكعبرية القصيرة للرسغ . ومن حافتها الزندية للباسطة للخنصر والباسطة الزندية للرسغ

والباسطة للخنصر عضلة دقيقة وضعها الى الجانب الانسي من سابقتها وفي الغالب تكون متصلة بها . منشأها من الوتر المشترك بنسخة رقيقة وترية ومن الفاصل بين العضلات .

عضلات الجهة الكعبرية


والوجه الذي اسفله ومن صفاق متين يغطي الثالث الانسي لهذه العضلة. تجه اليافها افقياً الى الوحشية وتندغم بالربع السفلي للوجه المقدم والحافة الوحشية لجسم الكعبرة . مجاورتها . من الظاهر للقابضة الغائرة للاصابع والقابضة الطويلة للابهام والقابضة الكعبرية للرسغ والاعوية الكعبرية . ومن الباطن للكعبرة والزند والغشاء بين العظمين اعصاب جميع عضلات الطبقة السطحية من العصب المتوسط الا القابضة الزندية للرسغ التي ياتيها فرع من العصب الزندي . والقابضة الغائرة للاصابع من الزندي والمقدم بين العظمين والقابضة الطويلة للابهام والكابة المربعة من المقدم بين العظمين عملها . تعمل هذه العضلات على الساعد والرسغ واليد . فالتى تعمل على الساعد هي الكابة المستديرة والكابة المربعة اللتان تدبران الكعبرة على الزند دوراً ورحوياً فتكبان اليد فاذا تم الكب اعانت الكابة المستديرة بقية العضلات في قبض الساعد . والقابضة الزندية للرسغ والقابضة الكعبرية قابضتان للرسغ . والقابضة السطحية تقبض السلاميات الثواني والقابضة الغائرة تقبض السلاميات الثوالت . والقابضة الطويلة للابهام تقبض السلامية الاخيرة للابهام . والعضلات الثلاث الاخيرة بعد قبضها للسلاميات اذا ادامت عملها اعانت قوابض الرسغ وجميعها تشترك في قبض الساعد على العضم . والراحية الطويلة شادة للنافة الراحية فاذا فعلت ذلك قبضت اليد على الساعد

الجهة الكعبرية

الباطحة الطويلة - الباسطة الكعبرية الطويلة للرسغ - الباسطة الكعبرية القصيرة للرسغ

الباطحة الطويلة اوجه عضلات هذه الجهة الى السطحية وهي لحمية في ثلثها العلويين وترية من الاسفل . منشأها من الثلثين العلويين للشفة المقدمة من الحافة الوحشية العضدية ومن الفاصل الوحشي بين العضلات . ويحد منشأها من الاعلى الثلم العضلي المغزلي . وتنتهي الالياف اعلى منتصف الساعد بوتر مسطح يندغم بقاعدة التواء ابري للكعبري . مجاورتها . من الظاهر للنافة والجلد في معظم مسيرها . ومن الباطن للعضم والباسطتين الكعبريتين للرسغ الطويلة والقصيرة ومن دغم الكابة المستديرة والباطحة القصيرة . ومن حافتها الانسية اعلى المرفق للعضدية المقدمة والعصب العضلي المغزلي والشريان الكعبري الراجع وفي الساعد للاوعية الكعبرية والعصب الكعبري والباسطة الكعبرية الطويلة للرسغ وضعها في بعض مسيرها تحت سابقتها . منشأها من الثالث السفلي للشفة المقدمة من الحافة الوحشية العضدية ومن الفاصل الوحشي بين العضلات

وتنشأ أيضاً من انخفاض على الوجه الانسي للتوالمقاري وبصفاق من الثلثين العلويين للحافة الخلفية من الزند ومن النصف الزندي للغشاء بين العظمين. وتكوّن الالياف بطناً لحمياً ينقسم الى اربعة اوتار تمر تحت الرباط الحلقى وتحت اوتار القابضة السطحية فاذا وصلت مقابل السلاميات الأول دخلت بين فمختي اوتار القابضة السطحية وتقدمت واندغمت في قواعد السلاميات الاخيرة. ويتصل بهذه الأوتار اربع عضلات خراطينية شكل ١٤٦



سياتي الكلام عليها. مجاورتها. من الظاهر في الساعد للقابضة السطحية للاصابع والقابضة الزندية للرسغ والاعوية الزندية والعصب الزندي والعصب المتوسط. وفي اليد لاوتار القابضة السطحية. ومن الباطن في الساعد للزند والغشاء بين العظمين والكابة المربعة. وفي اليد للعضلات بين العظام والمقربة للابهام والقوس الغائر الراحي. ومن حافتها الزندية للقابضة الزندية للرسغ. ومن حافتها الكعبية للقابضة الطويلة للابهام وانما يتوسط بينهما الاعوية المقدمة والعصب بين العظمين


والقابضة الطويلة للابهام موضوعة على الجانب الكعبري على مساحة واحدة مع سابقتها. منشأها من الثلثين العلويين للوجه المقدم المحفور من جسم الكعبية فتبدأ اسفل الحدبة والخط المنحرف من الاعلى وتمتد من الاسفل الى قرب الكابة المربعة. وتنشأ أيضاً من الجزء المجاور لها من الغشاء بين العظمين وحياناً بنسخة لحمية من الوجه الانسي لقاعدة التوالمقاري. تنجى اليافها الى الاسفل وتنتهي بوتر مسطح يمر تحت الرباط الحلقى ثم في قناة وترية عظمية ويندغم في السلامية الاخيرة للابهام. مجاورتها.

من الظاهر للقابضة السطحية للاصابع والقابضة الزندية للرسغ والباطحة الطويلة والاعوية الكعبية. ومن الباطن للكعبية والغشاء بين العظمين والكابة المربعة. ومن حافتها الزندية للقابضة الغائرة للاصابع وانما ينفصلها الاعوية والعصب بين العظمين المقدمة

والكابة المربعة عضلة صغيرة مسطحة مربعة الشكل ممتدة عرضاً على مقدم الكعبية والزند اعلى طرفيها الرسغيين. منشأها من الخط المنحرف في الربع السفلي للوجه المقدم من جسم الزند

شكل ١٤٦ عضلات الطبقة الغائرة لمقدم الساعد ١ الرباط الجانبي الانسي للذرفق ٢ الرباط المقدم ٣ الرباط الخيطي براس الكعبية ٤ العضلة القابضة الغائرة للاصابع ٥ القابضة الطويلة للابهام ٦ الكابة المربعة ٧ المقربة للابهام ٨ الظهيرة بين العظمين للوسطى والراحية للنبصر ٩ الظهيرة بين العظمين للنبصر والراحية للنبصر

الانسي للتوالمقاري من الزند اعلى المنشأ الزندي للكابة المستديرة. والراس الثالث ينشأ من الخط المنحرف الكعبرة من الحدة الى مندغم الكابة المستديرة. نتيجه الالياف عمودياً الى الاسفل فتكوّن عضلة عريضة غليظة تنقسم الى اربعة اوتار عند منتصف الساعد فاذا مرّت هذه الاوتار تحت الرباط الخلفي صارت زوجين يذهب الزوج المقدم الى الوسطى والبنصر والزوج الخلفي الى السبابة والخنصر منفرجةً بعضها عن بعض كلما تقدمت ومندغمة في الجوافي الجانبية للسلاميات الثواني عند مركزها. وكل من هذه الاوتار ينشق مقابل قاعدة السلامية الاولى فيمرّ



من الشق المذكور احد اوتار القابضة الغائرة ثم يدخل الوتران المنشقان من وتر واحد في قناة عظمية صفاقية ويندغمان بجوافي السلاميات الثواني. مجاورتها. في الساعد من الظاهر للفاقة الغائرة وجميع العضلات السابقة السطحية. ومن الباطن للقابضة الغائرة للاصابع والقابضة الطويلة للإبهام والاعوية الزندية والعصب الزندي المتوسط. وفي اليد اوتارها مجاورة من الظاهر للفاقة الراحية وللقوس السطحي الراجي وفروع العصب المتوسط. ومن الباطن لاوتار القابضة الغائرة والعضلات الخراطينية

الجهة المقدمة للساعد

عضلات الطبقة الغائرة

القابضة الغائرة للاصابع — القابضة الطويلة للإبهام — الكابة المربعة

القابضة الغائرة للاصابع ويقال لها الثاقبة موضوعة على الجانبي الزندي للساعد تحت القوابض السطحية. منشأها من الثلثين العلويين للوجه المقدم والوجه الانسي من جسم الزند معانقة لمندغم العضدية المقدمة من الاعلى وتمتد من الاسفل الى قرب من الكابة المربعة.

شكل ١٤٥ العظام المشطية والسلاميات مع الاوتار. في الشكل العلوي الاوتار مربوطة بالسلاميات بواسطة الرباط العمدي وفي السفلي مجردة منه ١ العظم المشطي ٢ وتر القابضة السطحية للاصابع ٣ وتر القابضة الغائرة ٤ الثانية ثاقبة الاولى ٤ وتر الباسطة المشتركة للاصابع ٥ عضلة خراطينية ٦ عضلة بين عظمين مشطيين

الى الباطن. وهي رقيقة صفاقية في مبتدأها ثم تغلظ ثم تنتهي بوتر طويل يكون ثلثيها السفليين. وهذا الوتر يمر في قناة تثقب الرباط الحلقي الى الوحشية ثم في ميزاب على العظم المربع المنحرف ويندغم في قاعدة العظم المشطي للسبابة. والشريان الكعبري موضوع بين وتر هذه العضلة والباطحة الطويلة فيمكن الوصول اليه وربطه بسهولة. مجاورتها من الظاهر للفاقة الغائرة والجلد. ومن الباطن للقبضة السطحية للاصابع والقبضة الطويلة للإبهام والمفصل الرسغي. ومن حافتها الوحشية للكابة المستديرة. ومن حافتها الانسية للراحية الطويلة من الاعلى والعصب المتوسط من الاسفل

والراحية الطويلة عضلة دقيقة مغزلية الشكل موضوعة على الجانب الانسي لسابقتها. منشأها من الوتر المشترك من العقدة الانسية ومن اللفاقة الغائرة والفاصل بين العضلات وتنتهي بوتر دقيق مسطح يندغم بالرباط الحلقي ثم تنبسط وتغيب في اللفاقة الراحية. مجاورتها من الظاهر للفاقة الغائرة. ومن الباطن للقبضة السطحية للاصابع. ومن الانسية للقبضة الزندية للرسغ. ومن الوحشية للقبضة الكعبرية للرسغ

والقبضة الزندية للرسغ موضوعة على الجانب الزندي للساعد. منشأها براسين يفصلها قوس وتري يمر من تحت العصب الزندي والشريان الزندي الخلفي الراجع. وينشأ احد الراسين من الوتر المشترك من العقدة الانسية والاخر من الحافة الانسية للتو المرفقي وبصفاق ن الثلثين العلويين للحافة الخلفية من الزند ومن الفاصل بين العضلات. وتنتهي الالياف بوتر يشغل الجزء المقدم للنصف السفلي من العضلة ويندغم بالعظم البسلي الآن بعض الالياف تمتد الى الرباط الحلقي والى قاعدة العظم المشطي للخنصر. والشريان الزندي موضوع الى الجهة الوحشية لوتر هذه العضلة على مسافة الثلثين السفليين للساعد فيكون الوتر المذكور دليلاً للوصول الى هذا الشريان وربطه. مجاورتها من الظاهر للفاقة الغائرة. ومن الباطن للقبضة السطحية والقبضة الغائرة والكابة المربعة والوعية الزندية والعصب الزندي. ومن حافتها الوحشية وهي الكعبرية للراحية الطويلة من الاعلى وللوعية الزندية والعصب الزندي من الاسفل

والقبضة السطحية للاصابع وضعها تحت العضلات السابقة. وهي اعظم عضلات الطبقة السطحية. منشأها بثلاثة رؤوس احدها من الوتر المشترك من العقدة الانسية ومن الرباط الانسي الجانبي للمفصل المرفقي ومن الفاصل بين العضلات. والراس الثاني ينشأ من الجانب

جهة الخلفية. وهذان المجموعان الاخيران يشلان جميع العضلات البواسط والباطنين

الجهة المقدمة للساعد

عضلات الطبقة السطحية

الكابة المستديرة للكعبرة - الفايضة الكعبرية للرسغ - الراحية الطويلة - الفايضة الزندية للرسغ - الفايضة
للأصابع السطحية

جميع هذه العضلات تنشأ بوتر مشترك بينها من العقدة الانسية للعضد

الكابة المستديرة للكعبرة. منشأها براسين. احدها وهو الأكبر والأوجه الى السطحية

ينشأ من العضد اعلى العقدة الانسية ومن الوتر المشترك لبقية عضلات شكل ١٤٤



هذا المجموع ومن لفافة الساعد والفاصل بين هذه العضلة والفايضة الكعبرية للرسغ. والراس الاخر حزمة رقيقة تنشأ من الوجه الانسي للمتوالمرفقي من الزند ويمر بين الراسين العصب المتوسط. وتذهب العضلة بانحراف مقاطعة للساعد من الجانب الانسي الى الوحشي وتنتهي بوتر مسطح يعكف على الحافة المقدمة للكعبرة ويندغم في خط خشن عند منتصف الوجه الوحشي لجسم هذا العظم. مجاورتها. من الظاهر للفاية الغائرة والباطحة الطويلة والأوعية الكعبرية والعصب الكعبري. ومن الباطن للعضدية المقدمة والفايضة للأصابع السطحية والعصب المتوسط والشريان الزندي. وحافتها الوحشية مكونة للحد الانسي لخلاء مئاث موضع فيه الشريان العضدي والعصب المتوسط وتتر ذات الراسين. وحافتها الانسية ملاصقة للفايضة الكعبرية للرسغ

والفايضة الكعبرية للرسغ واقعة الى الانسية من سابقتها. منشأها

من الوتر المشترك من العقدة الانسية ومن لفافة الساعد والفاصل بينها

وبين الكابة المستديرة الى الانسية والراحية الطويلة الى الوحشية والفايضة للأصابع السطحية

شكل ١٤٤ عضلات الطبقة السطحية لمقدم الساعد ١ الطرف السفلي لذات الراسين ووترها ٢ العضدية المقدمة الموضوعة تحت ذات الراسين ٣ بعض الثلاثية الرؤوس ٤ الكابة المستديرة للكعبرة ٥ الفايضة الكعبرية للرسغ ٦ الراحية الطويلة ٧ احدى حزم الفايضة السطحية للأصابع. وما بقي من هذه العضلة يشاهد تحت وترتي الراحية الطويلة والفايضة الكعبرية للرسغ ٨ الفايضة الزندية للرسغ ٩ اللفافة الراحية ١٠ الراحية القصيرة ١١ المبعدة للابهام ١٢ الفايضة القصيرة للابهام ١٣ الباطية الطويلة ١٤ الباسطة لمخطي الابهام والباسطة الاولى للابهام منعكفتين حول الجزء السفلي للفاية الوحشية من الساعد

الاسفل المستديرة الكبيرة ومن الوحشية الراس الطويل لثلاثية الرؤوس . وتمر من الخلاء
المربع الاوعية المنعكفة الخلفية والعصب المنعكف الخلفي ويحدّه من الاعلى المستديرة الصغيرة ومن
الاسفل المستديرة الكبيرة ومن الانسية الراس الطويل لثلاثية الرؤوس ومن الوحشية العضد
مجاورتها . من الظاهر تركيب عليها الذالية من الاعلى وهي سطحية فيما بقي من مسيرها . ومن
الباطن للعضد والعصب العضلي المغزلي والوعية العلوية الغائرة والجزء الخلفي من المفصل المرفقي .
وراسها المتوسط وهو الطويل مجاور من الخلف للذالية والمستديرة الصغرى ومن الامام للعضلة
تحت اللوح والظهرية العريضة والمستديرة الكبيرة

والعضلة تحت المرفقية عضلة صغيرة ممتازة عن ثلاثية الرؤوس ومشابهة للعضلة تحت الخذبية
في الطرف السفلي . تُشاهد عند رفع ثلاثية الرؤوس من الجزء السفلي للعضد . تاليفها من حزمة
رقيقة او حزمتين تنشأ من العضد اعلى الحفرة المرفقية وتندغم بالرباط الخلفي للمفصل المرفقي
اعصاب ثلاثية الرؤوس من العصب العضلي المغزلي

عملها . ثلاثية الرؤوس الباسطة العظيمة الساعد عقيب قبضه فتجذبه الى خط مستقيم مع
العضد . وعلى ذلك يكون عملها معاكساً لعمل ذات الراسين والعضدية المقدمة . واذا كان
العضد منبسطاً قد يشترك الراس الطويل مع المستديرة الكبيرة والظهرية العريضة في جذب
العضد الى الخلف . وهذا الراس يقي الجزء السفلي لمفصل الكتف فيمنع خلع راس العضد الى
الاسفل والخلف

في عضلات الساعد

اللفافة الغائرة للساعدا من اللفافة المحيطة بعضلات العضد وهي صفاق متين لامع
بكون غمداً عاماً محيطاً بعضلات الساعد . ترتبط من الخلف بالتو المرفقي وبالحفافة الخلفية
للزند وترسل فواصل عديدة عمودية تدخل بين العضلات وتحيط كل عضلة بمجدها وترسل
ايضاً فواصل مستعرضة على الوجه المقدم والوجه الخلفي تفصل بين الطبقة الغائرة والطبقة السطحية
لعضلات الساعد . وفيها ثقب كثيرة لمرور اوعية واعصاب اكبرها عند مقدم المرفق يسير منه
فرع موصل بين الاوردة السطحية والغائرة

تقسم عضلات الساعدا الى مجاميع تبعاً للجهة الواقعة هي فيه . فيشغل احدها الجهة الانسية
والمقدمة للساعد وهو شامل للقوايض والاكابتين . ويشغل اخر الجهة الوحشية للساعد واخر

لنفاة الساعد بواسطة الصفاق العريض الذي يُرسَل من وترها. فاذا تثبت الساعد قبضت ذات الرأسين والعضدية المقدمة العضد على الساعد كما يشاهد في التعمشق. والعضدية المقدمة وقاية عظيمة للمفصل المرفقي

الجهة العضدية الخلفية

ثلاثية الرؤوس العضلة تحت المرفقية

ثلاثية الرؤوس موضوعة على جميع طول الوجه الخلفي للعضد وهي عضلة عظيمة تنقسم الى ثلاثة اقسام تُسمى بالرؤوس ومنها اسم العضلة. فالراس المتوسط ويقال شكل ١٤٣



له الطويل منشأه بوتر مسطح من انخفاض خشن مثلث الشكل واقع تحت الحفرة العنابية ويختلط عند جزئه العلوي بالرباطين المحفظي والعنابي. وتجه اليافة العضلية الى الاسفل بين القسمين الاخرين للعضلة وتجد معها في الوتر المشترك. والراس الوحشي ينشأ من الوجه الخلفي لجسم العضد بين مندغم المستديرة الصغيرة والجزء العلوي للثلم العضلي المغزلي ومن الحافة الوحشية للعضد والفاصل الوحشي بين العضلات. وتجتمع الالياف من هذا المنشأ الى الاسفل في الوتر المشترك. والراس الانسي ينشأ من الوجه الخلفي للعضد تحت الثلم الذي للعصب العضلي المغزلي فيبدأ ضيقاً مستدقاً تحت مندغم المستديرة الكبيرة ويمتد الى نحو قيراط من الوجه البكري. وينشأ ايضاً من الحافة الانسية ومن الفاصل الانسي بين العضلات. وبعض الياف هذا القسم تنجه الى الاسفل الى التوالمرفقي وبعضها يجتمع في

الوتر المشترك. والوتر المشترك يبدأ نحو منتصف الجزء الخلفي لهذه العضلة. وهو مؤلف من طبقتين صفاقتين احلاهما تحت الجلد تغطي النصف السفلي الخلفي لهذه العضلة. والآخرى غائرة في جوهر العضلة. فاذا وصلت اليها الالياف العضلية اتحدتا اعلى المرفق واندمجتا في الجزء الخلفي للوجه العلوي من التوالمرفقي. وينحدر الراس الطويل لثلاثية الرؤوس بين المستديرة الصغيرة والمستديرة الكبيرة قاسماً الخلاء المثلث الواقع بينها الى خلائين اصغرين احدهما مثلث والآخر مربع. فتمر من الخلاء المثلث الاوعية الظهرية اللوحية ويجده من الاعلى المستديرة الصغيرة ومن

شكل ١٤٣ الجهة الخلفية للعضد ١ الراس الوحشي لثلاثية الرؤوس ٢ الراس الطويل وهو اللوحي ٢ الراس الانسي وهو القصير ٤ التوالمرفقي للزبد ٥ الكبيرة ٦ الرباط المحفظي للمفصل الكف

فيكونان بطناً لحمياً ضيقاً فيه بعض تسطح ينتهي اعلى المرفق بوتر مسطح يندغم بالجزء الخلفي لحدبة الكعبرة منفصلاً عن جزئها المقدم بكيس زلاي . وهذا الوتر رقيق عريض اذا قارب الكعبرة ضاق وانحنى وانبرم على نفسه وارسل عند ثنية المرفق من جانب الانسي صفاقاً عريضاً يسير بانحراف الى الاسفل والانسية مقاطعاً للشريان العضدي ويخاط بلقافة الساعد . والحافة الانسية لهذه العضلة دليل للجراح في ربط الشريان العضدي عند منتصف العضد . مجاورتها . من الظاهر تتركب عليها من الاعلى الصدرية الكبيرة والذالية وتغطيها فيما بقي من مسيرها اللقافة السطحية واللقافة الغائرة والجلد . ومن الباطن تستقر على مفصل الكتف والعضد واما تنفصل عنها بالعضلة تحت اللوح والمستديرة الكبيرة والعريضة الظهرية والعضدية المقدمة والعصب العضلي الجليدي . وحافتها الانسية مجاورة للغرابية العضدية والاعوية العضدية والعصب المتوسط . وحافتها الوحشية مجاورة للذالية والباطحة الطويلة

والعضدية المقدمة عضلة عريضة تغطي مفصل المرفق والنصف السفلي لمقدم العضد . فيها بعض انضغاط من المقدم الى الخلف وهي اعرض في الوسط من الطرفين . منشأها من النصف السفلي للوجه الوحشي والوجه الانسي من جسم العضد فتعانق مندغم الذالية من الاعلى بواسطة زائدين واحدة من كل جانب وتمتد الى الاسفل الى قيراط من حافة الوجه المنفصلي محدودة من الجانبين بالحافة الوحشية والحافة الانسية للعضد . وتنشأ ايضاً من الفواصل بين العضلات الى كل جانب ولا سيما من الفاصل الانسي . تجتمع اليافها في وتر غليظ يندغم بحفرة خشنة على الوجه السفلي للتو المنقاري من الزند في خلاء بين فسخين لحميتين للناضبة الغائرة للاصابع . مجاورتها . من الظاهر لذات الراسين والاعوية العضدية والعصب العضلي الجليدي والعصب المتوسط . ومن الباطن للعضد ومقدم المفصل المرفقي . ومن حافتها الانسية لثلاثية الرؤوس والعصب الزندي والكابة المستديرة للكعبرة . ويفصلها عنها جميعها الفاصل بين العضلات . ومن حافتها الوحشية للعصب العضلي المغزلي والشريان الكعبري الراجع والباطحة الطويلة والباطحة الكعبرية الطويلة للرسغ اعصاب هذا المجموع من العصب العضلي الجليدي . والعضدية المقدمة ياتيها فرع اضافي من العضلي المغزلي

عملها . الغرابية العضدية تجذب العضد الى المقدم والانسية وتعين في رفعه نحو اللوح . وذات الراسين والعضدية المقدمة قابضتان للساعد . وذات الراسين باطحة ايضاً للساعد وتمتد

العضدية وترتبط به من الخلف ثلاثية الرووس ومن المتدم العضدية المقدمة ويثقبه العصب الزندي والشريان الغائر السفلي والشريان المتفخم الكبير. وترتبط باللفافة الغائرة عند المرفق جميع الاجزاء المهمة في تلك الجهة

والعضلة الغرابية العضدية اصغر العضلات الثلاث الواقعة في هذه الجهة موضوعة في الجزء العلوي والانسى للعضد. منشأها بالياف وترية من رأس التواء الغرابي مشتركةً بينهما وبين الراس التصير لذات الرأسين ومن الفاصل بين العضلات الذي يفصل هاتين العضلتين. توجه اليافها الى الاسفل والخلف وقليلاً الى الوحشية وتندغم بوتر مسطح في خط خشن في منتصف الوجه الانسي لجسم العضد. ويثقب هذه العضلة العصب العضلي الجندي. وحافتها الانسية دليل في عمل ربط الشريان العضدي في الجزء العلوي من مسيره مجاورتها. من وجهها المتدم للذالية والصدرية الكبيرة من الاعلى. ونقاطها من الاسفل الاوعية العضدية والعصب المتوسط. ومن وجهها الخلفي لاوتار العضلة تحت اللوح والظهيرية العريضة والمستديرة الكبيرة والرأس التصير ثلاثية الرووس والعضد والوعية المنعكنة المقدمة. ومن حافتها الانسية شكل ١٤٢ الشريان العضدي والعصب المتوسط والعصب العضلي الجندي. ومن حافتها الوحشية للرأس التصير من ذات الرأسين والعضدية المقدمة



وذات الرأسين عضلة طويلة مغزلية الشكل وضعها على جميع طول الجهة المقدمة للعضد ومنقسمة في الاعلى الى رأسين فتسمت بهما الاسم. منشأ الرأس التصير بوتر غليظ مسطح من قمة التواء الغرابي. وهذا الوتر مشترك بينهما وبين الغرابية العضدية. ومنشأ الرأس الطويل من الحافة العليا للحفرة العنابية بوتر طويل مستدير هو امتداد من الرباط العنابي. وهذا الوتر يتقوس على رأس العضد ويحيطه غمد خاص به من الغشاء الزلالي لمفصل الكتف ثم يثقب الرباط الخفطي عند ارتباطه بالعضد وينزل في ميزاب ذات الرأسين ويثبت هناك بواسطة زائدة ليفية آتية من وتر الصدرية الكبيرة. ويحدد الرأسان نحو منتصف العضد

شكل ١٤٢ عضلات الجهة المقدمة للعضد ١ التواء الغرابي لوح ٢ الرباط الغرابي الترقوي وهو المربع المنحرف ٣ الرباط الغرابي الاخري ٤ العضلة تحت اللوح ٥ المستديرة الكبيرة. وير من الخلاء المثلث الذي اعلاها الشريان الظهري اللوح ٦ الغرابية العضدية ٧ ذات الرأسين ٨ الجزء العلوي للكعبرة ٩ العضدية المقدمة. ويشاهد بعضها الى الوحشية من وتر ذات الرأسين ١٠ الرأس الانسي ثلاثية الرووس

من اللوح ومن الفواصل الليفية الواقعة بينها وبين المستدبرة الصغيرة والعضلة تحت الشوكة. تتجه اليافها الى الاعلى والوحشية وتنتهي بوتر مسطح طوله نحو قيراطين يندغم بالخط الخلفي لثم ذات الراسين. ووتر هذه العضلة عند اندغامه بالعضد واقع خلف وتر الظهريه العريضة منفصل عنه بجراب زلاي. مجاورتها. من وجهها الخلفي للجلد وإنما يفصلها عنه الى الانسية الظهرية العريضة واني الوحشية الراس الطويل اثلثية الرؤوس. ومن وجهها المقدم للعضلة تحت اللوح والظهريه العريضة والغرايبه العضديه والراس القصير لثلاثية الرؤوس والوعية الابطيه والصغيرة العضديه. وحافتها العليا مجاورة عند منشأها للمستدبرة الصغيرة ثم يفصلها الراس الطويل لثلاثية الرؤوس. وحافتها السفلى تكوّن مع الظهريه العريضة جزءاً من الحد الخلفي للابط

اعصاب العضلة فوق الشوكة وتحت الشوكة من العصب فوق اللوح. والمستدبرة الصغيرة من المنعكف والمستدبرة الكبيرة من تحت اللوح

عملها. العضلة فوق الشوكة تعين الذالية في رفع العضد من الجانب. العضلة تحت الشوكة والمستدبرة الصغيرة تدبران رأس العضد دوراً رحوياً الى الوحشية فاذا رُفِعَ العضد اعانت على حفظه في هذا الوضع وحملوه الى الخلف. ومن الفوائد العظيمة لهذه العضلات الثلاث وقاية مفصل الكتف فان العضلة فوق الشوكة تسندُه من الاعلى فتمنع خلع راس العضد الى الاعلى. والعضلة تحت الشوكة والمستدبرة الصغيرة تقيان خالعه الى الخلف. والمستدبرة الكبيرة تعين الظهريه العريضة في جذب العضد الى الاسفل والخلف عقيب رفعه وتدبره دوراً رحوياً الى الانسية

الجهة العضدية المقدمة


الغرايبه العضديه - ذات الراسين - العضديه المقدمة

اللفافة الغائرة للعضد امتداد اللفافة التي تغطي الكتف ومقدم الصدرية الكبيرة. ترتبط من الاعلى بالترقوة والاخرم وشوكة اللوح وتكوّن غمداً رقيقاً رخواً يحيط بعضلات العضد ويرسل بينها فواصل. وهي مبنية من الياف حلقيه او مغزلية ترتبط بعضها ببعض بواسطة الياف عمودية. ويخرج من كل جانب منها فاصل فيفصلان عضلات الجهة المقدمة للعضد عن عضلات الجهة الخلفية. فالفاصل الوحشي يمتد من الجزء السفلي للخط المقدم من ثم ذات الراسين الى التواقي الوحشي حيث يندغم ويختلط بوتر الذالية وترتبط به من الخلف لثلاثية الرؤوس ومن المقدم العضديه المقدمة والباطحة الطويلة والباسطة الكعبرية الطويلة للرسغ وبقبة العصب العضلي المغزلي والشريان الغائر العلوي. والفاصل الانسي يمتد من الجزء السفلي للخط الخلفي من ثم ذات الراسين اسفل اندغام المستدبرة الكبيرة الى التواقي الانسي حيث يندغم ويختلط بوتر الغرايبه

عضلات الجهة الخلفية للوح

المنخرقة والترقوة والآخرم والرباط الغرابي الاخرمي والذالية. ومن الباطن للوح والاوعية
والاعصاب فوق الشوكة والجزء العلوي للمفصل الكتفي

شكل ١٤١



واللفافة تحت الشوكة غشاء كثيف ليفي تغطي
العضلة تحت الشوكة وترتبط بمحيط الحفرة تحت
الشوكة. ترتبط بوجهها الباطن الياف هذه العضلة.
وهي امتداد لفاقة العضد وترسل زوائد تنصل العضلة
تحت الشوكة عن المستديرة الصغيرة وتنصل المستديرة
الصغيرة عن الكبيرة

والعضلة تحت الشوكة غليظة مثلثة الشكل شاغلة لمعظم الحفرة تحت الشوكة تنشأ بالياف
لحمية من ثلثها الانسيين وباللياف وترية من الخطوط التي على وجهها. وتنشأ ايضاً من اللفافة
التي تحيط بها من الظاهر وتفصلها عن المستديرتين. تجتمع اليافها في وتر ينزل على الحافة المنخرقة
الشوكة للوح ويسير على الرباط المحفظي لمفصل الكتف ويندغم بالسطح المتوسط في الحدبة
الكبيرة للعضد. مجاورتها. من الظاهر للذالية والمربعة المنخرقة والظهرية العريضة والجلد. ومن
الباطن للوح الذي تفصلها عنه الاوعية اللوحية العلوية والظهرية وللرباط المحفظي. وحافتها
السفلى ملاصقة للمستديرة الصغيرة وقد تختلط بها والمستديرة الكبيرة

والمستديرة الصغيرة عضلة ضيقة مستطيلة محاذية للحافة الوحشية من اللوح. منشأها من الوجه
الظهري للحافة المذكورة على مسافة ثلثها العلويين ومن الطبقة الصفاقية التي تنصل هذه العضلة
عن العضلة تحت الشوكة ومن الطبقة الصفاقية التي تفصلها عن المستديرة الكبيرة. تنجم اليافها
الى الاعلى والوحشية وتنتهي بوتر يندغم بالسطح الثالث على الحدبة الكبيرة من العضد وباللياف
لحمية تندغم بالعضد تحت الحفرة المذكورة ويسير وتر هذه العضلة على الرباط المحفظي. مجاورتها.
من وجهها الخلفي للذالية والظهرية العريضة والجلد. ومن وجهها المقدم للوح والفرع الظهري
للشريان تحت اللوح والراس الطويل لثلاثية الرؤوس ومفصل الكتف. ومن حافتها السفلى
المستديرة الكبيرة التي يفصلها عنها الراس الطويل لثلاثية الرؤوس

والمستديرة الكبيرة عريضة فيها بعض تسطح منشأها من الوجه الظهري للزاوية السفلى

شكل ١٤١ عضلات الجهة الخلفية للوح ١ التواخرمي للوح ٢ العضلة فوق الشوكة ٣ الزاوية العليا للوح ٤ شوكة
الارح ٥ ومنشأ العضلة تحت الشوكة ٦ و٧ منشأ المستديرة الكبيرة ٨ منشأ المستديرة الصغيرة ٩ مندغم المستديرة الكبيرة
١٠ جسم العضد ١١ الجزء السفلي للرباط المحفظي ١٢ مندغم المستديرة الصغيرة ١٣ مندغم العضلة تحت الشوكة

عملها. ترفع العضد باستقامة عن الجانب بحيث يصير على زاوية قائمة من الجذع. اليافها المقدمة تشترك مع الصدرية الكبيرة في جذب العضد الى الامام. واليافها الخلفية تشترك مع المستديرة الكبيرة والظهرية العريضة في جذبه الى الخلف

الجهة المقدمة للوح

العضلة تحت اللوح (شكل ١٤٢)

الصفاق تحت اللوح غشاء رقيق يرتبط بجميع محيط الحفرة تحت اللوح ويرتبط بوجهه الباطن بعض الياف العضلة تحت اللوح

والعضلة تحت اللوح عظيمة مثلثة تملأ الحفرة تحت اللوح وتنشأ من ثلثها الانسيين الاحافة الانسية التي ترتبط بها المسننة الكبيرة. وينشأ بعض اليافها من صفايح وترية تقاطع العضلة وتندغم بخطوط في اللوح وغيرها من صفاق يفصل هذه العضلة عن المستديرة الكبيرة والراس الطويل لثلاثية الرؤوس. تنجم اليافها الى الوحشية وتجتمع وتنهي بوتر يندغم في الحدة الصغرى للعضد. واما الالياف التي تنشأ من الحافة الابطية للوح فتندغم في عنق العضد على مساحة قيراط تحت الحدة. ووتر هذه العضلة ملاصق للرباط المحفظي الخاص بالمفصل الكتفي ويتزلق على جراب عظيم يفصله عن قاعدة التواء الغراي. ويستطرق الجراب المذكور الى تجويف المفصل بواسطة ثقب في الرباط المحفظي. مجاورتها. من المقدم للمسننة الكبيرة والغرابية العضدية وذات الراسين والواعية والاعصاب الابطية. ومن الخلف للوح والواعية والاعصاب تحت اللوح والرباط المحفظي لمفصل الكتف. وحافتها السفلى مجاورة للمستديرة الكبيرة والظهرية العريضة. اعصابها من الاعصاب تحت اللوح. عملها. تدبر راس العضد دوراً رحوياً الى الانسية. وهي وقاية عظمية لمقدم المفصل الكتفي اذ تمنع خلع راس العضد الى المقدم

الجهة الخلفية للوح (شكل ١٤٥)

العضلة فوق الشوكة - تحت الشوكة - المستديرة الكبيرة - المستديرة الصغيرة

المنافذ فوق الشوكة طبقة غشائية كثيفة متممة للغلاف العظمي الليفي الذي يحيط بالعضلة فوق الشوكة. ترتبط بوجهها الباطن بعض الياف هذه العضلة

والعضلة فوق الشوكة شاغلة لجميع الحفرة فوق الشوكة وتنشأ من ثلثها الانسيين ومن المنافذ المغطية لوجهها. تجتمع اليافها وتنهي بوتر يسير على الرباط المحفظي ويلتصق به ثم يندغم باعلى السطوح الثلاثة الواقعة على الحدة الكبيرة للعضد. مجاورتها. من الظاهر المربعة

الاعلى للاوعية والاعصاب الابطية. ووجهها الباطن يستقر على الاضلاع والعضلات بين الاضلاع اعصاب المسنة الكبيرة من الصدري الخلفي

عملها . اذا ثبت الكتفان رفعت الاضلاع ومددت التجويف الصدري فتشارك مع الصدرتين والعضلة تحت الترقوة في الشيق الطويل او الاغصامي . وقساها المتوسط والسفلي يجذبان قاعة اللوح الى الامام فيرفعان رأس الكتف ويشتركان مع المربعة المنخرقة في حمل الاثقال على الكتف

واللفافة السطحية للطرف العلوي مؤلفة من طبقات رقيقة خلوية ليفية تتخللها الاوردة السطحية والوعية الليمفاوية والاعصاب الجلدية. وهي اكثر ظهوراً الى الامام من المرفق وقليلة الوضوح في راحة اليد. ويوجد فيها اجربة فوق الاخرم والمرفق والعقد الاصبعية. وسباني الكلام على اللفافة الغائرة

الجهة الاخرية

الذالية (شكل ١٢٨)

اللفافة الغائرة التي تغطي الذالية غليظة متينة ترسل زوائد كثيرة بين حزمها. وهي امتداد لفاقة الصدر من الانسية واللفافة تحت الشوكة من الخلف. وتندغم من الاتلي بالترقوة والاخرم وشوكة اللوح

والعضلة الذالية كبيرة غليظة مثلثة الشكل تكون رمانة الكتف وتسمى بهذا الاسم لمشايتها بالذال اليونانية المنعكسة. وهي محيطة بالمفصل الكتفي من الوحشية والمقدم والخلف. منشأها من الثالث الوحشي للحافة المقدمة والوجه العلوي من الترقوة ومن الحافة الوحشية والوجه العلوي للتو الاخرمي ومن جميع طول الحافة السفلى لشوكة اللوح. ومن هذا المنشأ المتسع تذهب الالياف المتوسطة عمودياً والمقدمة الى الاسفل والخلف والخلفية الى الاسفل والامام وتجتمع وتنتهي بوتر غايط يندغم في ارتفاع خشن على وسط الوجه الوحشي لجسم العضد . مجاورتها. من الظاهر للعضلة الجلدية والاعصاب فوق الاخرم واللفافة السطحية والجلد. ومن الباطن تنفصل عن رأس العضد بواسطة جراب زلاي . وتغطي التو الغرابي والرباط الغرابي الاخرمي والصدرية الصغيرة والعضدية الغرابية ورأس ذات الرأسين ووتر الصدرية الكبيرة والمستديرة الصغيرة والراس اللوحي والوحشي لثلاثية الرؤوس والوعية المنعكفة والعصب المنعكف والعضد. وحافتها المقدمة منفصلة عن الصدرية الكبيرة بواسطة خلاء يستقر فيه الوريد الراسي والفرع النازل من الشريان الصدري الاخرمي. وحافتها الخلفية تستقر على العضلة فوق الشوكة والثلاثية الرؤوس اعصابها من العصب المنعكف

يحدُّه من الامام الغشاء الضلعي الغرابي ومن الباطن الاضلاع. يُشاهد في هذا الخلاء الاوعية والاعصاب الابطية

والعضلة تحت الترقوة عضلة طويلة رقيقة مغزلية الشكل شاغلة للخلاء بين الترقوة والضلوع الاول. منشأها بوتر قصير غليظ من غضروف الضلع الاول الى مقدم الرباط المعين. نتجها اليافها بانحراف الى الوحشية وتندغم في ميزاب عميق على الوجه السفلي للترقوة في ثلثه المتوسط. مجاورتها من وجهها العلوي للترقوة. ومن وجهها السفلي تفصلها عن الضلع الاول الاوعية والاعصاب الابطية. ووجهها المقدم يفصله عن الصدرية العظيمة صفاق متين اعصاب الصدرية العظيمة من الاعصاب الصدرية المقدمة. والعضلة تحت الترقوة من فرع يأتي من الحبل المكوّن من اتحاد العصب الخامس والسادس العنقيين عملها. اذا رُفِع العضد بواسطة الذالية اشتركت الصدرية الكبيرة مع الظهرية العريضة والمستديرة الكبيرة وجذبته الى جانب الصدر فان عملت وحدها جذبت العضد الى مقدم الصدر. والصدرية الصغيرة تخفض راس الكتف جاذبةً اللوح الى الاسفل والانسية نحو الصدر. والعضلة تحت الترقوة تخفض الكتف جاذبةً الترقوة الى الاسفل والامام. واذا تثبتت العضدان عملت هذه العضلات الثلاث على الاضلاع فتجذبها الى الاعلى وتمدد الصدر فتكون عوامل مهمة في الشهيق الانعصامي. والمصابون بالربو يثبتون اكتافهم لكي تفعل جميع هذه العضلات في تديد التجويف الصدري

الجهة الصدرية الجانبية

المسننة الكبيرة (شكل ١٢٨)

هي عضلة عريضة رقيقة موضوعة في الجزء العلوي للصدر وعلى جانبيه. منشأها بتسع زوائد لحمية من الاضلاع الثمانية العليا (الضلع الثاني يرتبط به زائدتان) ومن الصفاق الذي يغطي الاخلية بين الاضلاع العليا. وتندغم بجميع طول الشفة الباطنة للحافة الانسية في اللوح. وقد قسم بعض المشرحين هذه العضلة الى ثلاثة اقسام فالقسم العلوي منشأه من الضلع الاول والثاني ونتجها اليافه الى الاعلى والوحشية والحاف. والقسم المتوسط منشأه من الضلع الثاني والثالث والرابع ونتجها اليافه على خط افقي الى الخلف. والقسم السفلي منشأه من الضلع الخامس الى الثامن ونتجها اليافه الى الاعلى والوحشية والخلف واندغامها جميعها بالحافة الانسية للوح من الاعلى الى الاسفل. مجاورتها من الامام للصدريتين الكبيرة والصغيرة ومن الخلف للعضلة تحت اللوح ومن

طوله ومن غضاريف جميع الاضلاع الصحيحة ومن صفاق المنخرقة الظاهرة البطنية . ومن هذا المنشأ المتسع توجه اليافها نحو محل اندغامها فمنها ما يتجه الى الاسفل والوحشية ومنها الى الافقية ومنها الى الاعلى والوحشية فتركب العليا على المتوسطة والمتوسطة على السفلى وتجتمع وتنتهي بوتر مسطح عرضه نحو قيراطين يندغم بالخط المقدم لميزاب ذات الراسين في العضد . على شكل ان الالياف العليا والمتوسطة تندغم بالجزء السفلي للخط الميزابي والالياف السفلى بالجزء العلوي منه . ويتصل هذا الوتر عند اندغامه بوتر النالية . ومن هذا الوتر ما ينسبط على الميزاب ومنه ما ينسبط الى الخلف فيبطن الميزاب ومنه ما ينسبط ويختلط بلقافة العضد . مجاورتها . من وجهها المقدم للعضلة الجلدية والغدة الثديية واللقافة السطحية والجلد . ومن وجهها الخلفي جزءها الصدري للقص والاضلاع والغضاريف الضامعية والعضلة تحت الترقوة والصدرية الصغيرة والمسنة الكبيرة والعضلات بين الاضلاع . وجزءها الابطي يكون الجدار المقدم للخلاء الابطي ويغطي الاوعية والاعصاب الابطية . وحافتها العليا على خط مواز لحافة الذالية يفصلها عنها الوريد الراسي (القفال) والفرع النازل من الشريان الصدري الاخرمي . وحافتها السفلى تكون الحافة المقدمة للإبط

والغشاء الضلعي الغرابي بقي الاوعية والاعصاب الابطية يرتبط الى الوحشية بالتواغرابي وهو في هذه الجهة امتداد لقافة العضد والى الانسية بالحافة السفلى للترقوة . ثم يسير الى الاسفل خلف الصدرية الصغيرة ويحيط الاوعية والاعصاب الابطية كغمد ويرسل من الاعلى زائدة خلف العضلة تحت الترقوة ترتبط بالحافة السفلى للترقوة فتكون كغمد للعضلة المذكورة . وينقب الغشاء الضلعي الغرابي الوريد الراسي والشريان والوريد الاخرميان الصدرية والشريان الصدري العلوي والعصب الصدري المقدم

والصدرية الصغيرة عضلة صغيرة مسطحة مثلثة الشكل . وضعها في الجزء العلوي للمصدر تحت الصدرية الكبيرة . منشأها بثلاث زوائد وترية من الحافة العليا والوجه الظاهر للضلغ الثالث والرابع والخامس بقرب غضاريفها ومن الصفاق الذي يغطي العضلات بين الاضلاع . توجه اليافها الى الاعلى والوحشية ثم تجتمع وتكون وترًا مسطحًا يندغم بالحافة المقدمة للتواغرابي في اللوح . مجاورتها . من الامام للصدرية الكبيرة والاعوية والاعصاب الصدرية العلوية . ومن الخلف للاضلاع والعضلات بين الاضلاع والمسنة الكبيرة والخلاء الابطي والاعوية والاعصاب الاربطية . ويفصل حافتها العليا عن الترقوة خلايا مثلث عريض من الانسية ضيق من الوحشية

فتابع للتنفس فيعلو عند الزفير وينخفض عند الشهيق وهو تابع أيضاً لدرجة تمدد المعدة والأمعاء
ولحم الكبد

اعصاب الحجاب هي العصبان الحجابيان

عمله . مدة الشهيق الاغصابي يتسع التجويف الصدري من الاعلى الى الاسفل قيراطين او ثلاثة فتمتشر الرئتان وتحدران نحو قيراطين وينجذب القلب الى الاسفل نظراً الارتباطه بالرئتين وبالجزء المركزي نحو قيراط ونصف فتنضغط الاحشاء البطنية بمثل هذه النسبة . ومدة الزفير يُدفع الحجاب الى الاعلى بواسطة عمل العضلات البطنية فينضغط القلب والرئتان الى الاعلى ويقصر القطر العمودي للتجويف الصدري . ويكون الحجاب في الحالة اللازمة اذا رُفع او خُفض بواسطة الاحشاء البطنية نظراً الى كونها ممتدة او غير ذلك . ولذلك يشعر بثقل عقيم الامتلاء من الطعام او لسبب تمدد المعدة والأمعاء بواسطة الارياح التي تُجمع فيها . ويعمل الحجاب في كل الاعمال الدافعة لاعانة الدفع فينقبض قبيل العطاس والسعال والضحك والبكاء والتي ودفع البول والغايط والجنين من الرحم اذ يسبق جميع هذه الاعمال شهقة طويلة

في عضلات ولفائف الطرف العلوي

في الجهة الصدرية المقدمة (شكل ١٢٨)

الصدرية الكبيرة - الصدرية الصغيرة - تحت الترقوة

اللفافة السطحية للصدر طبقة رخوة خلوية ليفية هي امتداد اللفافة السطحية للعنق والطرف العلوي من الاعلى واللفافة السطحية للبطن من الاسفل . وتنفصل مقابل الثدي الى طبقتين تسير احدها الى مقدم هذه الغدة والاخرى الى خلفها وتذهب منها فواصل كثيرة تدخل بين فصوصها وتسندها . وتذهب من الطبقة المقدمة زوائد ليفية الى الجلد والحلمة تتضمن في اخليتها كتلاً دهنية . وتحت اللفافة السطحية اللفافة الغائرة . وهي طبقة صفاقية رقيقة تغطي الصدرية الكبيرة وترسل زوائد كثيرة بين حزمها . ترتبط من الاعلى بالترقوة والقص ومن الاسفل بالنتوات الشوكية للفقرات الظهرية

والصدرية الكبيرة عضلة عريضة غليظة مثلثة الشكل وضعها في الجزء العلوي والمقدم الصدر والى مقدم الأبط . منشأها من مقدم النصف القصي للترقوة ومن جانب القص على جميع

للفقرة الثانية القطنية ومن الآخر براس الضلع الاخير وحافته السفلى ويرتبط الحجاب بالعمود الفقري بواسطة ساقين موضوعين على اجسام الفقرات القطنية واحد على كل جانب من الاورطي. فالساق اليمنى اعظم واطول من اليسرى وتنشأ من الوجه المقدم لاجسام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة القطنية. والساق اليسرى تنشأ من الثانية والثالثة. ويمتد قوس وتري من الساق الواحدة الى الاخرى على مقدم العمود الفقري يسير من تحته الاورطي والوريد الفرد الاكبر والقناة الصدرية. وينتهي الوتران ببطينين لحميين غليظين واحد من كل جانب يسمى كل منهما مع البطن ساق الحجاب او قائمته

والوتر المركزي ويقال له القلبي الشكل ايضاً صفاق رقيق وضعه في مركز قبة الحجاب تحت التامور الذي يختلط به محيط الوتر المذكور. شكله يشبه ورقة مثلثة القطع فهو مؤلف من ثلاثة اقسام او وريقات. فالوريقة اليمنى اعظمها واليسرى اصغرهما والمتوسطة التي لوجه نحو الغضروف الخنجري ما بينهما في الحجم. والوتر المذكور مؤلف من طبقات ليفية تتقاطع ثم تتحد وتصبح حزاماً مستقيمة او منحنية


وفي الحجاب ثلاث فتحات كبيرة هي فتحة الاورطي وفتحة المري وفتحة الاجوف السفلى. اما فتحة الاورطي فواجهها الى الاسفل والخلف. وضعها في الخط المتوسط الى مقدم اجسام الفقرات فتكون خلف الحجاب لانيه حقيقة. وهي فتحة عظيمة صفاقية مكونة من قوس وتري ممتد من الساق الواحدة الى الاخرى. ويسير منها الاورطي والوريد الفرد الاكبر والقناة الصدرية واحياناً السيمباتوي الايسر. وفتحة المري شكلها بيضي تاليفها عضلي مكونة من الساقين وضعها اعلى سابقتها والى المقدم منها و قليلاً الى اليسار. يمر منها المري والعصب الرئوي المعدي. وفتحة الاجوف اعلاها شكلها مربع بناؤها وتري وضعها عند اتصال الوريقة اليمنى بالوريقة المتوسطة للوتر المركزي. لا يمر منها الا الاجوف السفلى

والاغشية المصلية التي تبطن الحجاب اربعة. ثلاثة منها على وجهه العلوي وهو الصدري وهي البليورا على كل من الجانبين والطبقة الزلائية للتامور التي تغطي الجزء المتوسط للوتر المركزي. وواحد على وجهه السفلي او البطني وهو جزء من البريتون المحيط بالتجويف البطني ثم ان الحجاب محدب من الاعلى نحو الصدر مقعر من الاسفل نحو البطن. فالجزء الايمن كقوس ممتد من الامام الى الخلف يعلو الوجه المحدب للكبد وتستقر عليه قاعدة الرئة اليمنى. والجزء الايسر مقوس من الامام الى الخلف ايضاً تستقر عليه قاعدة الرئة اليسرى ويغطي الطرف العظيم للمعدة والطحال والكليتين اليسرى. والجزء المركزي يستقر عليه القلب. واما ارتفاع الحجاب

رفع الاضلاع. والمثلثة القصية تجذب الى الاسفل الغضاريف الصليبية فتعين في الزفير

في الحجاب الحاجز

شكل ١٤٠



الحجاب الحاجز فاصل عضلي ليفي بين الصدر والبطن يكون ارض التجويف الصدري وقبوة التجويف البطني وضعه بانحراف بين الثلث العلوي والثلثين السفليين للجذع. شكله بيضي قطره الطويل من الجانب الواحد الى الجانب الاخر. مؤلف من جزئين احدهما واسع اهليلجي وضعه افقي والثاني ضيق وضعه عمودي يتصل بالاول على زاوية قائمة. منشأه من جميع المحيط الباطن للصدر فيرتبط من الامام بالغضروف الخنجري. ومن الجانبين بالوجه

الباطن للغضاريف والاجزاء العظمية للاضلاع الستة او السبعة السفلى متداخلاً بين الزوائد التي ترتبط بها المستعرضة. ومن الخلف بقوسين صفاقيين يقال لهما الرباطان القوسيان الوحشي والانسي وبالفتحات القطنية

فالرباط القوسي الانسي قنطرة وترية مقوسة على الجزء العلوي من العضلة الصليبية الكبرى (بسواس) على كل جانب من العمود الشوكي. يرتبط من طرفه الواحد بالجانب الوحشي لجسم الفقرة الاولى القطنية. وهذا الطرف امتداد من الجانب الوحشي لوتر الساق المحاذية له. ويرتبط من الطرف الاخر بمقدم التواء المستعرض للفقرة الثانية القطنية والرباط القوسي الوحشي مكوّن من الحافة العليا للطبقة المقدمة من اللفافة المستعرضة. وهو ممتد على الجزء العلوي للمربعة القطنية ويرتبط من طرفه الواحد بمقدم التواء المستعرض

شكل ١٤٠ الوجه السفلي للحجاب الحاجز ١ الوريقة المتوسطة او المركزية ٢ الوريقة اليسرى وهي اصغرهما ٣ الوريقة اليمنى ٤ حزمة من الغضروف الخنجري والى كل من جانبيه خلاص صغير مثلث الشكل مسدود بالاغشية الصلبة للصدر والبطن ٥ الرباط القوسي الوحشي الايسر ٦ الرباط القوسي الانسي ٧ فتحة صغيرة توجد احياناً فير منها العصب المحنوس الصغير السيمبائوري ٨ الساق اليمنى وهي الكبرى ٩ الفقرة القطنية الرابعة ١٠ الساق اليسرى وهي الصغرى ١١ الفتحة الاورطية. وبشاهد الشريان خارجاً منها مقطوعاً ١٢ قطعة من المريء خارجة من الفتحة المرئية ١٣ الفتحة الاجوفية ١٤ الصلبة الكبيرة سائرة تحت الرباط القوسي الانسي ١٥ المربعة القطنية سائرة تحت الرباط القوسي الوحشي ١٦ عضلات بين التواء المستعرضة للفتحات

كاتبها المنخرقة الظاهرة البطنية. وهي اغلظ من العضلات الباطنة بين الاضلاع. مجاورتها. من الظاهر للعضلات المحيطة بالصدر. ومن الباطن للطبقة الرقيقة اللفائفية التي تنصلها عن الاوعية بين الاضلاع وعصبيها والعضلات الباطنة بين الاضلاع ثم البليورا الضلعية الواقعة خلفها جميعها

والعضلات الباطنة بين الاضلاع احدى عشرة ايضاً وضعها الى الوجه الباطن من سابقتها. منشأها من الشفة الباطنة للميزاب الواقع في الحافة السفلى لكل ضلع ومن الغضروف الضلعي المحاذي له وتندغم بالحافة العليا للضلع الاسفل. اليافها نجيح بانحراف الى الاسفل والخلف وتتصالب مع الياف سابقتها. مجاورتها. من الظاهر للعضلات الظاهرة بين الاضلاع والاعصاب والاعصاب بين الاضلاع. ومن الباطن للبليورا الضلعية والمثلثة القصية والنجاب الحاجر

والعضلات تحت الاضلاع حزم صغيرة عضلية وصفافية تختلف في العدد والطول واكثر وجودها بين الاضلاع السفلى. اتجاه اليافها على الغالب كاتجاه الياف العضلات الباطنة بين الاضلاع

والمثلثة القصية طبقة عضلية ووترية رقيقة وضعها في الجدار الباطن لمقدم الصدر. منشأها من الجزء السفلي لجانب القص من الباطن ومن الوجه الباطن للغضروف المنخبري ومن اطراف القصية لغضاريف بعض الاضلاع الصحيحة السفلى. وتنفرج اليافها الى الاعلى والوحشية وتندغم بزوائد لحمية في الحوافي السفلى والوجوه الباطنة لغضاريف الضلع الثاني والثالث والرابع والخامس

والروافع للاضلاع اثنتا عشرة من كل جانب هي حزم صغيرة منشأها من اطراف التوات المستعرضة للفقرات الظهرية. نجيح بانحراف الى الاسفل والوحشية وتندغم بالوجه الخشن العلوي للاضلاع التي اسفلها بين المحدة والزاوية

اعصاب هذا المجموع من الاعصاب بين الاضلاع

عملها. العضلات بين الاضلاع هي اخص الفواعل التي تحرك الاضلاع في التنفس الاعنيادي. فالظاهرة منها ترفع الاضلاع ولاسيما جزءها المقدم فتزيد سعة الصدر من المقدم الى الخلف وتجذب حوافيها السفلى الى المقدم فيمتسع التجويف الصدري عرضاً. والباطنة تخفض الاضلاع وتجذب حوافيها السفلى الى الخلف فتضيق التجويف الصدري. وانما في الجزء المقدم للصدر تعين العضلات الظاهرة في رفع الغضاريف. والروافع للاضلاع تعين العضلات الظاهرة في

غضروف الضلع الثامن الى العانة . تكوينه من صفاق المنخرقة الباطنة عند انفصاله الى طبقتين لاحاطة المستقيمة . والخطوط المستعرضة ثلاثة او اربعة تقاطع المستقيمة وتوصل الخطين الهلاليين بالخط الأبيض

عملها . للعضلات البطنية ثلاثة اعمال . الاول اذا ثبتت الحوض والصدر ضغطت الاحشاء البطنية بواسطة عصرها للتجويف البطني ويعينها في ذلك انحدار الحجاب الحاجز . فيندفع الجبين من الرحم والغائط من المستقيم والبول من المثانة وما يكون في باطن المعدة عند القي . والثاني اذا ثبتت العمود الشوكي ضغطت الجزء السفلي للصدر فاعانت في الزفير . واذا لم تثبت العمود الشوكي فان عملت عضلات الجانبيين سوية انحنى الصدر باستقامة الى الامام وان تعاقب عمل كل جانب انحنى الى الجانب المعمول فيه ودار الجذع دوراً رحوياً الى الجانب الاخر . والثالث اذا ثبتت الصدر وعملت هذه العضلات سوية انجذب الحوض الى الاعلى كما في التعمشوق . فان عملت عضلات كل جانب وحدها انجذب الحوض الى الاعلى ودار العمود الفقري دوراً رحوياً الى احد الجانبيين . واذا عملت المستقيمتان من الاسفل خفضت الصدر فحنت العمود الفقري فاذا عملت من الاعلى قبضت الحوض على العمود الفقري . والهريمتان ممددتان للخط الأبيض

في العضلات واللفائف الخاصة بعظام الصدر دون غيرها

العضلات بين الاضلاع الظاهرة - بين الاضلاع الباطنة - تحت الاضلاع - المثلة القصية - الروافع للاضلاع اللفائف بين الاضلاع ثلاث طبقات . طبقة تغطي الوجه الظاهر للعضلات الظاهرة بين الاضلاع . وطبقة تغطي الوجه الباطن للعضلات الباطنة بين الاضلاع . وطبقة تتوسط بين العضلات الظاهرة والباطنة

والعضلات بين الاضلاع طبقتان رقيقتان مولفتان من الياف عضلية ووترية موضوعتان الواحدة فوق الاخرى شاءت ان للاخية بين الاضلاع واتجاهها بانحراف بين حوافي الاضلاع المتجاورة . ويقال لها الظاهرة والباطنة بالنظر الى نسبة وضعها بعضها الى بعض فالعضلات الظاهرة بين الاضلاع احدى عشرة من كل جانب . ترتبط بالحوافي المتجاورة لكل زوج من الاضلاع وتمتد من حديبات الاضلاع في الخلف الى بداءة الغضاريف في الامام حيث تنتهي بصفاق رقيق يتقدم الى القص . منشأها من الشفة الظاهرة للميزاب الواقع في الحافة السفلى لكل ضلع وترتبط بالحافة العليا للضلع الاسفل . اليافها تنجبه بانحراف الى الاسفل والامام


عن رفيقتهما من الجانب الآخر الخط الأبيض . وهي اعرض في الاعلى منها في الاسفل . منشأها بوترين يرتبط الوحشي منها وهو الأكبر يعرف العظم العاني والانسي يتضفر برقيقه من الجانب الآخر ويتصل بالاربطة التي تغطي الارتفاق العاني . وتجه الالياف عمودياً الى الاعلى وتنقسم عند الطرف الى ثلاثة اقسام تندغم بغضاريف الضلع الخامس والسادس والسابع . ويقاطع هذه العضلة عرضاً خطوط وترية تُسمى بالخطوط المستعرضة عددها من اثنين الى خمسة . ويحيط بثلاثة ارباعها العلوية عمدة مؤلف من الظاهر من الطبقة الصفاقية الظاهرة للمخرقة الباطنة وصفاق المخرقة الظاهرة . ومن الباطن من صفاق مشترك بين المخرقة الباطنة والمستعرضة . واما ربعها السفلي فتسير عليه من المقدم صفاقات العضلات الثلاث ومن الخلف لا يفصله عن البريتون الا اللفافة المستعرضة

والهرمية عضلة صغيرة قد لا توجد شكلها مثلث وضعها في الجزء السفلي للبطن الى الجهة المقدمة من المستقيمة . منشأها بالياف وترية من مقدم العظم العاني والرباط المقدم العاني . توجه اليافها الى الاعلى وتنتهي براس مستدق يندغم في الخط المتوسط على نصف المسافة بين السرة والارتفاق العاني

والمربعة القطنية وضعها في الجهة القطنية شكلها مربع غير منتظم اعرض في الاسفل منها في الاعلى ومؤلفة من قسمين . الواحد ينشأ بالياف وترية من الرباط الحرقفي القطني ومن العرف الحرقفي ويندغم في الحافة السفلى للضلع الاخير الى نحو نصف طوله ويندغم ايضاً باربعة اوتار صغيرة في رؤوس التواء المستعرضة للفقرات الثالثة والرابعة والخامسة القطنية . والقسم الاخر وضعه الى مقدم سابقه ينشأ من الحواف العليا للتواء المستعرضة القطنية الثالثة والرابعة والخامسة ويندغم في الحافة السفلى للضلع الاخير

اعصاب العضلات البطنية من الاعصاب بين الاضلاع السفلى ومن الحرقفي الختلي ومن الحرقفي الأربي . والمربعة القطنية تقبل خيوطاً من الفروع المقدمة للاعصاب القطنية الخط الأبيض قيد وتري يشاهد في الخط المتوسط للبطن ممتد من الغضروف الخنجري الى الارتفاق العاني . وضعه بين الحافتين الانسيبتين للمستقيمتين وهو مؤلف من اختلاط صفاقات العضلات المخرقة والمستعرضة وفيه عدة ثقب لمرور اوعية واعصاب اعظمها السرة التي تمر منها الاوعية السرية في الجنين وتنسد بعد الولادة . والخطان الهاليليان خيطان وتريان منخيان واحد من كل جانب للخط الأبيض . يقابل كل منها الحافة الوحشية للعضلة المستقيمة ويمتد من

شكل ١٢٩



الوحشي لرباط بويارت ومن الشفة الباطنة للعرف المحرفي ومن الوجه الباطن لغضاريف الاضلاع الستة السفلى وبصفاق عريض من التواء الشوكية والمستعرضة للفقرات القطنية. فالالياف السفلى تنحني الى الاسفل وتندغم مع الياف المنخرقة الباطنة في عرف العاني والخط المشطي فيتكون من اجتماع اليافها الوتر المشترك لهاتين العضلتين. وما بقي من اليافها يذهب الى الانسية فاذا وصلت الى الحافة الوحشية للعضلة المستقيمة انتهت في صفاق يندغم في الخط الابيض على شكل ان ثلاثة ارباعه العليا تذهب وراء المستقيمة وربعة السفلى الى مقدمها. مجاورتها. من الظاهر للمنخرقة الباطنة والوجه الباطنة للاضلاع السفلى والعضلات بين الاضلاع الباطنة. ومن الباطن تبطنها اللفافة المستعرضة التي تفصلها عن البريتون. وحافتها السفلى تكوّن الحد الاعلى للقناة المنوية

اللفافة القطنية. يُسمّى الصفاق الخلفي او الفقري للعضلة المستعرضة الى ثلاث طبقات مقدمة ومتوسطة وخلفية. فالمقدمة رقيقة ترتبط بمقدم رؤوس التواء المستعرضة للفقرات القطنية ومن الاعلى بالحافة السفلى للصلع الاخير فتكوّن الرباط القوسي الوحشي. والمتوسطة ترتبط برؤوس التواء المستعرضة. والخلفية ترتبط برؤوس التواء الشوكية. فالعضلة المربعة القطنية موضوعة بين الطبقة المقدمة والمتوسطة والناصبة الشوكية بين المتوسطة والخلفية وتصل بالطبقة الخلفية المنخرقة الباطنة وتخلط الطبقة المذكورة بصفاق المسنة الخلفية السفلى وبصفاق الظهرية العريضة فتكوّن من ذلك اللفافة القطنية

والمستقيمة البطنية عضلة طويلة مسطحة تمتد على جميع طول مقدم البطن ويفصلها

شكل ١٢٩ عضلات جانب الجذع ١ المنشا الضلعي للظهرية العريضة ٢ المسنة الكبيرة ٣ الجزء العلوي للمنخرقة الظاهرة متظوعاً لاجل كشف العضلات التي تحته. وتناهد زوائد الخمس المتداخلة بين زوائد المسنة الكبيرة ٤ ثتان من العضلات الظاهرة بين الاضلاع ٥ ثتان من العضلات الباطنة بين الاضلاع ٦ المستعرضة ٧ صفاقها الخلفي ٨ صفاقها المقدم الذي يتكون منه بعض الطبقة الخلفية لغمد المستقيمة ٩ الجزء السفلي للمستقيمة اليسرى حيث يسير صفاق المستعرضة الى مقدمها ١٠ المستقيمة اليمنى ١١ الحفنة الباطنة البطنية وهي عبارة عن قوس حده العلوي الحافة السفلى للعضلتين المستعرضة والمنخرقة الباطنة وحده السفلي رباط بويارت ١٢-١٣ الشادة لغمد الفخذ والالوية المتوسطة والالوية الكبيرة مغلقة باللفافة العريضة

جلدية . ومن الباطن للمخرفة الباطنة وللأجزاء السفلي للأضلاع الثانية السفلي والعضلات بين الأضلاع والمعانة للخصية والحبل المنوي في الذكور والرباط المستدير في الإناث . وقد تكون حافتها الخلفية مغطاة بالعريضة الظهرية وقد يكون بينهما خلاء يشاهد فيه بعض المخرفة الباطنة

والمخرفة الباطنة ارق واصغر من سابقتها ووضعها تحتمها على جانب البطن والى مقدمه . منشأها باللياف لحمية من النصف الوحشي لرباط يويارت ومن الثلثين المقدمين للشفة المتوسطة من العرف الحرقفي ومن الغافة القطنية . ومن هذا المنشأ تذهب الالياف الى جهات مختلفة . فالتى تأتي من رباط يويارت تذهب الى الاسفل والانسية متقوسة على الحبل المنوي وتندغم مع الياف المستعرضة في عرف العظم العاني والخط المشطي على مسافة نصف قيراط فيتكوّن من ذلك الوتر المشترك للمخرفة الباطنة والمستعرضة . والتي من الشوكة المقدمة العليا الحرقفية اتجاهها افقي . والتي تنشأ من الجزء المقدم للعرف الحرقفي تسير بانحراف الى الاعلى والانسية وتنتهي بصفاق يتقدم الى الخط الابيض . والالياف الخلفية تصعد الى الاعلى على خط يقرب من العمودية وتندغم بالحوائى السفلى لغضاريف الأضلاع الاربعة السفلى والوتر المشترك للمخرفة الباطنة والمستعرضة يندغم في عرف العظم العاني والخط المشطي وراء الحلقة الظاهرة البطنية وفائدته وقاية جدار البطن في هذه الجهة الا انه احياناً لا يكفي لمقاومة الضغط من الباطن فيندفع امام الجزء البارز من الحلقة الظاهرة البطنية ويكون احد الاغطية للفتق الأريّ المستقيم

وصفاق المخرفة الباطنة يصل الى الخط الابيض حيث يتحد برفيقه من الجانب الاخر ويمتد من حافة الصدر الى العانة . غير انه اذا وصل الى الحافة الوحشية للعضلة المستقيمة ينفصل الى طبقتين على مسافة ثلاثة ارباعه العلوية فتحيطان العضلة المذكورة كعند ثم تحدان عند حافتها الانسية على الخط الابيض وتختلط الطبقة المقدمة بصفاق المخرفة الظاهرة والخلفية بصفاق المستعرضة . واما الربع السفلي فيمرّ بغير انفصال على الوجه الظاهر للمستقيمة الى الخط الابيض مجاورتها . من الظاهر للمخرفة الظاهرة والظهرية العريضة والحبل المنوي والحلقة الظاهرة . ومن الباطن للعضلة المستعرضة والغافة المستعرضة والحلقة الباطنة والحبل المنوي . وحافتها السفلى تكوّن الحد الاعلى للقناة المنوية

والمستعرضة عضلة مسطحة وضعها تحت المخرفة الباطنة . منشأها باللياف لحمية من الثلث

غضاريف الاضلاع المقابلة لها والزائدة السفلى براس غضروف الضلع الاخير والمتوسطة بالاضلاع على بعض مسافة من اتصال الغضاريف بها. والزوائد الخمس العليا تدخل بين زوائد تقابلها من المسننة العظيمة والثلاث السفلى تدخل بين زوائد تقابلها من الظهريّة العريضة. وتذهب الالياف المحيطة من هذه الارتباطات الى جهات مختلفة. فالتى تأتي من الاضلاع السفلى توجه الى الاسفل وتندغم في النصف المقدم للشفة الظاهرة من العرف المحرقفي. والمتوسطة والعليا توجه الى الاسفل والمقدم وتنتهي بالياف وتربة تنفرج وتصير صفاقاً عريضاً اذا اختلط برفيقه من الجانب الاخر للخط المتوسط غطى جميع مقدم البطن. وهذا الصفاق من الاعلى يتصل بالحافة السفلى للصدرية الكبيرة ومن الاسفل تنضم اليافه بعضها الى بعض وتندغم بانحراف من الشوكة المقدمة العليا المحرقفية الى شوكة العظم العاني والخط المشطي. وفي الخط المتوسط يتشكك برفيقه من الجانب الاخر فيتكون من ذلك الخط الابيض الذي يمتد من الغضروف الخجري الى الارتفاق العاني


واما الجزء المذكور من الصفاق الذي يمتد بين الشوكة المقدمة العليا للمحرقفي وشوكة العاني فرباط عريض ينطوي الى الباطن هو امتداد اللقافة العريضة من الاسفل ويقال له رباط يويارت. والجزء الذي ينعكس من رباط يويارت الى الخلف والباطن ويندغم بالخط المشطي يقال له رباط كيمبارنت. وتوجه بعض الياف من اندغام رباط كيمبارنت بالخط المشطي الى الاعلى والانسية خلف القائمة الانسية للحلقة وتندغم بالخط الابيض غير انها تنفرج وهي صاعدة فتكون رباطاً ليفياً رقيقاً مثلثاً يقال له الرباط المثلث

وفي صفاق المنخرقة الظاهرة اعلى العرف العاني فتحة مثلثة يقال لها الحلقة البطنية الظاهرة مكونة من تفریق بين الياف الصفاق وهو في هذه الجهة. يمر من الفتحة المذكورة الحبل المنوي في الذكور والرباط المستدير في الاناث. وهي متجهة بانحراف الى الاعلى والوحشية تبعاً لاتجاه الياف الصفاق. يجدها من الاسفل عرف العظم العاني ومن الاعلى بعض الياف منحنية ومن الجانبين حافتا الصفاق اللتان يقال لهما قائمتا الحلقة. وتندغم القائمة الوحشية او السفلى بشوكة العظم العاني. والقائمة الانسية او العليا تنضم بالياف العضلة المقابلة من الجانب الآخر وتندغم بالارتفاق العاني. وترتبط بهاتين القائمتين لقافة في غاية ما يكون من الرقة تستطيل الى الاسفل وتغطي الوجه الظاهر للحبل والخصيتين. ويقال لهذه اللقافة بين القائمتين نظراً لارتباطها بقائمتي الحلقة وايضاً للقافة الظاهرة المنوية لكونها اظهر اللقائف المحيطة بالحبل المنوي مجاورتها. من الظاهر للقافة السطحية وللشريانين المحرقفين الشراسيفي السطحي والمنعكف ولبعض اعصاب

في عضلات البطن

المخرفة الظاهرة - المخرفة الباطنة - المستعرضة - المستقيمة - الهرمية - المربعة الفظنية

المخرفة الظاهرة سمّت بهذا الاسم لسبب انحراف اتجاه اليافها وضعها على جانب البطن ومقدّمه. وهي عريضة رقيقة أكبر العضلات الثلاث الواقعة في هذه الجهة واقربها الى السطحية.



منشأها بثان زوائد لحمية من الوجوه الظاهرة والحواف السفلية للاضلاع الثانية السفلى. وهذه الزوائد موضوعة على خط منحرف ممتد الى الاسفل والمخلف فالزوائد العليا ترتبط بقرب

شكل ١٢٨ عضلات مقدم الجذع السطحية منها الى اليسار والغائرة الى اليمين ١ الصدرية الكبيرة ٢ الذالية. ويستقر في الحبال الذي بينها الوريد الراسي ٣ الحافة المقدمة للظهرية العريضة ٤ المسنة الكبيرة ٥ العضلة تحت الزقوة اليمنى ٦ الصدرية الصغيرة ٧ الغرابية العضدية ٨ الجزء العلوي لذات الراسين ٩ التنويراني لوح ١٠ المسنة الكبيرة اليمنى ١١ العضلة الظاهرة بين الاضلاع للخلاء الخامس بين الاضلاع ١٢ المخرفة الظاهرة ١٣ صفاقها. والحظ المتوسط الذي الى يسار الرحم هو الحظ الابيض. والحظ الذي الى يمينه هو الحظ المهلاي. والحظ الذي اعلاه والحظ الذي اسفله من الحظوط المستعرضة ١٤ رباط بوبارت ١٥ الحلقة الظاهرة البطنية. والحافة التي اعلى الحلقة هي قائمتها العليا والانسية. والتي اسفلها هي قائمتها السفلى او الوحشية. والحظوط الختنية بين القائمتين صاعدة من رباط بوبارت لاجل تقوية الحلقة ١٦ المستقيمة البطنية وقد تجردت عن غمدها الذي تشاهد منه قطعة عند * ١٧ الهرمية البطنية ١٨ المخرفة الباطنة ١٩ الوتر المشترك للمخرفة الباطنة والمستعرضة نازلاً وراء رباط بوبارت الى الحظ المشطي ٢٠ الحلقة الباطنة البطنية التي يخرج منها الحبل المنوي والفتق الاربي المنحرف

بحيث يكاد يكون اتجاهها أفقياً وتندغم برأس التواء المستعرض للحاملة. مجاورتها من الظاهر للمضاعفة ويقاطعها الفرع الخلفي للعصب العنقي الثاني. ومن الباطن للشريان الفقري والرباط المُوخري الحاملي الخلفي

والمخرقة العليا ضيقة من الأسفل عريضة من الأعلى تنشأ من التواء المستعرض للحاملة عند مندغم سابقتها ثم تسير بانحراف الى الأعلى والانسية وتندغم في العظم المُوخري بين الخطين المنحنيين الى الوحشية من المضاعفة. وبين المخرقة العليا والسفلى والمستقيمة الخلفية الكبيرة خلاء مثلث يشاهد فيه الشريان الفقري والفرع الخلفي للعصب تحت المُوخري. مجاورتها من الظاهر للمضاعفة والقفوية المحلية. ومن الباطن للرباط المُوخري الحاملي الخلفي

اعصابها. اعصاب الشوكية النصف الظهرية والمدبرات الشوكية من الفروع الباطنة الخلفية للاعصاب الظهرية. والشوكية النصف العنقية والعضلات اعلى الشوكات وبين الشوكات من الفروع الباطنة الخلفية للاعصاب العنقية. والعضلات بين التواء المستعرضة من الفروع الباطنة الخلفية للاعصاب العنقية والظهرية والقطنية. والمفلجة منها ومن الاعصاب العجزية. والمستقيمةين والمنحرفتين من العصب تحت المُوخري والمُوخري العظيم

عملها. الناصبة الشوكية التي تشتمل على العجزية القطنية والطويلة الظهرية والشوكية الظهرية تنصب العمود وتحني الجذع الى الخلف اذا كان ثقل في المقدم كما يشاهد في الحوامل والاستسقاء البطني. وامتداد هذه العضلات الى الاعلى يحفظ الرأس والعنق متصبين. واذ عملت العجزية القطنية والظهرية الطويلة من الجانب الواحد جذبتا الصدر والعمود الى الاسفل الى جانبها. والعضلة الاضافية اذا كانت نقطتها الثابتة من الفقرات العنقية رفعت الاضلاع التي ترتبط بها. والمفلجة الشوكية تعمل في اجزاء مختلفة من العمود فان الحزم الناشئة من العجز تعمل في القسم القطني والتي اعلاها تعمل في القسم الظهرية وكل ذلك في الاتصاف الا انها تشترك مع المنخرقة الظاهرة البطنية في ادارة العمود الى الجانب المخالف لها دوراً رحوياً. والمضاعفتان تجذبان الراس الى الخلف فان عملت احدها دون الاخرى جذبت الراس الى الجانب الواحد بحيث يتحول الوجه الى الجهة المخالفة لها. والراسية المستقيمة الخلفية الصغيرة والمنخرقة العليا تجذبان الراس الى الخلف والمنخرقة قد تحول الوجه الى الجانب المخالف. والمستقيمة الخلفية الكبيرة والمنخرقة السفلى تدبران الحاملة دوراً رحوياً فيدور الراس معها على التواء النابي ويتحول الوجه نحوها

الشوكية وفي القسم المحرفي من الوجه الباطن للشوكة الخلفية العليا وفي القسم القطني والعنقي من التواءات المفصليّة وفي القسم الظهري من التواءات المستعرضة. وتجه كل حزمة الى الاعلى والانسية وتندغم بالصفائح والتواءات الشوكية التي اعلاها. مجاورتها من الظاهر للظهرية الطويلة والشوكية الظهرية والشوكية النصف الظهرية والعنقية. ومن الباطن للمديرات الشوكية في القسم الظهري والمديرات الشوكية احدى عشرة من كل جانب موضوعة في القسم الظهري للعمود تحت المنفجّة الشوكية. تنشأ من رؤوس التواءات المستعرضة وحوافها العليا وتندغم بالحواف السفلى لصفائح الفقرات التي اعلاها. الاولى بين الفقرة الظهرية الاولى والثانية والاخيرة بين الحادية عشرة والثانية عشرة

والعضلات اعلى الشوكات حزم لحمية موضوعة على التواءات الشوكية للعنق ممتدة من التواء الواحد الى الآخر

والعضلات بين الشوكات حزم لحمية قصيرة موضوعة بين التواءات الشوكية المتجاورة من المحور الى العجز

والباسطة للعصعص حزمة لحمية دقيقة اثرية في الانسان وكثيراً ما تكون مفقودة. فان وجدت نشأت من الوجه الخلفي للقطعة الاخيرة من العجز او الاولى من العصعص واندمت في جزئه السفلي

والعضلات بين التواءات المستعرضة صغيرة موضوعة بين التواءات المستعرضة للفقرات والراسية المستقيمة الخلفية الكبيرة تنشأ بوتر مستدق من التواء الشوكي للمحور ثم تسع وهي صاعدة الى الاعلى والوحشية وتندغم بالخط المنحني السفلي للموخرى وما اسفله. وبين العضلتين اليمنى واليسرى خلافاً تشاهد فيه الراسيتان المستقيمتان الخلفيتان الصغيرتان. مجاورتها من الظاهر للمضاعفة وعند مندغمها للمنحرفة العليا. ومن الباطن لقوس الحاملة الخلفي والرباط الموخري الحاملي الخلفي وبعض الموخري


والراسية المستقيمة الخلفية الصغيرة مثلثة الشكل صغيرة تنشأ بوتر ضيق من الحادة التي على القوس الخلفي للحاملة ثم تسع وهي صاعدة وتندغم بالسطح المخشن الذي اسفل الخط المنحني السفلي للموخرى. مجاورتها من الظاهر للمضاعفة ومن الباطن للرباط الموخري الحاملي الخلفي والمنحرفة السفلى اعظم من العليا. تنشأ من رأس التواء الشوكي للمحور ثم تسير الى الوحشية

مجاورة هذه العضلات . من الظاهر للمربعة المنحرفة والطحالية ومن الباطن للشوكية الظهرية والعنقية والمستقيمتين والمنحرفتين . ويفصل ذات البطنين عن رفيقتهما من الجانب المخالف الرباط القفوي . ويفصل المضاعفة عن الشوكية النصف العنقية الشريان الغائر العنقي والعنقي الرئيسي وفرع من المؤخري والصفيرة العصبية العنقية الخلفية اعصابها . اعصاب الناصبة الشوكية واقسامها في الجهة الظهرية من الفروع الظاهرة الخلفية للاعصاب القطنية والظهرية . واعصاب العنقية الصاعدة والعنقية المستعرضة والقفوية الحلمية والعنقية الشوكية من الفروع الظاهرة الخلفية للاعصاب العنقية . واعصاب المضاعفة من الفروع الباطنة الخلفية للاعصاب العنقية والعصب تحت المؤخري والمؤخري العظيم

الطبقة الخامسة

الشوكية النصف الظهرية - الشوكية النصف العنقية - المفجعة الشوكية - المديرات الشوكية - العضلات اعلى الشوكات - العضلات بين الشوكات - الباسطة للعصص - العضلات بين التوات المستعرضة - الراسية المستقيمة الخلفية الكبيرة - الراسية المستقيمة الخلفية الصغيرة - المنحرفة العليا - المنحرفة السفلى

الشوكية النصف الظهرية تنشأ باوتار صغيرة من التوات المستعرضة شكل ١٢٧



للفقرات الظهرية السفلى اي من الخامسة الى العاشرة وتندغم باوتار مثلها في التوات الشوكية للفقرات الظهرية الاربع العليا والفقرتين العنقيتين السفليتين

والشوكية النصف العنقية اغلظ من سابقتها وتنشأ برووس وترية ولحمية من التوات المستعرضة للفقرات الظهرية الاربع العليا ومن التوات المفصالية للفقرات العنقية الاربع السفلى وتندغم بالتوات الشوكية للفقرات العنقية من المحور الى الخامسة

مجاورتها . من الظاهر من الاسفل الى الاعلى للظهرية الطويلة والشوكية الظهرية والطحالية والمضاعفة والشريان العنقي الغائر والشريان العنقي الرئيسي والصفيرة العصبية العنقية الخلفية . ومن الباطن للمفجعة الشوكية

والمفجعة الشوكية مؤلفة من حزم لحمية وترية ومائلة الميزاب الفقري الى جانبي التوات الشوكية من العجز الى المحور . منشأ الحزم المذكور في القسم العجزي من مؤخر العجز وتر الناصبة

شكل ١٢٧ ١ الحاملة ٨ الفقرة الظهرية العاشرة ٢ و٥ و٦ العنقية الصاعدة ٥ و٦ منشأها ٢ مندغمها ١٠ و١١ و١٢ المستعرضة العنقية ١٠ و١١ منشأها ١٢ و١٣ مندغمها ٩ الشوكية النصف الظهرية ٢ و٤ و٧ الشوكية النصف العنقية

وتندغم بزوايا الاضلاع الست العليا . والعنقية الصاعدة امتداد الاضافية الى الاعلى . تنشأ من زوايا الاضلاع الاربعة او الخمسة العليا وتندغم بالتوات المستعرضة للفقرة الرابعة والخامسة والسادسة

والظهرية الطويلة هي الجزء الانسي والاكبر من الناصبة الشوكية وتندغم بالتوات المستعرضة لل فقرات القطنية والظهرية ويجمع الاضلاع الا الاول بين الحدبات والزوايا . وهذه العضلة ممتدة الى الاعلى بواسطة حزمتين اضافيتين يقال لها العنقية المستعرضة والقفوية الحلمية . فالعنقية المستعرضة موضوعة الى الانسية وتنشأ باوتار طويلة من قمة التوات المستعرضة للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة الظهرية وتندغم باوتار مثلها بالتوات المستعرضة لل فقرات العنقية الخمس السفلى . والقفوية الحلمية موضوعة الى الانسية من سابقتها بينها وبين المضاعفة . تنشأ باربعة اوتار من التوات المستعرضة لل فقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة الظهرية وباوتار اخر اضافية من التوات المفصالية لل فقرات العنقية الثالث او الرابع السفلى . وتندغم بالوجه الخلفي للتوا الحلمي اسفل الطحالية والقضية الحلمية

والشوكية الظهرية موضوعة الى الجانب الانسي من الظهرية الطويلة وتنشأ من التوات الشوكية لل فقرتين القطنيتين العلويتين والفقرتين الظهريتين السفليتين وتندغم بالتوات الشوكية لل فقرات الظهرية من اربع الى ثمان منها . وهذه العضلة مختلطة بالظهرية الطويلة التي الى الوحشية منها وبالشوكية النصف التي اسفلها

والشوكية العنقية عضلة صغيرة مختلفة الحجم والارتباط . تنشأ غالباً من التوات الشوكية لل فقرتين العنقيتين الخامسة والسادسة وتندغم بالتوا الشوكي للعمور . وقد لا توجد

والمضاعفة عضلة عريضة غليظة موضوعة في الجزء العلوي والخلفي للعنق تحت الطحالية . منشأها بنحو سبعة اوتار من رؤوس التوات المستعرضة لل فقرات الظهرية الثلاث العليا والعنقية السابعة ومن التوات المفصالية لل فقرات العنقية التي اعلى ذلك . وهذه الاوتار تكون عضلة عريضة تسير الى الاعلى والانسية وتندغم بالحفرة الانسية التي بين الخطين المنخمين للموخرى

و ذات البطنين العنقية حزمة صغيرة موضوعة الى الانسية من سابقتها وفي الغالب تكون مختلطة بها وسميت بهذا الاسم لان لها وتراً متوسطاً بين بطنين لحميين . فان كانت منفصلة عن المضاعفة كان منشأها من بعض الفقرات الظهرية العليا وندغمها بالخط المنخي العلوي للموخرى الى الانسية من المضاعفة

دون الاخرى جذبت الراس الى ناحيتها وادارته دوراً رحوياً قليلاً بحيث يتجه الوجه الى ناحيتها.
وتعينان ايضاً في انتصاب الرأس

الطبقة الرابعة


الجهة العجزية القطنية : الناصبة الشوكية

الجهة الظهرية : العجزية القطنية - الاضافية لها - الظهرية الطويلة - الشوكية الظهرية

الجهة العنقية : العنقية الصاعدة - العنقية المستعرضة - القنوية الحلقية - المضاعفة - ذات البطنين

العنقية - الشوكية العنقية

شكل ١٢٦



الناصبة الشوكية. قد اختلف المشرّحون من جهة

هذه العضلة نظراً الى اقسامها فقال بعضهم انها مؤلفة من عضلتين وقال غيرهم من ثلاث عضلات وغيرهم من سبع. وهي شاغلة للميزاب الفقري على جانبي العمود ضيقة في الجهة العجزية ثم تتسع في الجهة القطنية فاذا بلغت الجهة الظهرية انقسمت حذاء الضلع الاخير الى عضلتين هما العجزية القطنية والظهرية الطويلة. منشأها من الميزاب العجزية القطني ومن وتر عريض جداً غليظ مرتبط من الانسية بشوكات العجز وشوكات الفقرات القطنية والثلاث الظهرية السفلى وبالرباط فوق الشوكات ومن الوحشية بمؤخر الشفة الباطنة للعرف الحرقفي والتوات المستعرضة للعجز حيث يختلط بالرباط العظيم العجزية الوريكي

فالعجزية القطنية الجزء الوحشي والاصغر من الناصبة الشوكية وتندغم بزوايا الاضلاع الست السفلى. وهي ممتدة الى الاعلى لترتبط بالاضلاع العليا وبالقسم العنقي للعمود فيتكون من الامتداد المذكور عضلتان هما الاضافية للعجزية القطنية والعنقية الصاعدة. فالاضافية للعجزية القطنية تنشأ من زوايا الاضلاع الست السفلى

شكل ١٢٦ الطبقة الرابعة والخامسة من عضلات الظهر ١ المنشأ العام للناصبة الشوكية ٢ العجزية القطنية ٣ الظهرية الطويلة ٤ العنقية الصاعدة ٥ المستعرضة العنقية ٦ القنوية الحلقية ٧ المضاعفة ٨ المستعرضة العنقية ٩ الشوكية النصف الظهرية ١٠ الشوكية النصف العنقية ١١ المستقيمة الخلفية الصغيرة ١٢ المستقيمة الخلفية الكبيرة ١٣ الخرقفة العليا ١٤ الخرقفة السفلى ١٥ الخرقفة السفلى ١٦ المنجية الشوكية ١٧ و١٨ الروافع للاضلاع ١٨ العضلات بين التوات المستعرضة ١٩ المربعة القطنية

للضلع الثاني والثالث والرابع والخامس على بعد قليل من مقدم زواياها. مجاورتها من وجهها الظاهر للمربعة المنحرفة والمعينتين والمسنة الكبيرة. ومن الباطن للطحالية والجزء العلوي للناصبة الشوكية والعضلات بين الاضلاع

والمسنة الخلفية السفلى موضوعة حذاء اتصال القسم الظهري القطني بالقسم للعمود. تنشأ بصفاق رقيق من التواءات الشوكية للفقرتين الظهريتين والاقخيرتين والقطنيتين او الثلاث العليا. وتسير الى الاعلى والوحشية وتنقسم الى اربع زوائد وتندغم بالحوافي السفلى للاضلاع الاربعة السفلى الى مقدم زواياها. مجاورتها من الظاهر للظهرية العريضة ومن الباطن للناصبة الشوكية والعضلات بين الاضلاع. حافتها العليا مختلطة بالصفاق الفقري

والصفاق الفقري غشاء رقيق ممتد على جميع طول القسم الخلفي للصدر وفاصل بين الناصبة الشوكية والعضلات التي تربط العمود بالطرف العلوي. يرتبط في الخط المتوسط بالتواءات الشوكية للفقرات الظهرية ومن الوحشية بزوايا الاضلاع ومن الاسفل بالحافة العليا للمسنة الخلفية السفلى وبوتر الظهرية العريضة ومن الاعلى يسير تحت الطحالية ويختلط باللفافة الغائرة للعنق

والطحالية موضوعة في الجزء الخلفي للعنق والعلوي للقسم الظهري. وهي عند منشأها عضلة واحدة ضيقة ثم تصعد وتوسع وتنقسم الى قسمين راسي وعنقي. تنشأ من النصف السفلي للرباط القفوي ومن التواءات الشوكية للفقرة العنقية الاخيرة والفقرات الظهرية الست العليا. واما القسم الراسي ويقال له الطحالية الراسية فيندغم بالتواءات الحلي للصدغي وبالوجه الحشن الذي اسفل الخط المنحني العلوي للمؤخري. ويندغم القسم العنقي ويقال له الطحالية العنقية بالحدبات الخلفية للتواءات المستعرضة من الفقرات العنقية الثلاث العليا. ويفصل الطحالية اليمنى عن اليسرى خلافاً مثلث تشاهد فيه العضلة المضاعفة. مجاورتها من الظاهر اولاً للمعينتين والمسنة الخلفية العليا ثم للمربعة المنحرفة ومن الباطن للشوكية الظهرية والظهرية الطويلة والشوكية النصف العنقية والمضاعفة والقفوية الحلمية والمستعرضة العنقية

اعصابها. اعصاب الطحالية والمسنة العليا من الفروع الظاهرة الخلفية للاعصاب العنقية والمسنة السفلى من الفروع الظاهرة للاعصاب الظهرية

عملها. المسنتان عاملتان في التنفس فالعليا منها ترفع الاضلاع وتعين في الشهيق والسفلى تجذب الاضلاع السفلى الى الاسفل فتعين في الزفير. والطحاليتان اليمنى واليسرى اذا عملتا معاً جذبتا الراس الى الخلف فتعينان المربعة المنحرفة والمضاعفة واذا عملت الواحدة منها

والمعينة الكبيرة وضعها اسفل سابقنها وقد تختلط حافتها المتجاورتان. منشأها بالياف وترية من التواءات الشوكية للفقرات الاربع او الخمس الظهرية العليا ومن الرباط فوق الشوكات وتندغم في قوس وترى ضيق يرتبط من الاعلى بالوجه المثلث عند الشوكة ومن الاسفل بالزاوية السفلى ويتصل القوس المذكور بحافة اللوح بواسطة غشاء رقيق. مجاورة المعيتين. من الظاهر للربعة المنخرقة والجلد والمعينة الكبيرة للظهرية الغريضة. ومن الباطن للمسننة الخلفية العليا والشريان اللوحي الخلفي وبعض الناصبة الشوكية والعضلات بين الاضلاع والاضلاع اعصاب هذه العضلات من فروع العصب العنقي الخامس وبعض خيوط اضافية للرافعة لزاوية اللوح من الفروع الغائرة للضفيرة العنقية

عملها. اذا ثبتت الرأس رفع الجزء العلوي من المربعة المنخرقة رأس الكتف واذا عملت الالياف المتوسطة والسفلى حدث من ذلك بعض حركة رحوية للوح على جانب الصدر. واذا ثبتت الكتفان وعملت المربعتان المنخرقتان سوية انجذب الرأس الى الخلف باستقامة فاذا عملت واحدة منهما فقط انجذب الرأس الى الجانب الذي يقابلها. واذا عملت الظهرية الغريضة على العضد جذبتة الى الخلف والاسفل وحركته حركة رحوية الى الانسية. فاذا ثبتت العضد عملت اعمالاً مختلفة على الجذع. منها انها ترفع الاضلاع السفلى وتعين في الشهيق الاغصابي. واذا ثبتت العضدان تشترك هاتان العضلتان مع العضلات البطنية والصدريتين الكبيرتين في جذب جميع الجذع الى الامام كما في التعمشق والمشى على العكاكيز. والرافعة لزاوية اللوح ترفع الزاوية العليا للوح عتیب انخفاضها بواسطة الالياف السفلى للمربعة المنخرقة. والمعيتان تجذبان الزاوية السفلى للوح الى الخلف والاعلى فيحدث من ذلك بعض حركة رحوية للوح على جانب الصدر. واذا ثبتت الكتف قد تحي الرافعة لزاوية اللوح العنق الى الجانب المقابل لها. واذا اشتركت المعيتان مع الالياف المتوسطة والسفلى للمربعة المنخرقة جذبتا اللوح باستقامة الى الخلف نحو العمود الشوكي

الطبقة الثالثة

المسننة الخلفية العليا - المسننة الخلفية السفلى - الطحالية

المسننة الخلفية العليا عضلة رقيقة مسطحة موضوعة في الجزء العلوي والخلفي للصدر. تنشأ بصفاق رقيق عريض من الرباط القفوي ومن التواءات الشوكية للفقرة العنقية الاخيرة والظهريتين او الثلاث العليا. وتسير الى الاسفل والوحشية ثم تنقسم الى اربع زوائد وتندغم بالحواف العليا

للفقرات الست السفلى الظهرية وللقطنية والعجزية ومن الرباط فوق الشوكات. ويختلط صفاق هذه العضلة بوتر الناصبة الشوكية. وتنشأ أيضاً من الشفة الظاهرة للعرف الحرقفي خلف منشأ المنخرقة الظاهرة وإيضاً بزوائد لحمية من الاضلاع الثلاثة او الاربعة السفلى داخله بين زوائد مثلها من المنخرقة الظاهرة. ومن هذا المنشأ المتسع نتج اليافها الى جهات مختلفة الا انها تجتمع وتصير حزمة غليظة تقاطع الزاوية السفلى للوح وقد ياتيها بعض الياف منها ثم تنحني حول الحافة السفلى للمستديرة الكبيرة وتنثني على نفسها بحيث تصير الالياف العلوية اولاً خلفية ثم سفلية وتصير الالياف العمودية اولاً مقدمة ثم علوية. ثم تنتهي بوتر مربع الجوانب طوله نحو ثلاثة قراريط يسير الى الجهة المقدمة من وتر المستديرة الكبيرة ويندغم في قعر ميزاب ذات الراسين فوق اندغام وتر الصدرية الكبيرة. مجاورتها من الظاهر للجلد الآ في جزئها العلوي الذي تغطيه والمعينة المنخرقة. ومن الباطن للناصبة الشوكية والمسنة الخلفية السفلى والعضلات بين الاضلاع السفلى والمسنة الكبيرة والزاوية السفلى للوح والمعينة الكبيرة وتحت الشوكة والمستديرة الكبيرة. ويفصل حافتها الوحشية عند الاسفل عن المنخرقة الظاهرة خلائ صغير مثلك. ويفصل حافتها العليا عن حافة المربعة المنخرقة خلائ اخر مثلك حيث تظهر عضلات بين الاضلاع والمعينة الكبرى فيستعان بهذا المثلث الاخير في الاستئصال الصدري نظراً الى رقة الجدار اعصاب المربعة المنخرقة من الشوكي الاضافي والصفيرة العنقية والعريضة الظهرية من اعصاب تحت اللوح


الطبقة الثانية

الرافعة لزاوية اللوح - المعينة الصغيرة - المعينة الكبيرة

الرافعة لزاوية اللوح وضعها في الجهة الخلفية للعنق وفي جانبيه منشأها باربعة اوتار من الحدبات الخلفية للتوات المستعرضة البارزة من الفقرات العنقية الاربع العليا. وهذه الاوتار تصير لحمية ثم تتحد وتكون عضلة مسطحة نتجة الى الاسفل وتندغم في الحافة الانسية للوح بين الزاوية العليا والوجه المثلث عند اصل الشوكة. مجاورتها. من الظاهر للجلد والمربعة المنخرقة والقصية الحلمية. ومن الباطن للطحالية العنقية والمستعرضة العنقية والعنقية الصاعدة والمسنة الخلفية العليا وللشريانيين المستعرض العنقي واللوح الخلفي

والمعينة الصغيرة منشأها من الرباط القفوي ومن التوات الشوكية للفقرات العنقية السابعة والظهرية الاولى. نتجة الى الاسفل والوحشية وتندغم في حافة الوجه المثلث عند اصل شوكة اللوح

تلتقي المربعتان المنحرفتان. يمتد من الحدبة الموحرية الى التتوالشوكي للفقرة العنقية السابعة حيث



شكل ١٣٥

يُنْتَظُّ بِالرِّبَاطِ فَوْقَ الشُّوَكَاتِ. وَتُعْطَى مِنْ وَجْهِهِ الْمَقْدَمِ قِطْعَةً لِيَفِيَةَ لِكُلِّ مِنَ التَّنَوُّاتِ الشُّوكِيَّةِ الْعُنُقِيَّةِ الْأَحْمَالَةَ فَيَتَكَوَّنُ مِنْ ذَلِكَ فَاصِلٌ بَيْنَ عَضَلَاتِ الْعُنُقِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. وَإِنَّمَا هَذَا الرِّبَاطُ فِي الْإِنْسَانِ أَثْرِي خِلَافًا لِبَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي فَائِدَةٌ حَامِلٌ فِيهَا لِثِقَلِ الرَّاسِ

والظهرية العريضة عضلة عريضة مسطحة تغطي الجهة القطنية والنصف السفلي للجهة الظهرية ثم تجتمع وتصبح حزمة ضيقة تندغم في العضد. منشأها بصفاق من التتوات الشوكية

شكل ١٣٥ الطبقة الاولى والثانية وبعض الثالثة من عضلات الظهر ١ المربعة المنحرفة ٢ صفاق اهلبيجي الشكل مكون من التتوات المربعتين المنحرفتين في الخط المتوسط ويمتد من الفقرة السادسة العنقية الى الثالثة الظهرية ٣ التتوالشوكي والشوكة للوح ٤ الظهرية العريضة ٥ الذالية ٦ عضلات ظهر اللوح ٧ المنحرفة البطنية الظاهرة ٨ الاالوية المتوسطة ٩ الاالوية الكبيرة ١٠ الرافعة لزاوية اللوح ١١ المعينة الصغيرة ١٢ المعينة الكبيرة ١٣ الطحالية الراسية . والعضلة التي اعلاها والتي تتركب عليها الطحالية في المضاعفة ١٤ الطحالية العنقية ويشاهد منشأها اسفل المعينة الكبيرة ١٥ الصفاق الفقري ١٦ المسننة الخلفية السفلى ١٧ العضلة فوق الشوكة ١٨ العضلة تحت الشوكة ١٩ المستديرة الصغيرة ٢٠ المستديرة الكبيرة ٢١ الراس الطويل لثلاثية الروس ، الذي يسير بين المستديرة الصغيرة والكبيرة الى العضد ٢٢ المسننة الكبيرة سائرة من منشأها من اللوح الى المقدم ٢٣ المنحرفة البطنية الباطنة

في عضلات الجذع ولفائفه

تقسم عضلات الجذع الى اربعة مجاميع وهي ١. عضلات الظهر ٢. عضلات البطن
٣. عضلات الصدر ٤. عضلات العجان

في عضلات الظهر

عضلات الظهر كثيرة جداً وتنقسم الى خمس طبقات

الطبقة الاولى

الظهرية العريضة

المربعة المنحرفة

المربعة المنحرفة عضلة عريضة مسطحة مثلثة الشكل وضعها تحت الجلد تغطي الجزء العلوي والخلفي للعنق والكتف. منشأها من الثلث الانسي للخط المنحني العلوي في المؤخري ومن الرباط القفوي ومن التتو الشوكي للفقرة العنقية السابعة والتتوات الشوكية لجميع الفقرات الظهرية. ومن هذا المنشأ تنبج الالياف العلوية الى الاسفل والوحشية وتندغم في الثلث الوحشي للحافة الخلفية من الترقوة. وتنبج الالياف المتوسطة الى الوحشية وتندغم في الحافة العليا للاخزم وفي جميع طول الحافة العليا لشوكة اللوح. وتنبج الالياف السفلى الى الاعلى والوحشية وتجمع عند اللوح وترتبط بصفاق مثلث ينزلق على وجهه املس على الطرف الانسي للشوكة ويندغم هذا الصفاق في حدة الى الوحشية من الوجه المذكور. وهذه العضلة لحمية في معظمها وترية في منشأها واندغامها. اذا سُخِّت من الجانين كان شكل العضلتين مربعاً منحرفاً تقابل زواياه الاربع الكتفين والحذبة المؤخرية والتتو الشوكي للفقرة الاخيرة الظهرية. وقد يتصل الاندغام الترقوي لهذه العضلة الى نصف الترقوة وقد يخلط بالحافة الخلفية للقضية الترقوية الحلمية بحيث يلزم قطعها من هذه الجهة للوصول الى الجزء الثالث من الشريان تحت الترقوة وربطه. مجاورتها من الظاهر للجلد. ومن الباطن في العنق للمضاعفة والطحالية والرافعة لزاوية الكتف والمعينة الصغيرة وفي الظهر للمعينة الكبيرة والعضلة فوق الشوكة وتحت الشوكة وجزء صغير من المسنة الخلفية العليا والمصفاق بين الفقرات الذي يفصلها عن الناصبة الشوكية وللظهرية العريضة. ويسير العصب الشوكي الاضافي تحت الحافة المقدمة لهذه العضلة بقرب الترقوة والرباط القفوي غشاء كثيف خلوي ليفي وضعه في الخط المتوسط للعنق من الخلف حيث

العنقية. الجزء السفلي من هذه العضلة يفصل الشريان تحت الترقوة عن وريدِه فيكون الوريد الى الظاهر منها والشريان والضفيرة العضدية الى الباطن. مجاورتها من الظاهر للترقوة والعضلة تحت الترقوة والقصية الترقوية الحلمية والكنتفية اللامية والمستعرضة العنقية والشرايين العنقية الصاعدة والوريد تحت الترقوة والعصب الحجابي. ومن الباطن للبلبورا والشريان تحت الترقوة والضفيرة العضدية. ويفصلها عن العنقية الطويلة الى الانسية الشريان تحت الترقوة


والاخيمية المتوسطة اكبر الاخيميات الثلاث واطولها. منشأها من الوجه العلوي للضلع الاول من خلف الميزاب الذي للشريان تحت الترقوة الى الحذبة. وتبعد بجانب العمود الفقري وتندغم بواسطة ستة اوتار في التواءات المستعرضة للفقرات العنقية الست السفلى. ويفصلها عن الاخيمية المقدمة الشريان تحت الترقوة من الاسفل والضفيرة العنقية من الاعلى. مجاورتها من الظاهر للقصية الحلمية ونقاطها الترقوة والكنتفية اللامية. والى الوحشية منها الرافعة لزاوية اللوح والاخيمية الخلفية

والاخيمية الخلفية اصغر الاخيميات الثلاث. منشأها بوتر رقيق من الوجه الظاهر للضلع الثاني خلف ارتباط المسنة الكبيرة. ثم تتعاطم وهي صاعدة وتندغم بوترين او ثلاثة في التواءات المستعرضة للفقرتين او الثلاث العنقية السفلى. وهي ابعد الاخيميات عن السطحية وقد تكون مختلطة بالموتوسطة

اعصاب المستقيمتين الراسيتين المقدمتين الكبرى والصغرى من العصب تحت المؤخري ومن الفروع الغائرة للضفيرة العنقية. والمستقيمة الجانبية من تحت المؤخري والطويلة العنقية والاخيميات من فروع الاعصاب العنقية السفلى

عملها. المستقيمتان المقدمتان الكبرى والصغرى عملها مضاد لعضلات العنق الخلفية فانها ترجعان بالراس الى وضعه الطبيعي عقيب انجذابه الى الخلف بواسطة العضلات المذكورة. وتحنيان الراس وتدبرانه بحيث يتحوّل الوجه الى احد الجانبين. والطويلة العنقية تحني الجزء العنقي للعمود وتدبره قليلاً. والاخيميات اذا تثبتت من الاسفل جذبت الى الاسفل التواءات المستعرضة للفقرات العنقية وحنّت العمود الشوكي الى احد الجانبين فاذا عملت من الجانبين سوية تثبت العمود منتصباً. واذا تثبتت من الاعلى رفعت الضلع الاول والثاني ولذلك كانت عضلات تنفسية

شكل ١٣٤



والمستقيمة الجانبية عضلة قصيرة مسطحة وضعها بين التواء المستعرض للحاملة والتواء الوداجي للمؤخري. منشأها من الوجه العلوي للتواء المستعرض للحاملة وتندغم بالوجه السفلي للتواء الوداجي من المؤخري. مجاورتها من وجهها المقدم للوريد الوداجي الباطن. ومن وجهها الخلفي للشريان الفقري

والطويلة العنقية عضلة طويلة مسطحة وضعها على الوجه المقدم للعمود الفقري بين الحاملة والفقرة الثالثة الظهرية. وهي عريضة في الوسط ودقيقة عند الطرفين. تنقسم الى ثلاثة اجزاء علوي منحرف وسفلي منحرف وعمودي. فالجزء

العلوي المنحرف ينشأ من الحديبات المقدمة للتواء المستعرضة من الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة العنقية ويصعد بانحراف الى الانسية ويندغم بوترضيق في الحدبة الواقعة على القوس المقدم للحاملة. والجزء السفلي المنحرف اصغر الاجزاء الثلاثة لهذه العضلة ينشأ من اجسام الفقرات الاولى والثانية وحياناً الثالثة الظهرية. ويسير بانحراف الى الوحشية ويندغم بالتواء المستعرضة للفقرتين الخامسة والسادسة العنقيتين. والجزء العمودي وضعه امام العمود الشوكي ويمتد من جسم الفقرة الخامسة العنقية الى الثالثة الظهرية. مجاورتها من وجهها المقدم للبلعوم والمرى والعصب السيمباتوي وغمد السباتي والوداجي والرئوي المعدي والشريان الدرقي السفلي والعصب الخنجري الرابع. ومن وجهها الخلفي للعمود الشوكي

٨ في الجهة الفقرية الجانبية

الاخعية المقدمة - الاخعية المتوسطة - الاخعية الخلفية

الاخعية المقدمة عضلة مخروطية الشكل وضعها غائر في جانب العنق خلف القصبة الحليمية. منشأها بوترضيق مسطح من الحدبة الواقعة على الحافة الانسية والوجه العلوي للضلوع الاول. تصعد عمودياً وتندغم بالتواء المستعرضة للفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة

شكل ١٣٤ العضلات الفقرية المقدمة والجانبية ١ المستقيمة المقدمة الكبيرة ٢ الاخعية المقدمة ٣ الجزء السفلي للعنقية الطويلة اليمنى واعلاها منحوب بالمستقيمة المقدمة الكبيرة ٤ المستقيمة المقدمة الصغيرة ٥ الجزء العلوي للعنقية الطويلة ٦ جزءها السفلي ٧ الاخعية المتوسطة ٨ الاخعية الخلفية ٩ احدى العضلات بين التواء المستعرضة ١٠ المستقيمة الجانبية اليسرى

الى الوحشية والاسفل خلف اللوزة وتختلط بالابرية البلعومية وتندغم بالحافة الخلفية للغضروف الدرقي وبعض اليافها تضيع في جانب البلعوم وبعضها تقطع الخط المتوسط الخلفي وتتصالب مع رفيقتها من الجانب الاخر. مجاورتها. في اللهاة وجهاها المقدم والخلفي يغطيها الغشاء المخاطي الا انه يتوسط بينهما وبينه طبقة من الغدد اللهوية. ومن حافتها العليا للرافعة للهاة. وفي البلعوم واقعة بين الغشاء المخاطي والعواصر

اعصاب الشادة للهاة من العقدة الاذنية. والرافعة للهاة والمفردة الغلصمية من الوجهي وما بقي من العضلات من الفروع اللهوية لعقدة ميكل

عملها. في العمل الاول للازدرداد تُدفع اللقمة الى الخلف الى الحلق وذلك بان يُضغَط اللسان على الحنك الصلب. فاذا تقلصت قاعدة اللسان ورفعت الحنجرة مع البلعوم ضغط لسان الزمار على فتحة الحنجرة وعبرت اللقمة الى ما وراء ذلك فتم العمل الثاني من الازرداد. ثم تنقبض العضلات اللهوية اللسانية وترفع اللهاة بواسطة الرافعة لها وتشد بواسطة الشادة وتنقبض العضلات اللهوية البلعومية بحيث اذا اعانتها الغلصمة بان تسد الخلاء الواقع بينها سدت الفتحة من الاعلى والتزم الطعام ان ينجدر الى الاسفل من غير ان يكون له سبيل الى الصعود الى الجزء العلوي من البلعوم او الى الفتحين المؤخرين للانف

٧ في الجهة الفقرية المقدمة


المستقيمة الراسية المقدمة الكبيرة - المستقيمة الراسية المقدمة الصغيرة - المستقيمة الجانبية - العنقية الطويلة

المستقيمة الراسية المقدمة الكبيرة عريضة غليظة من الاعلى ضيقة من الاسفل كانتها استطالة الاخمعية المقدمة الى الاعلى وليست كذلك. منشأها باربعة اوتار من التوتات المستعرضة للفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة العنقية. وتصل الى الانسية لثور رفيقتها من الجانب الاخر وتندغم بالوجه السفلي للتو القاعدي المؤخري. مجاورتها. من وجهها المقدم للبلعوم والعصب السيمبانوي والغد المحيط بالسباتي والوداجي والعصب الرثوي المعدي. ومن وجهها الخلفي للطويلة العنقية والمستقيمة المقدمة الصغيرة والفقرات العنقية العلوية

والمستقيمة الراسية المقدمة الصغيرة قصيرة مسطحة تحت الجزء العلوي لسابقتها. منشأها من الوجه المقدم للكنتلة الجانبية للحاملة ومن اصل نتوها المستعرض. تسير الى الاعلى والانسية وتندغم بالتو القاعدي خلف سابقتها. مجاورتها. من وجهها المقدم للمستقيمة المقدمة الكبيرة. ومن وجهها الخلفي لمقدم المنفصل المؤخري الحاملي. ومن الوحشية للعقدة العنقية العليا من السيمبانوي

الأنسية وما يليها الى الخلف حتى شوكة الوتدي ومن الوجه المقدم للجزء الغضروفي من بوق
اوستاكوس ثم يتدر عمودياً بين الصفحة الجناحية الانسية

شكل ١٢٢



والوجه الانسي للعضلة الجناحية الانسية وينتهي بوتر يلتفت
حول التتو الكلاي. والقسم الافقي وهو الوتر المذكور يذهب
افقياً الى الانسية ثم ينسط فيصير صفاقاً عريضاً على الوجه
المقدم للهاء يتصل برقيقه من الجانب الآخر في الخط المتوسط.
واما الالياف فانها تندغم من الامام بالحافة الخلفية للصفحة
الافقية من العظم الحنكي. مجاورتها. من الوحشية للجناحية

الانسية. ومن الانسية للرافعة للهاء التي يفصلها عنها العاصرة العليا والصفحة الجناحية
الانسية

والمفردة الغلصمية ليست عضلة واحدة كما يظهر من اسمها ولكنها حزمتان لحميتان
وضعهما في الخط المتوسط للهاء. منشأها من الشوكة الانفية الخلفية للعظم الحنكي وتندغمان في
الغلصة

واللهوية السانية حزمة لحمية صغيرة يتكون منها ومن الغشاء المخاطي المغطي لها القائمة
المقدمة للهاء. تنشأ من الوجه المقدم للهاء الى جانب الغلصة ثم تسير الى المقدم والوحشية الى
مقدم اللوزة وتندغم بجانب اللسان وظهره حيث تخلط باللياف الابرية السانية

واللهوية البلعومية حزمة لحمية طويلة ضيقة في وسطها اكثر من طرفيها وتكون مع الغشاء
المخاطي المبطن لوجها القائمة الخلفية للهاء. ويفصلها عن سابقتها خلافاً تستقر فيه اللوزة. منشأها
من الهاء بواسطة حزمة منبسطة تقسمها الرافعة للهاء الى قسمين. فالحزمة المقدمة وهي اعظمها
تدخل الهاء بين الرافعة والمهددة اللهويتين وتشارك مع رفيقتها في الخط المتوسط. والحزمة
الخلفية ملاصقة للغشاء المخاطي وتشارك مع رفيقتها من الجانب الآخر في الخط المتوسط. ثم تذهب

شكل ١٢٣ عضلات الهاء ١ قطع عرضي للتتو القاعدي المؤخر في الخط المتوسط والقسمين المحجرين للصدغي الى كل
من الجانبين ٢ الميكة فاصلة بين التتوين الانفيين الخلفيتين ٣ و٢ قناتا اوستاكوس ٤ الرافعة اليسرى للهاء واما اليمنى
فمقطوعة ٥ التتو الكلاي للصفحة الجناحية الانسية الذي يدور عليه وتر الشادة للهاء ٦ الرباط الجناحي الفكي ٧ العاصرة العليا
اليسرى مقلوبة ٨ الغلصية المفردة ٩ الصفحة الجناحية الانسية ١٠ الصفحة الجناحية الوحشية ١١ الشادة للهاء ١٢ وترها
المتقشر في بناء الهاء ١٣ الجناحية الوحشية ١٤ نفاذ ارتباط الذقنين السانيتين من الاعلى والذقنين اللامينيين من الاسفل
١٥ ارتباط الضرسية اللامية ١٦ ارتباط العضلتين ذاتي البطنين من المقدم ١٧ الخنناض في الفك السفلي لاستقرار الغدة
تحت الفك

للفك السفلي اعلى الطرف الخلفي لخطه المنحرف الباطن. ومن هذا المنشأ نخني اليافها الى الخلف وتندغم بالتبند المتوسط الخلفي ثم بواسطة صفاق ليفي بالشوكة البلعومية على التوافق القاعدي للعظم المُوخري وتنفوس اليافها العليا تحت الرافعة للهامة وبوق اوستاكيوس. مجاورتها. من وجهها الظاهر للعمود الفقري والوعية السباتية والوداجي الباطن والعصبين الثامن والتاسع والعاصرة المتوسطة التي تتركب عليها والابرية البلعومية. ومن الباطن تغطي اللهوية البلعومية واللوزة ويبطنها الغشاء المخاطي

والابرية البلعومية دقيقة مستديرة من الاعلى عريضة رقيقة من الاسفل. منشأها من الوجه الانسي لقاعدة التو الابري وتقدر على جانب البلعوم بين العاصرتين العليا والمتوسطة وتنبسط تحت الغشاء المخاطي فيضيع بعض اليافها في العاصرتين وبعضها يندغم بالحافة العليا للغضروف الدرقي. والعصب اللساني البلعومي يصلب وجهها الظاهر في مروره الى اللسان. مجاورتها. من الظاهر للابرية اللسانية والسباتي الظاهر والغدة النكفية والعاصرة المتوسطة. ومن الباطن للسباتي الباطن والوداجي الباطن والعاصرة العليا والحنكية البلعومية والغشاء المخاطي اعصاب هذا المجموع من الضفيرة البلعومية والعصب اللساني البلعومي عملها. عند تقارب الازدراء يُجذب البلعوم الى الاعلى ويتمدد لقبول اللقمة المندفعة اليه من الفم. فاذا وصلت اللقمة الى البلعوم ارتخت العضلات الروافع وانقبضت العواصر على اللقمة فتندفع الى المريء. وللبلعوم ايضاً فعل على الحان الصوت فانه يرفعها

٦. الجهة اللهوية


الرافعة للهامة - الشادة للهامة - الغلصية المفردة - اللهوية اللسانية - اللهوية البلعومية

الرافعة للهامة عضلة طويلة غليظة مستديرة وضعها على الجانب الوحشي للفتحة الخلفية للانف منشأها من الوجه السفلي لقمة الجزء الحجري من الصدغي ومن الجزء الغضروفي لبوق اوستاكيوس. فاذا عبرت الى البلعوم انبسطت اليافها على الوجه الخلفي للهامة واختلفت في الخط المتوسط برفقتها. مجاورتها. من الوحشية للشادة للهامة والعاصرة العليا. ومن الانسية يغطيها الغشاء المخاطي للبلعوم. ومن الخلف للغشاء المبطن للهامة

الشادة للهامة عريضة رقيقة وضعها الى الوحشية من سالفها ومولفة من قسمين قسم عمودي وقسم افقي. فالقسم العمودي ينشأ بصفاق رقيق من الحفرة الزورقية عند قاعدة الصفيحة الجناحية

الخلفية ومن القرن السفلي. وتنسب اليافها الى الخلف والانسية وتندغم بالقيد الليفي في الخط المتوسط الخلفي للبلعوم. اليافها السفلى افقية وهي امتداد الياف المري. وما بقي منها يصعد بانحراف ويركب على العاصرة المتوسطة. والعصب الخنجري العلوي يسير بقرب حافتها العليا والعصب الخنجري السفلي وهو الراجع يسير تحت حافتها السفلى. مجاورتها. يغطيها غشاء كثيف خلوي يحيط بجميع البلعوم. من الخلف تستقر على العمود الفقري والطويلة

شكل ١٢٢



العنقية. من الجانب مجاورتها للغدة الدرقية والشريان السباتي الاصيلي والقصية الدرقية. ومن وجهها الباطن للعاصرة المتوسطة والابرية البلعومية واللوية البلعومية والغشاء المخاطي للبلعوم

والعاصرة المتوسطة شكلها مثلث اصغر من سالفتهما. منشأها من جميع طول القرن العظيم للامي ومن قرنيه الصغير ومن الرباط الابري اللامي. ومن هذا المنشأ تنفرج اليافها فالسفلى منها يتحد رالى تحت العاصرة السفلى والالياف المتوسطة تذهب عرضاً والعليا تصعد وتغطي العاصرة العليا. وتندغم

بالقيد الليفي في الخط المتوسط الخلفي مختلطة بالياف رفيقتها المقابلة لها من الجانب الآخر. مجاورتها. يفصل هذه العضلة عن العاصرة العليا العصب اللساني البلعومي والعضلة الابرية البلعومية ويفصلها عن العاصرة السفلى العصب الخنجري العلوي. من الخلف تستقر على العمود الفقري والطويلة العنقية والمستقيمة المقدمة الكبيرة. ومن الجانبين مجاورتها للاوعية السباتية والضفيرة البلعومية وبعض غدد ليفاوية. عند منشأها تغطيها اللامية اللسانية التي تنصل عنها بواسطة الشريان اللساني. وهي تغطي العاصرة العليا والابرية البلعومية واللوية البلعومية والغشاء المخاطي

والعاصرة العليا مرعبة الجوانب وضعها في الجهة العلوية للبلعوم. منشأها من الثلث السفلي لحافة الصفيحة الجناحية الانسية ومن نتوها الكلاوي ومن الجزء المجاور للعظم الحنكي ومن التتوالسنخي

شكل ١٢٢ منظر جانبي لعضلات البلعوم ١ القصبة ٢ الغضروف الحنكي ٣ الغشاء الحنكي الدرقي ٤ الغضروف الدرقي ٥ الغشاء الدرقي اللامي ٦ العظم اللامي ٧ الرباط الابري اللامي ٨ المري ٩ العضلة العاصرة السفلى ١٠ العاصرة المتوسطة ١١ العاصرة العليا ١٢ الابرية البلعومية سائرة الى الاسفل بين العاصرة العليا والمتوسطة ١٣ احافة العليا المنفردة للعاصرة العليا حيث الياف البلعوم العضلية ناقصة ١٤ الرباط الجناحي الفكي ١٥ المبوقة ١٦ المحيطة الشفوية ١٧ الضرسية اللامية

اللامية اللسانية والذقنية اللامية اللسانية وتمتد من قاعدة اللسان الى رأسه. من الخلف بعض اليافها تضيع في قاعدة اللسان وبعضها يرتبط بالعظم اللامي. وما بقي من الياف هذه العضلة منها ما يختلط بالياف الابرية اللسانية للامام من اللامية اللسانية ومنها ما يستمر ذاهباً الى الامام حتى راس اللسان. مجاورتها من وجهها السفلي للشريان الضفدعي

والابرية اللسانية اقصر واصغر العضلات الابرية الثلاث. منشأها من الجانب المقدم والوحشي للتو الابري بقرب مركزه ومن الرباط الابري الفكي. تنحدر الى الاسفل والامام بحيث يكاد اتجاهها يكون افقياً وتنقسم عند جانب اللسان الى قسمين احدها طولي يندغم بجانب اللسان مختلطاً بالياف اللسانية الى الامام من اللامية اللسانية والاخر منحرف يركب على اللامية اللسانية ويتصلب مع اليافها. مجاورتها من وجهها الوحشي من الاعلى الى الاسفل للغدة النكفية الجناحية الانسية والغدة تحت اللسان والعصب الذوقي والغشاء المخاطي للفم. ومن وجهها الانسي للوزة والعاصرة العليا واللامية اللسانية

واللهوية اللسانية سيأتي الكلام عليها في عضلات المهية

اعصاب اللهوية اللسانية من الفروع اللهوية لعقدة ميكل. واللسانية من عصب الطلبة.

وما بقي من عضلات هذا المجموع من العصب تحت اللسان

عملها. الذقنيتان اللاميتان اللسانيتان بواسطة اليافها الخلفية والسفلية تجذب الى الاعلى العظم اللامي وتاينان به وبقاعدة اللسان الى الامام بحيث يدفع راس اللسان من الفم. والالياف المقدمة تجذبه الى الخلف وترجع به الى وضعه الاصلي في الفم. واذا عملت هاتان العضلتان على الخط المتوسط للسان جذبته الى الاسفل وقعرته من الامام الى الخلف فيتمكون من ذلك ميزاب لمرور السوائل الى البلعوم كما في المص. واللاميتان اللسانيتان تجذبان الى الاسفل جانبي اللسان بحيث يصير محدداً من الجانب الى الجانب. واللسانيتان تجذبان مركز اللسان ورأسه الى الاسفل فيصير محدداً من الامام الى الخلف. واللهويتان اللسانيتان تجذبان قاعدة اللسان الى الاعلى والابريتان اللسانيتان الى الاعلى والخلف


o الجهة البلعومية

العاصرة السفلى - العاصرة المتوسطة - العاصرة العليا - الابرية البلعومية - اللهوية البلعومية

العاصرة السفلى اغلظ العواصر الثلاث واقربها الى السطحية. منشأها من جانب الغضروف الحفقي امام الحفرة المفصالية ومن الخط المنحرف للغضروف الدرقي ومن وجهه الغضروفي الى حافته

فتذهب اليافها السفلى الى الاسفل وتندغم في الجزء العلوي لجسم العظم اللامي والياؤها المتوسطة الى الخلف والعليا الى الاعلى والامام وتندغم بجميع طول الوجه السفلي للسان من قاعدته الى راسه. مجاورتها. من وجهها الانسي ملاصقة لرفيقتها من الجانب الاخر وانما يفصلها عنها في الجهة الخلفية

شكل ١٢١



للسان بناء ليفي خلوي يمتد الى الامام في وسط العضو المذكور. ومن وجهها الوحشي للسانية واللامية اللسانية والابرية اللسانية والشريان اللساني والعصب تحت اللسان والعصب الذوقي والغدة تحت اللسان. ومن حافتها العليا للغشاء المخاطي لارض الفم. ومن حافتها السفلى للذقنية اللامية

واللامية اللسانية عضلة رقيقة مسطحة مربعة الجوانب منشأها من الجسم والقرن الصغير وجميع القرن العظيم للعظم اللامي. تنجه اليافها اتجاهاً يقرب ان يكون عمودياً وتندغم بجانب اللسان بين الابرية اللسانية والسانية. ولما كانت الياف هذه العضلة الناشئة من

الجسم متجهة الى الاعلى والخلف وراكبة على الالياف الناشئة من القرن العظيم التي اتجاهاها بانحراف الى الامام وكانت الالياف الناشئة من القرن الصغير متجهة الى الامام والوحشية بجانب اللسان وتغطيها الياف الجسم قسم بعض المشرحين هذه العضلة الى ثلاث عضلات. مجاورتها. من وجهها الوحشي لذات البطنين والابرية اللامية والابرية اللسانية والضرسية اللامية والعصيين الذوقي وتحت اللسان وقناة هوارتن والغدة تحت اللسان. ومن وجهها الغائر للذقنية اللامية اللسانية والسانية والعاصرة المتوسطة والاوعية اللسانية والعصب اللساني البلعومي

واللسانية حزمة الياف عضلية موضوعة طولاً على الوجه السفلي للسان في الخلاء الواقع بين

شكل ١٢١ العضلات الابرية والعضلات اللسانية ١ جزء من العظم الصدغي يشاهد فيه التواليري والتوالحي والصاخ السمي الظاهر ٢ والجانب الايمن للفك السفلي واما الجانب الايسر فمقطوع عند الارتفاق الذقي ٣ اللسان ٤ الذقنية اللامية ٥ الذقنية اللامية اللسانية ٦ اللامية اللسانية. منشأها الذي من جسم العظم اللامي ٧ منشأها الذي من قرن اللامي ٨ الالياف المقدمة للسانية خارجة بين اللامية اللسانية والذقنية اللامية اللسانية ٩ الابرية اللسانية مع بعض الرباط الابري الفكي ١٠ الابرية اللامية ١١ الابرية البلعومية ١٢ العظم اللامي ١٣ الغشاء الدرقي اللامي ١٤ الغضروف الدرقي ١٥ العضلة الدرقي اللامية الناشئة من الخط المنحرف للغضروف الدرقي ١٦ الغضروف الحلقي ١٧ الغشاء الحلقي الدرقي الذي يشق في عمل فتح المنخورة ١٨ القصبة ١٩ بداية المري

تسير بانحراف الى الامام وتندغم بجسم اللامي. والياؤها المتوسطة والمقدمة تختلط بالياف رفيقتها من الجانب الاخر بواسطة قيد ليني في الخط المتوسط. وقد لا يوجد هذا القيد فتكون الياف ممتدة من الجانب الواحد الى الاخر. مجاورتها من وجهها السفلي او الجلدي للجلدية والبطن المقدم لذات البطنين والصفاق فوق اللامي والغدة تحت الفك والوعية تحت الذقن. ومن وجهها العلوي او الغائر للذقنية اللامية وبعض اللامية اللسانية والابرية اللسانية والاعصاب اللسانية والذوقية والغدة تحت اللسان والغشاء الفمي المخاطي

والذقنية اللامية عضلة ضيقة دقيقة وضعها تحت الحافة الانسية لسابقتها. منشأها من الحدبة الذقنية السفلى على الوجه الباطن للارتفاق الذقني وتسير الى الاسفل والخلف وتندغم بالوجه المقدم لجسم اللامي. وهذه العضلة ملاصقة لرفيقتها عند الخط المتوسط. مجاورتها. تغطيها الضرسية اللامية وتستقر على الذقنية اللامية اللسانية

اعصاب ذات البطنين اما بطنها المقدم فمن الفرع الضرسي اللامي للسني السفلي وبطنها الخلفي من الوجهي. والابرية اللامية من الوجهي. والضرسية اللامية من الفرع الضرسي اللامي للسني السفلي. والذقنية اللامية من عصب تحت اللسان

عملها. لعضلات هذا المجموع إعلان مهمان جداً. الاول انها ترفع العظم اللامي وترفع معه قاعدة اللسان مدة الازرداد والثاني انها تنخفض الفك السفلي اذا تثبت العظم اللامي بواسطة خوافضه وخوافض الحجره وذلك مدة التكلم والمضغ وفتح الفم لغرض اخر. ففي المدة الاولى للازرداد اذ تندفع كتلة الطعام من الفم الى البلعوم يحمل العظم اللامي ومعه قاعدة اللسان الى الاعلى والامام بواسطة البطن المقدم لذات البطنين والضرسية اللامية والذقنية اللامية. وفي المدة الثانية للازرداد اذ تكون الكتلة مندفعة في البلعوم يرفع العظم اللامي على الاستقامة الى الاعلى بواسطة عمل مشترك بين هذه العضلات جميعاً. فاذا عبرت الكتلة حمل العظم اللامي الى الاعلى والخلف بواسطة البطن الخلفي لذات البطنين والابرية اللامية واعان ذلك في منع رجوعها الى الفم

٤ الجهة اللسانية

الذقنية اللامية اللسانية — اللامية اللسانية — اللسانية — الابرية اللسانية — المحنكية اللسانية

الذقنية اللامية اللسانية عضلة رقيقة مسطحة مثلثة الشكل. وضعها عمودي في الخط المتوسط. رأس المثلث يرتبط بالفك السفلي وقاعدته باللسان والعظم اللامي. منشأها بوتر قصير من الحدبة الذقنية العليا اعلى الذقنية اللامية. ومن هذا المنشأ تنفرج اليافا على شكل المروحة

وهذه العضلات شادة ايضاً للفافة العنقية

٣ الجهة اللامية العليا

عضلاتها رافعات للعظم اللامي وخافضات للفك السفلي وهي:

ذات البطنين - الابرية اللامية - الضرسية اللامية - الذقنية اللامية

ذات البطنين مؤلفة من بطنين لحميين يتصلان بواسطة وتر متوسط مستدير. هي عضلة صغيرة وضعها تحت جسم الفك السفلي ممتدة على شكل منحني من جانب الرأس الى الارتفاق الذقني. البطن الخلفي اطول من المقدم منشأه من ميزاب ذات البطنين على الوجه الخلفي للنتوء الحلمي من العظم الصدغي ويمر الى الاسفل والامام والباطن. والبطن المقدم ينعكس الى الاعلى والامام ويندغم بجفرة على الوجه الباطن للحافة السفلى من الفك السفلي بقرب الارتفاق الذقني. واما الوتر المتوسط لهذه العضلة فيثقب الابرية اللامية ويرتبط بجانب جسم اللامي بواسطة عروة صفاقية ويرسل من كل جانب طبقة صفاقية تتوسط بين البطنين المقدمين للعضلتين وترتبط بجسم اللامي وقرنيه العظيم يقال لها الصفاق فوق اللامي. وتقسم هذه العضلة المثلث المقدم العلوي الى مثلثين صغيرين. اعلاهما ويقال له تحت الفك يحدّه من الاعلى الفك السفلي والتواحلمي ومن الاسفل هذه العضلة. والسفلي ويقال له المثلث السباتي العلوي يحدّه من الاعلى البطن الخلفي لذات البطنين ومن الخلف القصبة الحلمية ومن الاسفل الكتفية اللامية. مجاورتها. من الظاهر للجملدية والقصبة الحلمية والقفوية الحلمية وبعض الابرية اللامية والغدة النكفية والغدة تحت الفك. ومن الباطن يستقر البطن المقدم على الضرسية اللامية والبطن الخلفي على الابرية اللسانية والابرية البلعومية واللامية اللسانية والسباتي الظاهر وفرعيه اللساني والوجي والسباتي الباطن والوداجي الباطن وعصب تحت اللسان

والابرية اللامية عضلة صغيرة دقيقة وضعها الى الظاهر من البطن الخلفي لذات البطنين واعلاه. منشأها من نصف الوجه الظاهر للنتوء الابري تسير الى الاسفل والامام ثم تندغم في جسم اللامي عند اتصاله بالقرن العظيم اعلى اندغام الكتفية اللامية. ويثقب هذه العضلة عند اندغامها المذكور وتر ذات البطنين. مجاورتها كجواردة البطن الخلفي لذات البطنين

اذا قُطعت ذات البطنين والابرية اللامية ظهرت الضرسية اللامية. وهي عضلة مسطحة مثلثة الشكل وضعها تحت البطن المقدم لذات البطنين وتكون مع رفيقتها من الجانب الاخر ارضاً عضلية لتجويف الفم. منشأها من جميع طول الخط المنحرف الباطن للفك السفلي. اليافها الخلفية

المخالف عند الجزء السفلي للعنق. مجاورتها. من الظاهر للقضية اللامية والكتفية اللامية والقضية الحلمية. ومن الباطن من الأسفل الى الأعلى للقضية والوريد اللامية والسباتي الاصيلي (ومن الجانب الايمن للشريان اللامية) والغدة الدرقية واوعيتها والجزء السفلي للخجيرة. والوريد الدرقي يسير عند حافتها الانسية

والدرقية اللامية صغيرة مربعة الجوانب كأنها استطالة القضية الدرقية. منشأها من الخط المنحرف على جانب الغضروف الدرقي وتصعد عمودياً وتندغم بالحافة السفلى للعظم اللامي وقرنيه العظيم. مجاورتها. من الظاهر للقضية اللامية والكتفية اللامية. ومن الباطن للغضروف الدرقي والغشاء الدرقي اللامي والاعوية والاعصاب الخجيرية العلوية

والكتفية اللامية مولفة من بطنين لحميين يوصلها وتر مركزي. وضعها مقاطع لجانب العنق من الوجود الى العظم اللامي. منشأها من الحافة العليا للوح واحياناً من الرباط المستعرض ايضاً الذي يقاطع شرم فوق اللوح ويختلف هذا المنشأ من بعض خطوط الى قيراط. ويسير البطن الخلفي من هذا المنشأ الى الامام مقاطعاً للجزء السفلي للعنق فاذا وصل الى الباطن من القضية الحلمية صار وترياً وصعد البطن المقدم حذاء الحافة المتقدمة للقضية الحلمية صعوداً يكاد يكون عمودياً وانما على زاوية منفرجة للبطن الخلفي ويندغم في الحافة السفلى لجسم اللامي الى الوحشية من مغرس القضية اللامية. وانما يحفظ الوتر المتوسط لهذه العضلة في موقعه المذكور بواسطة زائدة من اللقافة العنقية الغائرة تغلفه ثم تستطيل الى الأسفل وترتبط بغضروف الضلع الاول. وهذه العضلة تقسم كلاً من المثلثين العنقيين العظيمين الى مثلثين صغيرين. ويقال للمثلثين الخلفيين الخلفي العلوي او تحت الموحري والخلفي السفلي او تحت الترقوي والمثلثين المقدمين المقدم العلوي او السباتي العلوي والمقدم السفلي او السباتي السفلي. مجاورتها. من الظاهر للربعة المنخرقة وعضلة تحت الترقوة والعظم الترقوي والقضية الحلمية واللقافة العنقية الغائرة والعضلة الجملدية والجلد. ومن الباطن للعضلات الاخيمية والضفيرة العضدية وغمد السباتي الاصيلي والعصب التاسع النازل والقضية الدرقية والدرقية اللامية

اعصاب الدرقية اللامية من عصب تحت اللسان. واعصاب ما بقي من عضلات هذا المجموع من فروع عروة الاتصال بين التاسع النازل والتاسع الاستطراقي عملها. هذه العضلات تخفض الخجيرة والعظم اللامي بعد انجذابها الى الاعلى مع البلعوم عند الازدراد. واما الكتفية اللامية فتخفض العظم اللامي وتجذبها الى الخلف والى كل من الجانبين.

العنقية والطبقة الظاهرة للفاة العنقية الغائرة. ومن الباطن تستقر على المفصل القصي الترقوي والطبقة الغائرة للفاة العنقية والقصبة اللامية والقصبة الدرقية والكثبية اللامية والبطن الخلفي لذات البطنين والرافعة لزاوية اللوح والطحالية والإخميمات. ومن الأسفل للجزء السفلي من السباتي الأصلي والوداجي الباطن والعصب الرئوي المعدي والعصب التاسع النازل والتاسع الاستطراقي والغدد الليمفاوية الغائرة وللعصب الشوكي الإضافي الذي يفتبها عند ثلثها العلوي والضميرة العنقية والشريان المؤخري وبعض الغدة النكفية

اعصاب الجلدية من الوجهي والعنقي السطحي واعصاب القصبة الخلمية من الشوكي الإضافي والضميرة العنقية

عملها . اذا عملت جميع الياف الجلدية حصل في الجلد بعض تجعد عمودي . واذا عملت اليافها المقدمة فقط انخفض الفك السفلي واحياناً تجذب الى الاسفل الشفة السفلى وزاوية الفم وذلك للدلالة على الكرب والغم . واذا عملت القصبتان الخلميتان سويةً خفضتا الراس على العنق والعنق على الصدر . فاذا عملت واحدة منهما دون الاخرى حنت الراس واذا اشتركت مع الطحالية جذبتة الى ناحية الكنف الذي الى جهتها

٢ في الجهة اللامية السفلى

عضلات هذه الجهة خافضة للعظم اللامي وللخنجره وهي :

القصبة اللامية - القصبة الدرقية - الدرقية اللامية - الكثبية اللامية

القصبة اللامية عضلة رقيقة ضيقة . منشأها على الغالب من الطرف الانسي للترقوة ومن الجزء العلوي والخلفي للقطعة الاولى من القص . تنبج اليافها الى الاعلى والانسية وتنتهي بالياف قصيرة وترية تندغم في الحافة السفلى للجسم اللامي . وضعها بجانب الخط المتوسط للعنق الا انه يفصلها من الاسفل عن رفيقتهما من الجانب الآخر خلافاً وثقاربان عند منتصف مسيرها ثم تنفرجان عند الاعلى . مجاورتهما من الظاهر للقص والطرف القصي للترقوة والقصبة الخلمية من الاسفل وللجلدية والفاة العنقية الغائرة من الاعلى . ومن الباطن للقصبة الدرقية والحلقية الدرقية والدرقية اللامية والغدة الدرقية والاوعية الدرقية العليا والغشاء بين الخلفي الدرقي والدرقي اللامي

والقصبة الدرقية وضعها تحت سابقتهما الا انها اقصر واعرض منها . منشأها من الوجه الخلفي للقطعة الاولى من القص تحت منشأ القصبة اللامية وقد تنشأ ايضاً من حافة غضروف الضلع الاول . وتندغم بالخط المنحرف للغضروف الدرقي . وتصل هذه العضلة برفيقتها من الجانب

وتحيطها طبقتا اللفافة العنقية الغائرة. وهي غليظة ضيقة في جزئها المتوسط عريضة رقيقة عند طرفيها. منشأها براسين من القص والترقوة. فراسها القصي حزمة مستديرة وترية من الامام لحمية

شكل ١٢٠



من الخلف ينشأ من الجزء العلوي والمقدم للقطعة الاولى من القص تنجها اليافة الى الاعلى والخلف. وراسها الترقوي ينشأ من الثلث الانسي للحافة العليا من الترقوة اليافة بعضها لحمية وبعضها صفاقية تنجها الى الاعلى على خط يقرب من العمودي. ويفصل هذين الراسين او القسمين عند منشأها خلافاً مثلث ثم يخلطان قبل منتصف العنق فيصيران عضلة غليظة مستديرة ترتبط من الاعلى بواسطة وترمتين في الوجه الظاهر للنتق

الحلي من راسه الى حافته الخلفية وبواسطة صفاق رقيق في الثلثين الوحشيين للخط المنحني العلوي المؤخري. وقد يبلغ عرض الراس الترقوي ثلاثة قراريط وقد يكون منقسماً الى حزم بحيث يحتاج الى قطع بعضها في ربط الشريان تحت الترقوة في جزئه الثالث وهذه العضلة تقسم السطح المربع الواقع في جانب العنق الى مثلثين مقدم وخلفي. فالمثلث المقدم حدوده من الامام الخط المتوسط للعنق ومن الاعلى الحافة السفلى لجسم الفك السفلي وخط وهي ممتد من زاوية الفك الى التواحلي ومن الخلف الحافة المقدمة للقصبة الحلمية. وحدود المثلث الخلفي من الامام الحافة الخلفية للقصبة الحلمية ومن الاسفل الحافة العليا للترقوة ومن الخلف الحافة المقدمة للربعة المنخرقة. والحافة المقدمة لهذه العضلة تكون حرفاً بارزاً جداً تحت الجلد يستدل به الجراح على ربط الشريان السباتي الاصلي. مجاورتها من الظاهر للجلد والعضلة الجلدية. ويتوسط بينها وبين العضلة الجلدية الوريد الوداجي الظاهر والفروع السطحية للضفيرة

شكل ١٢٠ عضلات العنق. تشاهد العضلات السطحية الى يمين الشكل والغائرة الى يساره ١ البطن الخلفي لذات البطنين ٢ بطنها المقدم ٣ العظم اللامي. الى يمين الرقبة البكرة الصفاقية التي يمر منها وتر العضلة المذكورة ٤ الابرية اللامية التي يفتحها البطن الخلفي لذات البطنين ٥ الضرسبة اللامية ٦ الذقنية اللامية ٧ الابرية اللسانية ٨ اللامية اللسانية ٩ الابرية اللسانية ١٠ الابرية البلعومية ١١ القصبة الحلمية ١٢ منشأها القصي ١٣ منشأها الترقوي ١٤ القصبة اللامية ١٥ القصبة الدرقية اليمنى ١٦ الدرقية اللامية ١٧ البطن المقدم للكففة اللامية ١٨ البطن الخلفي. يشاهد في يمين الشكل ارتباط وتر هذه العضلة بفضروف الضلع الاول بواسطة زائدة من اللفافة العنقية الغائرة ١٩ القسم الترقوي للربعة المنخرقة ٢٠ الاضعية المقدمة اليمنى ٢١ الاضعية الخلفية ٢٢ الاضعية المتوسطة بينها

والعضلة الجلدية رقيقة عريضة وضعها تحت الجلد على كل من جانبي العنق. منشأها من الترقوة والآخرم واللفافة المغطية للجزء العلوي من الصدرية والذالية والمربعة المنحرفة. نتجها اليافها بانحراف الى الاعلى والانسية على جانب العنق وتندغم بالفك السفلي تحت الخط المنحرف الظاهر وبعضها بزاوية الفم وبعضها يغيب في النسيج الخلوي للوجه. اليافها المقدمة تتضمّر بالياف رفيقتها عند مقدم الفك السفلي وبعض اليافها الخلفية تختلط بالخاصة للشفة السفلى والخاصة لزاوية الفم وبعضها تستطيل الى جانب الخد وتختلط بعضلات زاوية الفم وقد تستصفي الى الزوجيتين والى الحافة السفلى للمحيطة الجفنية. ويشاهد تحت هذه العضلة الوريد الوداجي الظاهر نازلاً من زاوية الفك الى الترقوة. فاذا فُصِدَ يجب ان تكون الشحمة معارضة لاتجاه الالياف لانها اذا كانت موازية لها تنضم وتمنع خروج الدم. مجاورتها من الظاهر للجلد. ومن الباطن للترقوة والصدرية الكبيرة والمربعة المنحرفة من الاسفل. وفي العنق للوريدين الوداجيين الظاهر والمقدم واللفافة العنقية الغائرة والصفيرة العنقية السطحية والقصية الحلمية والقصية اللامية والكتفية اللامية وذات البطين. وتغطي الى الامام من القصية الحلمية غمد الاوعية السباتية والى الخلف منها العضلات الاخمعية واعصاب الصفيرة العنقية. وفي الوجه مجاورتها للغدة النكفية والشريان والوريد الوجهيين والمضغية والمبوقة

واللفافة العنقية الغائرة تُكشَف عند رفع العضلة الجلدية. وهي طبقة ليفية متينة تغلف عضلات العنق وترسل فواصل بينها وتحيط بالاعوية والاعصاب. تنشأ بطبقة رقيقة جداً عند قفا العنق حيث ترتبط بالتوات الشوكية للفقرات العنقية وبالرباط القفوي وتسير الى الامام وتنقسم عند الحافة الخلفية للقصية الحلمية الى طبقتين تحيطان بالعضلة المذكورة من الظاهر والباطن ثم تتحدان عند حافتها المقدمة فتصيران طبقة واحدة تسيروا الى مقدم العنق وتختلط بلفافة الجانب الخالف. وترتبط الطبقة السطحية لهذه اللفافة من الاعلى بالحافة السفلى للقوس الزوجي وبالحافة السفلى لجسم الفك السفلي ومن الامام بالعظم اللامي ومن الاسفل بالنص. وترتبط الطبقة الغائرة من الاعلى بالتوا الابرئ وبزاوية الفك السفلي فيتكون من ذلك الرباط الابرئ الفكي ومن الاسفل بالترقوة وغضروف الضلع الاول. وتعين الطبقة الغائرة هذه اللفافة في تكوين الغمد الذي يحيط بالشريان السباتي الاصلي والوريد الوداجي الباطن والعصب الرئوي المعدي وتحد الى تجويف الصدر وترتبط بالنامور

والعضلة القصية الترقوية الحلمية كبيرة غليظة تسيروا بانحراف على جانب العنق

في عضلات ولفائف العنق

٥	الجهة البلعومية	١	الجهة السطحية
	العاصرة العليا		الجلدية
	الابرية البلعومية		الفصية الترقوية الحلمية
	اللهاوية البلعومية	٢	الجهة اللامية السفلى
٦	الجهة اللهاوية		الفصية اللامية
	الرافعة للهاة		الفصية الدرقية
	الشادة للهاة		الدرقية اللامية
	المفردة الغلصية		الكتفية اللامية
	اللهاوية اللسانية	٣	الجهة اللامية العليا
	اللهاوية البلعومية		ذات البطنين
٧	الجهة الفقرية المقدمة		الابرية اللامية
	الراسية المستقيمة المقدمة الكبيرة		الضرسية اللامية
	الراسية المستقيمة المقدمة الصغيرة		الذقنية اللامية
	المستقيمة الجانبية	٤	الجهة اللسانية
	الطويلة العنقية		الذقنية اللامية اللسانية
٨	الجهة الفقرية الجانبية		اللامية اللسانية
	الاخعية المقدمة		اللسانية
	الاخعية المتوسطة		الابرية اللسانية
	الاخعية الخلفية		اللهاوية اللسانية
٩	الجهة الخجيرية وسياتي الكلام عليها في الخجيرة	٥	الجهة البلعومية
			العاصرة السفلى
			العاصرة المتوسطة


١ الجهة العنقية السطحية

الجلدية الفصية الترقوية الحلمية

اللفافة العنقية السطحية تظهر عند رفع الجلد من جانب العنق. وهي طبقة صفراوية رقيقة جداً يكاد لا يمكن فصلها وحدها. فاذا سُخِّتْ تشاهد تحتها العضلة الجلدية والوريد الوداجي الظاهر

طبقة وترية في الاثر الحشن الواقع بين زاوية الفك السفلي والثقب السني السفلي على الوجه الباطن. مجاورتها. من وجهها الظاهر لفرع الفك السفلي

شكل ١٢٩



المنفصلة عنه من الاعلى بالجناحية الوحشية والرباط الجانبي الانسي والشريان الفكي الباطن والاوعية والاعصاب السنية. ومن الباطن للشادة للماء

والجناحية الوحشية عضلة قصيرة يقرب شكلها من المخروط وضعها افقي بين الحفرة الزوجية والتواء للقي للفك السفلي. منشأها من المحظ الجناحي على الجناح العظيم للوتدي ومن

الوجه الوحشي للصفحة الجناحية الوحشية ومن حدبتي الحنكي والفك العلوي. توجه اليافها اتجاهاً افقياً الى الخلف والوحشية وتندغم في حفرة عند مقدم عنق التواء للقي للفك السفلي وفي الغضروف المفصلي المجاورة. ويظهر ان اصلها مؤلف من قسمين يفصلهما خلاء صغير. مجاورتها من وجهها الظاهر لفرع الفك السفلي وللشريان الفكي الباطن الذي يمر عليها ولوتر الصدغية والمضغية. ومن الباطن تستقر على الجزء العلوي للجناحية الانسية والرباط الجانبي الانسي والشريان السبائي المتوسط والعصب الفكي السفلي. ومن حافتها العليا للفروع الصدغية والمضغية من العصب الفكي السفلي

اعصاب هاتين العضلتين من العصب الفكي السفلي

عملها. الصدغية والمضغية والجناحية الانسية ترفع الفك السفلي على العلوي بقوة عظيمة. والمضغية والجناحية الانسية تعينان الجناحية الوحشية في جذب الفك السفلي الى الامام على العلوي. فاذا انجذب الى الخلف كان ذلك من عمل الالياف الغائرة للمضغية والالياف الخلفية للصدغية. والجناحيتان الوحشيتان هما العاملتان العظيمتان في المضغ فانهما تجذبان الفك السفلي الى الامام بحيث تبرز الاسنان السفلي الى مقدم العليا. فاذا عملت احدهما من الجانب الواحد انجذب الفك الى الامام وثبت التواء للقي من الجانب الاخر وانحرف الارتفاع الذقني الى الجهة المخالفة. واذا تعاقب عملها نتج من ذلك السحق

شكل ١٢٩ العضلتان الجناحيتان وقد قُطع القوس الزوجي ومعظم فرع الفك السفلي لاجل اظهارها ١ المنشأ الوتدي

للجناحية الوحشية ٢ منشأها الجناحي ٣ الجناحية الانسية

وتندغم في النصف العلوي لفرع الفك السفلي على وجهه الظاهر وفي الوجه الظاهر للتوالمقاري منه. يغطي بعض القسم الغائر من هذه العضلة قسمها السطحي من الامام وتغطيها الغدة النكفية من الخلف. وتعد الياق القسمين عند اندغامها. مجاورتها. من وجهها الظاهر للجلد. ومن الاعلى المحيطة الجفنية والزوجيتين. ونقاطها عرضاً قناة ستينو وفروع العصب الوحي والوعية الوجهية المستعرضة. ومن وجهها الباطن لفرع الفك والمبوقة التي تفصلها عنها طبقة دهنية واللفافة الصدغية تُشاهد في تشرح هذه الجهة مغشية للعضلة الصدغية. وهي صفاق متين تندغم بوجهها الباطن الالياف السطحية لهذه العضلة. تاليها من الاعلى من طبقة واحدة ترتبط بجميع طول الخط الصدغي ومن الاسفل من طبقتين ترتبطان بالحافة العليا للقوس الزوجي. وتضمن هاتان الطبقتان الفرع الحجاجي للشريان الصدغي. يغطيها من وجهها الظاهر صفاق المؤخرية الجبهية والمحيطة الجفنية والاذنيتان العليا والمقدمة. ونقاطها من الاسفل الى الاعلى الوعية والشرايين الصدغية

والصدغية عضلة عريضة مشعة وضعت على جانب الراس وشاغلة لجمع الحفرة الصدغية. منشأها من جميع الحفرة الصدغية التي تمتد من التو الزاوي الوحشي للجبهية من الامام الى القسم الخلفي للصدغي من الخلف ومن الخط المنحني للجبهية والجداري من الاعلى الى الخط الجناحي للجناح العظيم الوتدي من الاسفل. وترتبط ايضاً بالوجه الباطن للفاية الصدغية. وتجمع الياقها وتنتهي في وتر غليظ مسطح يندغم في الوجه الباطن للتوالمقاري وفي راسه وفي حافته المقدمة. مجاورتها. من وجهها الظاهر للجلد واللفافة الصدغية وصفاق المؤخرية الجبهية والاذنيتين العليا والمقدمة والوعية والاعصاب الصدغية والقوس الزوجي والمضغية. ومن الباطن للحفرة الصدغية والجناحية الوحشية وبعض المبوقة والشريان الفكي الباطن وفروعه الصدغية الغائرة والاعصاب الصدغية

اعصاب هاتين العضلتين من العصب الفكي السفلي

١٠ في الجهة الجناحية الفكية

الجناحية الوحشية

الجناحية الانسية

الجناحية الانسية عضلة غليظة مربعة الجوانب تشبه المضغية في الشكل والبناء واتجاه الالياف. منشأها من الحفرة الجناحية فترتبط بالوجه الباطن للصفحة الجناحية الوحشية وبالوجه المنحرف لحدبة العظم المنكي. توجه الياقها الى الاسفل والوحشية والخلف وتندغم بواسطة

للرباط الجناحي الفكي الى الخلف. تجتمع اليافها وتجه نحو زاوية الفم حيث تتصالب الالياف المركزية فتخلط السفلية بالطبقة العليا للمحيطة الشفوية والعلوية بالطبقة السفلي واما الالياف التي اعلى المركزية والتي اسفلها فتذهب على خط مستقيم وتخلط بما يقابلها من طبقتي المحيطة الشفوية. مجاورتها. من وجهها الظاهر الى الخلف لكتلة عظيمة دهنية تفصلها عن فرع الفك السفلي والمضغية ولبعض الصدغية والى الامام للزوجيتين والمضحكة والرافعة لزاوية الفم والمخافضة لزاوية الفم ولقناة سنينواتي ثقبها وتنفذ منها مقابل الضرس الثاني للفك العلوي. ويصاحبها من الاسفل الى الاعلى الشريان والوريد الوجهيان ويصاحبها ايضاً فروع الاعصاب الوجهية والقيمية. ومن الباطن للغدد القمية والغشاء المخاطي للفم

والرباط الجناحي الفكي يفصل المبوقة عن العاصرة العليا للبعوم وهو رباط وتري يرتبط من طرفه الواحد برأس الصفيحة الجناحية الانسية ومن الاخر بالطرف الخلفي للخط المنحرف الباطن للفك السفلي. وجهه الباطن يقابل تجويف الفم ويبطنه الغشاء المخاطي. وجهه الظاهر تفصله طبقة دهنية عن فرع الفك السفلي. ترتبط بجافته السفلي العاصرة العليا للبعوم وبجافته المقدمة المبوقة

والمضحكة ويقال لها عضلة سنوريني حزمة ضيقة منشأها من اللقافة اعلى المضغية تنبج الى الامام على خط افقي وتندغم بزواوية الفم مخلطة بالمخافضة لزاوية الفم اعصاب المحيطة الشفوية من الوجهي والمبوقة من الوجهي والفرع القمي للعصب الفكي

السفلي عملها. المحيطة الشفوية مضادة لجميع العضلات التي تجتمع الى الشفتين من الوجه فان عملها تطبيق الشفتين واذا انقبضت غاية الانقباض تجعد الجلد. والمبوقتان نقبضان وتضعطان الحدين بحيث يُحفظ الطعام منضغطاً بين الاسنان مدة المضغ

٩ في الجهة الصدغية الفكية

المضغية الصدغية

المضغية عضلة قصيرة غليظة تكاد تكون مربعة الجوانب مؤلفة من قسمين سطحي وغائر. فالقسم السطحي اعظمها ينشأ بصفاق غليظ وتري من التتو الوجهي للفك العلوي ومن الثلثين المقدمين للحافة السفلي من القوس الزوجي. تنبج اليافه الى الاسفل والخلف وتندغم في زاوية الفك السفلي وفي النصف السفلي لفرعه على وجهه الظاهر. والقسم الغائر صغير ينشأ من الثلث الخلفي للحافة السفلي من القوس الزوجي ومن جميع وجهه الباطن. تنبج اليافه الى الاسفل والامام

الجم وهي امتداد من العضلة الجذلية عند منشأها والمحيطة والمضخكة عند اندغامها. مجاورتها من وجهها الظاهر للجلد. ومن وجهها الباطن للمخافضة للشفة السفلى والمبوقة اعصاب هذا المجموع من العصب الوجهي عملها. الرافعة للشفة السفلى ترفع الشفة السفلى وتدفعها الى الامام وتجعد جلد الذقن. والمخافضة للشفة السفلى تجذب الشفة السفلى الى الاسفل وقليلاً الى الوحشية. والمخافضة لزاوية الفم تخفض زاوية الفم وتقاوم عمل الرافعة لزاوية الفم والزوجية الكبيرة. فاذا عملت معها انجذبت زاوية الفم الى الخلف

٨ في الجهة بين الفكين

المحيطة الشفوية - المبوقة - المضخكة

المحيطة الشفوية عضلة عاصرة بيضية الشكل مؤلفة من الياض الحلقية محيطية بفتحة الفم. وتنقسم هذه الالياف الى طبقتين غليظتين تحيطان بفتحة الفم من الاعلى والاسفل وتلتقيان عند زاويتي الفم حيث تنضفران بالياض المبوقة وغيرها من العضلات التي تندغم في هذه الجهة. الا ان الالياف الواقعة في الحافة السائبة للشفتين ممتدة من الشفة الواحدة الى الاخرى حول زاوية الفم. ويضاف لكل من الطبقتين المذكورتين عند طرفها الوحشي بعض الياض خاصة توصل الشفتين رأساً بالفكين العلويين والفك السفلي وبالفاصل الانفي. فالالياف الخاصة بالطبقة العليا مؤلفة من اربع حزم. حزمتان منها ترتبطان من الطرف الواحد بالحافة السنخية للفك العلوي مقابل الاسنان القواطع وتجهان الى الوحشية وتخلطان من الطرف الاخر بالياض العضلات التي تدخل في تاليف زاوية الفم ويقال لها الحزمتان الاضافيتان للمحيطة العلوية. واما الحزمتان الاخريان فيقال لها الانفيتان الشفويتان توصلان الشفة العليا بالفاصل الانفي الا انه اذا انحدرتا الى الاسفل تركتا خلافاً بينهما يقابل الخلاء الواقع بين الحزمتين الاضافيتين اللتين تنفرج اليافهما الى الوحشية كما سبق فيكون من الخلاء المذكور الانخفاض الذي يشاهد على وجه الجلد تحت الفاصل الانفي اعلى الشفة. واما الالياف الاضافية للطبقة السفلى فتنشأ من الفك السفلي الى الوحشية من الرافعة الذقنية وتجه الى الوحشية الى ان تخلط بالمبوقة وغيرها في زاوية الفم. مجاورتها من وجهها الظاهر للجلد ومن الباطن للغشاء المخاطي الفمي والغدد الشفوية والاوعية الاكليلية

والمبوقة عضلة عريضة رفيقة مربعة الجوانب شاغلة للخلايين الفكين عند جانب الوجه. منشأها من الوجه الظاهر للثوبين السنخيين مقابل الاضراس الثلاثة الاخيرة ومن الحافة المقدمة

الكجاج . ومن وجهها الباطن للفك العلوي والمبوقة والغشاء المخاطي والزوجية الكبيرة حزمة رقيقة منشأها من العظم الوجني امام الدرز الزوجي . نتجه اليافها بانحراف الى الاسفل والانسية وتندغم بزاوية الفم مختلطةً بالياف المحيطة الشفوية والخافضة لزاوية الفم . مجاورتها . من وجهها الظاهر للطبقة الدهنية التي تحت الجلد . ومن وجهها الباطن للعظم الوجني والمبوقة والزوجية الصغيرة منشأها من العظم الوجني خلف الدرز الفكي . نتجه اليافها الى الاسفل والانسية وتختلط بالحافة الوحشية للرافعة للشفة العليا وضعها امام سابقتها . مجاورتها . من وجهها الظاهر للجلد والمحيط الجفنية من الاعلى . ومن وجهها الباطن للرافعة لزاوية الفم اعصاب هذا المجموع من العصب الوجني عملها . الرافعة للشفة العليا ترفع الشفة وتجذبها قليلاً الى الوحشية . والرافعة لزاوية الفم ترفع زاوية الفم وتجذبها قليلاً الى الانسية . والزوجيتان ترفعان الشفة العليا وتجذبانها قليلاً الى الوحشية كما في الضحك

٧ الجهة الفكية السفلى (شكل ١٢٥)

الرافعة للشفة السفلى - الخافضة للشفة السفلى - الخافضة لزاوية الفم الرافعة للشفة السفلى ويقال لها الرافعة للذقن حزمة صغيرة مخروطية الشكل . وضعها على جانب قيد الشفة السفلى . منشأها من الحفرة التي تحت القواطع الى الوحشية من الارتفاق الذقي في الفك السفلي . تندحر اليافها وتندغم في جلد الذقن . مجاورتها . من وجهها الظاهر للغشاء المخاطي وفي الخط المتوسط تختلط برقيقتها من الجانب الاخر . ومن وجهها الوحشي للخافضة للشفة السفلى الخافضة للشفة السفلى ويقال لها المربعة الذقنية عضلة صغيرة مربعة وضعها الى الجانب الوحشي من سابقتها . منشأها من الخط المحرف للظاهر للفك السفلى بين الارتفاق الذقي والثقب الذقي . نتجه اليافها بانحراف الى الاعلى والانسية وتندغم في جلد الشفة السفلى مختلطة بالياف المحيطة الشفوية وبالياف رقيقتها من الجانب الاخر . وبين الياف هذه العضلة مادة دهنية صفراء . مجاورتها من وجهها الظاهر لبعض الخافضة لزاوية الفم وللجلد الذي تلتصق به التصاقاً شديداً . ومن وجهها الباطن للاوعية والاعصاب الذقنية والغشاء المخاطي للشفة السفلى والغدد الشفوية والرافعة للذقن والخافضة لزاوية الفم ويقال لها المثالثة الذقنية مثلثة الشكل . منشأها بقاعدتها العريضة من الخط المنحرف للظاهر للفك السفلي . نتجه اليافها الى الاعلى فتصير حزمة ضيقة وتندغم في زاوية

والضاغطة لفتحة الانف عضلة صغيرة مثلثة الشكل . ينشأ رأسها من الفك العلوي اعلى الحفرة الانسية وقليلًا الى الوحشية منها . نجه اليافها الى الاعلى والانسية وتفرج وتنتمي بصفاق رقيق . وهذا الصفاق يندغم بالغضروف الليفي للانف ويختلط برفيقه من الجانب الاخر وبصفاق الهرمية الانفية

والضاغطة الصغيرة لفتحة الانف عضلة صغيرة يرتبط طرفها الواحد بالغضروف الجناحي للانف والاخر بالجلد عند طرف الانف

والخافضة لجناح الانف عضلة قصيرة مشعة تنشأ من الحفرة الآسية للفك العلوي وتصعد اليافها وتندغم في الحاجز الانفي وفي الجهة الخلفية لجناح الانف . وضعها بين الغشاء المخاطي والبناء العضلي للشفة

اعصاب جميع هذا المجموع من العصب الوجهي

عملها . الهرمية الانفية تجذب الزاوية الانسية للحاجب الى الاسفل . وبعضهم يعدها رافعة للجناح ومعدة لفتحة الانف . والرافعة للشفة العليا وجناح الانف ترفع الشفة العليا وجناح الانف وانما اهم عملها تمديد فتحة الانف فيحصل من ذلك تاثير عظيم في السخنة التي تدل وقتئذ على الاحتقار . والممددتان توسعان فتحة الانف وكذلك الضاغطة للانف ولو كان اسمها مخالفاً لعملها . والخافضة لجناح الانف مضادة لاعمال العضلات السابقة فتجذب جناح الانف الى الاسفل وتضيّق الفتحة الانفية

٦ . الجهة الفكية العليا (شكل ١٣٥)

الرافعة للشفة العليا - الرافعة لزاوية الفم - الزوجية الكبيرة - الزوجية الصغيرة

الرافعة للشفة العليا عضلة رقيقة مربعة الجوانب . منشأها من الحافة السفلى للجناح اعلى ثقب تحت الجناح فترتبط بعض اليافها بالفك العلوي وبعضها بالوجني ثم تجتمع وتندغم بالجوهر العضلي للشفة العليا . مجاورتها . من وجهها الظاهر للقطعة السفلى من المحيطة الجفنية ومن الاسفل للجلد . ومن وجهها الباطن تغطي منشأ الضاغطة للانف والرافعة لزاوية الفم والواعية والاعصاب الخارجة من ثقب تحت الجناح

والرافعة لزاوية الفم منشأها من الحفرة النابية اسفل ثقب تحت الجناح . نجه اليافها الى الاسفل وقليلًا الى الوحشية وتندغم في زاوية الفم مختلطةً باللياف الزوجيين والخافضة لزاوية الفم والمحيطة الشفوية . مجاورتها . من وجهها الظاهر للرافعة للشفة العليا والواعية والاعصاب تحت


الاسفل او الانسية او الوحشية تبعاً لاسم العضلة العاملة. واذا عملت اثنتان من المستقيمتين الاربع انجذبت المقللة الى خط منحرف بين العاملتين. واذا عملت جميع المستقيمتين بالتعاقب دارت المقللة دوراً رحوياً كما تُدار الاعين لمشاهدة ما حول داخل البيت. وبعض المشرحين يعتبر هذه العضلات الفواعل العظيمة في توقيع القوة الباصرة لمسافات مختلفة وذلك بضغط المقللة فيستطيل قطرها الامامي الخلفي. وعمل المنحرفتين انهما تدبران المقللة دوراً رحوياً على محورهما الامامي الخلفي على مذهب المعلم سترذرس

٥ الجهة الانفية

الهرمية الانفية - الرافعة للشفة العليا وجناح الانف - المهددة الخلفية لفتحة الانف - المهددة الامامية لفتحة الانف - الضاغطة لفتحة الانف - الضاغطة الصغيرة لفتحة الانف. الخافضة لجناح الانف

الهرمية الانفية قطعة صغيرة هرمية الشكل هي استطالة المؤخرية الجبهية الى الاسفل على جانب الانف حيث تصير وترية وتختلط بالضاغطة لفتحة الانف فاذا انحدرت هاتان العضلتان الى الاسفل انفرجنا فصار خلائاً بينهما. مجاورتها من وجهها الظاهر للجلد ومن الباطن للعظم الجبهي والانفين

شكل ١٢٨



والرافعة للشفة العليا وجناح الانف عضلة رقيقة مثلثة الشكل وضعها بجانب الانف ممتدة من الحافة الانسية للجناح الى الشفة العليا. منشأها برأس مستدق من الجزء العلوي للتو الانفي من الفك العلوي وتجه بانحراف الى الاسفل والوحشية ثم تنقسم الى قطعتين تندغم احدها بغضروف جناح الانف والاخرى تنحدر الى الشفة العليا وتختلط هناك بالمحيطة الشفوية والرافعة للشفة العليا. مجاورتها. من الظاهر للجلد ومن الاعلى لبعض المحيطة الجفنية

والمهددة الخلفية لفتحة الانف عضلة صغيرة بعضها موضوع تحت سابقتها. منشأها من حافة الشرم الانفي للفك العلوي ومن الغضاريف السمسانية واندغامها في الجلد بقرب حافة الانف والمهددة الامامية لفتحة الانف حزمة صغيرة رقيقة تذهب

من غضروف جناح الانف الى الجلد بقرب حافته. وضعها الى الامام من سابقتها

شكل ١٢٨ عضلات الانف ١ الهرمية الانفية ٢ الجزء العلوي من الرافعة للشفة العليا وجناح الانف منقوب الى الوراء ٣ الضاغطة لفتحة الانف ٤ فتحة اضافية لها ٥ المهددة المقدمة لفتحة الانف ٦ المهددة الخلفية لفتحة الانف ٧ بعض الخافضة لجناح الانف ٨ القطعة العليا للمحيطة الشفوية ٩ و١٠ حزم اضافية للمحيطة الشفوية ١١ الضاغطة الصغيرة لفتحة الانف

ومن الغمد اللبني للعصب البصري وتندغم بواسطة وتر منبسط في الطبقة الصلبة على نحو ثلاثة
 او اربعة خطوط من الحافة القرنية . مجاورتها . من وجهها العلوي للرافعة الجفن . ومن وجهها
 السفلي للعصب البصري والشريان العيني والعصب الانفي . ومن الامام لوتر المنخرقة العليا والمقلة
 والمستقيمة السفلى والانسية منشأها بوتر مشترك يقال له رباط زنّ يندغم حول محيط
 الثقب البصري الامن الاعلى والوحشية . والمستقيمة الوحشية منشأها برأسين اعلاها يصعد من
 الحافة الوحشية للثقب البصري والسفلي من رباط زنّ ومن تو صغير على الحافة السفلى
 للفرجة الوتدية . وكل من هذه العضلات تسير الى الامام على جهة تُعرف من اسم العضلة وتندغم
 بوتر عريض في الطبقة الصلبة على ثلاثة او اربعة خطوط من حافة القرنية . وما بين الرأسين
 للمستقيمة الوحشية خلاء ضيق يمر منه العصب الثالث والفرع الانفي للخامس والعصب السادس
 والوريد العيني

والمنخرقة العليا مغزلية الشكل وضعها في الجانب العلوي والانسي للحجاج وللانسية من الرافعة
 للجفن . منشأها على مسافة خط للاعلى من الحافة الانسية للثقب البصري تسير الى الامام الى الزاوية
 الانسية للحجاج وهناك تنتهي بوتر مستدير يدخل في حلقة ليفية غضروفية واقعة في انخفاض تحت
 التو الزاوي الانسي للجفهي ثم يعكس الوتر المذكور الى الخلف والوحشية تحت المستقيمة العليا
 ويندغم بالجزء الوحشي للمقلة في الطبقة الصلبة عند نقطة متوسطة بين مدخل العصب البصري
 وحافة القرنية وبين المستقيمتين العليا والوحشية . مجاورتها من وجهها العلوي لقبوة الحجاج
 والعصب الرابع . ومن وجهها السفلي للعصب الانفي والحافة العليا للمستقيمة الانسية

والمنخرقة السفلى رقيقة ضيقة وضعها بقرب الحافة المقدمة للحجاج . منشأها من انخفاض في
 في الصفيحة المحجاجة للفك العلوي والى الوحشية من الميزاب الدمعي . تسير الى الوحشية والخلف
 تحت المستقيمة السفلى وبين المقلة والمستقيمة الوحشية وتندغم بالجزء الوحشي للطبقة الصلبة بين
 المستقيمتين العليا والوحشية بقرب اندغام وتر المنخرقة العليا . مجاورتها . من وجهها العلوي للمقلة
 والمستقيمة السفلى . ومن وجهها السفلي للسمحاق المغطي لارض الحجاج والمستقيمة الوحشية

اعصابها . اعصاب الرافعة للجفن والمنخرقة السفلى وكل المستقيمت الا الوحشية من العصب
 الثالث . واعصاب المنخرقة العليا من العصب الرابع . واعصاب المستقيمة الوحشية من العصب
 السادس

عملها . الرافعة للجفن ترفع الجفن العلوي وعملها مضاد لعمل المحيطة الجفنية . والمستقيمت
 الاربع مندغمة بالمقلة على نوع انه اذا عملت كل واحدة منها بمفردها انجذبت المقلة الى الاعلى او

بجواره من الوجه المحجاجة لهذا العظم. تنبج اليافها الى الانسية على الكيس الدمعي وتنقسم الى قطعتين
تغطيان القناتين الدمعيتين ثم تندغان بالفصروفين الجفنيين بقرب النقطتين الدمعيتين .
وقد لا يحق وجودها الا بالمجد

اعصاب المحيطة الجفنية والمجعدة للمحاجب من الوجهي والعصب فوق المحجاج والشادة للجفن


من الوجهي

عملها . المحيطة الجفنية عاصرة للجفنين . جزءها الجفني يطبق الجفنين وهو غير خاضع للارادة
وذلك من غير مشاركة للجزء المحيط فانه خاضع للارادة . فاذا عملت جميع العضلة انجذب جلد
الجبهة والصدغ والوجهة نحو الزاوية الانسية للعين وانطبق الجفنان بشدة . والرافعة للجفن العلوي
مضادة للمحيطة فانها ترفع الجفن وتظهر المقلة . والمجعدة للمحاجب تجذب المحاجب الى الاسفل
والانسية فتسبب الثنيات العمودية للجبهة . وعمل هذه العضلة يشعر بالغم . والشادة للجفن تجذب
الجفنين وطرفي القناتين الدمعيتين الى الانسية وتضغطها على سطح المقلة فتصيران في احسن موقع
لقبول الدموع . وتضغط الكيس الدمعي ايضاً

٤ الجهة المحجاجة

الرافعة للجفن - المستقيمة العليا - المستقيمة السفلى - المستقيمة الانسية - المستقيمة الوحشية - المخرفة العليا
المخرفة السفلى

شكل ١٢٧



الرافعة للجفن العلوي عضلة رقيقة مسطحة
مثلثة الشكل . تنشأ من الوجه السفلي للجناح الصغير
الوتدي للامام من الثقب البصري وتندغم بواسطة
وتر عريض في الحافة العليا للفصروف الجفني العلوي .
مجاورتها . من وجهها العلوي للعصب والشريان

الجبهيين . ومن الامام للوجه الانسي للرباط الجفني العريض . ومن وجهها السفلي للمستقيمة
العليا . وفي الجفن للملتحم . يدخلها من وجهها السفلي فرع من العصب الثالث
والمستقيمة العليا ارق المستقيمتين الاربع واضيقها تنشأ من الحافة العليا للثقب البصري


شكل ١٢٧ عضلات المقلة وهي الجهة المحجاجة كما نشاهد من الجانب الوحشي للجناح الايمن ١ قطعة من العظم الوتدي التي
يرمنها العصب البصري ٢ العصب البصري ٣ المقلة ٤ الرافعة للجفن العلوي ٥ المخرفة العليا ٦ بكرتها اللبيفة ٧ وترها
المعكس ٨ المخرفة السفلى ٩ المستقيمة العليا ١٠ المستقيمة الانسية والعصب البصري حاجب بعضها ١١ بعض المستقيمة
الوحشية مع راسيها اللذين تنشأ بها ١٢ طرف المستقيمة الوحشية عند مندغها وقد فُطع القسم المتوسط ١٣ المستقيمة السفلى
١٤ الطبقة البيضاء المكونة من انبساط اوتار المستقيمتين الاربع

الانسي ومن التوالاني للفك العلوي امام الميزاب الدمعي ومن وتر الجفنين الموضوع في الزاوية الانسية للحجاج. ومن هذا المنشأ تنبج اليافها الى الوحشية وتكون طبقة عريضة رقيقة تغطي الجفنين وتحيط بدائرة الحجاج وتنسبط على الصدغ وعلى الوجنة وتخلط بالموخرية الجبهية والمجعدة للحاجب. وهي منقسمة الى جزئين. فالجزء الجفني ويقال له الهدبي رقيق يميل الى الصفرة ينشأ من وتر الجفنين ويتكون من خطوط منحنية نصف اهليلجية تتصل على زاوية حادة الى الوحشية من الجفنين. والجزء المحيط ويقال له العريض غليظ احمر بيضي الشكل

واما وتر الجفنين فقصير طولة نحو خطين وعرضه خط واحد يندغم بالتق الانفي للفك العلوي امام الميزاب الدمعي. يقاطع الكيس الدمعي اولاً ثم ينقسم الى جزئين يندغم كل منهما بالطرف الانسي لما يقابله من الغضروف الجفني. وعند تقاطعه للكيس الدمعي ترسل من وجهه الخلفي طبقة متنية تنسبط على الكيس المذكور وتندغم بالخط البارز الذي على العظم الدمعي مجاورتها. من وجهها الظاهر للجلد. ومن وجهها الباطن للموخرية الجبهية والمجعدة للحاجب ولاوعية وعصب فوق الحجاج. ومن الاسفل تغطي الكيس الدمعي ومنشأ الرافعة للشفة العليا والرافعة للشفة العليا وجناح الانف. ومن الانسية قد تخلط بالهرمية الانفية. ومن الوحشية تغطي اللقافة الصدغية. ويفصلها عن الغشاء المتتم غشاء ليفي والغضروف الجفني

والمجعدة للحاجب عضلة صغيرة ضيقة هرمية وضعها عند الطرف الانسي للحاجب تحتم الموخرية الجبهية والمحيطة الجفنية. منشأها من الطرف الانسي للقوس المحاجبي. اتجاه اليافها الى الاعلى والوحشية وتندغم في الوجه السفلي للمحيطة الجفنية مقابل نصف القوس المحاجبي. مجاورتها. من وجهها المقدم للموخرية الجبهية والمحيطة الجفنية. ومن وجهها الخلفي للعظم الجبهي والعصب البكري

شكل ١٢٦



والرافعة للجفن ياتي شرحها في الكلام على الجهة المحاجبية

والشادة للجفن عضلة صغيرة عرضها نحو ثلاثة خطوط وطولها ستة. وضعها في الجهة الانسية للحجاج خلف وتر العين. منشأها من عرف العظم الدمعي وما

شكل ١٢٦ العضلة الشادة للجفنين ١ او جزء وهي من التجويف المحاجبي ٢ الفرجة التي بين الجفنين ٣ الوجه المحاجبي للعظم الدمعي ٤ منشأ الشادة للجفنين ٥ وه مندها بقرب النقطتين الدمعيتين

القوس الزوجي. وهذا الصفاق يلتصق بالجلد من الظاهر ويتصل بالسحاق من الباطن اتصالاً رخوياً بواسطة نسيج خلوي بحيث تمكن حركة الجلد اعصابها. اعصاب القطعة الجبهية فروع من العصب فوق الحاجب والوجهي. والقطعة المؤخرية من الفرع الاذني الخلفي للوجهي واحياناً من المؤخري الصغير عملها. القطعة الجبهية ترفع الحاجب والجلد الذي اعلى اصل الانف وثني جلد الجبهة ثنيات مستعرضة اشعاعاً بجاسة الفرع. واذا تعاقب عمل القطعتين المؤخرية والجبهية تحرك جلد الراس من الامام الى الخلف

٢ الجهة الاذنية

الاذنية العليا - الاذنية المقدمة - الاذنية الخلفية

هذه العضلات الثلاث صغيرة جداً في الانسان الذي اذنه الظاهرة لا تتحرك الا قليلاً جداً وعظيمة ومهمة في بعض الحيوانات ذوات الثدي فالاذنية العليا ويقال لها الرافعة للاذن اكبرها رقيقة مثلثة الشكل منشأها من صفاق المؤخرية الجبهية وتجمع اليافها الى نقطة وترية فتندغم بالجزء العلوي للصيوان على وجهه الخوذى والاذنية المقدمة ويقال لها الجاذبة للاذن الى الامام اصغرها رقيقة مثلثة قليلة الوضوح. منشأها من المحافة الجانبية لصفاق المؤخرية الجبهية. تجمع اليافها وتندغم بمقدم الايلكس والاذنية الخلفية ويقال لها الجاذبة الاذن الى الخلف مؤلفة من حزمتين او ثلاث لحمية. منشأها من الجزء الحلمي للصدغي. تندغم بالجزء السفلي للصيوان على وجهه الخوذى مجاورتها. من الظاهر للجلد. ومن الباطن العليا للصفاق الصدغي والمقدمة للنافذة الصدغية التي تفصلها عن الشريان والوريد الصدغيين والخلفية للجزء الحلمي من العظم الصدغي اعصابها. اعصاب العليا من المؤخري الصغير والمقدمة من الوجهي والفرع الاذني الصدغي للفكي السفلي والخلفية من الفرع الخلفي الاذني للوجهي عملها. اعمال هذه العضلات في الانسان قليلة جداً. فاذا عملت العليا جذبت الاذن الى الاعلى والمقدمة الى الامام والخلفية الى الخلف

٣ الجهة الجفنية

المحيطة الجفنية - الجمدة للحاجب - الرافعة للجفن - الشادة للجفنين

المحيطة الجفنية عضلة عاصرة مبطنة بدائرة الحاجب والجفنين. منشأها من التوايحاجي

من الجانبين وتضمن بين طبقاتها العضلات الاذنية والاعصاب السطحية الصدغية والعضلة الموخرية الجبهية طبقة عضلية ليفية تغطي جميع الجانب الواحد لقمة الجبهة من الفقا الى الحاجب . وهكذا من الجانب الاخر فهما عضلتان او عضلة مزدوجة مولفة من قطعتين عضليتين يفصلها صفاق وترتي متوسط بينهما .

شكل ١٢٥



فالقطة الموخرية رقيقة مربعة الجوانب طولها نحو قيراط ونصف تنشأ من الثلثين الوحشيين للخط المنحني العلوي من العظم الموخري ومن القسم الحلي للعظم الصدغي. الياف منشأها وترية ثم تصير عضلية وتصدر متوازية وتنتهي في الصفاق الوترتي المتوسط بين القطعتين. والقطة الجبهية رقيقة مربعة الجوانب ملتصقة بالجلد. اليافا الانسية مختلطة بالعضلة الهرمية الانفية. واليافا المتوسطة مختلطة بالجمدة للحاجب والمحيطة الجفنية. واليافا الوحشية مختلطة بالمحيطة الجفنية اعلى

النواحج الوحشي للجبي . وتتصل هذه الالياف من الاعلى بالصفاق المتوسط تحت الدرز الاكليي . والحافة الانسية للقطة الجبهية تتصل برفيقتها من الجانب الآخر فوق اصل الانف . واما القطعتان الموخريتان فيبينها خلاء

والصفاق المتوسط يغطي الجزء العلوي لقمة الجبهة ويختلط برفيقتها من الجانب الاخر في الخط المتوسط. ويندغم من الخلف بالحدبة الموخرية والخط المنحني العلوي فوق اندغام المربعة المنخرقة اي في الخلاء الذي بين القطعتين الموخريتين . ومن الامام يستطيل ويدخل بين القطعتين الجبهيتين . ومن الجانب نتصل به الاذنتان العليا والمقدمة ثم تمتد فوق اللقافة الصدغية الى

شكل ١٢٥ عضلات الراس والوجه ١ القطعة الجبهة للعضلة الموخرية الجبهة ٢ القطعة الموخرية ٣ الصفاق المتوسط بين القطعتين ٤ المحيطة الجفنية التي تجذب الجمدة للحاجب والشادة للجفنين ٥ الهرمية الانفية ٦ الضاغطة للفتحة الانفية ٧ المحيطة الشفوية ٨ الرافعة للشفة العليا ولجناح الانف . والحزمة التي الى الوحشية من الرقم هي الفتحة الشفوية منها ٩ الرافعة للشفة العليا ١٠ الزوجية الصغيرة ١١ الزوجية الكبيرة ١٢ الحافضة للشفة السفلى ١٣ الحافضة لزاوية الفم ١٤ الرافعة للشفة السفلى ١٥ القسم السطحي للمضغية ١٦ بعض قسمها الفائر ١٧ الاذنية المقدمة ١٨ المبوقة ١٩ الاذنية العليا ٢٠ اللقافة الصدغية التي تغطي العضلة الصدغية ٢١ الاذنية الخلفية ٢٢ البطن المقدم لذات البطنين ويشاهد ان وترها مار في بكرته الصفاقية التي تربطه بالعظم اللامي ٢٣ الابرية اللامية مثقوبة من البطن الخلفي لذات البطنين ٢٤ الضرسية اللامية ٢٥ القسم العلوي للقصة الخلفية ٢٦ القسم العلوي للمربعة المنخرقة . والعضلة التي تشاهد بين ٢٥ و٢٦ هي الظلمة

٩ الجهة الصدغية الفكّية

١٠ الجهة الجناحية الفكّية

٧ الجهة الفكّية السفلى

٨ الجهة بين الفكّين

اسماء عضلات المجاميع المذكورة على ترتيبها

٥ الجهة الانفية

الضاغطة للفتحة الانفية

الضاغطة الصغيرة لها

الخافضة لجناح الانف

٦ الجهة الفكّية العليا

الرافعة للشفة العليا

الرافعة لزاوية الفم

الزوجية الكبيرة

الزوجية الصغيرة

٧ الجهة الفكّية السفلى

الرافعة للشفة السفلى

الخافضة للشفة السفلى

الخافضة لزاوية الفم

٨ الجهة بين الفكّين

المبوقة

المضحكة

الحيطة الشفوية

٩ الجهة الصدغية الفكّية

المضغية

الصدغية

١٠ الجهة الجناحية الفكّية

الجناحية الوحشية

الجناحية الانسية

١ الجهة الخوذية

المؤخرية الجبهية

٢ الجهة الاذنية

الاذنية العليا

الاذنية المقدمة

الاذنية الخلفية

٣ الجهة الجفنّية

الحيطة الجفنّية

المجمّدة للحاجب

الشادة للجفنّين

٤ الجهة المحجّاجية

الرافعة للجفنّ العلوي

المستقيمة العليا

المستقيمة السفلى

المستقيمة الانسية

المستقيمة الوحشية

المنخرقة العليا

المنخرقة السفلى

٥ الجهة الانفية

الهرمية الانفية

الرافعة للشفة العليا وجناح الانف

المهددة الخلفية للفتحة الانفية

المهددة المقدمة للفتحة الانفية

١ الجهة الخوذية

المؤخرية الجبهية

اللفافة السطحية لهذه الجهة متمينة كنزرة ملتصقة التصاقاً شديداً بالجلد والعضلة المؤخرية

الجبهية وشفافها الوتري، وهي ممتدة من اللفافة السطحية للعنق من الخلف وتغطي الشفاق الصدغي

الراحية لليدين والقدمين حيث يكون الجلد ملتصقاً باللفافة الغائرة. ومن فوائد هذه اللفائف فضلاً عن كونها الموصلة للجلد بالاجراء التي تحته انها مجمع للاوعية والاعصاب الجلدية وانها تحافظ على حرارة الجسد لكون الطبقة الدهنية الواقعة في خلاياه موصلاً ردياً للحرارة واللفائف الصفاقية او الغائرة اغشية ليفية متينة لاشيء من المرونة فيها يتكوّن منها اغماد للعضلات وقد ترتبط العضلات بواسطتها. تأليفها من خيوط وترية لامعة متوازية منضمة بعضها الى بعض بواسطة خيوط اخر مستعرضة. وضعها تحت اللفائف السطحية ويتكوّن منها غلاف متين يحيط بالعضلات الخاصة بكل جهة فيربطها سوية ويرسل زوائد تنصلها بعضها عن بعض فتغلف كلاً منها على حدتها وتغلف ايضاً الاوعية والاعصاب. وهي سميكة في المواقع غير المحمية كالوجه الوحشية للاعضاء رقيقة في الوجه الانسية. والصفق على نوعين اندغامية وغلافية. فالصفق الاندغامية فائدتها ان العضلات تندغم بالعظام بواسطتها. ومن هذه الصفق ما هو امتداد الاوتار كوتر الخياطية. ومنها ما هو ليس كذلك كصفق العضلات البطنية. والصفق الغلافية تكوّن غلافاً عاماً لعضو كامل وغلافاً خاصاً لكل عضلة بمفردها. الا ان بعض الصفق يخدم الحذمتين المذكورتين فيكون واسطة لاندغام العضلات وغلافاً لها ايضاً كالصفاق المنسط من وترذات الرأسين العضدية عند اندغامها فانه يختلط بالصفاق الغلافي للساعد ومنه تنشأ عضلات هذه الجهة. ثم ان اللفائف الغائرة تعين احياناً العضلات في عملها وذلك بواسطة الشد والضغط اللذين تفعلها على وجوه العضلات كالشادة لغمد الفخذ. وتحيط اللفائف بالاطراف احاطة تامة وترسل فواصل لفصل العضلات بعضها عن بعض وترتبط هذه الفواصل بالسحماق من الاسفل فيقال لها الفواصل بين العضلات

نقسم العضلات واللفائف الى اربعة اقسام كبرى وهي الاقسام العامة للجسد. اولها عضلات الرأس والوجه والعنق. الثاني عضلات الجذع. الثالث عضلات الطرف العلوي. الرابع عضلات الطرف السفلي

في عضلات ولفائف الرأس والوجه

نقسم عضلات الرأس والوجه الى عشرة مجاميع مرتبة بحسب الجهة الواقعة هي فيه

١	الجهة الخوذية
٢	الجهة الاذنية
٣	الجهة الجفنية
٤	الجهة الجحاجية
٥	الجهة الانفية
٦	الجهة الفكية العليا

العظم عن محله الطبيعي في الانواع المختلفة للكسر والمخلع والآفات الاخر التي تصيبه فيستعمل لمقاومة الخلل الوسائط الصوابية. ويجب عليه ان ينبيه كل الانتباه الى مجاورة بعض العضلات من جهة الاعوية الدموية العظيمة لانها تكون دليلاً للجراح في ربط الاعوية المذكورة

الوتار حبال ليفية البقاء بيضاء لامعة تختلف في الطول والغلاظة وتكون احياناً مستديرة واحياناً مسطحة. وهي قوية وليس فيها من المرونة الا ما قل. تاليفها من نسيج ابيض ليفي اليافة متوازية ومنظمة بعضها الى بعض انضماماً متيناً. او عيتها الدموية واعصابها قليلة جداً وفي الوتار الصنيرة لا يشاهد شيء منها. والصفق اغشية ليفية لونها ابيض لؤلؤي قرحة لامعة وبنائهما يشبه بناء الوتار. لا يوجد فيها اعصاب والغليظة منها فقط ياتيها بعض اعوية دموية. فهذه الوتار والصفق تتصل من الجهة الواحدة بالعضلات ومن الجهة الاخرى بالابنية المتحركة كالعظام والتمضاريف والاربطة والاعشية الليفية كالصلبة والاعشية الزلاية كارتباط العضلة تحت الفخذية

واللفائف "طبقات ليفية خلوية او صفاقية تختلف في السماكة والقوة وتوجد في كل اجزاء الجسد محيطة بالاعضاء اللينة الغضة. وقد قسمت بالنظر الى بنائها الى قسمين ليفية خلوية ويقال لها سطحية ايضاً وصفاقية ويقال لها غائرة

فاللفائف الليفية الخلوية موضوعة تحت الجلد محيطة بجميع الجسد تقريباً ويقال لها غالباً اللفائف السطحية. فائدتها انها توصل الجلد باللفائف الغائرة او الصفاقية. تاليفها من نسيج ليفي خلوي يتضمن بين خلاياه كتل دهنية الا في الاجفان والصفن فهو كثير التعرض هناك للرشح المصلي. وتختلف سماكة اللفافة السطحية بحسب المحل الواقعة هي فيه. فهي سمكة جداً في الأربية مثلاً (وهي اصل الفخذ) بحيث يمكن فصلها الى طبقات عديدة ورقيقة جداً في راحة اليد ملتصقة بالجلد. ويمكن فصل اللفافة السطحية الى طبقتين او اكثر توجد بينهما الاعوية الدموية السطحية والاعصاب السطحية والاعوية الليففاوية السطحية كالاعوية الشراسيفية السطحية في القسم البطني والوريد بن الكعبري والزندي في الساعد والوريد بن الصافنين في الساق والفخذ وتوجد بينها احياناً عضلات كالعضلة الجلدية في العنق والمحيطة بالاجفان. وهي اكثر وضوحاً في الجزء السفلي للبطن وفي الصفن والعجان والاطراف ورقيقة جداً في الجهات التي ترتبط فيها العضلات بالجلد كجانب العنق والوجه وحول حافة الالست وتكاد تكون معدومة في الجهة

وتتصل العضلات بالعظام والغضاريف والاربطة والمجلد اما رأساً او بواسطة ابنية ليفية يقال لها اوتار وصفاقات. فاذا كان ارتباط العضلة بالعظم او الغضروف انتهت اليافها باطراف مندغمة في السمحاق او الغشاء الغضروفي لافي نفس العظم او الغضروف. واذا كان اتصالها بالمجلد فتكون على شكل طبقة مسطحة موضوعة تحته وانها تتصل بنسجته الخلوي بواسطة حزم ليفية كما في عضلات الوجه

واما شكل العضلات فيختلف كثيراً. لانها في الاطراف طويلة تغطي العظام. وفي المذرع عريضة مسطحة تحيط التجاويف العظمية وتكون جدرانها. ولذلك يقال في وصفها انها طويلة او قصيرة او غير ذلك تبعاً لشكلها. وتختلف بعض العضلات عن غيرها من جهة وضع اليافها بالنظر الى الاوتار. ففي بعض العضلات الالياف موضوعة طولاً وتنتهي من طرفيها بوتر ضيق. فاذا كان الوتر ممتداً على طول العضلة وكانت اليافها خارجة من جانبه الواحد قيل انها ريشية الشكل كالعضلات الشظوية. فاذا كانت خارجة من جانبيه الاثنين قيل ريشية مزدوجة كالمستقيمة الفخذية. واذا اجتمعت من سطح عريض الى نقطة وتربية قيل مشععة لان اليافها موضوعة كالاشعة المنفرجة من نقطة منيرة كالصدغية والالويات. وتختلف ايضاً من جهة حجمها فان التوأمية الساقية تكون معظم بطن الساق والياف الخياطية طولها نحو قدمين والركابية وهي عضلة صغيرة في باطن الاذن وزنها نحو قمح. غير انها في كل حال مع اختلاف شكلها وجرمها موافقة على اتم ما يكون للاعمال المطلوبة منها

والاسماء الموضوعة للعضلات المختلفة ماخوذة عن الظروف الآتية ١ وضعها كالقصية والشظوية والزندية والكعبرية ٢ اتجاهها كالمستقيمة البطنية والمنحرفتين الراسيتين والمستعرضة ٣ وظيفتها كالتواضع والبواسط والمقربات والمبعدات ٤ شكلها كالدالية والمربعة المنحرفة ٥ عدد اقسامها كذات الراسين وذات البطنين وثلاثية الرؤوس ٦ محل ارتباطها كالقصية الترقوية الحلمية والقصية اللامية والقصية الدرقية

وفي وصف العضلات كثيراً ما يذكر منشأها ومندغمها فيراد بالمنشأ نقطة ارتباطها الثابتة وبالمندغم النقطة المتحركة. ولكن هذا القول لا يصح الا في بعض العضلات كالعضلات الوجهية التي ترتبط من الطرف الواحد بالعظم ومن الطرف الاخر بالمجلد المتحرك. ففي اكثر العضلات يمكن عملها من كل من الطرفين. وفي تشريح العضلات يجب على التلميذ ان ينتبه على الخصوص الى منشأها ومندغمها ووظائفها ومجاوراتها المهمة للاجزاء القريبة لها. فان معرفة محال الارتباط تؤدي الى معرفة وظيفتها واذا عرفت وظيفتها امكن الجراح ان يفهم اسباب خروج

وقد اختلفوا كثيراً من جهة حقيقة الخطوط الطولية والعرضية ولم يتفقوا عليها الى الآن . واما
الخيوط الاصلية التي نتوقف عليها خاصة الانقباض العضلي فاسطوانية الشكل مسطحة قليلاً
سماك الواحد منها نحو $\frac{1}{180}$ جزء من القيراط . وعليها خطوط عرضية ايضاً بعد الخط الواحد
عن الآخر نحو $\frac{1}{100}$. فمن هذا النوع من النسيج العضلي تتألف جميع العضلات الخاضعة
للارادة وعضلات الاذن والحنجرة والبلعوم واللسان والنصف العلوي للمرىء والقلب وجدران
الاوردة عند اتصالها بالقلب

وعضلات الحياة الالية ويقال لها غير المخططة ايضاً مؤلفة من الياض مستطيلة مغزلية
مسطحة لونها يميل الى الصفرة عرض كل خيط منها نحو $\frac{1}{300}$ مبقعة بحيث يظهر شكل ١٢٤
انها مخططة وليست كذلك بالحقيقة وفي كل ليفة نواة عصبوية الشكل . وتنضم
الالياض في حزم يجمعها نسيج خلوي والياض مرنة . وقد تكون هذه الحزم متوازية
وقد تتصلب وتتقاطع . وهذا النوع من النسيج العضلي يوجد في القناة الغذائية
مكوناً للطبقة العضلية من نصف المريء الى العاصرة الباطنة للاست وفي
الجدار الخلفي للقصبة وفي الشعب الرئوية وفي الغدة تحت الفك وفي الحوصلة
المرارية والقناة الصفراوية المشتركة وفي كوروس الكلية وحوضها وفي الحالمين
والمثانة وقليلاً في مجرى البول وفي النساء في المهبل والرحم وقناتي فلوبيوس والرباطين
العريضين وفي الذكور في العجان والاعوية المنوية والبروستتا وفي الاجسام الكهفية في الجنسين
وفي طبقات جميع الشرايين واكثر الاوردة والاعوية الليمفاوية وفي القرحة والعضلة الهدبية
وفي الجلد



ويتوزع في النسيج العضلي مقدار عظيم من الاعوية الدموية . والاعوية الليمفاوية التي توجد
في العضلات قليلة والظاهر انها لا توجد الا في الكبيرة فقط . واما اعصاب العضلات الارادية
فعظيمة وتمتد فرعها بين الحزيمات وتتشعب ثم تتصل وتكون ضفائر اصلية يخرج منها خيوط
عصبية تمتد بين الالياض العضلية

ويحيط بكل عضلة من الظاهر طبقة رقيقة خلوية يقال لها غمد العضلة لا تغلف وجهها
الظاهر فقط ولكنها تنفذ الى باطنها وتغلف الحزيمات وتضمها بعضها الى بعض فتكون كثافة
العضلة والحزيمات المؤلفة منها


شكل ١٢٤ ليفتان اصليتان من العضل غير المخطط A ليفة من المثانة B ليفة من المعدة . مكبرتان ٦٠٠ ضعف . قطر
الواحدة منها $\frac{1}{270}$ جزء من القيراط . ويشاهد في كل منها نواتان

الفصل الثالث

في العضلات واللفائف

العضلات هي الجهاز المتعدي للحركة الانتقالية. وهي مؤلفة من حزم الياف حمراء تركيبها الكيماوي من الفيرين ولها خاصية الانقباض. والنسيج العضلي على نوعين احدهما خاص بالحياة الارادية او الحيوانية والثاني خاص بالحياة غير الارادية او الآلية

فعضلات الحياة الحيوانية ويقال لها المخططة ايضاً خاضعة للإرادة وهي مؤلفة من حزم الياف يحيطها نسيج رقيق خلوي. وكل حزمة مؤلفة من حزميات يحيطها نسيج خلوي خاص بها. وكل حزمة مؤلفة من حزم صغيرة جداً يقال لها الحزم الصغيرة الاصلية. وكل حزمة اصلية مؤلفة من خيوط تحيطها لفافة شفافة مرنة. فالحزم الاصلية شكلها اسطواني او منشوري عرضها يختلف



من $\frac{1}{3}$ الى $\frac{1}{10}$ جزء من القيراط. يمتاز هذا النوع من الالياف العضلية بان يوجد عليها بحسب الظاهر خطوط عرضية دقيقة مظلمة محيطة بها. ويوجد عليها خطوط طولية ايضاً تدل على اتجاه الخيوط الاصلية التي تتألف منها الحزم الاصلية ولكنها اقل وضوحاً من المخطوط العرضية.

شكل ١٢١ و ١٢٢ و ١٢٣ البناء الميكروسكوبي للعضل المخطط شكل ١٢١ حزمة اصلية مخططة بلقائفها. ويشاهد عليها المخطوط الطولية والعرضية

شكل ١٢٢ تاليف الخيوط الاصلية على مذهب المعلم بومان ٢ خيط واحد ٢ خيوط جملة منضبة بواسطة لفافة شفافة شكل ١٢٣ حزمة منطوية عرضاً من العضلة ذات الراسين. ويشاهد انها مؤلفة من حزم اصلية كثيرة الجوانب لسبب انضغاطها. والنقط الصغيرة التي ضمنها تشير الى اطراف الخيوط الاصلية

الاول رباطة واحدة تانيه من الاسفني الانسي. ولثاني ثلاثة رباطة من كل من الاسفنية الثلاثة. ولثالث رباطة من الاسفني الوحشي. وللرابع رباطة من المكعب. وكذلك الخامس والاربطة الاخمصية كالظهيرية الا انها موضوعة على الوجه الاخصي للقدم والاربطة بين العظام ثلاثة انسي ومتوسط ووحشي. فالانسي يربط الطرف الوحشي للاسفني الانسي بالزاوية الانسية للمشطي الثاني. والمتوسط يربط الاسفني الوحشي بالزاوية الوحشية للمشطي الثاني. والوحشي يربط الزاوية الوحشية للاسفني الوحشي بالجانب المجارلة من المشطي الثالث

والاغشية الزلاية لهذه المفاصل ثلاثة. الاول لاتصال مشطي الابهام بالاسفني الانسي. والثاني لاتصال المشطي الثاني والثالث بالاسفني المتوسط والوحشي وهذا الغشاء متصل بالغشاء العظيم الزلاي للرسغ. والثالث لاتصال المشطي الرابع والخامس بالمكعب. فتكون جميع الاغشية الزلاية الخاصة بالرسغ والعظام المشطية ستة

اتصال العظام المشطية ببعضها ببعض

تتصل العظام المشطية بعضها ببعض الا الابهامي بواسطة اربطة ظهيرية واخصية وبين العظام. فالاربطة الظهيرية والاخصية تمتد من المشطي الواحد الى المجارلة. والاربطة بين العظام غائرة الوضع وترتبط الوجوه الجانبية الخشنة بعضها ببعض. ولطرف العظام المشطية السلامي رباط مستعرض يختلف عن الرباط اليديوي بانه يربط المشطي الابهامي بالعظام المشطية الباقية عملها. حركة الاطراف الرسغية للعظام المشطية ضعيفة تقتصر على انزلاق الوجوه المفصالية بعضها على بعض. واما اطرافها السلامية فحركتها اعظم

٧ اتصال العظام المشطية بالسلاميات

هذه المفاصل مكوّنة من دخول رويس العظام المشطية في السطوح المقعرة المفصالية للسلاميات الاول. اربطتها اخصية وجانبية فهي كالاربطة التي تقابلها في اليد من كل جهة. وتر البواسط بمنزلة اربطة ظهيرية. حركتها القبض والبسط والتقريب والتباعد

٨ اتصال السلاميات بعضها ببعض

لكل مفصل منها رباط اخصي ورباطان جانبيان. فهي كاربطة سلاميات اليد وحركتها كذلك

فيختلط منشأ الرباط العقبي المكعبي الانسي ثم يسير من الجانب الانسي لطرف العقب المقدم ويرتبط بالجانب الوحشي للزورقي

والرباط العقبي الزورقي السفلي أكبر جداً من سابقه واقوى فهو رباطة عريضة غليظة تمتد الى المقدم والانسية من الطرف المقدم والانسي للعقب الى الوجه السفلي للزورقي . وهذا الرباط يرتبط العقب بالزورقي ويكون بعض الحفرة المفصلي لقبول راس الكعب . وجهه العلوي مغطى بغشاء زلالي ممتد من المفصل العقبي الكعبي المقدم . وجهه السفلي مجاور لوتر القصبة الخلفية

٢. واتصال الزورقي بالكعب من المفاصل الرحوية فان الراس المستدير للكعب يدخل في الحفرة المكونة من الوجه الخلفي للزورقي والوجه المفصلي المقدم للعقب والوجه العلوي للرباط العقبي الزورقي السفلي . ولهذا المفصل رباط واحد فقط هو الكعبي الزورقي العلوي . والرباط المذكور عريض يسير منحرفاً نحو المقدم من عنق الكعب الى الوجه العلوي للزورقي . وهو رقيق تغطيه الاوتار الباسطة . والرباط العقبي الزورقي يقوم مقام رباط سفلي لهذا المفصل

ولهذا المفصل غشاء زلالي ممتد الى المقدم من المفصل العقبي الكعبي المقدم . وعلى ذلك تكون الاغشية الزلالية الخاصة بمفاصل الرسغ اربعة . الاول للمفصل العقبي الكعبي الخلفي . والثاني للمفصل العقبي الكعبي المقدم والمفصل الكعبي الزورقي . والثالث للمفصل العقبي المكعبي والرابع لاتصال الزورقي بالاسفينية الثلاثة والاسفينية بعضها ببعض والاسفيني الوحشي بالمكعب والاسفيني المتوسط والوحشي بقاعدة المشطي الثاني والثالث

عملها . الحركة التي تتم بين الكعب والعقب انزلاق الواحد على الاخر من المقدم الى المؤخر ومن الجانب الى الجانب . والحركة التي تتم بين عظام الصف الثاني جزئية لا تعتبر . والحركة التي تتم بين الصفيين من النوع الرحوي بحيث ينقبض الاخمص وينبسط ويقرب ويبعد

٦ . في المفاصل الرسغية المشطية

هي من المفاصل المنزلة ومكوّنة من اتصال الاسفيني الانسي والمتوسط والوحشي والمكعب بالعظام المشطية الخمسة . فيتصل المشطي الابهامي بالاسفيني الانسي . والمشطي الثاني بالاسفيني المتوسط داخلاً بين الانسي والوحشي ومتصلاً بهما . والمشطي الثالث بالاسفيني الوحشي . والمشطي الرابع بالاسفيني الوحشي والمكعب . والمشطي الخامس بالمكعب . اربطتها:

ظاهرة اخصية اربطة بين العظام

فالاربطة الظهرية رباطات ملحقة متينة تربط عظام الرسغ بالعظام المشطية . فالمشطي

المتوسط والوحشي والرابع بين الاسفيني الوحشي والمكعب

اتصال الصف الاول من عظام الرسغ بالصف الثاني

نقسم الاربطة الى ثلاثة اقسام الاول اربطة العقب بالمكعب الثاني اربطة العقب بالزورقي

الثالث اربطة الكعب بالزورقي

١. فالاربطة التي تربط العقب بالكعب اربعة اثنان منها ظهريان واثنان اخمصيان

فالظهريان هما العقبيان المكعبيان العلوي والانسي. والاخصصيان هما العقبيان المكعبيان الطويل

والقصير

فالرباط العقبي المكعب العلوي حزمة رقيقة ضيقة ممتدة بين العقب والمكعب على الوجه

شكل ١٢٠

الظهري

والرباط العقبي المكعب الانسي حزمة قصيرة غليظة قوية تنشأ من

الميزاب الغائر الذي على الوجه العلوي للعقب وترتبط بالوجه الانسي

للمكعب. وهو من الاربطة الرئيسة التي تربط الصف الاول بالثاني

والرباط العقبي المكعب الطويل اقرب الرباطين الاخصصيين الى

السطحية واطول جميع الاربطة الرسغية. يرتبط من الخلف بالوجه السفلي

للعقب بقرب الحدبتين ومن المقدم بالخط الذي على الوجه السفلي للمكعب

وبقاعدة المشطي الثاني والثالث والرابع وهذا الرباط يقاطع الميزاب الذي

على الوجه السفلي للمكعب فيمتولة الى قناة يمر منها وتر الشظوية الطويلة

والرباط العقبي المكعب القصير اقرب الى العظام من سابقه. وهو

عريض جداً طوله نحو قيراط ويمتد من الحدبة الصغيرة التي على مقدم

الوجه السفلي للعقب الى السطح الخلفي للمكعب وراء الميزاب الشظوي

٢ والاربطة التي تربط العقب بالزورقي اثنان وهما:

العقب الزورقي العلوي والعقب الزورقي السفلي

الرباط العقبي الزورقي العلوي ينشأ من الميزاب الغائر الذي بين الكعب والعقب

شكل ١٢٠ اربطة اخمص القدم ١ العقب ٢ الكعب ٣ حدبة الزورقي ٤ الرباط العقبي المكعب الطويل ٥ بعض العقبي

المكعب القصير ٦ الرباط العقبي الزورقي السفلي ٧ اربطة رسغية اخصصية ٨ و٨ وتر العضلة الشظوية الطويلة ٩ و٩ اربطة

رسغية مشطية اخصصية ١٠ الرباط الاخصص المفضل المشطي السلامي الابهامي. ومثله لبقية المفاصل المشطية السلامية ١١

و١١ و١١ اربطة جانبية المفاصل المشطية السلامية ١٢ الرباط المستعرض ١٢ رباطان جانبيان للمفضل السلامي الابهامي.

ومثلها المفاصل السلامية الاخر

المقدم

عملة. حركة هذا المفصل مقتصرة على القبض والبسط . وليس له حركة جانبية

٥ في مفاصل الرسغ القدي

تقسم اربطة الرسغ الى ثلاثة اقسام الاول اربطة عظام الصف الاول والثاني اربطة عظام الصف الثاني والثالث اربطة الصف الاول بالثاني

اربطة الصف الاول من عظام الرسغ

عظام الصف الاول من الرسغ اثنان فقط وهما الكعب والعقب والانصال الواقع بينهما من المفاصل المنزلقة . واما الاربطة التي تربطها فتلاثة وهي

الرباط العقبي الكعبي الوحشي - العقبي الكعبي الخلفي - الرباط بين العظمين

الرباط العقبي الكعبي الوحشي حزمة قصيرة متينة ممتدة من الوجه الوحشي للكعب الى المحافة الوحشية للعقب

والرباط العقبي الكعبي الخلفي رباطة قصيرة ضيقة تربط الطرف الخلفي للكعب بالوجه العلوي المجاورة من العقب

والرباط بين العظمين هو الرباط الرئيسي بين هذين العظمين . يرتبط من طرفه الواحد بالميزاب الواقع على الوجه السفلي للكعب بين السطحين المفصلين ومن طرفه الاخر بميزاب مثله على الوجه العلوي للعقب . وهو غليظ متين عرضه نحو قيراط من الجانب الى الجانب ولهذا المفصل غشاء زلايمان احدهما للاتصال العقبي الكعبي الخلفي والثاني للمقدم والغشاء لمقدم يدوم الى المقدم ويدخل بين السطحين المتجاورين للكعب والزورقي

اتصال الصف الثاني من عظام الرسغ

هذا الصف مؤلف من خمسة عظام وهي المكعب الى الوحشية والزورقي الى الانسية والاسفينية الثلاثة الى مقدم الزورقي . واما اربطتها فهي :


ظهيرية - اخمصية - اربطة بين العظام

فالاربطة الظهيرية حزم صغيرة متوازية موضوعة على الوجه الظهري بين كل عظمين يتصلان . والاربطة الاخمصية مثلها موضوعة على الوجه الاخصي

والاربطة بين العظام اربعة تمر بين الوجوه الخشنة الغير المفصلية للعظام المتجاورة . فالاول ممتد بين جانبي الزورقي والمكعب والثاني بين الاسفيني الانسي والمتوسط والثالث بين الاسفيني

القصبية المقدمة ووتر الشظوية الثالثة والشريان والعصب القصبين المقدمين. ومن الخلف
الغشاء الزلالي

شكل ١١٨



والرباط الجانبي الانسي ويقال له الذالي ايضاً مؤلف من طبقتين سطحية وغائرة. فالطبقة السطحية متينة مثلثة الشكل ترتبط من الاعلى بالكعب الانسي ومن الاسفل بالكعب والعقب والزورقي. والغائرة حزمة قصيرة متينة ممتدة من قمة الكعب الانسي الى الوجه الانسي للكعب اسفل السطح المفصلي وهذا الرباط مغطى بوتر القصبية الخلفية ووتر القابضة الطويلة للاصابع

والرباط الجانبي الوحشي مؤلف من ثلاث حزم متينة تنشأ

شكل ١١٩



من الجانب الانسي للكعب الوحشي وتشعع الى ثلاث جهات مختلفة. فالحزمة المقدمة تذهب الى المقدم وترتبط بالكعب. والخلفية تنجى الى الخلف وترتبط بالجزء الخلفي للكعب. والمتوسطة اطولها تنزل وترتبط بالجانب الوحشي للعقب. ويغطي الحزمة المتوسطة وتر الشظوية الطويلة ووتر الشظوية القصيرة والغشاء الزلالي يبطن الوجه للاربطة ويرسل ثنية الى باطن

المفصل القصي الشظوي السفلي

مجاورات هذا المفصل. الى المقدم من الانسية الى الوحشية وتر القصبية المقدمة والباسطة والشريان والعصب القصبين المقدمان والباسطة المشتركة للاصابع والشظوية الثالثة. والى المؤخر من الانسية الى الوحشية القصبية الخلفية والقابضة الطويلة للاصابع والشريان والعصب القصبين الخلفيان والقابضة الطويلة للاصابع. وفي الميزاب وراء الكعب الوحشي وتر الشظوية الطويلة ووتر الشظوية القصيرة

شرايينه ناشئة من الفروع الكعبية للشريان القصي المقدم والشظوي. واعصابه من القصي

شكل ١١٨ المفصل الرسغي من الانسية ١ الكعب الانسي القصبية ٢ و٢ عظم الكعب ٣ العقب ٤ الزورقي ٥ الاسفني الانسي ٦ الرباط الجانبي الانسي وهو الذالي ٧ الرباط المقدم ٨ وتر اكيلس. ويشاهد كيس مخاطي بين هذا الوتر والحذبة الخلفية للعقب

شكل ١١٩ المفصل الرسغي من الوحشية ١ القصبية ٢ الكعب الوحشي للشظوية ٣ و٣ عظم الكعب ٤ العقب ٥ الكعب ٦ الحزمة المقدمة الرباط الجانبي الوحشي التي ترتبط بعظم الكعب ٧ حزمة المتوسطة التي ترتبط بالعقب ٨ حزمة الخلفية التي ترتبط بعظم الكعب ٩ الرباط المقدم لمفصل الرسغ

لمرور الاوعية الشظوية المقدمة. ويتصل من الاسفل بالرباط بين العظمين السفلي. مجاورته من المقدم للفصية المقدمة والباسطة الطويلة للاصابع والباسطة للابهام والشظوية الثالثة والشريان والعصب القصبين المقدمين. ومن الخلف للفصية الخلفية والقابضة الطويلة للابهام

الاربطة القصبية الشظوية السفلي

هذا المفصل مكوّن من اتصال الوجه الانسي الخشن لطرف الشظية السفلي بمثل في القصبية الرباط بين العظمين السفلي - القصي الشظوي المقدم السفلي - الخلفي السفلي - المستعرض

الرباط بين العظمين السفلي ممتد بين الوجهين الخشنين المتجاورين لهذين شكل ١١٧ العظمين في الاسفل ويتصل من الاعلى بالرباط بين العظمين العلوي والرباط المقدم السفلي رباطة مثلثة الشكل قاعدتها الى الاعلى. ويمتد الى الاسفل والوحشية من القصبية الى الشظية على الوجه المقدم للمفصل والرباط الخلفي السفلي كسابقه الا انه موضوع على الوجه الخلفي للمفصل والرباط المستعرض رباطة ضيقة متصلة بالرباط السابق وممتدة عرضاً بين الكعبيين في الجهة الخلفية والغشاء الزلالي المبطن للسطوح المفصالية ناشيء من الغشاء الخاص بالمفصل



الرسغي

عملها. حركة اتصال هذين العظمين جزئية تقتصر على انزلاق الاسطح المفصالية بعضها على بعض

٤ في المفصل الرسغي

هو من المفاصل الزاوية واما العظام التي تدخل في تكوينه فهي من الاعلى الطرف السفلي للقصبية وكعبها وكعب الشظية ومن الاسفل السطح المحدب لعظم الكعب وحفراته الجانبيتان. اربطته ثلاثة وهي

المقدم الجانبي الانسي الجانبي الوحشي

الرباط المقدم غشائي رقيق عريض يرتبط من الاعلى بجافة السطح المفصلي للقصبية ومن الاسفل بجافة الكعب الى مقدم سطحه المفصلي. مجاورته من المقدم لاوتار بواسطة الابهام والاصابع ووتر

شكل ١١٧ المفصل الرسغي من الخلف ١ الرباط السفلي بين العظمين ٢ الرباط القصي الشظوي الخلفي السفلي ٣ الرباط المستعرض ٤ الرباط الجانبي الانسي وهو الذي ٥ الحزمة الخلفية للرباط الجانبي الوحشي ٦ حزمته المتوسطة ٧ الغشاء الزلالي المفصل الرسغي ٨ المحدبة الخلفية للعقب

الغضروف وتر المابضية ويغطي أيضاً السطح المفصلي للقصبية ويحيط بالرباطين المتصاليين وبالوجه الباطن للاربطة المحيطة بالمفصل ثم يقرب من عقدتي الفخذ ويصعد الى الجزء السفلي لجسم هذا العظم. واما العضلة تحت الفخذية فتندغم بالجراب الزلالي الواقع بين الوتر الباسط والفخذ وتسنده مدة حركة مفصل الركبة

شرايين هذا المفصل ناشئة من الفرع المتفرع للفخذي وفروع مفصلية من المابضي والفرع الراجع من القصي المقدم. واعصابه من الساد والفخذي المقدم والمابضيين الانسي والوحشي عملة. هو من اقوى مفاصل الجسد وحركته القبض والبسط. فعند القبض ينزلق السطح المفصلي للقصبية على التوبين اللتيمين للفخذ نحو المقدم فترتخي الاربطة الجانبية والخلفية والمتصالية ويمتد الرباط الرضفي فيضغط الكتلة الدهنية الى التجويف الذي الى مقدم المفصل. وعند البسط تمتد جميع الاربطة الا الرباط الرضفي. اذا كانت الركبة منقبضة قليلاً جازت لها حركة رحوية خفيفة

٣ في اتصال القصبية بالشظية

تقسم الاربطة التي تربط القصبية بالشظية الى ثلاثة اقسام الاول الاربطة القصبية الشظوية العليا الثاني الاربطة القصبية الشظوية المتوسطة الثالث الاربطة القصبية الشظوية السفلى

الاربطة القصبية الشظوية العليا

الاتصال بين القصبية والشظية من الاعلى من المفاصل المنزلة. واما اربطته فهي:

القصي الشظوي المقدم العلوي القصي الشظوي الخلفي العلوي

الرباط المقدم العلوي (شكل ١١٣) حزمة متينة ممتدة بانحراف نحو الاعلى والانسية من راس

للقصبية الى الحدبة الوحشية للقصبية

والرباط الخلفي العلوي (شكل ١١٤) يمتد من مؤخر راس الشظية الى مؤخر الحدبة الوحشية

الشظية ويغطيه وتر المابضية

والغشاء الزلالي يبطن هذا المفصل وقد يتصل بغشاء الركبة الزلالي عند اعلاها وموخرها

الرباط القصي الشظوي المتوسط

يقال لهذا الرباط الغشاء بين العظمين. وهو يمتد بين الحافتين المتجاورتين للقصبية والشظية


ويفصل العضلات المقدمة للساق عن الخلفية. وهو اعرض في الاعلى من الاسفل وفي جزئه العلوي

ثقب كبير بيضي الشكل يمر منه الشريان القصي المقدم الى مقدم الساق وفي جزئه السفلي فتحة

فالغضروف الانسي يقرب شكله من الهلالي. ترتبط حافته المحدبة بالرباط الجانبي الانسي وبراس القصبة بواسطة الاربطة الاكليلية. ويرتبط طرفاهُ المقدم والخلفي بالانخفاض الواقع الى مقدم الشوكة التصبية وخلفها. والغضروف الوحشي يقرب شكله من الدائرة. جانبه الوحشي محفور لمرور وتر المابضية ويرتبط محيطه براس القصبة بواسطة الاربطة الاكليلية وطرفاهُ بانخفاض الى مقدم الشوكة التصبية وخلفها. وهو اعرض من الانسي فيغطي جانباً عظيماً من السطح المفصلي للقصبة. ويرسل من حافته المقدمة حزمة هي الرباط المستعرض. ويختلط من طرفه المقدم بالرباط المتصالب المقدم. وينقسم من طرفه الخلفي الى ثلاث فسحات ترتبط ثتان منها بالوجه الوحشي للعقدة الانسية احدها الى مقدم الرباط المتصالب الخلفي والاخرى الى موخره. والثالثة بموخر الرباط المتصالب المقدم

والرباط المستعرض فسحة صغيرة ممتدة عرضاً بين الحافة المقدمة المحدبة للغضروف الوحشي والطرف المقدم للغضروف الانسي

والاربطة الاكليلية حزم قصيرة تربط الحافة المحدبة للغضروفين الهلاليين بحيط راس القصبة والاربطة المجاورة




والغشاء الزلالي لمنصل الركبة اعظم الاغشية الزلالية في الجسد واكثرها اتساعاً يبدأ عند الحافة العليا للرضفة ويكون كيساً تحت الوتر الباسط للساق. ويمتد من جانبي الرضفة الى تحت صفاق التسعينين ولا سيما تحت الانسية. وتفصله كتلة دهنية عن الرباط المقدم الذي تحت الرضفة. ويرسل وهو في هذه الجهة زائدة مثلثة تتضمن بعض الياف رباطية وتمتد من مقدم المفصل اسفل الرضفة الى مقدم الشرم بين العقدين يقال لها الرباط الخاطي. واما الرباطان الجناحيان فثنتان تمتدان من جانبي الرباط الخاطي الى جانبي الرضفة. ويغطي

الغشاء الزلالي الغضروفين الهلاليين ويكون عند موخر الوحشي منهما جراباً واقعاً بين ميزاب

شكل ١١٦ قطع طولي لمنصل الركبة اليسرى يظهر انعكاسات الغشاء الزلالي ١ النسيج الشبكي للتم السفلي من عظم الفخذ ٢ وتر العضلات الباسطة للساق ٣ الرضفة ٤ الرباط الرضفي ٥ النسيج الشبكي لراس القصبة ٦ كيس مخاطي موضوع بين الرباط الرضفي وراس القصبة ٧ كتلة دهنية داخلية الى تجويف المفصل اسفل الرضفة ٨ الكيس الزلالي الذي يصعد بين وتر الباسط للساق ومقدم عظم الفخذ ٩ احد الرباطين الجناحيان واما الآخر فقد قطع مع النظر الخالف ١٠ الرباط الخاطي ١١ الرباط المتصالب المقدم ١٢ الرباط الخلفي للركبة. وبناء على هذا الرسم يستقصى الغشاء الزلالي من الكيس الزلالي ٨ الى الوجه الباطن للرضفة ثم الى الكتلة الدهنية ٧ حيث يرسل الرباط الخاطي ثم الى راس القصبة حيث يكون غدها محوطاً بالرباطين المتصالبين ثم الى الاعلى بجانب الرباط الخلفي والتنوين القميين للفخذ حتى الكيس الذي بدأنا منه

شكل ١١٤




والرباط الجانبي الوحشي الطويل حبل ليفي متين مستدير مرتبط من الاعلى بالعمدة الوحشية للفخذ ومن الاسفل بالوجه الوحشي لراس الشظية. وجهة الظاهر يغطيه وتر ذات الراسين ويمر تحته وتر المابضية والوعية المفصالية الوحشية السفلى

والرباط الجانبي الوحشي القصير حزمة اضافية موضوعة خلف الرباط الطويل. يرتبط من الاعلى بالجزء السفلي للعمدة الوحشية للفخذ ومن الاسفل بقمة التواء البري للشظية. وهو مختلط بالرباط المحفظي والرباط المحفظي غشاء رقيق جداً ولكنه متين يشغل الاخوية الواقعة

بين الاربطة السابقة. ارتباطه من الاعلى بالفخذ اعلى سطحه المفصلي ومن الاسفل بحوافي الرضفة وحوافي راس القصبه ويختلط من الخلف بالرباط الخلفي. وتقويه انبساطات ليفية ناشئة من اللقافة العريضة والعضلات المجاورة

الاربطة الباطنة

شكل ١١٥



الرباطان المتصاليان سميّا بذلك لان الواحد منهما يصل بالآخر. وهما قويان موضوعان في باطن مفصل الركبة. فالقدم منها اصغر من الخلفي ينشأ من حفرة الى مقدم الشوكة القصبية الواقعة في الوجه العلوي لراس القصبه ويسير الى الاعلى والخلف ويندغم بالجزء الانسي لعمدة الفخذ الوحشية. والخلفي ينشأ من حفرة الى مؤخر الشوكة القصبية ويسير الى الاعلى والمقدم ويندغم بالجزء الوحشي لعمدة الفخذ الانسية والغضروفان اللينيان الهلاليان صفحيتان شكلهما اهلالي مرتبطتان بحوافي راس القصبه فتزيدانه غوراً لقبول التواءين اللقيين الفخذيين.

شكل ١١٤ اربطة مفصل الركبة من الخلف ١ حزمة من الرباط الخلفي ناشئة من وتر الغشائية النصف ٢ وتر الغشائية النصف ٢ انبساط من الوتر المذكور يختلط باللقافة المابضية ٤ زائدة ممتدة وراء الرباط الجانبي الانسي ٥ الجزء الخلفي للرباط الجانبي الانسي ٦ الرباط الجانبي الوحشي الطويل ٧ الرباط الجانبي الوحشي القصير ٨ وتر العضلة المابضية مقطوعاً ٩ الرباط القصي الشظوي الخلفي العلوي


شكل ١١٥ الركبة البيني مفتوحة من المقدم لاجل اظهار الاربطة الباطنة ١ السطح الغضروفي للتواءين اللقيين من عظم الفخذ وقد وضع رقم ٥ على الوحشي منها و٢ على الانسي ٢ الرباط المتصالب المقدم ٣ المتصالب الخلفي ٤ الرباط المستعرض ٥ محل ارتباط الرباط الخاطي ٦ الغضروف الهلالي الانسي ٧ الغضروف الهلالي الوحشي ٨ بعض الرباط الرضفي مقلوب الى الاسفل ٩ كيس مخاطي موضوع بين الرباط الرضفي وراس القصبه وقد فُخ ١٠ الرباط القصي الشظوي المقدم العلوي ١١ الرباط بين العظمين . والفتحة التي اعلاه لمرور الشريان القصي المقدم

٢ مفصل الركبة

الركبة من المفاصل الزاوية والعظام التي تدخل في تركيبها هي التواء المقيمان للفخذ من الاعلى وراس القصبية من الاسفل والرضفة من المقدم. تُقسم اربطتها الى ظاهرة وباطنة فالاربطة الظاهرة: المقدم - الخلفي - الانسي الجانبي - الوحشيان الجانبيان - الخفطي والاربطة الباطنة: المقدم - الخلفي - الغضروفان الهلايان - المستعرض - الاكليبي - الخاطي - الجناحي

الاربطة الظاهرة

شكل ١١٢



الرباط المقدم ويقال له الرباط الرضفي ايضاً هو استدامة الوتر المشترك لبواسط الفخذ من الرضفة الى الحدبة القصبية فتتوب عن رباط مقدم وليست كذلك حقيقةً. وبين هذا الرباط والرضفة كيس مخاطي صغير وبينه وبين الجلد كيس اخر كبير. وتفصل وجهه الخلفي عن المفصل كتلة عظمية دهنية

والرباط الخلفي عريض مسطح يغطي جميع الوجه الخلفي للمفصل. وهو مؤلف من قسمين جانبيين يرتبطان من الاعلى بالتوبين اللقيمين للفخذ ومن الاسفل بالوجه الخلفي لراس القصبية ويختلطان باوتار التوأمية الساقية والاخمصية والمابضية. واما الجزء المركزي فمؤلف من حزم منحرفة الوضع تتخللها ثقب لمرور الاوعية واقوى الحزم المذكورة ينشأ من وتر الغشائية النصف ويسير بانحراف من الحدبة الانسية القصبية الى العقدة الوحشية الفخذية. وهذا الرباط يكون بعض ارض الحلاء المابضي وعليه يستقر الشريان المابضي

والرباط الجانبي الانسي غشائي عريض مسطح يرتبط من الاعلى بالحدبة الانسية للفخذ ومن الاسفل بالحدبة الانسية والوجه الانسي لجسم القصبية الى مسافة فيراطين. ويقاطع جزءه السفلي صفاق الخياطية ووتر الرقيقة والوترية النصف الا انه يتوسط بينهما كيس زلالي. ووجهه الباطن يغطي الجزء المقدم لوتر الغشائية النصف والغشاء الزلالي للمفصل والشريان الانسي المفصلي السفلي

شكل ١١٢ اربطة مفصل الركبة من المقدم ١ وتر رباعية الرؤوس الباسطة للساق ٢ الرضفة ٣ الرباط المقدم وهو الرضفي يرب مندغوه في الحدبة القصبية ٤ غشاء زلالي ٥ الرباط الجانبي الانسي ٦ الرباط الجانبي الوحشي الطويل ٧ القصب الشظوي المقدم العلوي

الرباط المحنظي (شكل ١٠٢) محنظة متينة كثيفة محيطة بحافة الحق الحرقفي من الاعلى وبعنى عظم الفخذ من الاسفل. محيطة العلوي مرتبط بالحق الحرقفي على بعد خطين او ثلاثة من الرباط الحقي ولكنه يتصل حذاء الشرم الحقي بالرباط المستعرض وبحافة الثقب الساد. ومحيطه السفلي يعانق عنق الفخذ فيرتبط من المقدم بالخط المغزلي ومن الاعلى بقاعدة العنق ومن الخلف بمتصف العنق. وهو غليظ في الاعلى حيث يحتاج الى المقاومة رقيق واسع في الاسفل ويفصله عن العضلة الصليبية والحرقفية الى المقدم كيس مخاطي كثيراً ما يستطرق الى باطن المفصل بواسطة ثقب مستدير

والرباط الحرقفي الفخذي (شكل ١٠٢) حزمة اضافية ممتدة بانحراف على مقدم المفصل فتقوي الرباط المحنظي من هذه الجهة. ارتباطه من الاعلى بالشوكة المقدمة السفلى الحرقفية ومن الاسفل الخط المقدم بين المدورين

والرباط المستدير (شكل ١٠٣) مثلث الشكل يرتبط من راسه باثر خشن اسفل مركز راس الفخذ. وقاعدته منقسمة الى حزمتين ترتبطان بجوافي الشرم الذي في قعر الحق الحرقفي. ولهذا الرباط غمد زلالي خاص به

والرباط الحقي (شكل ١٠٣) شفة غضروفية ليفية مرتبطة بحافة الحق الحرقفي فتزیده غوراً ونقي حوافيه. وهو غليظ في الاعلى والخلف منه في المقدم ومكوّن من الياف ناشئة من جميع محيط الحق تتصلب على زوايا حادة

والرباط المستعرض حزمة متينة ممتدة من الرباط الحقي على الشرم فتحوّله الى ثقب تمر منه اوعية غذائية لباطن المفصل

والغشاء الزلالي يبطن راس الفخذ ثم ينعكس على الوجه الباطن للرباط المحنظي ويغطي الرباط الحقي والكتلة الدهنية المستقرة في باطن الحق ثم يحيط بالرباط المستدير الى راس الفخذ واما العضلات المجاورة لهذا المفصل فهي من المقدم الصليبية والحرقفية منفصلتين عنه بواسطة كيس مخاطي ومن الاعلى الراس القصير للمستقيمة والالوية الصغيرة ومن الانسية السادة الظاهرة والمشطية ومن الخلف الهرمية والتوأمية العليا والسادة الباطنة والتوأمية السفلى والسادة الظاهرة والمربعة الفخذية

شرايينه فروع من الساد والوركي والمنعكف الانسي والابوي. واعصابه فروع منفصلية من الضفيرة العجزية ومن الساد والساد الاضافي

عمله. حركة هذا المفصل التقبض والبسط والتقريب والتبعيد والحركة الرحوية والمفلاعية

اتصال العظام المشطية بعضها ببعض

تتصل هذه العظام بواسطة اربطة ظهرية وراحية تمتد عرضاً من العظم الواحد الى الاخر واربطة بين العظام تمتد بين سطوحها المتجاورة . وترتبط اطرافها السلامية بواسطة رباط مستعرض

١٠ اتصال العظام المشطية بالسلاميات

هذه المفاصل من النوع الرحوي ومكوّنة من دخول الراس المستد بالعمم المشطي في حفرة السلامي الاول . اربطتها مقدمة وجانبية (شكل ١١١)

الاربطة المقدمة غليظة بناؤها ليفي غضروفي . وضعها على الوجه الراحي للمفاصل بين الاربطة الجانبية التي تتصل بها . وتتصل من وجهها الراحي اي العاوي بالرباط المستعرض . وهي محنورة من جانبيها لمرور الاوتار القابضة . وتكوّن من وجهها الباطن بعض السطح المفصلي لقبول راس العظم المشطي

والاربطة الجانبية حزم مستديرة متينة تربط العظام من جوانبها فتربط من الاعلى بالحدبة التي على جانب راس المشطي ومن الاسفل بطرف السلامي . واوتار البواسط بمنزلة رباط خلفي لها عملها . حركة هذه المفاصل القبض والبسط والتقريب والتباعد والحركة الرحوية

١١ اتصال السلاميات بعضها ببعض

هذه المفاصل زاوية لانقبض الالبسط . اربطتها مقدمة وجانبية شبيهة باربطة المفاصل المشطية السلامية . واوتار البواسط بمنزلة اربطة خلفية لها

في اربطة الطرف السفلي

تقسم مفاصل الطرف السفلي الى ثمانية مجاميع وهي

١ مفصل الورك ٢ مفصل الركبة ٣ اتصال الفصية بالشظية ٤ مفصل الكعب ٥ مفاصل الرسغ
٦ المفاصل الرسغية المشطية ٧ المفاصل المشطية السلامية ٨ اتصال السلاميات بعضها ببعض

١ مفصل الورك

هو من المفاصل المتلاعبية ومكوّن من دخول راس عظم الفخذ في الحنق الحرقفي . وتغطي السطوح المفصليّة طبقة غضروفية . واما اربطته فهي

الحفطي الحرقفي الفخذي المستدبر الحفي المستعرض

اتصال عظام الاصابع المشطية بالرسغ


الاربطه التي تربط المفاصل المكوّنه من اتصال العظام المشطية الاربعه الانسية بالرسغ
ظهيره وراحه وبين العظام

الاربطه الظهيره حزم متينه تربط عظام الصف الثاني من الرسغ بالوجه الظهري للعظام
المشطية. فالمشطي الثاني يقبل حزمتين واحده من المربع المنحرف واحده من الشبيه به. والثالث
يقبل حزمة من الكبير. والرابع يقبل حزمتين واحده من الكبير واحده من الكلاي. والخامس
يقبل حزمة من الكلاي

والاربطه الراحية موضوعة على الوجه الراحي وهي كسابقتها في العدد الامشطي الثالث
فان له ثلاث حزم

والاربطه بين العظام الياف قصيرة غليظة تربط الكبير والكلاي بالمشطي الثالث والرابع
والغشاء الزلالي امتداد من الغشاء الذي يتخلل صفي

شكل ١١٢



عظام الرسغ. وعلى ذلك تكون الاغشية الزلاية الخاصة
بالرسغ خمسة. الاول الغشاء الكيسي الواقع بين الزند
والغضروف المتوسط. الثاني يبطن الطرف السفلي للكعبه
والغضروف المتوسط من الاعلى والزورقي والهلالي والهرمي
من الاسفل. والثالث اكثرها اتساعاً ويغطي السطوح المتجاورة
لصفي عظام الرسغ ثم يربط بين عظام الصف الثاني ويغطي
الاطراف الرسغية للعظام المشطية الاربعه الانسية. والرابع واقع
بين اتصال البسلي بالهرمي. والخامس واقع بين اتصال
مشطي الابهام بالمربع المنحرف

عملها. حركة المفاصل الرسغية المشطية قليلة من النوع المتزلق الا مفصل المربع المنحرف
والمشطي الابهامي فان له حركة القبض والبسط والتقريب والتباعد والحركة الرحوية

شكل ١١٢ رسم الاغشية الزلاية الخمسة الخاصة بالرسغ وجوارره ١ الغشاء الاول الكيسي ٢ الغشاء الثاني ٣ والغشاء
الثالث وهو اكبرها اتساعاً ٤ الغشاء الرابع الواقع بين البسلي والهرمي ٥ الغشاء الخامس الواقع بين مشطي الابهام والمربع المنحرف
٦ الطرف السفلي للكعبه ٧ الطرف السفلي الزند ٨ الغضروف اللبني المتوسط ٩ و١٠ قواعد العظام المشطية. واما
الاحرف الانفرنجية فتدل على عظام الرسغ وهي من الوحشية الى الانسية اولاً الزورقي والهلالي والهرمي والبسلي ثانياً المربع المنحرف
والشبيه به والكبير والكلاي

ثلاثة ظهريّة ثلاثة راحية اثنان بين العظمين

الأربطة الظهرية الثلاثة ممتدة عرضاً على الوجه الظهري فتربط المربع المنحرف بالشبيه به والشبيه بالمربع الكبير والكبير بالكلاي والأربطة الراحية الثلاثة كسابقتها إلا أنها موضوعة على الوجه الراجي والرباطان بين العظمين يربطان العظم الكبير بالشبيه بالمربع من الوحشية وبالكلاي من الانسية

اتصال الصف الأول من عظام الرسغ بالصف الثاني

اتصال العظم الكبير بالزورقي والهلالي من المفاصل الرحوية واتصال الزورقي بالمربع المنحرف والشبيه به واتصال الكلاي بالهرمي والكبير من المفاصل المتزلقة. وأما أربطتها فهي المقدمة الخلفية الجانبية الانسية الجانبية الوحشية الأربطة المقدمة أو الراحية ممتدة بانحراف بين الصف الأول والصف الثاني من عظام الرسغ

والأربطة الخلفية أو الظهرية كسابقتها إلا أنها موضوعة على الوجه الظهري للرسغ والأربطة الجانبية قصيرة يربط الوحشي منها الزورقي بالمربع المنحرف والانسي يربط الهرمي بالكلاي. وهذان الرباطان متصلان بالرباطين الجانبيين للرسغ ولا اتصال عظام الرسغ بعضها ببعض غشاء ان زلايان. أحدها يبطن الوجه السفلي الزورقي والهلالي والهرمي ويرسل زائدين بين سطوحها المتجاورة ثم ينعكس على عظام الصف الثاني ويرسل ثلاث زوائد بينها أولاً ثم بينها وبين العظام المشطية الأربعة الانسية. والغشاء الثاني موضوع بين البسلي والهرمي

وأما الرباطان الحلقيان المتقدم والخلفي فسياتي الكلام عليهما في باب العضلات عملها. الحركة التي بين عظام الرسغ جزئية جداً وتقتصر على القبض والبسط

٩ في اتصال عظام الرسغ بالعظام المشطية

اتصال مشطي الابهام بالمربع المنحرف

هو من المفاصل المفلاعية. له رباط واحد هو المحفظي الذي يرتبط من الأسفل بحيط الطرف العلوي للمشطى الأول ومن الأعلى بالحافة التي تحد الوجه المفصلي السفلي للمربع المنحرف. وهذا الرباط مبطن بغشاء زلاي

والرباط الخلفي ارق من المقدم ويرتبط من الاعلى بالحافة الخلفية لطرف الكعبرة السفلي ومن الاسفل بالوجه الظهري للزورقي والهلالي والهرمي. مجاورته من المقدم للغشاء الزلالي ومن المؤخر لاوتار بواسطة الاصابع

والغشاء الزلالي يبطن الوجه السفلي للغضروف المتوسط ثم ينعكس على الوجه الباطن للاوتار المذكورة آنفاً

مجاورته. اوتار القوابض تغطي هذا المفصل من المقدم واوتار البواسط من المؤخر. ويجاور ايضاً الشريان الكعبري والشريان الزندي

شرايينه. الفروع الرسغية المقدمة والخلفية من الكعبري والزندي وفروع من الشريانين بين العظمين الامامي والخلفي وبعض فروع صاعدة من القوس الغائر الراجي عمله. حركة هذا المفصل القبض والبسط والتقريب والتباعد والحركة الرحوية

٨ اتصال عظام الرسغ بعضها ببعض

يقسم هذا الاتصال الى ثلاثة اقسام. الاول اتصال الصف الاول من عظام الرسغ بعضها ببعض. والثاني اتصال الصف الثاني من عظام الرسغ بعضها ببعض. والثالث اتصال الصف الاول بالثاني

اتصال الصف الاول من عظام الرسغ بعضها ببعض

هذه المفاصل من النوع المتزلق وسطوحها المفصلية مغطاة بغضروف. واما ارتباطها فهي رباطان ظهريان رباطان راحيان رباطان بين العظمين

الرباطان الظهران موضوعان عرضاً في مؤخر الصف الاول من عظام الرسغ فيربطان الزورقي بالهلالي والهلالي بالهرمي

والرباطان الراحيان كما الظهرين من جهة ارتباطهما الا ان وضعهما الى المقدم

والرباطان بين العظمين حزمتان ضيقتان من نسج ليفي تربطان الهلالي بالزورقي من

الوحشية والهلالي بالهرمي من الانسية وتسدان الخلائين الواقعين بين هذه العظام الثلاثة

واما ارتباط البسلي بالهرمي فبواسطة رباط محفظي رقيق مبطن بغشاء زلالي. وللبسلي ايضاً

فسختان رباطيتان تربطانه بالكلابي وبقاعة المشطي الخامس

اتصال الصف الثاني من عظام الرسغ بعضها ببعض

هي من المفاصل المتزلفة وسطوحها مغطاة بغضروف. واما ارتباطها فهي

ضمن الرباط المحيط والحفرة السينية الصغيرة الزندية في الاعلى. واما في الاسفل فتدور الحفرة السينية الكعبرية على الراس المستدير للزند. ويحد هذه الحركة الرحوية الجانبية الرباط المقدم والحلفي

٧ المفصل الرسغي


هذا المفصل اكثر الصفات الخاصة بالمفاصل الرحوية. والاجزاء التي تدخل في تكوينه هي الطرف السفلي للكعبرة والوجه السفلي للعضروف المتوسط من الاعلى والزورقي والهلالي والهرمي من الاسفل فيتصل الزورقي والهلالي بسطحين منفصلين في الكعبرة ويتصل الهرمي بالعضروف. واما اربطته فهي

الجانبي الوحشي الجانبي الانسي المقدم الخلفي

الرباط الجانبي الوحشي يمتد من قمة التواء ابري الكعبري الى الجانب الوحشي للزورقي وبعض اليافه تدوم الى المربع والرباط الخلفي. والشريان الكعبري يستقر على هذا الرباط في مروره الى الخلف الى الخلاء الاول بين المشطيين

والرباط الجانبي الانسي جبل مستدير يتصل من الاعلى بطرف التواء ابري الزندي وينفصل من الاسفل الى فستحين ترتبطان بالهرمي والسلي

والرباط المقدم عريض غشائي مؤلف من ثلاث فستحات. يرتبط من الاعلى بالطرف السفلي للكعبرة ويتواءم ابري وبالزند ومن الاسفل بالوجه الراحي للزورقي والهلالي والهرمي. فيه ثقب كثيرة لمرور الاوعية. مجاورته من المقدم لوتر القابضة الغائرة للاصابع والقابضة الطويلة للابهام ومن المؤخر للغشاء الزلالي



شكل ١١١ اربطة الوجه المقدم للرسغ واليد الايسرين ١ الجزء السفلي للرباط بين العظمين ٢ الرباط الكعبري الزندي المقدم ٣ الرباط الرسغي المقدم ٤ الرباط الجانبي الوحشي ٥ الجانبي الانسي ٦ اربطة الرسغ الراحة ٧ العظم السلي واربطة ٨ الاربطة التي تربط الصف السفلي من عظام الرسغ بالعظام المشطية والعظام المشطية بعضها ببعض ٩ الرباط الخلفي الذي يربط المشطي الابهامي بالمربع المنحرف ١٠ الرباط المقدم للفصلي المشطي السلامي الابهامي ١١ احد الرباطين الجانبيين للمفصل المذكور ١٢ الرباط المقدم للفصل المشطي السلامي السباي ١٣ والرباطين الجانبيين لهذا المفصل. وقس على ذلك بقية المفاصل المشطية السلامية ١٤ الرباط المستعرض الذي يربط رؤوس العظام المشطية بعضها ببعض ١٥ الرباط المقدم واحد الرباطين الجانبيين للمفصل السلامي الابهام ١٦ والرباط المقدم والرباطان الجانبيان للمفصلين السلامييين. وقس على ذلك بقية المفاصل السلامية

الاربطة السفلى للمفصل الكعبري الزندي

التي عند قاعدة التتوالمقاري للزند الى اسفل المحدة لذات الراسين في الكعبرة والرباط بين العظمين طبقة رقيقة عريضة من الياف صفاقية ممتدة بانحراف الى الاسفل من الحافة الانسية للكعبرة الى الحافة الوحشية للزند . وهو ناقص في الاعلى عريض في الوسط ويثقبه في جزئه السفلي الشريان بين العظمين . واما الشريان الخلفي بين العظمين فيمر الى الخلف بين الرباط المنحرف والحافة العليا لهذا الرباط . وفائدة هذا الرباط اولاً ربط العظمين وثانياً اتساع المساحة لاجل اندغام العضلات . مجاورته من المقدم للقابضة الغائرة للاصابع والقابضة الطويلة للابهام والكابة المربعة والشريان والعصب بين العظمين . ومن الخلف للباطحة القصيرة والباسطة لمشطي الابهام والباسطتين الاولى والثانية للابهام والباسطة للسبابة . وعند الرسغ للشريان المقدم بين العظمين والعصب الخلفي بين العظمين

الاربطة السفلى للمفصل الكعبري الزندي


هذا المفصل مكوّن من راس الزند الذي يدخل في الحفرة السينية التي في الجانب الانسي لطرف الكعبرة السفلي . وتغطي السطوح المفصليّة طبقة غضروفية وتربطها الاربطة الاتية

الرباط الكعبري الزندي المقدم - الكعبري الزندي الخلفي - الغضروف المثلث المتوسط

الرباط الكعبري الزندي المقدم رباطة ضيقة ممتدة من الحافة المقدمّة للحفرة السينية الكعبرية الى الوجه المقدم لراس الزند

والرباط الكعبري الزندي الخلفي مرتبط كسابقه الا ان وضعه على الوجه الخلفي للمفصل

شكل ١١



والغضروف الليفي المثلث المتوسط موضوع عرضاً اسفل راس الزند فيربطه بالكعبرة ربطاً ممتيناً . يرتبط من راسه بانخفاض في الوجه الانسي للتتوالبري الزندي ومن قاعدته بالحافة السفلى للحفرة السينية الكعبرية . مجاورته من وجهه العلوي لراس الزند ومن وجهه السفلي للعظم الهرمي . وبين وجهه العلوي وراس الزند محفظة زلاالية يقال لها الغشاء الكيسي

عملة . لهذا الاتصال المفصلي حركة رحوية من الكعبرة على الزند فان كانت نحو المقدم يقال لها الكعب وان كانت نحو المؤخر البطح . وفي هذه الحركة يدور راس الكعبرة على محوره

شكل ١١٠ الطرفان السفليان للكعبرة والزند والغضروف الليفي المثلث الذي يوصلها ١ الزند ٢ تنوه الابري ٣ الكعبرة ٤ سطحها المفصلي الذي يتصل بالعظم الزورقي ٥ سطحها الذي يتصل بالهلال ٦ الغضروف المثلث من وجهه السفلي * قطعة عظم سبك وضعت بين الوجه العلوي للغضروف المذكور وراس الزند

والرباط الوحشي حرمة قصيرة ضيقة . يرتبط من الاعلى بالعتدة الوحشية للعضد ومن الاسفل بالرباط المحيط والحافة الوحشية للزند . وهو مختلط بالوتر المنشأي للباطحة القصيرة والغشاء الزلالي كثير الاتساع وينعكس من السطوح الغضروفية الى الوجه الباطن للاربطة . ويحيط من الاسفل براس الكعبرة فيكون كيساً مفصلياً بينه وبين الحفرة السينية الصغيرة

والعضلات المجاورة للمفصل من المقدم العضدية المقدمة ومن الخلف ثلاثية الرؤوس والمرفقية ومن الوحشية الباطحة القصيرة والوتر المشترك للبواسط ومن الانسية الوتر المشترك للقوابض والقابضة الزدية للرسغ والعصب الزندي

عملة . حركة هذا المفصل من النوع الزاوي التام فلا يقبل الا القبض والبسط شرايينه شبكة محيطية به مكونة من فروع من الغائر العلوي والسفلي والعضدي والزندي الراجع المقدم والزندي الراجع الخلفي وبين العظمين والكعبري الراجع

٦ في اتصال الكعبرة بالزند

تقسم الاربطة التي توصل الكعبرة بالزند الى ثلاثة اقسام الاول اربطة الطرفين العلويين والثاني اربطة الجسمين والثالث اربطة الطرفين السفليين

شكل ١٠٩



الاربطة العليا للمفصل الكعبري الزندي

هذا المفصل مكون من الجانب الانسي لمحيط راس الكعبرة الذي يدور في الحفرة السينية الصغيرة

الرباط المحيط هو الرباط الوحيد لهذا المفصل . وهو مسطح متين محيط برأس الكعبرة ويرتبط بطرفي الحفرة السينية الصغيرة للزند . وجهه الظاهر يقويه الرباط الوحشي الجانبي . وجهه الباطن مبطن بغشاء زلالي

الاربطة المتوسطة بين جسي الكعبرة والزند

المنحرف بين العظمين

الرباط المنحرف حبل صغير مستدبر ممتد امتداداً منحرفاً الى الاسفل والوحشية من الحدة

شكل ١٠٩ الرباط المحيط ١ السطح المفصلي للتوالمرفقي الزندي ٢ التوالمقاري ٣ الرباط المحيط الذي يكتمل عنق الكعبرة

شرايين المفصل الكتفي فروع مفصلية من المنعكف المقدم والخلفي والشريان فوق اللوح.
واعصابه من المنعكف والعصب فوق اللوح
عملة. المفصل الكتفي يتبل الحركة الى كل جهة اي الى المقدم والموخر والتبعيد والتقريب
والحركة المقلعية والرحوية

٥ المفصل المرفقي

هو من المفاصل الزاوية ومكوّن من السطح البكري الذي يدخل في الحفرة السينية الكبيرة للزند والحذبة الكعبرية التي تتصل بالتنقيع الكاسي الواقع في راس الكعبرة. فيتم من الاتصال الاول حركة القبض والبسط ومن الثاني حركة رحوية للكعبرة على الزند. وتغطي الاسطح المذكورة طبقة غضروفية رقيقة. واما اربطته فهي

المقدم الخلفي الانسي الوحشي

الرباط المقدم عريض رقيق يغطي الوجه المقدم للمفصل. ارتباطه من الاعلى بمقدم العضد

شكل ١٠٧ اعلى الحفرة المنقارية ومن الاسفل بالوجه المقدم للتو المنقاري شكل ١٠٨

للزند والرباط المحيط ويخيلط من الجانبيين بالرباطين الجانبيين. اليافة بعضها عمودية وبعضها عرضية وبعضها ورية منحرفة. مجاورته من المقدم للعضدية المقدمة


والرباط الخلفي رقيق واسع يرتبط من الاعلى بالطرف السفلي للعضد اعلى الحفرة المرفقية ومن الاسفل بحافة التو المرفقي ويخيلط من الجانبيين بالرباطين الجانبيين. ويغطيه وتر الايلائية الرووس والمرفقية

والرباط الانسي طبقة غليظة مثلثة الشكل. ارتباطه من الاعلى من راسه بالعقدة الانسية للعضد ومن الاسفل بقاعدته بالحافة الانسية للتو المرفقي والتو المنقاري. مجاورته من الانسية لثلاثية الرووس والقابضة الزندية للرسغ والعصب الزندي



شكل ١٠٧ اربطة المفصل المرفقي من الانسية ١ الرباط المقدم ٢ و٢ الرباط الانسي ٣ الرباط المحيط ٤ الرباط المنحرف
٥ الرباط بين العظمين ٦ العقدة الانسية التي تحجب الرباط الخلفي
شكل ١٠٨ المفصل المرفقي من الوحشية ١ العضد ٢ الزند ٣ الكعبرة ٤ الرباط الوحشي ٥ الرباط المحيط ٦ الطرف
السفلي للرباط المحيط عند اندغامه في الزند ٧ الرباط المقدم ٨ الرباط الخلفي ٩ الرباط بين العظمين

شكل ١٠٦



العضلة تحت اللوح. وواحدة الى الوحشية مستطرفة بين الكيس الزلالي الذي في باطن المفصل وكيس مخاطي اسفل العضلة تحت الشوكة. وواحدة في الحافة السفلى للرباط بين الحدبتين لمرور وتر ذات الراسين

والرباط الغرابي العضدي رباطة عريضة اضافية تقوي الجزء العلوي والانسي للرباط المحفطي. وهو ممتد بانحراف من الحافة الوحشية للتو الغرابي الى مقدم الحدبة الكبيرة للعضد ويختلط بوتر العضلة فوق الشوكة

والرباط العنابي رباطة غضروفية ليفية مرتبطة بمحيط الحفرة العنابية فتزيد لها غوراً وتقي حوافها. وهو منقسم في الاعلى الى فسخين مختلطتين بالراس الطويل لذات الراسين ولذلك وصفه بعض المشرحين بانه مكون من انفصال الوتر المذكور الى فسخين. ويبطنه الغشاء الزلالي

واما الغشاء الزلالي فيغطي حافة الحفرة العنابية والشفة الليفية الغضروفية المحيطة به ثم ينعكس على الوجه الباطن للرباط المحفطي. ولوتر ذات الراسين الذي يمر ضمن المفصل غمد خاص من هذا الغشاء ينعكس عليه عند ثقبه للرباط المحفطي ويحيط به حتى منشأه عند قمة الحفرة العنابية الا ان مرور الوتر المذكور الى خارج الكيس الزلالي لا يفي باطنه. وهذا الكيس يستطرق الى كيس مخاطي كبير تحت وتر العضلة تحت اللوح بواسطة ثقب في الجانب الانسي للرباط المحفطي وقد يستطرق ايضاً الى كيس مخاطي اخر تحت وتر العضلة تحت الشوكة. وهناك كيس مخاطي ثالث لا يستطرق الى باطن المفصل موضوع بين الوجه السفلى للذالية والوجه الوحشي للمحفظة

واما العضلات المجاورة لهذا المفصل فهي من الاعلى العضلة فوق الشوكة ومن الاسفل الراس الطويل لثلاثية الرؤوس ومن الانسية العضلة تحت اللوح ومن الوحشية العضلة تحت الشوكة والمستديرة الصغيرة ومن الباطن الراس الطويل لذات الراسين. واما الذالية فوضعها الى الظاهر وتغطي المفصل على وجهه الوحشي والى المقدم والمؤخر

شكل ١٠٦ اربطة الترقوة واللوح من الجانب الايسر ١ الترقوة ٢ التتوالاخرى للوح ٣ الحفرة العنابية محاطة بالرباط العنابي ٤ التتوالغرابي ٥ الرباط الغرابي الترقوي وهو المربع المنحرف ٦ الرباط الغرابي الاخرى ٧ الرباط الطويل لذات الراسين ٨ الرباط الاخرى الترقوي العلوي

المفصل الكتفي

للترقوة. فائدة هذين الرباطين تحديد حركة اللوح الى المقدم والمؤخر والغضروف الليفي المتوسط غير ثابت الوجود في هذا المفصل. فان وجد كان فصلاً للمفصل جزئياً. وقد يكون كاملاً فيغطيه غشاء زلاي اوائنان عملة. لهذا المفصل نوعان من الحركة وهما انزلاق السطحين المفصلين الواحد على الاخر وحركة رحوية للوح على طرف الترقوة يحدها الرباطان المربع المنحرف والمخروطي

٢ الاربطة الخاصة باللوح

الغراي الاخري المستعرض

الرباط الغراي الاخري عريض رقيق مسطح مثلث الشكل ممتد عرضاً بين التتو الغراي والاخري. يرتبط من راسه بقمة الاخرم ومن قاعدته بجميع طول الحافة الوحشية للتتو الغراي. وهذا الرباط يكمل القبوة التي يكونها التتو الاخري والتتو الغراي لاجل وقاية راس العضد. مجاورته من الاعلى لوجه العضلة الذالية الباطن ومن الاسفل لوتر العضلة فوق الشوكة الا انه يتوسط بينه وبين الوتر كيس مخاطي

والرباط المستعرض يحول الشرم فوق اللوح الى ثقب يمر منه العصب فوق اللوح و اعلاه الشريان فوق اللوح. ويرتبط من طرفه الواحد بقاعدة التتو الغراي ومن الاخر بالطرف الانسي للشرم

٤ المفصل الكتفي

هذا المفصل من المفاصل المفلاعية. وهو مؤلف من الراس الكروي للعضد والحفرة العنابية التي يدخل فيها فيتألى من هذا الوضع حركة واسعة كانت كثيراً ما تنتهي بالخلع لولا وقاية الاربطة القوية والوتار المحيطة بالمفصل والقبوة التي تعلوه المؤلفة من الوجه السفلي للتو الغراي والتتو الاخري والرباط الغراي الاخري. وتغطي الاسطح المفصلية طبقة غضروفية. واما اربطته فهي:

المخفي الغراي العضدي العنابي

الرباط المخفي محيط بالمفصل احاطة تامة ويرتبط من الاعلى بحيط الحفرة العنابية ومن الاسفل بحيط العنق التشريجي للعضد. وهو غليظ من الاعلى حيث يحتاج الى المقاومة. وتقويه في الاعلى اوتار العضلة فوق الشوكة وتحت الشوكة والمستديرة الصغيرة وتحت اللوح. واما من الاسفل فهو رقيق واسع. وفي هذا الرباط ثلاث فتحات واحدة الى الانسية يمر منها وتر

مثنوياً في مركزه كما يتفق أحياناً

عملة. هذا المفصل مركز حركات الكتف ويقبل الحركة نحو كل جهة أي إلى الأعلى والأسفل والإمام والخلف وأيضا الحركة المقلعية. وذلك على شكل أن الطرف التصي للترقوة والغضروف المتوسط ينزلقان على السطح المفصلي للقص

المفصل اللوحي الترقوي

المفصل اللوحي الترقوي من المفاصل المنزلة وتكوينه من الطرف الوحشي للترقوة والمحافة العليا للأخرم. ارتباطه:

الأخري الترقوي العلوي - الأخرى الترقوي السفلي - الغراي الترقوي المواقف من المربع المنحرف والمخروطي - الغضروف اللبني المتوسط

الرباط الأخرى الترقوي العلوي عريض مربع الشكل يغطي الجزء العلوي للمفصل ويمتد بين الجزء العلوي لطرف الترقوة الوحشي والجزء المجاورة من الأخرم والرباط الأخرى الترقوي السفلي يغطي الجزء السفلي ويمتد بين الجزء بين المتجاورين للعظمين. وهذا الرباط يتصل بالعلوي المقدم والمؤخر فيتكون من هذا الاتصال منمنظة تامة محيطة بالمفصل

والرباط الغراي الترقوي يربط الترقوة بالنتو الغراي. وهو مؤلف من حزمتين هما الرباط

شكل ١٠٥



المربع المنحرف والمخروطي

فالرباط المربع المنحرف هو الحزمة المقدمة والوحشية مربع الشكل منحرف الوضع بين النتو الغراي والترقوة يرتبط من الأسفل بالوجه العلوي للنتو الغراي ومن الأعلى بالخط المنحرف على الوجه السفلي للترقوة

والرباط المخروطي هو الحزمة الخلفية والانسية مخروطي الشكل قاعدته إلى الأعلى ورأسه إلى الأسفل. يرتبط من رأسه بانخفاض خشن عند قاعدة النتو الغراي إلى الانسية من سابقه. ومن قاعدته بالحدبة المخروطية على الوجه السفلي


شكل ١٠٥ اربطة اللوح والمفصل الكتفي ١ الرباط الأخرى الترقوي العلوي ٢ الرباط المربع المنحرف وهو قسم من الغراي الترقوي ٣ الرباط الغراي الأخرى ٤ الرباط المستعرض ٥ الرباط الخفطي ٦ الغراي العضدي ٧ الرأس الطويل للعضلة ذات الرأسين خارجاً من الرباط الخفطي وداخلاً ميزاب ذات الرأسين

المرفئي ٦ المفصل الكعبري الزندي ٧ المفصل الرسغي ٨ مفاصل العظام الرسغية ٩ المفاصل الرسغية المشطية
١٠ المفاصل المشطية السلامية ١١ المفاصل السلامية

١ المفصل القضي الترقوي

هذا المفصل من المفاصل المنزقة وهو مكون من الطرف القضي للترقوة وجزء جانبي من القطعة الاولى للقص وغضروف الضلع الاول. واما اربطته فهي:
القضي الترقوي المقدم - القضي الترقوي الخلفي - المتوسط بين الترقوتين - الضلي الترقوي - الغضروف اللبني المتوسط

شكل ١٠٤



الرباط القضي الترقوي المقدم رباطة عريضة تغطي الوجه المقدم للمفصل وترتبط من الاعلى بالجزء العلوي والمقدم للطرف الانسي من الترقوة ومن الاسفل بالجزء العلوي والمقدم للقطعة الاولى من القص. ويغطيه من المقدم الجزء القضي للقصبة الترقوية الخلفية. ومن الخلف يجاور الغضروف المتوسط

والرباط القضي الترقوي الخلفي (شكل ١٠٠) رباطة

عريضة تغطي الوجه الخلفي للمفصل وتجاور من المقدم الغضروف المتوسط ومن الخلف العضلة القصية اللامية والقصية الدرقية

والرباط بين الترقوتين رباطة مسطحة ممتدة بين الطرفين الانسيين للترقتين وملتصقة بالحافة العليا للقص. مجاورته من المقدم للجلد ومن الخلف للعضلتين القصيتين الدريقتين والرباط الضلي الترقوي (المعين) رباطة قصيرة معينة الشكل رابطة الطرف القضي للترقوة بغضروف الضلع الاول. وضعه منحرف بين الضلع والوجه السفلي للترقوة. مجاورته من المقدم لوتر منشأ العضلة تحت الترقوة ومن الخلف للوريد تحت الترقوة

والغضروف اللبني المتوسط قطعة مسطحة شكلها يقرب من المستدير موضوعة بين السطحين المفصلين للقص والترقوة. يتصل من الاعلى بالترقوة ومن الاسفل بغضروف الضلع الاول عند اتصاله بالقص ومن محيطه بالرباطين القصيين الترقويين المقدم والخلفي. وهذا الغضروف يقسم المفصل الى تجويفين لكل منهما كيس زلاحي لا استتراق بينهما الا اذا كان الغضروف

شكل ١٠٤ اربطة المفصل القضي الترقوي والمفصل الضلي القضي ١ الرباط القضي الترقوي المقدم ٢ الرباط بين الترقوتين

٣ الرباط الضلي الترقوي وهو المعين ٤ الغضروف اللبني المتوسط الذي يظهر عند نزح الرباط المقدم والخلفي ٥ الرباطان الضليان القصيان المقدمان للضلع الاول والثاني

والغضروف الليفي المتوسط موضوع ضمن المفصل العجزي العصصي وقد يصاحبه غشاء زلالي ولا سيما مدة الحمل. واتصال العصص بالعجز يقبل حركة جزئية الى الوراء ولا سيما مدة الولادة. ويتعظم الغضروف المذكور في سن الشيخوخة فلا تبقى حركة بين العظمين

اربطة العظمين العائيين

اتصال العظمين العائيين من المفاصل المشتركة ويقال له الارتفاق العائي واما اربطته فهي :

العائي المقدم - العائي الخلفي - العائي العلوي - العائي السفلي - الغضروف الليفي المتوسط

الرباط العائي المقدم مكوّن من الياف سطحية تمرّ من العظم الواحد الى الاخر وتتصلب مع الياف صفاق العضلة المنحرفة الظاهرة والياف غائرة تقاطع الارتفاق وتختلط بالغضروف الليفي المتوسط

والرباط العائي الخلفي مكوّن من الياف قليلة متفرقة تضم العظمين من الخلف

والرباط العائي العلوي رباطة الياف تضم العظمين العائيين من الاعلى

والرباط العائي السفلي قوس غليظ مثلث الشكل يوصل العظمين من الاسفل ويكون الحد العلوي للقوس العائي. يرتبط من الاعلى بالغضروف الليفي المتوسط ومن الجانبين بالفرعين النازلين للعائيين


والغضروف الليفي المتوسط مؤلف من طبقتين واحدة لكل من وجهي الارتفاق العائي شكلها بيضي. وهو شبيه بالعضاريف بين اجسام الفقرات ومكوّن من دوائر ليفية حلقة اكنف عند السطح مما هي بقرب المركز. وهو غليظ في المقدم رقيق في المؤخر. ويشاهد احياناً غشاء زلالي في النصف الخلفي للمفصل

واما الرباط الساد فغشاء كثيف مكوّن من الياف متصالبة ومرتبطة بحيط الثقب الساد فيسده سداً تاماً الا في جزئه العلوي والوحشي حيث تبقى قناة صغيرة لمرور الاوعية السادة والعصب الساد. ويرتبط به من الظاهر بعض السادة الظاهرة ومن الباطن بعض السادة الباطنة

في مفاصل الطرف العلوي

١ المفصل القصي الترقوي ٢ المفصل اللوحي الترقوي ٣ اربطة اللوح ٤ المفصل الكفوي ٥ المفصل

شكل ١٠٣



والرباط العجزي الوريكي الصغير وهو المقدم
اقصر واصغر جداً من سابقه . شكله مثلث رقيق
يرتبط من راسه بالشوكة الوريكية ومن قاعدته
العريضة بالحافة الجانبية للعجز والعصص الى مقدم
ارتباط الرباط العجزي الوريكي الكبير فتخنط اليافها.
مجاورته من المقدم للعضلة العصصية ومن الخلف
يغطيه الرباط الخلفي وتقاطعها الاوعية الاستحيائية
والعصب الاستحيائي . حافته العليا تكوّن الحد
السفلي للثقب العجزي الوريكي الكبير . وحافته السفلي
تكوّن بعض الثقب العجزي الوريكي الصغير

وهذان الرباطان يحولان الشرمين العجزيين الوريكيين الى ثقبين . فالثقب العجزي الوريكي
العلوي الكبير تحده من الاعلى والمقدم الحافة الخلفية للعظم اللا اسم له . ومن الخلف الرباط
العجزي الوريكي الكبير ومن الاسفل الرباط الصغير . وتشغل معظم هذا الثقب العضلة الهرمية
وتراعاها الاوعية الالوية والاعوية الاستحيائية الباطنة والعصب الاستحيائي الباطن وعصب
السادة الباطنة . والثقب العجزي الوريكي السفلي او الصغير تحده من المقدم الحدة الوريكية ومن
الاعلى الشوكة الوريكية والرباط الصغير ومن الخلف الرباط الكبير . ويمر منه وتر السادة
الباطنة وعصبا والاعوية الاستحيائية

اربطة العجز بالعصص

العجزي العصصي المقدم - العجزي العصصي الخلفي - الغضروف الليفي المتوسط

الرباط العجزي العصصي المقدم مكوّن من بعض الياف غير منتظمة تمتد من الوجه
المقدم للعجز الى مقدم العصص وتخلط بالسحقاق
والرباط العجزي العصصي الخلفي رباطة مسطحة لولوية اللون تنشأ من حافة الثقب
السفلي للقناة العجزية وترتبط بالوجه الخلفي للعصص الى راسه . مجاورته من المقدم للغشاء العنكبوتي
للقناة العجزية ومن الخلف للالوية الكبيرة

شكل ١٠٣ اربطة الحوض والمفصل الوريكي ١ الرباط العجزي الحرفني المنحرف ٢ الرباط العجزي الوريكي الخلفي وهو الكبير
٣ الرباط العجزي الوريكي المقدم وهو الصغير ٤ الثقب العجزي الوريكي الكبير ٥ الثقب العجزي الوريكي الصغير ٦ الرباط الخفي
٧ الرباط المستدير ٨ ارتباط الرباط الخفي من الاسفل ٩ بعض الغشاء الساد

تربط العجز بالحرقي. الثاني الاربطة التي تمتد بين العجز والوركي. الثالث الاربطة التي تربط العجز بالعصص. رابعاً الاربطة التي بين العظمين العائنين

اربطة العجز بالحرقي

انصال وجهي العجز الجانبيين بالعظمين الحرقيين من المفاصل المشتركة. وتغطي الاسطحة المفصلية طبقة رقيقة غضروفية. لهذا المفصل رباطان

والعجزى الخلفي

العجزى المقدم

الرباط العجزى الحرقي المقدم مكوّن من ربائط كثيرة رقيقة تربط الوجهين المقدمين للعجز والحرقي

والرباط العجزى الحرقي الخلفي رباط متين موضوع في الانخفاض الغائر الذي بين العجز والحرقي في المؤخر فهو الواسطة الرئيسة للاتصال بين هذين العظمين. وهو مكوّن من حزم كثيرة متينة تمرّ بين العظمين على جهات مختلفة ثلاث حزم منها كبيرة. فالاثنتان العلويتان متجهتان اتجاهاً افقياً ينشآن من الحدبتين المستعرضتين الاولى والثانية لمؤخر العجز وترتبطان بالوجه الحشن الواقع في الجزء الخلفي للوجه الباطن للحرقي. والثالثة وربية الاتجاه مرتبطة من طرفها الواحد بالحدبة المستعرضة الثالثة او الرابعة على مؤخر العجز ومن طرفها الاخر بالشوكة العليا الخلفية للحرقي

اربطة العجز بالوركي

الرباط العجزى الوركي الصغير (المقدم)

الرباط العجزى الوركي الكبير (الخلفي)

الرباط العجزى الوركي الكبير وهو الخلفي موضوع في الجزء السفلي والخلفي للحوض. وهو مثلث الشكل رقيق مسطح يرتبط من قاعدته العريضة بالشوكة الخلفية السفلى للحرقي وبالحدبة المستعرضة الثالثة والرابعة على العجز وبالجزء السفلي للحافة الجانبية للعجز والعصص ثم يسير بانحراف الى الاسفل والوحشية والمقدم ويرتبط بالحافة الانسية للحدبة الوركية والفرع الوركي حيث يكوّن الزائدة المنحنية التي تقي الشريان الاستحيائي الباطن وتختلط باللفافة السادة. مجاورته من الباطن للعضلة السادة الباطنة ومن الظاهر للعجان. وتنشأ من وجهه الخلفي بعض الياف الالوية العظيمة. ويتصل من وجهه المقدم بالرباط العجزى الوركي الصغير. وحافته العليا تكوّن الحد السفلي للثقب العجزى الوركي الصغير. وحافته السفلى تكون بعض حد العجان. وثقبه الفرع العصصي للشريان الوركي


فالرباط القصي المقدم طبقة الياف طويلة الوضع تختلط باللياف الاربطة الضلعية القصية من الجانبيين وبالصفناق المشأى للصدرية الكبيرة والرباط القصي الخلفي موضوع على الوجه الخلفي للقص ويمتد من القبضة الى التواخجري

٩ في اتصال الحوض بالعمود

الاربطة التي تربط الفقرة القطنية الاخيرة بالعجز كالاربطة التي تربط قطع العمود بعضها ببعض وهي اولاً امتداد الرباطين المشتركين المقدم والخلفي الى الاسفل. ثانياً غضروف متوسط بين الفقرة الاخيرة والعجز. ثالثاً الرباطان الاصفران اللذان يربطان قوس الفقرة الاخيرة بالحافة الخلفية للقناة الشوكية. رابعاً الرباطان المحظيان اللذان يربطان التوات المفصليّة. خامساً الاربطة بين الشوكات والاربطة اعلى الشوكات. غيرانه ما عدا ذلك يوجد رباطان خاصان بهذا المفصل وهما

الفظي العجزى والفظي الحرقفي

شكل ١٠٢



فالرباط الفظي العجزى حزمة قصيرة غليظة مثلثة الشكل ترتبط من الاعلى بالجزء السفلي والمقدم للتوا المستعرض للفقرة القطنية الاخيرة ثم تنجّه بانحراف الى الوحشية وترتبط من الاسفل بالوجه الجانبي لقاعدة العجز. وهذا الرباط يجاور من المقدم العضلة الصليية والرباط الفظي الحرقفي ممتد افقياً الى الوحشية من راس التوا المستعرض للفقرة القطنية الاخيرة الى عرف الحرقفي عند مقدم المفصل العجزى الحرقفي. شكله مثلث ومجاورته من المقدم للعضلة الصليية ومن الخلف للعضلات الشاغلة لليزاب الفقري ومن الاعلى للمربعة القطنية

١٠ في اربطة الحوض

تقسم الاربطة التي تربط عظام الحوض بعضها ببعض الى اربعة مجاميع الاول الاربطة التي

شكل ١٠٢ اربطة الحوض والمفصل الوركي ١ القسم السفلي للرباط المقدم المشترك الفقري ممتداً الى مقدم العجز ٢ الرباط الفظي العجزى ٣ الرباط الفظي الحرقفي ٤ الرباط العجزى الحرقفي المقدم ٥ الغنائه الساد ٦ رباط بوبارت ٧ رباط كمبرنات ٨ الرباط المحفظي للمفصل الوركي ٩ الرباط الحرقفي الخدي وهو الاضافي

الصدرية الكبيرة



والرباط الضلعي القصي الخلفي اصغر من المقدم تشعع اليافه من الوجه الخلفي لغضاريف الاضلاع الى الوجه الخلفي للقص وتختلط بالسحقاق

والرباط المحفظي محيط بالمفاصل المكوّنة من غضاريف الاضلاع الصحيحة والقص. وهو رقيق محتلط بالرباط المقدم والخلفي ويحفظ الاغشية الزلالية

واما الاغشية الزلالية فثمانية اثنان للضلع الثاني واثنان للضلع الثالث وواحد لكل من الرابع والخامس والسادس والسابع. واما الضلع الاول فمتصل رأساً بالقص من غير غشاء زلاي عملها. حركة المفاصل الضلعية القصية جزئية مقتصرة على الارتفاع والانخفاض

اتصال غضاريف الاضلاع بعضها ببعض

تتصل غضاريف الضلع السادس والسابع والثامن من حوافها السفلى بالغضاريف المجاورة لها بواسطة حفر صغيرة ملساء مستطيلة. وكل اتصال من الاتصالات المذكورة محاط برباط محفظي يبطنه غشاء زلاي وتعيته الياف رباطية ممتدة من الغضروف الواحد الى الاخر

اتصال الاضلاع بغضاريفها


يقبل الطرف الوحشي لكل غضروف ضلعي في حفرة في الطرف القصي للضلع وينضمان بواسطة السحقاق

٨ في اربطة القص

تتصل القطعة الاولى بالثانية من القص بواسطة طبقة غضروفية لانه تعظم الا في سن الشيخوخة. وينضمان ايضاً بواسطة رباطين احدهما مقدم والاخر خلفي

شكل ١٠١ قطع القص والترقوة والغضاريف الضلعية لاجل اظهار اتصالاتها واغشيتها الزلالية والجوهر الاسفنجي للعظام
١- ١٠ الاضلاع العشرة العليا ١١ الترقوة ١٢ و١٣ و١٤ القطع الثلاث للقص ١٥ و١٧ الغشاءان الزلايان الموضوعان بين الترقوة والقص ١٦ الغضروف المتوسط بينها ١٨ و١٨ امتداد صفاتي من العضلات الظاهرة بين الاضلاع ١٩ الرباط الضلعي الترقوي وهو المعين ٢٠- ٢١ اتصال الغضاريف الضلعية بعضها ببعض والاغشية الزلالية التي بينها ٢٢ اتصال ثان قد يوجد بين الغضروف السادس والسابع ٢٣ الياف غضروفية توصل الغضروف التاسع بالعاشر

شكل ٩٨




والرباط المتوسط الضلعي المستعرض
رباط قوي يمتد بين الوجه الخلفي لعنق
الضلع والتواء المستعرض الذي يستقر عليه.
وهو اثري في الضلع الحادي عشر والثاني
عشر

والرباط الخلفي الضلعي المستعرض حزمة غليظة قصيرة ممتدة بين قمة التواء المستعرض
وحدبة الضلع. وليس للضلع الحادي عشر والثاني عشر رباط خلفي
عملها. حركة هذه المفاصل مقتصرة على انزلاق الاسطح المفصليتها بعضها على بعض


٧ في اربطة غضاريف الاضلاع بالقص

الضلعي القصي المقدم - الضلعي القصي الخلفي - الخلفي

فالرباط الضلعي القصي المقدم عريض رقيق يتشعب من الطرف الانسي لغضاريف



شكل ١٠٠



شكل ٩٩

الاضلاع الصحيحة الى الوجه المقدم للقص. وتختلط اليافه بالياف الجانب المخالف وبالياف

شكل ٩٨ ١ تتو مستعرض ٢ عنق الضلع ويشاهد الرباط المتوسط الضلعي المستعرض ممتدًا بينها ٣ غشاء زلاي بين
حدبة الضلع واسطح المفصلي للتواء المستعرض
شكل ٩٩ ١٠٠ المفاصل الضلعية القصية من المقدم ١-١٠ الاضلاع العشرة العليا ١١ الترقوة ١٢ و١٣ و١٤ النطق الثلاث
للقص ١٥ و١٥ رباطان ضلعيان قصيان مقدمان ١٦ رباط ضلعي قصي علوي يقول به بعضهم ١٧ رباط ضلعي قصي سفلي
١٨ و١٨ امتداد صفاتي من العضلات الظاهرة بين الاضلاع ١٩ الرباط الضلعي الترقوي وهو المعين ٢٠ الرباط القصي الترقوي
المقدم ٢١ و٢١ اربطة بين الاضلاع الكاذبة

شكل ١٠٠ المفاصل الضلعية القصية من الخلف ١٥ و١٥ رباطان ضلعيان قصيان خلفيان ٢٠ الرباط القصي الترقوي
الخلفي. وما بقي من ارقام هذا الشكل كارقام شكل ٩٩


ثلاث حزم مشعة من الجزء المقدم لرأس الضلع فالعليا منها تصعد وترتبط بحجم الفقرة التي اعلى المفصل والسفلى تنزل وترتبط بحجم الفقرة التي اسفله والمتوسطة تذهب افقياً وترتبط بالغضروف المتوسط بين الفقرات . ولا يشاهد التقسيم المذكور الى ثلاث حزم في الضلع الاول والحادي عشر والثاني عشر لانها لا تتصل الا بقرة واحدة دون البقية التي يتصل كل منها بفقرتين والرباط المحفزي كيس رقيق واسع محيط بالمفصل بين رأس الضلع والحفرة المفصالية للفقرة والرباط المتوسط (شكل ١٥) موضوع في باطن المفصل ويرتبط من طرفه الواحد بالعرف الحاد الذي على رأس الضلع ومن طرفه الاخر بالغضروف بين الفقرات فيقسم المفصل الى تجويفين لا استطراق بينهما لكل منها غشاء زلاي الا في الضلع الاول والحادي عشر والثاني عشر حيث لا وجود للرباط المذكور

عملها . حركة هذه المفاصل الارتفاع والانخفاض وقليلاً الى الامام والخلف الا للضلع الاول فانه لا يتحرك الا قليلاً عند التنفس الغائر


اربطة اعناق الاضلاع وحادباتها بالنتوات المستعرضة

الرباط المقدم الضلعي - المستعرض - المتوسط - المحفزي

فالرباط المقدم الضلعي المستعرض رباطة عريضة متينة مرتبطة من الاسفل بالعرف الحاد



شكل ٩٧



شكل ٩٦

الذي على الحافة العليا لعنق كل ضلع ومن الاعلى بالحافة السفلى للنتوا المستعرض الذي اعلى الضلع . وهو فاصل بين الفرع المقدم والفرع الظهرى للعصب بين الاضلاع . وليس للضلع الاول والاخير رباط مقدم

شكل ٩٦ ١ الرباط المشترك المقدم ٢ و٢ الرباط المقدم الضلعي الفقري وهو النجيبي ٣ الرباط المقدم الضلعي المستعرض

شكل ٩٧ ١ و١ الرباط اعلى الشوكات ٢ و٢ و٢ الاربطة الصفرا ٣ الرباط المقدم الضلعي المستعرض ٤ الرباط الخلفي الضلعي المستعرض

اربطه رؤوس الاضلاع باجسام الفقرات

شكل ٩٥



بين راس التواء للقي للفك السفلي والحفرة العنابية. ويتصل محيطه من الوحشية بالرباط الجانبي الوحشي ومن الانسية بالرباط المحفظي ومن المقدم بوتر الجناحية الوحشية. وهذا الغضروف يقسم المفصل الى تجويفين احدهما اعلى الغضروف والاخر اسفله

والاغشية الزلالية اثنان احدهما موضوع اعلى الغضروف وهو الاكبر والاخر اسفله. وقد يكون الغضروف مشقوقاً فيتواصلان

عمله. هذا المفصل واسع الحركة فان الفك قد ينخفض فينتفع الفم ويرفع فينطبق. ويتحرك الى الامام والخلف ومن الجانب الى الجانب. فاذا تعاقبت هذه الحركات تأتي من ذلك نوع من الحركة الرحوية بين الفك السفلي والعلوي على ان العلوي منها ثابت يعين في المضغ اعانة جوهرية (١)

٦ في اتصال الاضلاع بالفقرات

نقسم الابططة التي تربط الاضلاع بالعمود الفقري الى قسمين. الاول الابططة التي تربط رؤوس الاضلاع باجسام الفقرات. والثاني الابططة التي تربط اعناق الاضلاع وحدباتها بالنتوءات المستعرضة

اربطه رؤوس الاضلاع باجسام الفقرات

الرباط الضلعي الفقري المقدم - المحفظي - المتوسط

فالرباط الضلعي الفقري المقدم ويقال له ايضاً النجمي (شكل ١٥ و ٩٦) مؤلف من


شكل ٩٥ في هذا الرسم قطع المفصل من الاعلى الى الاسفل لاجل اظهار وضع الغضروف اللبني المتوسط وموافقته للسطوح المفصلي. ١ الحفرة العنابية ٢ الارتفاع المفصلي ٣ الغضروف المتوسط ٤ الغشاء الزلالي العلوي ٥ الغشاء الزلالي السفلي ٦ الغضروف اللبني المتوسط وقد رسم منفرداً لاجل اظهار شكله البيضي وتعبيره

(١) اذا انخفض الفك السفلي انخفاضاً يسيراً بقي التواء اللقميان في المحفرتين العنابيتين واذا انخفض كثيراً انزلق التواء اللقميان على الارتفاع المفصلي واندفع معها الغضروف المتوسط. فاذا زاد عن ذلك خلع التواء للقي واندفع مع الغضروف الى الحفرة الزوجية وهذا يحدث احياناً عند التثاؤب الشديد. واذا ارتفع الفك عاد الغضروف والتواء للقي الى وضعها الاصلي. والحركة الامامية الخلفية والجانبية انزلاق الغضروف على السطح المفصلي للحفرة العنابية

٥ في المفصل الصدغي الفكي

الاجزاء التي تدخل في تأليف هذا المفصل هي من الاعلى الجزء المقدم للحفرة العنابية من العظم الصدغي والارتفاع المفصلي ومن الاسفل التتوالقي للفك السفلي واما ارتباطه فهي الجانبي الوحشي - الجانبي الانسي - الابري الفكي - المحفظي - الغضروف الليفي


شكل ٩٣



فالرباط الجانبي الوحشي حزمة قصيرة رقيقة ضيقة مرتبطة من الاعلى بالوجه الظاهر للتو الزوجي وبالحدبة المحسنة التي على حافته السفلي ومن الاسفل بالوجه الوحشي وحافة الخلفية لعنق الفك السفلي. وهو اعرض في الاعلى منه في الاسفل. وتغطيه من الظاهر الغدة النكفية والجلد ومن الباطن يجاور الغضروف الليفي والاعشية الزلاية

والجانبي الانسي رباطة طويلة رقيقة مرتبطة من الاعلى بالتو الشوكي للاسفيني ومن الاسفل بالحافة الانسية للثقب السني. مجاورته من الظاهر للعضلة الجناحية الوحشية في الاعلى ثم يفصله الشريان الفكي الباطن عن عنق التتوالقي ثم تفصله الاوعية السنية السفلى عن فرع الفك. ومن الباطن يجاور الجناحية الانسية

شكل ٩٤



والرباط الابري الفكي حبل رقيق صفاقي يمتد من راس التتوالبري للصدغي الى زاوية الفك فيرتبط بين العضلة المضغية والجناحية الانسية. وهو فاصل بين الغدة النكفية والغدة تحت الفك

والرباط المحفظي كيس محفظي رقيق واسع مرتبط من الاعلى بمحيط الحفرة العنابية ومن الاسفل بعنق التتوالقي

والغضروف الليفي المتوسط صفيحة رقيقة بيضية الشكل غليظة الحوافي موضوعة وضعاً افقياً

شكل ٩٣ المفصل الصدغي الفكي من الظاهر ١ القوس الزوجي ٢ حدبة القوس ٣ فرع الفك السفلي ٤ القسم الحلي للعظم الصدغي ٥ الرباط الجانبي الوحشي ٦ الرباط الابري الفكي

شكل ٩٤ المفصل الصدغي الفكي من الباطن ١ قطع القسم الجبوي للصدغي والتو الشوكي اللوتدي ٢ الوجه الباطن لفرع الفك السفلي وجسمه ٣ الرباط المحفظي ٤ الرباط الجانبي الانسي ٥ خلاص صغير عند مندغوه يمر منه العصب الضرسى اللامي ٦ الرباط الابري الفكي وهو زائدة من اللقافة العنقية العائرة

اربطة المحور بالعظم المُوَّخري


تحت المُوَّخري . مجاورته من الخلف للمستقيمتين الخلفيتين الصغيرتين والمنحرفتين العلويتين ومن المقدم للام الجافية التي للقناة الشوكية والتي تخلط بها والرباطان الجانيان حزمتان متبنتان متجهان بانحراف الى الاعلى والانسية . يرتبطان من الاعلى بالتو الوداجي من العظم المُوَّخري ومن الاسفل بقاعدة التو المستعرض للحاملة والرباطان المحفظيان محيطان بالتوين اللقيمين للمُوَّخري ويربطانها بالسطين المنفصلين للحاملة . فهما محفظتان محيطتان بالغشاء الزلالي للفصل عملها . ان الحركة التي تتم بواسطة هذا المفصل هي القبض والبسط وحركة جانبية جزئية . فان زيد احد هذه الاعمال الى اكثر من الدرجة اليسيرة اشترك فيه الجزء العنقي من العمود

٤ اربطة المحور بالعظم المُوَّخري

المُوَّخري الحوري - ثلاثة نايبة

فالرباط المُوَّخري الحوري موضوع في الجزء العلوي للوجه المقدم من القناة الشوكية . وهو

شكل ٩٢



عريض متين يغطي التو النابي واربطة ويظهر انه امتداد من الرباط المشترك الخلفي للعمود الى الاعلى . ارتباطه من الاسفل بالوجه الخلفي لجسم المحور ومن الاعلى ينتشر اولاً ثم يرتبط بالثلث القاعدي للمُوَّخري الى مقدم الثقب العظيم . مجاورته من وجهه المقدم انه يتصل بالرباط المستعرض . ومن وجهه الخلفي بالام الجافية .

اذا قُطع هذا الرباط عرضاً ورُدَّ طرفاه الى الوراء ظهر الرباط المستعرض والاربطة النايبة والاربطة النايبة (شكل ١٩) جبالن ليفيان قويان مستدبران ينشآن من جانبي راس التو النابي ويسيران بانحراف الى الوحشية والاعلى ويرتبطان بانخفاضين خشنين على الوجه الانسي للتوين اللقيمين من المُوَّخري . ويشاهد في الخلاء المثلث المكوّن من هذين الرباطين وحافة الثقب العظيم رباط ثالث يصعد عمودياً من رأس التو النابي الى الحافة المقدمة للثقب العظيم ويخاط بالرباط المقدم المُوَّخري الحامل والفسحة العليا للرباط المستعرض للحاملة عملها . الاربطة النايبة تحد الحركة الرحوية للخوذة

شكل ٩٢ القسم العلوي من القناة الشوكية وقد قطع من الوراء لاجل اظهار الرباط المُوَّخري الحوري ١ القسم القاعدي من العظم الودي ٢ قطع العظم المُوَّخري ٣ الحاملة وقد قطع قوسها الخلفي ٤ المحور وقد قطع قوسه الخلفي ٥ الرباط المُوَّخري الحوري والى الوراء منه التو النابي ٦ الرباط المحفظي والجاني بين المُوَّخري والحاملة ٧ الرباط المحفظي المحيط بالتوين المنفصلين للحاملة والمحور


والرباط المستعرض

عمله . هذا المنصل كثير الحركة . فان الحاملة تدور دوراً رحوياً على المحور وتدور معها
الجمجمة المستقرة عليها . الا ان هذا الدور الرحوي يجده من كل جانب الرباط النائي
في اتصال العمود بالخوذة
نقسم الاربطة التي تربط العمود بالخوذة الى قسمين الاول اربطة المؤخري بالحاملة
والثاني اربطة المؤخري بالمحور


٢ اربطة الحاملة بالمؤخري

الرباطان الاقدام المؤخريان الحاملين - الخلفي المؤخري الحامل - الجانبيين المؤخريان الحاملين -
المخفظيان

شكل ٩٠



شكل ٩١



فالرباطان المقدمان احدهما سطحي والاخر غائر
فالسطحي جبل متين مرتبط من الاعلى بالتتو القاعدي
ومن الاسفل بالحدبة التي على القوس المقدم للحاملة . والغائر
طبقة رقيقة عريضة مارة بين الحافة المقدمة للثقب العظيم
من الاعلى وجميع طول الحافة العليا للقوس المقدم للحاملة
من الاسفل . وهذا الرباط مجاور من القدم للمستقيمتين
المقدمتين الصغيرتين ومن الخلف للاربطة النائية

والرباط الخلفي المؤخري الحامل صفيحة رقيقة غشائية
عريضة جداً مختلطة بالام الجافية . ارتباطه من الاعلى بالحافة
الخلفية للثقب العظيم ومن الاسفل بالحافة العليا للقوس
الخلفي للحاملة . وهو غير كامل من كل جانب فيكون مع الشرم
العلوي بين الفقرات فتحة لمرور الشريان الفقري والعصب

شكل ٩٠ اربطة الحاملة والمحور والمؤخري من المقدم ١ الرباط المقدم السطحي المؤخري الحامل ٢ الرباط المقدم الغائر
المؤخري الحامل ٣ بداية الرباط المقدم المشترك ٤ الرباط المقدم الحامل المحوري ٥ الرباط المخفي الحامل المحوري ٦ اتصال
التتوين المنفصلين ٧ الرباط المخفي المؤخري الحامل

شكل ٩١ الاربطة الخلفية بين المؤخري والحاملة وبين الحاملة والمحور ١ الحاملة ٢ المحور ٣ الرباط الخلفي المؤخري
الحامل ٤ الرباط المخفي والجانبي بين المؤخري والحاملة ٥ الرباط الخلفي الحامل المحوري ٦ ٧ الرباطان المخفظيان الحاملين
المؤخريان ٧ الزوج الاول من الاربطة الصفرا الواقع بين المحور والفقرة العنقية الثالثة ٨ ٨ الرباطان المخفظيان لهذه
الفقرات

٢ في اربطة الحاملة بالمحور

الرباطان المقدمان الحاملين المحوريان الخلفي الحامل المحوري المستعرض المحفظيان
فالمقدمان الحاملين المحوريان (شكل ٩٠) احدهما سطحي والاخر غائر. فالسطحي جبل
مستدير موضوع في الخط المتوسط يرتبط من الاعلى بالحدبة الواقعة في القوس المقدم للحاملة
ومن الاسفل بقاعدة التو النابي وجسم المحور. والغائر طبقة غشائية مرتبطة من الاعلى بالحافة
السفلى للقوس المقدم للحاملة ومن الاسفل بقاعدة التو النابي وجسم المحور. مجاورتها من المقدم
للمستقيمتين المقدمتين الكبيرتين


والرباط الخلفي الحامل المحوري (شكل ٩١) طبقة رقيقة عريضة غشائية مرتبطة من الاعلى
بالحافة السفلى للقوس الخلفي للحاملة ومن الاسفل بالحافة العليا لصفحة المحور. وهو ينوب في هذا
المحل عن الاربطة الصفراء

والرباط المستعرض حزمة غليظة متينة تقاطع حلقة الحاملة فتحفظ التو النابي متصلاً
انصلاً ثابتاً بالقوس المقدم للحاملة. ويرتبط من كل
جانب بمجدبة في الوجه الانسي للكتلة الجانبية للحاملة. وعند
مقاطعته للتو النابي تذهب منه فسخان احدها الى الاعلى
فترتبط بالتو القاعدي للموخرى والثانية الى الاسفل
فترتبط باصل التو النابي ولذلك يسمى احياناً بالرباط
الصلبي. وهذا الرباط يقسم حلقة الحاملة الى قسمين غير


متساويين فاصلاً بين التو النابي الى المقدم والحبل الشوكي واغشيته الى الخلف. ويتوسط غشاء
زلالي بينه وبين التو النابي

والرباطان المحفظيان (شكل ٩٠) محفظتان رقيقتان واسعتان تحيطان بالتوات المفصلي
للحاملة والمحور وتربطها بعضها ببعض. واغشيتا الالياف ما كان الى المقدم والوحشية
وفي هذا المفصل اربعة اغشية زلالية اثنتان يبطنان الرباطين المحفظيين وواحد متوسط
بين الوجه المقدم للتو النابي والقوس المقدم للحاملة وواحد بين الوجه الخلفي للتو النابي

شكل ٩١ الاربطة التي تربط الحاملة والمحور والموخرى كما تناهد من الخلف. وقد نشر الجزء الخلفي للموخرى وقوسي
الحاملة والمحور ١ القسم العلوي للرباط الموخرى المحوري وقد قطع لظهار ما وراءه من الاربطة ٢ الرباط المستعرض للحاملة
٣ فسخة العليا ٤ فسخة السفلى ٥ احد الرباطين النابيين ٦ احد الرباطين المحفظيين للموخرين الحاملين ٧ احد الرباطين
المحفظيين الحاملين المحوريين



شكل ٨٨



من قسمين جانبيين يبدآن عند اصل التتوين المفصليين ثم يمتدان الى الوراء حتى التتوالشوكي وهناك ينفصلان بمخلاء ضيق يشغله نسيج خلوي، وهي مكوّنة من النسيج اللدن الاصفر واليابها عمودية الوضع ترتبط من الاعلى بالوجه المقدم لحافة الصفيحة ومن الاسفل بالوجه الخلفي والحافة للصفيحة التي دونها. ولما كانت كثيرة اللدونة اعانت في انتصاب العمود ومقاومة عمل العضلات القابضة له. وليس لهذه الاربطة وجود بين المؤخري والمحور

اربطة التتوات المفصلية

الاربطة الحفظية

هي اكياس رقيقة واسعة مرتبطة بجواني التتوات المفصلية لكل فقرة على جميع محيطها الامن الجهة الانسية حيث تكملها الاربطة الصفراء. وهي مغطاة على وجهها الباطن بغشاء زلالي

اربطة التتوات الشوكية

رباط اعلى الشوكات

اربطة بين الشوكات

الاربطة بين الشوكات رقيقة غشائية متوسطة بين التتوات الشوكية في الجهة الظهرية والقطنية وممتدة بين اصول التتوات وقمها والرباط اعلى الشوكات (شكل ٩٧) حبل ليفي متين يربط رؤوس التتوات الشوكية من الفقرة العنقية السابقة الى شوكة العجز بعضها ببعض. تاليفة من الياف مختلفة الطول ارتباطها كارتباط الياف الرباطين المقدم والخلفي اي ان بعضها يمتد بين ثلاث اواربع فقرات وبعضها بين فقرتين


اربطة التتوات المستعرضة

الاربطة بين المستعرضة

هي الياف قليلة متفرقة ممتدة بين التتوات المستعرضة. وهي حبلية الشكل في الجهة الظهرية رقيقة غشائية في القطنية ولا توجد غالباً في العنقية

اربطة الصفاق

شكل ٨٦




ال فقرات من المحور في الاعلى حيث يتصل بالرباط المؤخري المحوري الى العجز في الاسفل . وهو اعرض في الاعلى منه في الاسفل وذلك عكس الرباط المقدم واغلاظ في الجهة الظهرية منه في العنقية والقطنية . وينتشر حذاء الغضاريف بين الاضلاع على هيئة تسننات وتفصه عن اجسام الفقرات اوردة قاعدة الفقرات . وهو مؤلف من الياق طويلة سطحية وقصيرة غائرة على نسق الرباط المقدم من جهة ارتباطها . ويفصله عن الام الجافية للجل الشوكي نسيج خيطي رخو

والغضاريف بين الفقرات قطع عدسية من جوهر ليفي غضروفي

متوسطة بين الاسطحة المتجاورة لاجسام الفقرات من المحور الى العجز فتتكون منها اخص وسائل الاتصال بين العظام المذكورة . ويختلف شكلها وحجمها وسماكتها بحسب مكان وضعها في العمود فانها بيضية الشكل في الجهة العنقية والقطنية ومستديرة في الظهرية وسميكة في الجهة القطنية واكثر سماكتها الى المقدم في الجهة العنقية والقطنية والى الخلف في الجهة الظهرية

شكل ٨٧



فيؤدي ذلك كثيراً الى تحدب القسم العنقي والقطني للعمود في المقدم واما تقعر القسم الظهرى فعائد على نوع خاص الى شكل اجسام فقراته . وقد حسبوا ان سماكة مجموع هذه الغضاريف يبلغ ربع طول جميع العمود ما عدا العجز والعصعص . وهي ملتصقة من وجهيها باجسام الفقرات ومن مقدمها بالرباط المشترك المقدم ومن مؤخرها بالخلفي ومن جانبيها في الجهة الظهرية برووس الاضلاع التي تتصل بفقرتين . اذا قطع غضروف منها قطعاً افقياً او عمودياً شوهد انه مؤلف من دوائر ليفية وليفية غضروفية محيطة بمركز رخولي

اربطة الصفاق

الاربطة الصفراء

الاربطة الصفراء متوسطة بين صفاق الفقرات من المحور الى العجز . كل رباط منها مؤلف

١ او الغضاريف بين الفقرات ٢ و٢ الصفاق منشورة مع ما يليها الى الورا ٣ الرباط الخلفي المشترك ٤ ثقب لمروور ويد

من اورده قاعدة الفقرات

شكل ٨٧ فقرة قطنية وقد قطع الغضروف التي اعلاها قطعاً مستعرضاً ١ او دوائر ليفية محيطة بالمركز ٢ الجوهري

الرخوالمركزي

في مفاصل الجذع

نقسم اربطة الجذع الى عشرة مجاميع وهي

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| ٦ اربطة الاضلاع بالفقرات | ١ اربطة العمود |
| ٧ اربطة الاضلاع بالقص وبعضها ببعض | ٢ اربطة الحاملة بالمحور |
| ٨ اربطة القص | ٣ اربطة الحاملة بالموخرى |
| ٩ اربطة العمود بالحوض | ٤ اربطة المحور بالموخرى |
| ١٠ اربطة الحوض | ٥ اربطة الفك السفلي |

١ في اربطة العمود الفقري


نقسم اربطة العمود الفقري الى خمسة مجاميع وهي اربطة اجسام الفقرات واربطة الصفايح واربطة التتوات المفصلية واربطة التتوات الشوكية واربطة التتوات المستعرضة

اربطة اجسام الفقرات

الرباط المقدم المشترك والرباط الخلفي المشترك والغضاريف بين الفقرات

فالرباط المقدم المشترك حزمة عريضة متينة مكونة من الياف رباطية ممتدة على الوجه المقدم لاجسام الفقرات من المحور الى العجز. وهو ملتصق التصاقاً شديداً بالغضاريف بين الفقرات وضعيفاً باجسام الفقرات غليظ في الجهة الظهرية رقيق في العنقية والتطنية. يُقسم الى جزء متوسط وجزءين جانبيين يفصل الجزء المتوسط عن الجانبيين ثقب لمرور الاوعية. وهو مكون من الياف مختلفة الطول فالغائرة منها قصيرة تمتد من غضروف واحد بين الفقرات الى غضروف ثانٍ والسطحية

شكل ٨٥



طويلة تمتد من الفقرة الواحدة الى ثلاث او اربع فقرات. ويرتبط من الاعلى بتتو مستدق في المحور مشترك بينه وبين منشا العنقية الطويلة ومن الاسفل بالقطعة الاولى للعجز والرباط المشترك الخلفي موضوع ضمن القناة الشوكية ويمتد على الوجه الخلفي لاجسام

شكل ٨٥ ١ الرباط المقدم المشترك لاجسام الفقرات ٢ الرباط الضلعي الفقري المقدم وهو النجي ٣ الرباط المقدم الضلعي المستعرض ٤ الرباط الضلعي الفقري المتوسط الذي يربط راس الضلع بالغضروف بين الفقرات ويفصل بين غشائين زلايين

انواع المفاصل وحركتها

والمفاصل المتحركة (ذيارثروسيس) ما كانت الحركة صفتها الخاصة ويدخل في هذا القسم اكثر مفاصل الجسد. وهي مكوّنة من سطحين مفصلين يغطيها غضروف وتربطها اربطة ويبطنها غشاء زلالي. تُقسم باعتبار نوع حركتها الى اربعة اقسام. الاول الزاوية ويقال لها المخالفة ايضاً وهي التي يتم من حركتها تكبير او تصغير زاوية بين عظيمين فان نتج من الحركة ثني عضو على اخر سميت قبضاً وان حصل تعديل سميت بسطاً كقبض الساعد على العضد وقبض الفخذ على الجذع وبسط الساق على الفخذ. وان كانت الحركة نحو الخط المتوسط للجسد فهي تقريب او منه الى نقطة بعيدة فهي تبعيد. واما تقريب الاصابع وتبعيدها فبالنسبة الى خط متوسط لليد او القدم. وتصل السطوح المفصلية من هذا النوع بواسطة اربطة جانبية قوية. ثم ان القبض والبسط خاصان بالمفاصل الزاوية كالمفصل المرفقي والمفاصل السلامية والتقريب والتبعيد خاصان بالمفاصل الكثيرة الحركة كالورك والكتفي والمشطي الابهامي. الثاني المفاصل المقلاعية وهي التي حركتها الى كل جهة فترسم شكلاً مخروطياً رأسه عند المفصل وقاعدته عند الطرف البعيد لعظم طويل. تأليفها من راس كروي داخل في نفرة غائرة وطريقة اتصالها بواسطة رباط محفظي واربطة اخر اضافية وامثلتها المفصل الورك والكتفي. الثالث الرحوية وهي دوران عظم على محوره بدون تغيير عظيم من جهة وضعه. وذلك كدوران الحاملة والراس معها على التوالنابي للسحور وكحركة الكعبرة على الزند في الكعب. الرابع المنزلقة وهي ابسط انواع الحركة وعامة على جميع المفاصل الا ان بعض المفاصل لا يقبل غيرها كمفاصل الرسغين. وهي مؤلفة من سطحين مسطحين او قد يكون احدها متعراً قليلاً والاخر محدباً قليلاً. وتحد هذه الحركة الاربطة والتوات العظمية المحيطة بالمفصل. وامثلتها اتصال التوات المفصلية للفقرات بعضها ببعض والفك السفلي بالعظم الصدغي والترقوة بالقص والاخرم. غير ان الحركات المذكورة كثيراً ما تشترك بين المفاصل ولو تغلبت او اخصت احياً في شكل

دون غيره

تُقسم المفاصل باعتبار الاماكن الواقعة هي فيها الى ثلاثة اقسام وهي مفاصل الجذع ومفاصل الطرف العلوي ومفاصل الطرف السفلي

والكيسية اكياس موضوعة بين سطحين ينزلق احدهما على الاخر كاتزلاق الاوتار او المجلد على اسطحة عظمية بارزة وفائدتها منع الاحتكاك الذي يقع بين السطحين المذكورين . وهي على نوعين مخاطية وزلاية . فالاكياس المخاطية كبيرة تتضمن سائلاً صافياً لزجاً واقعة في النسيج الخلوي تحت الجلد كالاكياس الواقعة بين المجلد ومقدم الرضفة وبينه والمرفق والكعبين . والزلاية متوسطة بين العضلات او الاوتار والاسطحة البارزة من العظم التي تنزلق عليها كالمدر الكبير الذي تنزلق عليه العضلات الالوية . فان كانت بقرب تجويف مفصل استطرفت اليه غالباً كالكيس المتوسط بين العظم وتر الصليبية العظيمة الذي يستطرق الى تجويف الرباط المحفظي للورك

والغمدية اغشية مكوّنة على هيئة اعمدة تلتصق احدى طبقتها بمجدار الفناة وتنعكس الاخرى على الوجه الظاهر للوتر المار ضمن التجويف . وتشغل الخلاء الواقع بين الطبقتين مادة زلاية . واكثر وجود هذه الاغشية الغمدية في الرسغين حيث تحيط بالاوتار القابضة والباسطة المارة في قنوات عظمية ليفية الى اليد او القدم

واما المادة الزلاية فسائل ابيض يميل الى الصفرة او الحمرة لزوج كيباض البيض عمله قلوي وطعمه ملحي

في انواع المفاصل وحركتها


تقسم المفاصل الى ثلاثة اقسام كبرى وهي الثابتة والمشاركة والمتحركة فالمفاصل الثابتة (سينارثروسيس) لا تقبل الحركة مطلقاً وهي مكوّنة من اتصال سطحين عظيمين يفصلهما غشاء ليفي لا تجويف زلاي . واقسامها اولاً المسننة كاتصال عظام الخوذة بعضها ببعض . ثانياً الشقية كدخول عرف الاسفيني وشفية المصفوي العمودية في شق الميكة . وثالثاً المسارية كاتصال الاسنان بالمحفرة السخية

والمفاصل المشتركة (امفيارثروسيس) ما كانت حركتها جزئية . وطريقة اتصالها اولاً بواسطة دوائر ليفية غضروفية مسطحة تلتصق بطرفي العظمين كاتصال اجسام الفقرات بعضها ببعض والنقطة الاولى بالثانية من القص . وثانياً بواسطة جوهر ليفي غضروفي بعضه مغطى بغشاء زلاي ويتم اتصال السطحين المفصليين بواسطة اربطة من الظاهر كاتصال المفصل العجزي الحرقفي والارتفاق العاني . وقد يتعظم الغضروف المذكور في سن الشيخوخة ولا سيما في الارتفاق العاني

الوضع او متقاطعة لونها ابيض لامع فضي وقد يميل الى الصفرة. وهي متينة قابلة للانثناء وفائدتها



شكل ١٣




شكل ١٢

انها تربط السطوح المفصالية للعظام بعضها ببعض

والغشاء الزلالي غشاء رقيق لطيف موضوع على هيئة اسطوانة قصيرة واسعة مفتوحة الطرفين فتندغم بواسطتها في محيط السطحين المفصليين وتبطن الوجه الباطن للاربطة. والغشاء المذكور شبيه التركيب بالاعشية المصلية الا انه يختلف عنها في السائل الذي يفرزه فانه غليظ لزج

شكل ١٤



كرلال البيض ومنه اسمه. وهو على ثلاثة انواع مفصلي وكيسي وغدي فالاعشية الزلالية المفصالية توجد في جميع المفاصل المتحركة مرتبطة بحيط الغضروف الذي يغطي السطح المفصلي ولا يتجاوز المحيط الا قليلاً فتبطن الوجه الباطن للاربطة الواقعة بين العظمين ثم تنعكس على وجه الاوتار المارة في تجويفها اذا وجدت كوتر المأبضية والوتر الطويل لذات الراسين في الكتف. وقد تنتهي ويكون بين ثيبتها كمل دهنية لاسيما في المفصل الحرقفي والركبة

النسيج اللينفي كثير الدخيل في الاجهزة الحيوانية ومكون من الياف دقيقة جداً وهو على نوعين ابيض واصفر اوالدن. فالابيض مكون من الياف في غاية ما يكون من الدقة فطرها نحو $\frac{1}{100}$ من القيراط اسطوانية الشكل شفافة منهوجة الميئة شهبوعة حرماً فطر الحزمة من $\frac{1}{100}$ الى $\frac{1}{1000}$ وهذا النسيج يدخل في تكوين الاعشية والاربطة والاورار والصفانات التي هي انبساط الاوتار والاصفر مكون من الياف لا لون لها اذا كانت منفردة صفراء اذا كانت مجتمعة في غاية ما يكون من اللدونة بحيث تمتد الى ضعف طولها. وهذا النسيج يدخل في الاربطة الصفراء والاورار الصوتية وغيرها

شكل ١٢ نسيج ليفي ابيض ٢ منظر الياف اذا كانت ممتدة ١٠ و٢ و٤ وه اذا كانت مرتخية مكبرة ٢٢٠ فطراً

شكل ١٣ الياف صفرا . منظرها المجعد اذا لم تكن مشدودة . مكبرة ٨٢٢٠ فطراً


شكل ١٤ كريات او حوصلات دهنية وقد صارت كثيرة الجوانب من ضغطها بعضها على بعض . ماخوذة من الثرب

ومكبرة نحو ٢٠٠ فطراً


الصفرة في غاية ما يكون من اللدونة بحيث تنضغط بسهولة ثم تعود الى هيئتها الأولى عند زوال



شكل ٧٩



شكل ٧٨




القوة الضاغطة. ويُسمّى الى غضروف زمني وهو ما يتكوّن في الجنين أولاً ثم يتحوّل الى جوهر عظمي وغضروف دائم وهو ما لا يتعظم مع مرور الزمن الآتي ما ندر.



شكل ٨٠

ومن هذا النوع ما لا يدخل في تكوين المفاصل كغضاريف الأذن والأنف والجنف وقناة أوستاكيوس والحجرة والقصبه. وأما الغضروف المفصلي فيكوّن طبقة رقيقة تغطي السطوح المفصالية للعظام وفائدتها تسهيل الحركة المفصالية وتبديد القوة الارتجاجية الناتجة عن الصدمات.



شكل ٨١

ومن هذا النوع الغضروف الليفي وهو مؤلف من جوهر غضروفي وجوهر ليفي فتتوقف مرونته اي قبوله للالتواء ومتانته على الجوهر الليفي وتتوقف لدونته اي تمدده وعوده الى حجمه الاول على الجوهـر الغضروفي

والأربطة توجد في جميع المفاصل المتحركة إلا ما ندر. وهي مكونة من حزم ليفية متوازية

شكل ٧٨ كريات غضروفية مقطوعة من الغضروف السابق عند نقطة متوسطة بين العظم والوجه السائب

شكل ٧٩ كريات غضروفية مقطوعة من الغضروف السابق بقرب الوجه السائب

الغضروف الأصفر مؤلف من كريات قطرها $\frac{1}{10}$ منفصلة بواسطة شبكة مظلمة ليفية غير ان الكريات اعرض من التسع المتوسط بينها. ومن هذا النوع غضروف الأذن الظاهرة ولسان الزمار وقناة أوستاكيوس

شكل ٨٠ قطعة من غضروف الصيوان مكبرة ١٥٥ قطراً

الغضروف الليفي مؤلف من حزم الياف بيضاء تتضمن بين تشبهاً كريات غضروفية على هيئة مجاميع متفرقة

شكل ٨١ قطعة من غضروف ليفي مقطوعة من الارتفاق العاني مكبرة ١٥٥ قطراً


الفصل الثاني

في المفاصل والاربطة

المفصل عبارة عن اتصال عظم بعظم وقد يكون بين عظم وغضروف. فان كان المفصل ثابتاً كان اتصال عظام الحجمة بعضها ببعض كان الموصل بين العظمين طبقة رقيقة من غشاء ليفي او من غضروف. وان كانت حركته جزئية يتصل السطحان العظميان بواسطة غضاريف متينة لدنة كمفاصل العمود والمفصل العجزي المحرفي والارتفاق العاني. وان كانت الحركة تامة كانت السطوح متاشرة يغطيها غضروف ويربطها بعضها ببعض نسيج ليفي يقال له رباط ويبطن المفصل غشاء زلالي يفرز سائلاً لتندية الاجزاء التي تدخل في تاليف المفصل بحيث تسهل الحركة المفصلية. وعلى ذلك تكون الاجزاء التي تدخل في تاليف المفصل اولاً العظم ثم الغضروف ثم الرباط ثم الغشاء الزلالي

اما العظم فهو الجزء الرئيسي في كل مفصل. وطريقة اتصال العظام بعضها ببعض ان الطويلة منها تتصل بواسطة اطرافها والمسطحة بواسطة حوافها والقصيرة بواسطة بعض وجوهها

شكل ٧٧



والغضروف مادة جامدة مظلمة لونها ابيض لؤلؤي او ابيض مائل الى الزرقة اولى

يقسم الغضروف باعتبار بنائه الى ثلاثة اقسام صحح واصفرو ليفي. فالخفيف مؤلف من جوهر متجانس البناء نصف شفاف يتضمن كريات دقيقة بيضية الشكل او مستطيلة او كثيرة الجوانب حاوية سائلاً صافياً ونوى وتيمطات زينية ومادة حبيبية قطرها الطويل نحو $\frac{1}{10}$ من المليمتر. وهي كبيرة بقرب العظم صغيرة مغزلية الشكل عند الوجه السائب شكل ٧٧ كريات غضروفية مكبرة ١٥٥ قطعاً مقطوعة قطعاً عمودياً من راس الشظية قرب العظم وهو من الغضروف الصحح

في قنطرة القدم

عظام القدم مركبة على هيئة قوس او قنطرة مزدوجة احدها ممتدة من المقدم الى الخلف
والثانية من الجانب الى الجانب. فالاولى مستقرة على العقب من الخلف والاطراف السلامية
للعظام المشطية من المقدم. والثانية مستعرضة مؤلفة من المكعب والاسفينية والمشطية. وكان
القنطرة الاولى منقسمة الى قسمين انسي ووحشي. فالانسي مؤلف من الثلثين الخلفيين للعقب
والاسفينية والمشطية الثلاثة الانسية وهو حامل اكثر ثقل الجسد ومرتفع عن الارض. والوحشي
مؤلف من العقب والمكعب والمشطي الرابع والخامس ومعظم هذا القسم مستقر على الارض عند
الوقوف. ويتوسط الكعب بين قنطرة القدم وثقل الجسد من الاعلى

العظام السمسانية

هي كتل صغيرة مستديرة غضروفية قبل البلوغ عظمية بعده تتولد في الاوتار التي تضغط
الاجزاء التي تنزلق عليها. قيل ان اكثر وجودها في الذكور ولا سيما في الذين يعتادون على
الاعمال العضلية الشديدة. وهي مغلفة بالنسيج الليفي للوتر الموضوعه في فيه الامن وجنباها الجوار
للجزء الذي تنزلق عليه فان الوجه المذكور عليه سطح سائب مفصلي. تقسم العظام السمسانية
الى نوعين الاول ما ينزلق على سطوح مفصلية والثاني على سطوح عظمية. فالعظام السمسانية
المفصلية في الطرف السفلي الرضفة التي تتولد في وتر الباسطة الرباعية واثنان في وتر القابضة
القصيرة للابهام مقابل المفصل المشطي السلامي وقد يشاهد غيرها مقابل المفاصل المشطية
السلامية للاصابع. وفي الطرف العلوي اثنان في وتر القابضة القصيرة للابهام مقابل المفصل
المشطى السلامي وقد يشاهد غيرها مقابل المفاصل المشطية السلامية للاصابع. والتي تنزلق
على سطوح عظمية واحد في وتر الشظوية الطويلة ينزلق في ميزاب العظم المكعب وواحد في
وتر القصبية المقدمة مقابل سطح امس على الاسفيني الانسي وواحد في وتر القصبية الخلفية مقابل
الوجه الانسي للكعب وواحد في الراس الوحشي للتوأمية وراء التواء التي الوحشي لعظم الفخذ.
ويندر مشاهدة غيرها

الجانب ضيقة في الوسط. ثالثاً السلاميات الثواني ولا سيما في الاصبع الثالث والرابع قصيرة جداً. رابعاً السلاميتان الاخيرتان في الخنصر كثيراً ما تحدان بعد البلوغ فتصيران قطعة واحدة

الاتصال المفصلي. يتصل العظم الاول بالعظام المشطية والسلاميات الثواني. وتتصل السلاميات الثواني بالاول والثالث. وتتصل السلاميات الثوالث بالثواني. واما الابهام فسلاميته الثانية تتصل بالاولى فقط

الارتباطات العظمية. بالسلامية الاولى للابهام الوتر الانسي للباسطة القصيرة للاصابع والمعدة للابهام والمقربة له والقابضة القصيرة له والمستعرضة القدمية. وبالسلامية الاولى للاصبع الاول الظهريتان بين العظام الاولى والثانية. وللاصبع الثاني الظهريه الثالثة والاحصية الاولى بين العظام. وللاصبع الثالث الظهريه الرابعة والاحصية الثانية. وللاصبع الرابع وهو الخنصر القابضة القصيرة والمعدة للخنصر والاحصية الثالثة. وبالسلامية الثانية للابهام الباسطة الطويلة للابهام والقابضة الطويلة له. وبالسلاميات الثواني للاصابع القابضة القصيرة للاصابع والباسطة القصيرة للاصابع والباسطة الطويلة لها. وبالسلاميات الثوالث الباسطة الطويلة والباسطة القصيرة للاصابع والقابضة القصيرة للاصابع

في تعظم القدم

يتعظم كل من عظام الرسغ بنقطة واحدة مركزية الا العقب الذي له نقطة ثانية لطرفه الخلفي. وتظهر نقطة العقب في الشهر السادس للحياة الجنينية. وفي الكعب نحو الشهر السابع. وفي الكعب نحو الشهر التاسع. وفي الاسفني الوحشي في السنة الاولى. وفي الاسفني الانسي في السنة الثالثة. وفي الاسفني المتوسط في السنة الرابعة. وتظهر النقطة الثانية في الحدة الخلفية للعقب نحو السنة العاشرة ثم تتصل الحدة بما بقي من العظم بعد البلوغ

ويتعظم كل من العظام المشطية بنقطتين واحدة للجسم وواحدة للطرف السلامي في الاربعة الوحشية واما مشطي الابهام فنقطة للجسم ونقطة للقاعدة اي الطرف الرسغي. وتظهر نقطة الجسم نحو الاسبوع السابع للحياة الجنينية ونقطة الاطراف نحو السنة الثالثة. وتتصل الاطراف بالاجسام بين السنة الثامنة عشرة والعشرين

ويتعظم كل من السلاميات بنقطتين واحدة للجسم وواحدة للطرف الخلفي

الانسي خال من سطح جانبي عند زاوية السفلى حذبة خشنة بيضية الشكل يندغم بها وتر الشظوية الطويلة. والرأس كبير على وجهه الاخصي سطحان مخفوران ينزلق عليهما عظامان سمسانيان والثاني اطولها يمتد من الخلف بين العظام الاسفينية الثلاثة. طرفه الخلفي عليه من الخلف سطح منفصلي مثلث الشكل يتصل بالاسفيني الثاني ومن جانبه الانسي سطح يتصل بالاسفيني الانسي ومن جانبه الوحشي اربعة سطوح يتصل اثنان منها بالاسفيني المتوسط واثنان بالمشطي الثالث والثالث يتصل من الخلف بالاسفيني الوحشي وعلى جانبه الانسي سطحان يتصلان بالمشطي الثاني وعلى جانبه الوحشي سطح واحد يتصل بالمشطي الرابع والرابع عليه من الخلف سطح مربع الجوانب للاتصال بالمكنع ومن الجانب الانسي للقاعدة سطحان يتصل المقدم منها بالمشطي الثالث والخلفي بالاسفيني الوحشي ومن الجانب الوحشي سطح واحد يتصل بالمشطي الخامس والخامس يتميز بحذبة بارزة على الجانب الوحشي للقاعدة. يتصل من الخلف بالمكنع ومن الانسية بالمشطي الرابع

الاتصال المنفصلي. يتصل كل عظم من العظام المشطية من الطرف الواحد بالعظام الرسغية ومن الطرف الاخر بالصف الاول من السلاميات. فيتصل الاول بعظم واحد من العظام المشطية والثاني بثلاثة والثالث بواحد والرابع باثنين والخامس بواحد الارتباطات العضلية. بالمشطي الاول ثلاث عضلات التصبية المتقدمة والشظوية الطويلة والظهيرية الاولى بين العظام. وبالثاني ثلاث عضلات المقربة للابهام والظهيريتان الاولى والثانية بين العظام. وبالثالث اربع عضلات المقربة للابهام والظهيريتان الثانية والثالثة بين العظام والاختصية الاولى. وبالرابع اربع عضلات المقربة للابهام والظهيريتان الثالثة والرابعة والاختصية الثانية. وبالخامس خمس عضلات الشظوية القصيرة والشظوية الثالثة والقابضة القصيرة للخنصر والظهيرية الرابعة والاختصية الثالثة

السلاميات

سلاميات القدم كسلاميات اليد عددًا ووضعًا وشكلًا فهي اربع عشرة ثلاث لكل اصبع واثنان للابهام مصنوفة ثلاثة صفوف في كل اصبع وصفين في الابهام. واما وجوه الاختلاف فهي اولاً ان سلاميات اصابع القدم اصغر جداً مما يقابلها في اليد وسلاميتا ابهام القدم اكبر من سلاميتي ابهام اليد. ثانياً سلاميات الصف الاول في الاصابع منضخطة من الجانب الى

يفصلها انخفاض خشن يتصل المقدم منها بالجانب الوحشي لقاعدة المشطي الثاني والخلفي بالاسفيني المتوسط. والوجه الوحشي عليه ايضاً سطحان مفصليان المقدم منها صغير موضوع عند الزاوية العليا يتصل بالجانب الانسي لقاعدة المشطي الرابع والخلفي كبير يتصل بالمكعب. والوجه العلوي وهو الظهري مستطيل خشن. والوجه السفلي وهو الاخصي رقيق مستدير تندغم به بعض القصبية الخلفية وبعض القابضة القصيرة للابهام

اذا مسك هذا العظم بحيث تكون قاعدته الى الاعلى وجانبه الطويل وهو الوجه المقدم نحو الماسك كان السطح المفصلي الذي يتصل بالمكعب متجهاً الى الناحية التي هو لها اتصاله المفصلي بستة عظام الزورقي والاسفيني المتوسط والمكعب والمشطي الثاني والثالث

والرابع

ترتبط به بعض القصبية الخلفية وبعض القابضة القصيرة للابهام

العظام المشطية

شكل ٧٦



عظام المشط خمسة تُعدّ من الانسية الى الوحشية . الاول اقصرها والثاني اطولها ثم يتناقص طولها الى الخامس . وهي شبيهة بالعظام المشطية لليد فيقسم كل منها الى جسم وطرفين . فالجسم منشوري الشكل يستدق تدريجاً من الطرف الرسغي الى الطرف السلامي منحني قليلاً في الطول بحيث يكون تحديبه الى الاعلى وتغيره الى الاسفل . والطرف الخلفي وهو القاعدة يتصل من وجهه الخلفي بعظام الرسغ ومن جانبيه بالعظام المشطية المجاورة له ووجهه الظهري والاخصي خشنان لارتباط الاربطة . والطرف المقدم وهو الراس امس مفصلي محدد مستطيل من الاعلى الى الاسفل يتصل بالسلامية الاولى ووجهه السفلي محفور في الخط المتوسط لمرور اوتار البواسط

المشطى الاول وهو الابهامي اقصرها واغظها يكون بعض الحد

الانسي للقدم . طرفه الخلفي عليه من الخلف سطح مفصلي كبير هلالى الشكل يتصل بالاسفيني

شكل ٧٦ اخص القدم اليسرى ١ الحدبة الانسية العقب ٢ الحدبة الوحشية ٣ الميزاب الذي يرفيه وتر القابضة الطولية
للصابع ٤ الراس المستدير للمكعب ٥ الزورقي ٦ حدبته ٧ قاعدة الاسفيني الانسي ٨ الاسفيني المتوسط ٩ الاسفيني الوحشي
١٠ والمكعب وهو الترددي ١١ الميزاب الذي يرفيه وتر الشظوية الطويلة ١٢ و١٣ اعظام المشطية ١٤ السلاميات الاولى
١٥ السلاميات الثواني ١٦ السلامية الاخيرة للابهام

من الخلف وقاعدة المشطي الاول من المقدم على شكل ان قاعدة الاسفين نحو الاخص وراسه نحو الظهر. وجهه الانسي مغطى بالجلد يكون بعض الحد الانسي للقدم وهو كبير خشن وعند زاوية المقدمة السفلى سطح امس ينزلق عليه وتر القصبية المقدمة. والوجه الوحشي مقعر يتصل من الخلف بالاسفيني المتوسط ومن المقدم بالمشطي الثاني. والوجه المقدم مقعر امس صغير يتصل بالمشطي الاول وهو الابهامي. والوجه الخلفي امس مستطيل يتصل بالسطح الانسي الاكبر من السطوح الثلاثة التي على الوجه المقدم للزورقي. والوجه السفلي وهو الاخصي قاعدة الاسفين خشن عليه من الخلف حدة يرتبط بها بعض القصبية الخلفية. ويرتبط بمقدم هذا الوجه بعض القصبية المقدمة. والوجه العلوي راس الاسفين متجه نحو الاعلى والوحشية ترتبط به اربطة اذا مسك هذا العظم بحيث تكون القاعدة الى الاسفل والسطح المفصلي الطويل الى المقدم كان الوجه الوحشي المقعر نحو الجهة التي يختص بها العظم

اتصاله المفصلي باربعة عظام الزورقي والاسفيني المتوسط والمشطي الاول والثاني ترتبط به القصبتان المقدمة والخلفية

والاسفيني المتوسط اصغر الثلاثة وضعه بين الاسفيني الانسي والوحشي من الجانبين وبين الزورقي من الخلف والمشطي الثاني من المقدم. قاعدة الاسفين الى الاعلى وراسه الى الاسفل. وجهه المقدم مثلث الشكل اضيق من الخلفي يتصل بقاعدة المشطي الثاني. والوجه الخلفي مثلث الشكل ايضاً يتصل بالزورقي. والوجه الانسي على حافته العليا والخلفية سطح مفصلي يتصل بالاسفيني الانسي. والوجه الوحشي عليه من الخلف سطح مفصلي يتصل بالاسفيني الوحشي. والوجه العلوي قاعدة الاسفين مربع الجوانب خشن والسفلي رقيق خشن ترتبط بها اربطة اذا مسك هذا العظم بحيث يكون وجهه العلوي الى الاعلى والجانب الاعرض وهو الوجه الخلفي نحو الماسك كان الوجه الوحشي الذي عليه من الخلف سطح مفصلي متجهاً الى الناحية التي هو لها

اتصاله المفصلي باربعة عظام الزورقي والاسفيني الانسي والوحشي والمشطي الثاني

والاسفيني الوحشي متوسط الحجم بين الاول والثاني وضعه في منتصف مقدم الرسغ بين الاسفيني المتوسط الى الانسية والمكعب الى الوحشية والزورقي الى الخلف والمشطي الثالث الى المقدم. قاعدة الاسفين الى الاعلى وراسه الى الاسفل. وجهه المقدم مثلث الشكل يتصل بالمشطي الثالث. والوجه الخلفي يتصل بالزورقي خشن من الاسفل. والوجه الانسي عليه سطحان مفصليان

العظام الاسفينية الثلاثة

مربع الجوانب يتصل بالمشطي الرابع والوحشي مثلث الشكل يتصل بالمشطي الخامس. والوجه الانسي كبير خشن عليه عند منتصفه نحو الاعلى سطح مفصلي صغير يتصل بالاسفيني الوحشي . وقد يوجد وراء السطح المذكور سطح اخر اصغر منه يتصل بالزورقي
 اذا مسك هذا العظم حسب وضعه الطبيعي اي بحيث يكون الميزاب الى الاسفل والسطح المفصلي الاكبر نحو الماسك كان الوجه الضيق الذي عليه بداءة الميزاب نحو الجهة التي هو لها اتصاله المفصلي باربعة عظام العقب والاسفيني الوحشي والمشطي الرابع والخامس . وقد يتصل بالزورقي ايضاً
 ترتبط به بعض القابضة القصيرة للاهتام

الزورقي

وضع الزورقي في الجانب الانسي للرسغ بين الكعب من الخلف والاسفينية الثلاثة من المقدم . يتميز بشكله الزورقي وبانه مقعر من الخلف للاتصال براس الكعب ومحدد مقسوم الى ثلاثة سطوح من المقدم للاتصال بالعظام الاسفينية فيها وجهها الخلفي والمقدم . واما الوجه العلوي فكبير محدب من الجانب الى الجانب خشن ترتبط به اربطة . والوجه السفلي مقعر خشن لارتباط الاربطة . والوجه الانسي عليه حذبة مستديرة هي حذبة الزورقي التي يرتبط بها بعض وتر القصبية الخلفية . والوجه الوحشي خشن وقد يكون عليه سطح مفصلي صغير يتصل بالكعب
 اذا مسك هذا العظم حسب وضعه الطبيعي بحيث يكون الوجه المقعر المفصلي نحو الماسك والوجه الظهري العريض نحو الاعلى كان الوجه العريض الوحشي مشرفاً نحو الجهة التي هو لها اتصاله المفصلي باربعة عظام الكعب والاسفينية الثلاثة . وقد يتصل بالكعب ايضاً
 ترتبط به بعض القصبية الخلفية

العظام الاسفينية الثلاثة

هذه العظام اسفينية الشكل موضوعة في مقدم الرسغ متصلة اتصالاً مفصلياً بالزورقي من الخلف والعظام المشطية الثلاثة الانسية من المقدم . وتعد من الانسية الى الوحشية فيقال لها الانسي والمتوسط والوحشي او الاول والثاني والثالث . قاعدة الثاني والثالث متجهة نحو ظهر القدم وقاعدة الاول نحو الاخص . ولكل منها ستة وجوه مقدم وخلفي وعلوي وسفلي وانسي ووحشي فالاسفيني الانسي وهو الاول اكبر الثلاثة وضعه في الجانب الانسي للقدم بين الزورقي

الوجه العلوي للعقب فاذا اتصل العظام تكونت من الميزابين قناة يشغلها الرباط بين العظمين العقبى الكعبي . والوجه الانسي عليه سطح مفصلي مثلث الشكل يتصل بالمكعب الانسي . واسفل السطح المذكور انخفاض خشن يرتبط به الرباط الجانبي الانسي . والوجه الوحشي عليه سطح مفصلي كبير مثلث الشكل يتصل بالمكعب الوحشي . والى مقدم السطح المذكور انخفاض خشن يرتبط به الرباط الجانبي الوحشي

والوجه المقدم محدب مستدير يتكوّن منه راس الكعب وهو املس بيضي الشكل متجه نحو الانسية والاسفل يتصل اتصالاً مفصلياً بالزورقي ومحاط باخناق هو عنق الكعب . والوجه الخلفي ضيق يقاطعه ميزاب منحرف الوضع نحو الاسفل والانسية يمرّ فيه وتر القابضة الطويلة الالهام

اذا اريد معرفة اية رجل هو لها يُسكّ بحيث يكون السطح العريض المفصلي الى الاعلى والراس المستدير الى المقدم . فيتجه السطح المفصلي الجانبي المثلث الذي يتصل بالمكعب الوحشي الى الناحية التي هو لها

اتصاله المفصلي باربعة عظام القصبية والشظية والعقب والزورقي

المكعب وهو النردي

وضع المكعب في الجانب الوحشي للقدم الى مقدم العقب ووراء العظمين المشطيين الرابع والخامس . وهو مكعب الشكل الا انه يقارب الخروط لسبب اتجاه اربعة من سطوحه نحو سطح صغير هو وجهه الوحشي . يتميز عن بقية عظام الرسغ بان على وجهه السفلي ميزاباً غائراً لمرور وتر الشظوية الطويلة . له ستة وجوه ثلاثة منها مفصلية وثلاثة غير مفصلية علوي وسفلي ووحشي فالوجه العلوي وهو الظهري متجه نحو الاعلى والوحشية خشن ترتبط به اربعة كثيرة . والوجه السفلي وهو الاخصي عليه من المقدم ميزاب غائر متجه من الوحشية الى الانسية والمقدم يستقر فيه وتر الشظوية الطويلة . والى الخلف من الميزاب حرف بارز ينتهي من الوحشية بارتفاع محدب يتصل اتصالاً مفصلياً بالعظم السسماني الخاص بالوتر المذكور . ويرتبط بالحرف وما بقي من الوجه الى الورا الرباطان العقبين المكعبيان الطويل والتقصير . والوجه الوحشي صغير ضيق عليه شرم هو بداية الميزاب الشظوي

والوجه المفصلية هي الخلفي والمقدم والانسي . فالوجه الخفي املس كبير يتصل بالعقب . والوجه المقدم اصغر من الخلفي متسوم الى سطحين مفصليين بواسطة خط عمودي الانسي منها

شكل ٧٥



الأوعية والأعصاب الأخصية، وأوتار القوابض إلى أخمص القدم وترتبط به بعض القابضة الإضافية. ويبرز من أعلى ومقدم هذا الوجه أفقياً إلى الأنسية تنوع عليه من الأعلى أحد السطحين المفصلين اللذين يتصلان بالكعب ومن الأسفل ميزاب يمر فيه وتر القابضة الطويلة للإبهام. والوجه المقدم املس مثلث الشكل يتصل اتصالاً مفصلياً بالكعب. والوجه الخلفي خشن من الأسفل يرتبط به وتر أكيلس املس من الأعلى عليه كيس مخاطي يفصله عن الوتر المذكور

اتصاله المفصلي بعظمين الكعب والمكعب

ارتباطاته العضلية. بالوجه الخلفي وتر أكيلس والأخصية. وبالوجه السفلي المبعدة للإبهام والمبعدة للخنصر والقابضة القصيرة للأصابع والقابضة الإضافية. وبالوجه الوحشي الباسطة القصيرة للأصابع

الكعب

الكعب "أكبر عظام الرسغ إلا العقب وضعه في القسم المتوسط والعلوي للرسغ حاملاً القصبية من الأعلى مستقراً على العقب من الأسفل متصلاً اتصالاً مفصلياً بالكعبين من الجانبين وبالزورقي من المقدم. يتميز برأسه الكبير المستدير وبسطح مفصلي عريض على وجهه العلوي المحذب وبسطحين مفصلين يفصلها ميزاب غائر على وجهه السفلي المقعر. له ستة وجوه علوي وسفلي وانسي ووحشي ومقدم وخلفي. فالوجه العلوي عليه من الخلف سطح مفصلي عريض بكري الشكل محذب من الأمام إلى الخلف مقعر قليلاً من الجانب إلى الجانب يتصل بالقصبية. وإلى مقدم السطح البكري الوجه العلوي لعنق الكعب وهو اختناق خشن ترتبط به أربطة. والوجه السفلي عليه سطحان مفصليان الخلفي منها كبير مربع الجوانب والمقدم صغير بيضي الشكل يتصلان بالعقب. ويفصل هذين السطحين ميزاب غائر متجه نحو المقدم والوحشية يقابل ميزاباً مثله على

شكل ٧٥ الوجه الظهري للقدم اليسرى ١ الوجه العلوي المفصلي للكعب ٢ الطرف المقدم للكعب الذي يتصل بالزورقي ٣ العقب ٤ الزورقي ٥ الأسفني الأنسي ٦ الأسفني المتوسط ٧ الأسفني الوحشي ٨ المكعب وهو الترددي ٩ مشطي الإبهام ومشطي الأصبع الأول ١٠ السلامية الأولى للإبهام ١١ السلامية الثانية للإبهام ١٢ السلامية الأولى للأصبع الأول ١٣ السلامية الثانية له ١٤ السلامية الثالثة له

(١) وهو الفنزعي في اصطلاح الكتب المناخرة للمدرسة المصرية

خلافًا للقاعدة العامة التي بموجبها يمتد الطرف العلوي بالجسم قبل السفلي
الارتباطات العضلية. بالراس ذات الراسين والنعلية والشظوية الطويلة. وبالوجه
الوحشي للجسم الشظويتان الطويلة والقصيرة. وبالوجه الانسي الباسطة الطويلة للاصابع والباسطة
الخاصة بالابهام والشظوية الثالثة والقصبية الخلفية. وبالوجه الخلفي النعلية والقابضة
الطويلة للابهام

في القدم

القدم هي القسم الثالث من اقسام الطرف السفلي. فائدتها حمل الجسد اذا كان منتصبًا
والحركة الانتقالية. وهي مؤلفة من ثلاثة اقسام رسغ ومشط وسلاميات

في الرسغ

عظام الرسغ سبعة العقب والكعب والمكعب والزورقي وثلاثة اسفينية انسي ومتوسط
ووحشي

العقب

العقب اكبر واقوى عظام الرسغ القدي شكله مكعب غير منتظم. ووضعه في القسم السفلي
والمؤخر للقدم. يستقر عليه الجسد في الوقوف وهو محل عظيم القوة لعضلات بطن الساق وله
سته وجوه علوي وسفلي ووحشي وانسي ومقدم وخلفي. فالوجه العلوي مؤلف من قسم خلفي
بارز الى الخلف يتكوّن منه عقب القدم وتعلوه كتلة دهنية موضوعة الى مقدم وتر اكيللس.
وقسم متوسط عليه سطحان مفصليان او ثلاثة يفصلهما ميزاب فالسطحان يتصلان بالكعب
والوحشي منها اكبر من الانسي ويرتبط بالميزاب الرباط بين العظمين الذي يربط العقب
بالكعب. وقسم مقدم عليه انخفاض خشن ترتبط به اربطة كثيرة والعضلة الباسطة القصيرة
للاصابع. والوجه السفلي ضيق خشن تحده من الخلف حدبتان تستقران على الارض عند
الوقوف. الوحشية منها اصغر من الانسية ترتبط بها بعض المبعدة للخنصر. والانسية اكبر من
الوحشية ترتبط بحافتها الانسية المبعدة للابهام وبمقدمها القابضة القصيرة للاصابع وبالاتخفاض
الواقع بين الحدبتين المبعدة للخنصر واللفافة الاختمصية. والوجه الوحشي عريض مسطح يكاد
لا يغطيه الا الجلد عليه بقرب مركزه حدبة الى مقدمها ميزاب يمر فيه وتر الشظويتين
الطويلة والقصيرة. والوجه الانسي عليه تغير غائر متجه بانحراف نحو الاسفل والمقدم تمر فيه

الشظويتين الطويلة والقصيرة . وقهته مستديرة ترتبط بها الخزمة المتوسطة للرباط الجانبي
الوحي

شكل ٧٤



الجسم . اذا نُظِرَ الى وضع الشظية وهي مركبة مع القصبه شوهد ان
لجسمها ثلاثة وجوه احدها انسي مشرف نحو القصبه والثاني مشرف
نحو الوحشية والثالث نحو الخلف . فالوجه الانسي مقسوم بواسطة خط
طولي الى قسمين غير متساويين يرتبط بالخط المذكور الرباط بين العظمين
الذي يفصل العضلات المقدمة للساق عن العضلات الخلفية ويرتبط
بالقسم الذي خلف الخط بعض القصبه الخلفية وبالقسم الذي الى مقدمه
الباسطة المشتركة للاصابع والباسطة الخاصة بالابهام والشظوية الثالثة .
والوجه الوحي ترتبط به الشظويتان الطويلة والقصيرة ويميل عند اسفله
الى الخلف بحيث يمر وتر العضلتين المذكورتين وراء الكعب الوحي . والوجه
الخلفي ترتبط بثلثه العلوي العلوية وبثلثيه السفليين القابضة الطويلة للابهام .
ويشاهد في هذا الوجه الثقب الغذائي . والوجه المذكورة منفصلة بواسطة
ثلاث حواف المقدمة منها حادة كالحافة المقدمة للقصبه وتنقسم اعلى

الطرف السفلي بخو قيراطين الى شعبتين تحيطان بمسطح مثلث مغطى بالجلد فقط
اذا اريد معرفة الجانب الذي يخص به العظم يمسك بحيث يكون طرفه السفلي الى الاسفل
والوجه المحفور للشظويتين نحو الماسك فيكون السطح المثلث المغطى بالجلد متخفاً نحو اليهين
او اليسار تبعاً لكون العظم ايمن او ايسر
الاتصال المنفصل . بعظمين القصبه والكعب

التعظم . بثلاث نقط واحدة لكل من الجسم والطرفين . وتظهر نقطة الجسم نحو الاسبوع
السادس للحية الجينية ونقطة الطرف السفلي في السنة الثانية ونقطة الطرف العلوي نحو السنة
الرابعة . ويتحد الطرف السفلي بالجسم نحو السنة العشرين والطرف العلوي نحو الخامسة والعشرين

شكل ٧٤ موخر عظمي الساق اليميني ١ التعغير الذي يتصل بالعقدة الوحشية لعظم الفخذ ٢ التعغير الذي يتصل بالعقدة
الانسية . والارتفاع الذي بين التعغيرين هو الشوكة ٣ الميزاب الذي تدغم فيه الغشائية النصف ٤ السطح المثلث الذي تدغم
فيه المابضية ٥ الخط المنحرف ٦ الثقب الغذائي ٧ الوجه الخلفي للقصبه ٨ الميزاب الواقع في موخر الكعب الانسي الذي يمر فيه
وترا القابضة الطويلة للاصابع والقصبية الخلفية ٩ ميزاب لمرور وتر القابضة الطويلة للابهام ١٠ جسم الشظية ١١ التورالابري
لراس الشظية الذي يتدغم فيه وتر ذات الراسين . ١٢ قسم من الشظية لا يغطيها الا الجلد ١٣ الكعب الوحي ١٤ الميزاب
الذي يمر فيه وتر الشظويتين

الوحشية الى الانسية هو الكعب الانسي . وجهه الانسي محدب مغطى بالجلد فقط . وجهه الوحشي املس مقعر يتصل اتصالاً مفصلياً بالكعب من عظام الرسغ . ويرتبط بتمته الرباط الجانبي الانسي للرسغ والى الخلف منه ميزاب قد يكون مزدوجاً يمر فيه وتر القصبية الخلفية

بناؤه كبناء بقية العظام الطويلة

يتعظم بثلاث نقط واحدة لكل من الجسم والطرفين . تظهر النقطة الاولى في مركز الجسم نحو الاسبوع الخامس وتمتد تدريجاً نحو الطرفين . والثانية في الطرف العلوي عند الولادة والثالثة في الطرف السفلي في السنة الثانية . ويحدد الطرف السفلي بالجسم نحو السنة العشرين والعلوي نحو الحادية والعشرين

اتصاله المفصلي بثلاثة عظام الفخذ والشظية والكعب

ارتباطاته العضلية . بالحذبة الانسية الغشائية النصف . وبالحدبة الوحشية القصبية المقدمة والباسطة الطويلة للاصابع . وبالوجه الانسي للجسم الخياطية والرقيفة والوترية النصف . وبالوجه الوحشي القصبية المقدمة . وبالوجه الخلفي المابضية والتعلية والتابضة الطويلة للاصابع والقصبية الخلفية . وبالحدبة الرباط الرضفي


الشظية

الشظية عظم طويل دقيق موضوع في الجانبي الوحشي للساق . طرفها العلوي موضوع اسفل مساواة مفصل الركبة لا يدخل في تكوينه وطرفها السفلي بارز اسفل القصبية يتكون منه الكعب الوحشي لها جسم وطرفان

الطرف العلوي ويقال له الراس فيه بعض استدارة غير منتظمة وعليه من الاعلى سطح مفصلي متجه نحو الاعلى والانسية يتصل بمثله في الحدبة الوحشية للقصبية . والى الوحشية من السطح المذكور ارتفاع خشن هو التواء الابري متجه الى الاعلى يرتبط به وتر ذات الراسين والرباط الجانبي الوحشي الطويل وتمته الرباط الجانبي الوحشي القصير

والطرف السفلي وهو الكعب الوحشي مخروطي الشكل اطول واشد بروزاً الى الاسفل من الكعب الانسي . وجهه الوحشي محدب لا يغطيه الا الجلد . ووجهه الانسي عليه سطح مفصلي املس مثلث الشكل يتصل بالكعب من عظام الرسغ ويحده من الخلف انخفاض خشن يرتبط به الرباط المستعرض واعلى السطح المفصلي وجه خشن يتصل بميزاب في القصبية . حافته المقدمة خشنة ترتبط بها الحزمة المقدمة للرباط الجانبي الوحشي . وحافته الخلفية محفورة يمر فيها وترا

بروزاً يقال لها عرف القصبه تبدأ في الاعلى من الحدبة القصبية وتنتهي في الاسفل عند مقدم الكعب الانسي وهي متعرجة السير وترتبط بها اللفافة الغائرة للساق . والحافة الانسية تبدأ في الاعلى عند مؤخر الحدبة الانسية وتنتهي في الاسفل عند مؤخر الكعب الانسي . يرتبط بثلاثها العلوي الرباط الجانبي الانسي وبعض الياف المابضية وثلاثها المتوسط بعض الياف النعلية والقابضة الطويلة للاصابع . والحافة الوحشية تبدأ الى مقدم الحفرة المفصليّة التي تتصل بالشظية وتنتهي في الاسفل متشعبة شعبتين . يرتبط بها الغشاء بين العظمين . الوجه الانسي محذب يغطي ثلثه العلوي ويندغم به صفاق الخياطية ووتر الرقيقة والوترية النصف . وما بقي من هذا الوجه مغطى بالجلد فقط . والوجه الوحشي اضيق من الانسي . على ثلثيه العلويين ميزاب قليل الغور تنشأ منه القصبية المقدمة . وثلثه السفلي محذب منعكف نحو المقدم تغطيه من الانسية الى الوحشية اوتار القصبية المقدمة والباسطة للابهام والباسطة الطويلة للاصابع والشظوية الثالثة . والوجه الخلفي يقاطع ثلثه العلوي بانحراف خط ممتد من مؤخر الحدبة الوحشية الى منتهى الثلث العلوي للحافة الانسية . ويقال للخط المذكور الخط المنحرف للقصبه ترتبط به النعلية وبالخلا المثلث الذي اعلاه المابضية .



والثلث المتوسط لهذا الوجه مقسوم بواسطة خط عمودي الى نصفين جانبيين ترتبط بالانسي منها القابضة الطويلة للاصابع وبالوحشي الذي يشاهد فيه الثقب الغذائي القصبية الخلفية والطرف السفلي اصغر جداً من الطرف العلوي يمتد من الانسية نحو الاسفل على هيئة نتوء متين هو الكعب الانسي . له خمسة وجوه . الوجه السفلي مربع الجوانب املس يتصل اتصالاً مفصلياً بعظم الكعب من عظام الرسغ ويقاطعه من الامام الى الخلف بروز خفيف فيقسمه الى انخفاضين جانبيين ويخناط من الانسية بسطح مفصلي على الكعب الانسي . والوجه المقدم املس من الاعلى تغطيه اوتار البواسط حافته السفلى مقعرة خشنة يرتبط بها الرباط الرسغي المقدم . والوجه الخلفي عليه ميزاب قليل الغور منحرف نحو الاسفل والانسية يتصل بثله في الطرف الخلفي للكعب ويمرّ فيه وتر القابضة الطويلة للابهام . والوجه الوحشي عليه انخفاض خشن مثلث الشكل يتصل اتصالاً مفصلياً بالشظية . والوجه الانسي بارز الى الاسفل على هيئة نتوء هرمي الشكل مسطح من

شكل ٧٢ مقدم عظمي الساق اليمنى ١ جسم القصبه ٢ الحدبة الانسية ٣ الحدبة الوحشية ٤ شوكة القصبه ٥ حدبة القصبه ٦ الوجه الانسي للجسم ٧ الطرف السفلي للقصبه ٨ الكعب الانسي ٩ جسم الشظية ١٠ طرفها العلوي ١١ طرفها السفلي

بيضي الشكل مقسوم الى شطرين بواسطة خط عمودي. يتصل الشطران المذكوران بالتونين اللقيين لعظم الفخذ والخط العمودي يميزاب يقابله على السطح البكري. واسفل السطح المفصلي انخفاض خشن نصفه العلوي ينفصل عن راس القصة بواسطة نسيج دهني ويرتبط بنصفه السفلي الرباط الرضفي. حوافيها الثلاث عليا وجانبيتان يرتبط بها وترالباسطة الرباعية. وقاعدتها هي الحافة العليا. وقيمتها مستدقة يرتبط بها الرباط الرضفي

بناؤها من النسيج الشبكي الكثيف تغطيه طبقة رقيقة من المندمج

تتعمم بنقطة واحدة تظهر نحو السنة الثالثة

اتصالها المفصلي بعظم الفخذ

ترتبط بها المستقيمة والفخذية والمتسعة الانسية والمتسعة الوحشية. وهذه العضلات الاربع تتحد عند مندغها بالرضفة فتكوّن الباسطة الرباعية الرووس

القصة

القصة اطول واكبر عظام الهيكل الا عظم الفخذ وضعها في مقدم الساق الى الانسية عمودي في الذكور منحرف قليلاً نحو الوحشية في الاناث لمقابلة انحراف عظم الفخذ فيهن نحو الانسية. شكلها منشوري وتقسّم الى جسم وطرفين علوي كبير وسفلي اصغر منه

فالطرف العلوي ويقال له الراس منتشر على هيئة ارتفاعين جانبيين هما الحدبتان. وعلى الحدبتين من الاعلى سطحان املسان متعمران يتصلان اتصالاً مفصلياً بالتونين اللقيين للفخذ السطح الانسي اطولها من الامام الى الخلف والوحشي اعرضها من الجانب الى الجانب. وبين السطحين المفصليين ارتفاع هو شوكة القصة تعلوه الى كل من الجانبين حدية بارزة يرتبط بها طرف الغضروفين الهلاليين والى مقدم الشوكة وخلفها حفرتان يرتبط بها الرباطان المتصالان بالانسي المقدم والخلفي. والى مقدم الحدبتين واسفلها حدبة هي الحدبة القصية نصفها السفلي خشن يرتبط به الرباط الرضفي ونصفها العلوي امس عليه كيس مخاطي ينفصل الرباط المذكور عن العظم. وعلى الوجه الخلفي للحدبة الانسية ميزاب غائر عرضي يندغم فيه وتر الغشائية النصف وعلى الوجه الخلفي للحدبة الوحشية سطح مفصلي مستد بر الشكل يتصل بالسطحية

والجسم منشوري الشكل عريض من الاعلى ثم يضيق تدريجياً الى بداءة ربعه السفلي حيث يقع اكثر الكسر ثم يتسع نحو الطرف السفلي. له ثلاث حوافٍ وثلاثة وجوه. فالحافة المقدمة اشدها

الصغير بين السنة الثالثة عشرة والرابعة عشرة. ويتصل المدور الصغير بالجسم نحو البلوغ ثم المدور الكبير ثم الراس واخيراً الطرف السفلي نحو السنة العشرين ارتباطاً العظمية. بالمدور الكبير الالوية المتوسطة والالوية الصغيرة والهرمية والسادتان الباطنة والظاهرة والتوأمتان العليا والسفلى والمربعة الفخذية. وبالمدور الصغير الصلية وأسفله المحرفية. وبالوجه الخلفي للجسم المتسعة الوحشية والالوية الكبيرة والراس القصير لذات الراسين والمتسعة الانسية والمقربة الكبيرة والمشطية والمقربتان القصيرة والطويلة. وبالوجه المقدم الفخذية وتحت الفخذية. وبالعتدين التوأمية والاخضمية والمأبضية


في الساق

عظام الساق ثلاثة الرضفة وهي عظم سماني موضوع في مقدم الركبة والقصبة والنظية

الرضفة

الرضفة عظم صغير مسطح مثلث الشكل موضوع في مقدم مفصل الركبة. وتعد من العظام السممانية لانها واقعة في وتر الباسطة الرباعية الرؤوس ولان بناءها من النسيج الشبكي الكثيف كبقية العظام السممانية. ويعدّها بعض المشرحين بمنزلة التوالمرفقي للزند. فائدتها انها تقي مقدم الركبة وتزيد القوة الخلية للعضلة الباسطة المشتركة. لها وجهان مقدم وخلفي وثلاث حواف وقاعدة وقمة. فالوجه المقدم محدب مثقوب ثقباً كثيرة غنائية عليه خطوط كثيرة طولية. يغطيه امتداد من وتر الباسطة الرباعية الرؤوس ويتوسط بين الامتداد المذكور والجلد

شكل ٧٢



شكل ٧١



كيس مخاطي ويرتبط باسفل الوجه الرباط الرضفي. والوجه الخلفي عليه سطح مفصلي املس

شكل ٧١ الوجه المقدم الرضفة وهو المغطى بالجلد ١ والقاعدة التي يرتبط بها وتر الباسطة المشتركة ٢ القمة التي يرتبط

بها الرباط الرضفي

شكل ٧٢ الوجه الخلفي للرضفة اليميني ١ والقاعدة ٢ القمة ٤ الخط العمودي الذي يدخل ميزاب البكرة الفخذية

٥ السطح الذي يتصل بالعتدة الانسية ٦ السطح الذي يتصل بالعتدة الوحشية

للمدور الكبير واقع بين الحافة الوحشية والخط الحشن ترتبط بثلاثة ارباعه العليا العضلة الفخذية.
والوجه الانسي واقع بين الحافة الانسية والخط الحشن تغطيه المتسعة الانسية

والطرف السفلي اكبر من العلوي مسطح من الامام الى الخلف يقسمه خلاء الى ارتفاعين
كبيرين هما العقدتان او التوان القميان اللذان يتصلان اتصالاً مفصلياً بالقصبة. والخلاء
المذكور عليه من المقدم انخفاض امس بكرية الشكل يتصل اتصالاً مفصلياً بالرضفة ومن
المؤخر شرم كبير هو الشرم بين العقدتين الذي تستقر فيه الاربطة المتصالية. العقدة الوحشية
اعرض واشد بروزاً الى المقدم من العقدة الانسية. والعقدة الانسية اطول واضيق واشد بروزاً الى
الانسية من العقدة الوحشية. والعقدتان مختلطتان من المقدم فيكونان السطح البكري الذي
يتصل اتصالاً مفصلياً بالرضفة

العقدة الوحشية. على وجهها الوحشي الى الورا من المركز ارتفاع هو الحدبة الوحشية التي
يرتبط بها الرباط الجانبي الوحشي لمفصل الركبة. واسفل الحدبة انخفاض يستقر فيه وتر منشأ
المابضية. ووجهها الانسي احد حدي الشرم بين العقدتين يرتبط بمؤخره الرباط المتصالب
المقدم. ووجهها السفلي امس محدب يتصل اتصالاً مفصلياً بمجرة تقابله في الطرف العلوي
للقصبة. وظهرها الخلفي محدب امس يعلوه انخفاض ينشأ من الانخفاض المذكور وتر الراس
الوحشي للتوأمية الساقية


العقدة الانسية. على وجهها الانسي ارتفاع محدب خشن هو الحدبة الانسية التي يرتبط بها
الرباط الجانبي الانسي. واعلى الحدبة المذكورة عند نهاية الشعبة الانسية للخط الحشن حديدية
يندغم بها وتر المقربة الكبيرة. وخلف الحدبية واسفلها انخفاض يرتبط به وتر الراس الانسي
للتوأمية. الجانب الوحشي للعقدة الانسية احد حدي الشرم بين العقدتين يرتبط بمقدم الرباط
المتصالب الخلفي

بناؤه. الجسم اسطوانة مؤلفة من النسيج المندمج تحترقها طولاً قناة نخاعية كبيرة. واما
طرفا الجسم والطرفان المفصليان فمؤلفة من النسيج الاسفنجي مغطي بطبقة رقيقة من المندمج
اتصاله المفصلي بثلاثة عظام اللا اسم له والقصبة والرضفة

يتعظم بخمس نقط واحدة لكل من الجسم والطرفين والمدورين. تظهر النقطة الاولى في
الجسم نحو الاسوع الخامس للحية الجيبينية. وفي الطرف السفلي في الشهر الاخير للحية الجيبينية.
وفي الراس عند نهاية السنة الاولى. وفي المدور الكبير بين السنة الثالثة والرابعة. وفي المدور

بين المتسعة الانسية الى المقدم والمشطية الى الخلف. والخط المقدم بين المدورين حرف خشن يحد العنق من المقدم بين المدورين يرتبط بنصفه العلوي الرباط الخنطي للمفصل الوركى وبنصفه السفلي الجزء العلوي للمتسعة الانسية. والخط الخلفي بين المدورين شديد البروز ممتد من الزاوية العليا الخلفية للمدور الكبير الى المدور الصغير ويحد العنق من الخلف. ويسير من منتصف الخط المذكور عمودياً الى الاسفل ارتفاع ظاهر طوله نحو قيراطين هو الخط المربع الذي تندغم فيه المربعة الفخذية


والجسم مقوس من الاعلى الى الاسفل بحيث يكون التحديب الى المقدم منتشر عند الطرفين اسطوانى نحو المركز مائل الى المنشوري. له ثلاثة وجوه مقدم وانسي شكل ٧٠ ووحشي تفصلها ثلاث حواف خلفية يقال لها الخط الحشن وجانبيتان. فالخط الحشن عرف طولي بارز يُقسم ثلثه المتوسط الى شفتين ووحشية وانسية وخلاء خشن بينهما. ويقسم في الاعلى الى ثلاثة خطوط الوحشي منها خشن جداً ممتد الى قاعدة المدور الكبير والمتوسط قليل الوضوح يمتد الى المدور الصغير والانسي يغيب عند طرف الخط المقدم بين المدورين. ويقسم في الاسفل الى شعبتين تحيطان خلاءً مثلثاً هو الخلاء المأبضي الذي يستقر عليه الشريان المأبضي. الشعبة الوحشية تنحدر الى قمة العقدة الوحشية والشعبة الانسية تنتهي بحدبة صغيرة عند قمة العقدة الانسية يندغم فيها وتر المقربة الكبيرة. وتندغم بجميع طول الشفة الانسية للخط الحشن المتسعة الانسية ويجمع طول الشفة الوحشية المتسعة الوحشية وباعلى الشفة الوحشية وباسفل الشفة الانسية المقربة الكبيرة. وبين المتسعة الوحشية والمقربة الكبيرة ترتبط الالوية الكبيرة من الاعلى والراس القصير لذات الراسين من الاسفل. وبين المقربة الكبيرة والمتسعة الانسية ترتبط الحرقفية والمشطية من الاعلى والمقربتان الطويلة والقصيرة اسفلها. ويشاهد



نحو منتصف الخط الحشن الثقب الغذائى متجهاً من الاسفل الى الاعلى. والحافتان الجانبيتان غير واضحتين تفصلان الوجه المقدم عن الوجهين الانسي والوحشي

والوجه المقدم للجسم واقع بين الحافتين الجانبيتين املس محدد ترتبط بثلاثة ارباعه العليا العضلة الفخذية. وربعة السفلي منفصل عن العضلة المذكورة بواسطة الغشاء الزلاي الممتد من مفصل الركبة وترتبط ببعضه العضلة تحت الفخذية. والوجه الوحشي متصل بالوجه الوحشي

شكل ٦٩



في الحالة الحديثة يتصل اتصالاً مفصلياً بالحق الحرقفي وعليه اسفل مركزه حفرة بيضية الشكل يرتبط بها الرباط المستدير. والعنق مسطح هرمي الشكل يوصل الرأس بالجسم منحرف الوضع بحيث يكون مع الجسم في الذكر البالغ زاوية منفرجة وفي الانثى زاوية تقرب من القائمة وفي الشيوخ والمتهوكين قد يكون افقياً فيهبط الرأس اسفل مساحة المدور الكبير ويقتصر طول العظم. وهو مسطح من الامام الى الخلف ضيق في الوسط. وجهه المقدم مثقوب ثقوباً كثيرة وعائية. وجهه الخلفي يرتبط بجانبه الوحشي الرباط المحفظي للمفصل الوركسي. حافته العليا قصيرة غليظة يحدها من الوحشية المدور الكبير. حافته السفلى ضيقة طويلة منحنية قليلاً نحو الخلف تنتهي بالمدور الصغير

والمدوران تتوان عظيمان ترتبط بها العضلات التي تدير عظم الفخذ دوراً رجوياً على محوره

فالمدور الكبير ارتفاع كبير مربع الجوانب موضوع الى الجانب الوحشي العنق عند اتصاله بالجسم اسفل الرأس بنحو ثلاثة ارباع الفيراط له وجهان

واربع حواف. فالوجه الوحشي مربع الجوانب خشن عليه خط بارز ممتد من الزاوية الخلفية العليا الى الزاوية المقدمة السفلى يرتبط به وتر الالوية المتوسطة. والى الاسفل والخلف من الخط المذكور سطح مثلث امس عليه كيس مخاطي يفصله عن وتر الالوية الكبيرة. والوجه الانسي صغير عند قاعدته حفرة غائرة هي الحفرة الاصبعية التي يندغم فيها وتر السادة الظاهرة. الحافة العليا سائبة غليظة تندغم فيها الهرمية من الخلف والسادة الباطنة والتوأمتان من المقدم. والحافة السفلى عبارة عن خط الاتصال بين قاعدة المدور والوجه الوحشي للجسم يرتبط بها الجزء العلوي المتسعة الوحشية. والحافة المقدمة بارزة ترتبط بها الالوية الصغيرة. والحافة الخلفية بارزة يتكون منها مؤخر الحفرة الاصبعية

والمدور الصغير ارتفاع منحروطي الشكل مختلف الحجم بارز من القسم السفلي والخلفي للعنق. قمته متجهة نحو الانسية والخلف يرتبط بها وتر الصليبية (بسواس) وتندغم اسفله في الجسم الحرقفية


شكل ٦٩ الوجه المقدم لعظم الفخذ الايمن ١ الجسم ٢ الرأس ٣ العنق ٤ المدور الكبير ٥ الخط المقدم بين المدورين ٦ المدور الصغير ٧ العقدة الوحشية ٨ العقدة الانسية ٩ الحدة الوحشية التي يرتبط بها الرباط الجانبي الوحشي ١٠ الاختناص الذي تنشأ منه العضلة المأبضية ١١ الحدة الانسية التي يرتبط بها الرباط الجانبي الانسي

عظم الفخذ

العصص الى الحافة السفلى للارتفاق العاني فيكون اتجاهه نحو الاسفل والمقدم. ومحور التجويف عبارة عن خط وهي ممتد من مركز خط المدخل الى مركز خط المخرج فيكون اتجاهه منحنيًا تابعاً لتغير العجز والعصص. ومعرفة هذه المحاور ضرورية لفهم سير الجنين في الحوض عند الولادة وللإعمال الجراحية ضمن الحوض كاستخراج الحصى وغيره.

اختلاف الحوض بين الانثى والذكر. العظام التي يتألف منها الحوض في الانثى اذق منها في الذكر واثارها العضلية اقل وضوحاً والعمق العمودي اقل والعرض والسعة اكثر

شكل ٦٨



والمحرفيان اكثر انتشاراً. والمدخل اقرب الى الشكل الخلفي وبروز الزاوية العجزية الفقرية الى المدخل اقل وقطره المستعرض اطول من قطره الامامي الخلفي. وعمق الارتفاق العاني اقل والفوس العاني اعرض جداً والمسافة بين الحدتين الوركيتين ابعد

في الفخذ

الفخذ مؤلف من عظم واحد هو عظم الفخذ

عظم الفخذ

عظم الفخذ اطول عظام الهيكل واعظها واقواها وضعه بين العظم اللا اسم له وقصبة الساق. اتجاهه اذا كان الجسد منتصباً الى الاسفل والانسية بحيث يكون طرفه العلوي منفرجاً عن رقيقه من الجانب الخلف وطرفه السفلي متقارباً. وهذا الانحراف اشد في الاناث منه في الذكور لزيادة اتساع الحوض فيهن. يقسم الى جسم وطرفين علوي وسفلي

الطرف العلوي يقسم الى راس وعنق وحدتين يقال لهما المدور الكبير والمدور الصغير فالراس نحو نصف كرة متجه الى الاعلى والانسية وقليلاً نحو المقدم املس مغطى بغضروف

شكل ٦٨ ١ حوض الذكر ٢ حوض الانثى

الجانبين الخط المحرقني المشطي ومن الخلف الحافة المقدمة لقاعدة العجز والزاوية العجزية الفقرية. ويقال للخلاء الواقع ضمن المحيط المذكور المدخل الذي له ثلاثة اقطار رئيسة امامي خلفي ومستعرض ومنحرف. فالقطر الامامي الخلفي وهو العجزى العاني ممتد من الزاوية العجزية الفقرية الى الارتفاق العاني وطوله عادة اربعة قراريط. والقطر المستعرض ممتد من منتصف الشفة من الجانب الواحد الى نقطة تقابلة من الجانب الاخر وطوله عادة خمسة قراريط. والقطر المنحرف ممتد من الارتفاق المحرقني المشطي من الجانب الواحد الى المفصل العجزى المحرقني من الجانب الخلف. وطوله عادة خمسة قراريط ايضاً

والتجويف للحوض الصحيح بجده من المقدم الارتفاق العاني ومن الخلف تقعر العجز والعصعص ومن الجانب الوجه الانسي للعظم الوركى فكانه قناة قصيرة منحنية جدارها الخلفي اطول جداً من المقدم عمقه من الخلف اربعة قراريط ونصف ومن الوسط ثلاثة ونصف وعند الارتفاق العاني قيراط ونصف. وهذا التجويف يتضمن المستقيم الى الخلف والمثناة الى المقدم ويتوسط بينهما في الاناث الرحم والمهبل

والحيط السفلي ويقال له المخرج غير منتظم الشكل بجده من الخلف طرف العصعص ومن الجانبين الحدبتان الوركيتان ومن المقدم القوس العاني. اقطار المخرج اثنان امامي خلفي ومستعرض. فالقطر الامامي الخلفي ممتد من طرف العصعص الى اسفل الارتفاق العاني وطوله نحو اربعة قراريط الا انه قد يطول او يقصر عن ذلك تبعاً الى حركة العصعص نحو المقدم او الخلف. والقطر المستعرض ممتد من مؤخر الحدبة الوركية الواحدة الى نقطة تقابلة من الجانب الخلف وطوله عادة اربعة قراريط

ثم ان الحوض موضوع وضعاً منحرفاً بالنسبة الى الجذع مدة الانتصاب بحيث يكون الوجه الباطن للارتفاق العاني مشرفاً نحو الاعلى والخلف فيسند الاحشاء البطنية ويكون تقعر العجز والعصعص مشرفاً نحو الاسفل والمقدم وتكون قاعدة العجز في الاناث اعلى مساحة الحافة العليا للارتفاق العاني بنحو اربعة قراريط وطرف العصعص اعلى حافته السفلى بنحو نصف قيراط


محاور الحوض. للحوض ثلاثة محاور واحد لكل من المدخل والمخرج والتجويف. اذا رُسم خط من قاعدة العجز الى الحافة العليا للارتفاق العاني دل ذلك الخط على سطح مدخل الحوض الصحيح ثم اذا رُسم خط اخر مقاطع له عند منتصفه على زاوية قائمة مس طرفه الواحد السرة وطرفه الاخر منتصف العصعص وهذا الخط يتجه نحو الاسفل والخلف وهو عبارة عن محور المدخل. ومحور المخرج عبارة عن خط ممتد من قاعدة العجز الى منتصف خط اخر ممتد من طرف

والضاغطة للجري وربما بعض الياف المسرعة للبول

في الحوض

الحوض حلقة عظمية موضوعة بين العمود الفقري والظرفين السفليين حاملة للعمود محمولة على الطرفين وسميت بالحوض لمشايتها له. تأليفه من اربعة عظام هي العظام الالاسم لها اللذان يجدايه من الجانبين والمقدم والعجز والعصعص اللذان يكملانه من الخلف

شكل ٦٧



يقسم الحوض بواسطة خط بارز هو الخط الحرقفي المشطي الى حوض كاذب وحوض صحيح.


فالحوض الكاذب ما كان اعلى الخط المذكور بجده من الجانبين العظام الحرقفيان وتكمل الخلاء الواقع بينهما الى المقدم الجدران البطنية ويتضمن الجزء السفلي من الامعاء. والحوض الصحيح هو التجويف الواقع اسفل الخط الحرقفي المشطي وهو اصغر من الحوض الكاذب الا ان جدرانه اتم. ويقسم الى محيط علوي ومحيط سفلي وتجويف بينهما

فالمحيط العلوي هو شفة الحوض التي يكونها من المقدم العرف والشوكة العانيان ومن

شكل ٦٧ حوض انثوي ١ الفقرة القطنية الاخيرة ٢ غضروفان بين الفقرات ٣ الزاوية العجزية الفقرية ٤ الوجه المقدم للعجز وعليه الخطوط المستعرضة والفتوب العجزية المتدمة ٥ راس العصعص ٦ و٦ الحفرتان الحرقفيتان اللتان يكرتان الحدين الجانبيين للحوض الكاذب ٧ الشوكة الحرقفية المتدمة العليا ٨ الشوكة المتدمة السفلى ٩ الحرقفي ١٠ الشرم الحقي ١١ جسم الوركي ١٢ الحدة الوركية ١٣ الشوكة الوركية تشاهد من النقب الساد ١٤ العظم العاني ١٥ الارتفاق العاني ١٦ النوس العاني ١٧ زاوية العاني ١٨ شوكة العاني ١٩ بين الزاوية والشوكة العرف العاني ٢٠ و٢٠ الخط المشطي للعاني ٢١ و٢١ الخط الحرقفي المشطي ٢٢ و٢٢ امتداد هذا الخط الى قاعدة العجز ٢٣ و٢٣ شفة الحوض الصحيح ٢٤ و٢٤ الارتفاق الحرقفي المشطي ٢٥ و٢٥ السطح الاملس الذي يسند الاوعية الغذائية ٢٦ و٢٦ الشرم العظيم العجزوي الوركي

يتعظم بثمان نقط ثلاث اصلية واحدة لكل من اقسام العظم الثلاثة وخمس ثانوية واحدة لكل من العرف والشوكة المقدمة السفلى والحدبة الوركية والارتفاق العاني وقطعة اتصال

شكل ٦٦



العظام الثلاثة في قاع الحق . وتظهر النقط الاصلية اولاً وذلك مدة الادوار الاولى للحياة الجنينية بقرب الحق . وعند الولادة يكون الحق والعرف وفرعا العاني والوركي غضروفية . وتظهر النقط الثانوية نحو البلوغ ولا يتكامل التعظم قبل السنة الخامسة والعشرين

اتصاله المفصلي بثلاثة عظام وهي العجز وعظم الفخذ ورفيقه من الجانب المخالف

ارتباطاته العضلية . الحرقفي : بالشفة الظاهرة للعرف الشادة لعقد الفخذ والمنخرفة الظاهرة والظهرية العريضة . وبالشفة الباطنة المستعرضة والمربعة القطنية والناصبة الشوكية . وبالمخلاء بين الشفتين المنخرفة الباطنة . وبالوجه الظاهر للحرقفي الالوية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والوتر المنعكس للمستقيمة الفخذية وقسم من الهرمية . وبالوجه الباطن الحرقفية . وبالحافة المقدمة الخياطية والوتر المستقيم للمستقيمة الفخذية . الوركى : بالوجه الظاهر السادة الظاهرة . وبالوجه الباطن السادة الباطنة والرافعة للاست . وبالشوكة الوركية التوأمية العليا والرافعة للاست والعصصية . وبالحدبة ذات الراسين والوترية النصف والغشائية النصف والمربعة الفخذية والمقربة الكبيرة والتوأمية السفلى والعجانبة المستعرضة والناصبة للقصيب . العاني : المنخرفة الظاهرة والمنخرفة الباطنة والمستعرضة والمستقيمة والهرمية البطنيتان والصلبية الصغيرة والمشطية والمقربتان الطويلة والقصيرة والرقيقة والسادتان الظاهرة والباطنة والرافعة للاست

شكل ٦٦ ادوار تعظم الالاسم ١ و٢ والنقط الثلاث الاصلية ٤ و٥ و٦ و٧ و٨ والنقط الخمس الثانوية ١ الحرقفي ٢ الوركى ٣ العاني ٤ قطعة الاتصال بين العظام الثلاثة الواقعة في قاع الحق الحرقفي ٥ عرف الحرقفي ٦ الحدبة الوركية ٧ زاوية العاني ٨ الشوكة المقدمة السفلى للحرقفي A رسم العظم في الجنين البالغ B دون السنة السادسة C قبل البلوغ D نحو السنة العشرين

في القسم العاني. هو القسم المقدم للعظم اللا اسم له وموَلَّف من فرعين علوي وسفلي فالفرع العلوي ويقال له الأفقي أيضاً يقسم الى طرفين واربعة وجوه. الطرف الوحشي يكون خمس الحق الحرقفي وعليه من الاعلى ارتفاع هو الحرقفي المشطي الذي يدل على خط الاتحاد بين العظم الحرقفي والعظم العاني والى مقدمه انخفاض امس ترم عليه الاوعية الغذائية. والطرف الانسي هو الارتفاق العاني شكلة بيضي ويرتبط به الغضروف الليفي المتوسط بينه وبين رقيقه من الجانب المخالف. الوجه العلوي عريض من الوحشية ضيق من الانسية يحده من الورا الخيط الحرقفي المشطي السائر الى الوحشية وهو شفة الحوض الصحيح. وينتهي الخيط المذكور بتوه هو الشوكة العانية التي يرتبط بها رباط پوپارت وما بين الشوكة والطرف الانسي عند الارتفاق العرف الذي ترتبط به المستقيمة البطنية والهرمية البطنية والوتر المشترك للمخرفة الباطنة والمستعرضة. ويقال لنقطة اتصال العرف بالارتفاق الزاوية العانية. ترتبط بالوجه العلوي الى مقدم الخيط المشطي العضلة المشطية. والوجه السفلي عليه من الوحشية ميزاب غائر يمر منه الشريان والعصب السادان. والوجه الظاهر مسطح خشن ترتبط به المقربة الطويلة والقصيرة وبعض الكبيرة والسادة الظاهرة والرقيقة. والوجه الباطن امس يكون بعض الجدار المقدم للحوض

والفرع السفلي وهو النازل ممتد الى الوحشية والاسفل فيتكوّن منه ومن رقيقه القوس العاني. وجهه الظاهر خشن ترتبط به عضلات. حافته الانسية ترتبط بها ساق التضييب والحق الحرقفي نقرة عميقة كاسية الشكل يتكوّن خمسه العلويان من الحرقفي وخمسه الى الاسفل والوحشية من الوركي وخمسه الانسي من العاني. تحده شفة بارزة يرتبط بها غضروف ليفي فيضيق فتحة النقرة ويزيدها غوراً لاجل الاتصال المفصلي براس عظم الفخذ. وعلى الجانب الانسي للحق شرم غائر هو الشرم الحقي الذي ترم منه اوعية غذائية الى باطن التجويف لاجل تغذية المفصل. وهذا الشرم متصل بتقعر مثقوب ثقوباً كثيرة حلقي الشكل تستقر فيه كتلة دهنية ويرتبط بجوافيه الرباط المستدير

والتقرب الساد ويقال له الدرقي أيضاً ثقب كبير موضوع بين الوركي والعاني. وهو كبير بيضي الشكل في الذكور صغير مئاث في الاناث مسدود في الحالة الحديثة بغشاء متين الامن الاعلى حيث يوجد ميزاب غائر يمر منه الى خارج الحوض الشريان والعصب السادان بناوه. اجزائه الغليظة من النسج الشبكي مغطى بطبقة من المندمج والرقيقة من المندمج فقط

غليظ هو الجسم والثاني رقيق ضاعد هو الفرع وبينهما حدبة
 فالجسم له ثلاثة وجوه ظاهر وباطن وخلفي . الوجه الظاهر عبارة عن الحُمسين السفليين
 للحق الحرقفي . واسفل الحق بينه وبين الحدبة ميزاب غائر يرفيه وتر السادة الظاهرة السائر الى
 الوحشية ليندغم في الحفرة الاصبعية لعظم الفخذ . والوجه الباطن واقع اسفل الخط الحرقفي المشطي
 عريض من الاعلى ضيق من الاسفل ترتبط به بعض السادة الباطنة . والوجه الخلفي مربع الجوانب
 امس تحده من المقدم حافة الحق الحرقفي ومن الخلف الشرم العظيم العجزي الوركي ومن الاسفل
 الحدبة . وهذا الوجه يسند العضلة الهرمية والتوأميتين والسادة الباطنة وهي سائرة الى الوحشية
 لتندغم في المدور الكبير للفخذ . والحافة الخلفية للجسم عليها اسفل المنتصف بقليل نتورقيق مستدق
 مثلث الشكل هو الشوكة الوركية ترتبط بوجهها الظاهر التوأمية العليا وبوجهها الباطن
العصصية والرافعة للاست والرباط الصغير العجزي الوركي . واعلى الشوكة شرم كبير هو الشرم
 العظيم العجزي الوركي الذي يتحول الى ثقب بواسطة الرباط الصغير العجزي الوركي ثم منه
 العضلة الهرمية ويخرج من باطن الحوض اعلاها الشريان والعصب الألويان واسفلها الشريان
 والعصب الوركيان والشريان والعصب الاستحيائيان الباطنان . واسفل الشوكة شرم صغير
 هو الشرم الصغير العجزي الوركي الذي يتحول الى ثقب بواسطة الرباطين العجزيين الوركيين ثم
 منه وتر السادة الباطنة والشريان والعصب الاستحيائيان

والحدبة الوركية موضوعة اسفل الجسم ولها شفة ظاهرة وشفة باطنة وخلاء بينهما . ترتبط
 بالشفة الظاهرة المربعة الفخذية وبعض المقربة الكبيرة . والشفة الباطنة عليها حرف حاد ترتبط
 به زائدة من الرباط العظيم العجزي الوركي . والى جانب الحرف ميزاب يستقر فيه الشريان
 والعصب الاستحيائيان الباطنان . وترتبط بالشفة المذكورة الى مقدم الحرف العجائية المستعرضة
 والناصبة للقضيب والضاغطة للهجري . واما الخلاء الذي بين الشفتين فعليه اربعة اثار اثنان
 منها الى المقدم مستطيلان خشنان يفصلهما خط بارز ترتبط بالوحشي منها المقربة الكبيرة
 وبالانسى الرباط العظيم العجزي الوركي . واثنان الى الخلف امسان كبيران يفصلهما خط منحرف
 ترتبط بالعلوي الوحشي منها التوتية النصف وبالسفلي الانسي ذات الراسين الفخذية والغشائية
 النصف . وترتبط باعلى الحدبة التوأمية السفلى

والفرع مسطح رقيق يصعد من الحدبة الوركية نحو الاعلى والانسية ويتحد بالفرع النازل
 للقسم العاني ويدل على خط الاتحاد بينها ارتفاع خشن . وجهه الظاهر خشن ترتبط به السادة
 الظاهرة

العجزي الوركي . ترتبط بالسطح الحشن الواقع بين هذا الخط والعرف بعض الالوية الكبيرة من الاعلى وبعض الياف الهرمية من الاسفل . والخط المتوسط المنحني اطولها يبدأ على بعد نحو قيراط من الطرف المقدم للعرف وينتهي في الجزء العلوي للشرم الكبير العجزي الوركي . والخلاء الواقع بين هذا الخط من الاسفل والعرف والخط العلوي من الاعلى مقعر ترتبط به الالوية المتوسطة . ويقرب منتصف الخط المتوسط الثقب الغذائي . والخط السفلي المنحني اقلها وضوحاً يبدأ من الشوكة المقدمة السفلى وينتهي في الجزء المقدم للشرم الكبير العجزي الوركي . والخلاء الواقع بين هذا الخط والخط المتوسط املس ترتبط به الالوية الصغيرة . ويرتبط بالخلاء الواقع بين هذا الخط والحافة العليا للحق الحرقفي الوتر المنعكس للمستقيمة الفخذية

والوجه الباطن يحدّه من الاعلى العرف ومن الاسفل خط بارز هو الخط الحرقفي المشطي ومن المقدم الحافة المقدمة ومن الخلف الحافة الخلفية . عليه من المقدم سطح كبير املس مقعر هو الحفرة الحرقفية ويقال لها البطن ايضاً تستقر فيها العضلة الحرقفية . والى الورا من الحفرة الحرقفية سطح خشن مقسوم الى قسم علوي وقسم سفلي . فالقسم السفلي على هيئة الاذن يتصل اتصالاً مفصلياً بـ سطح مثله على جانب العجز والسفلي خشن جداً يرتبط به الرباط العجزي الحرقفي الخلفي والعرف محدب رقيق المنتصف غليظ الطرفين وهو اطول في الاناث منه في الذكور . طرفاه بارزان على هيئة نتوين هما التوان الشوكيان الحرقفيان المقدم والخلفي . سطح العرف عريض مقسوم الى شفة ظاهرة وشفة باطنة وخلاء بينها . ترتبط بالشفة الظاهرة الشادة لغمد الفخذ والمنحرفة الظاهرة البطنية والظهرية العريضة واللفافة العريضة وبالخلاء المتوسط المنحرفة الباطنة وبالشفة الباطنة المستعرضة والقطنية المربعة والناصبة الشوكية

والحافة المقدمة مقعرة عليها بروزان يفصلهما شرم . فالعلوي منها واقع عند ملتقى العرف بالحافة المقدمة يقال له الشوكة المقدمة العليا للحرقفي يرتبط بقمتها رباط بويارت . ويرتبط بالشرم منشأ العضلة الخياطية ويمرّ منه العصب الجلدي الوحشي . واسفل الشرم الشوكة المقدمة السفلى للحرقفي يرتبط بها الوتر المستقيم للعضلة المستقيمة الفخذية . والى الجانب الباطن لهذه الشوكة ميزاب عريض قليل الغور تمر فيه العضلة الحرقفية والصلبية . والحافة الخلفية اقصر من المقدمة وعليها بروزان هما الشوكتان الحرقفيتان الخلفيتان العليا والسفلى يفصلهما شرم . واسفل الشوكة السفلى الشرم العظيم العجزي الوركي

في القسم الوركي . هو القسم السفلي الخلفي للعظم الملا اسم له وموّلّف من جزئين احدهما

العظم الحرقفي وهو اللا اسم له

العظم الحرقفي ويقال له ايضاً اللا اسم له لانه لا يشبه شيئاً معروفاً عظم كبير الحجم غير منتظم الشكل يتكوّن منه ومن رفيقه المقابل له جانبا التجويف الحوضي وجداره المقدم. وهو مؤلف في الاصل من ثلاثة عظام تتحد عند البلوغ وتصير عظاماً واحداً ولذلك اصطلح المشرحون على وصفه تبعاً لاقسامه الاصلية المذكورة وهي اولاً قسم علوي يقال له الحرقفي ثانياً قسم سفلي مقدم يقال له العاني ثالثاً قسم سفلي خلفي يقال له الوركي. فالحرقفي هو القسم العلوي المنتشر الذي يصعد نحو الاعلى من الجزء العلوي والمؤخر للحق الحرقفي ومنه يتكوّن بروز الوركي.

شكل ٦٥



والوركي ينحدر من الحق الحرقفي ثم ينتشر على هيئة حدبة كبيرة ثم ينعكف نحو الاعلى فيكوّن مع الفرع النازل للقسم العاني فتحة كبيرة هي الثقب الساد. والعاني هو القسم الذي يسير احياناً من الجانب الانسي للحق الحرقفي نحو الانسية الى مسافة نحو قيراطين ثم ينعكف فجأة ويسير الى الاسفل الى هذه المسافة فيتكوّن منه مقدم الحوض وترتبط به اعضاء التناسل الظاهرة. وكثيراً ما تسمى هذه الاقسام المذكورة عظاماً كأنها منفصلة وليست كذلك

في القسم الحرقفي. لهذا القسم وجهان ظاهر

وباطن وعرف وحافتان مقدمة وخلفية

فالوجه الظاهر ويقال له الظهر ايضاً امس من مدب من المقدم مقعر من الخلف يحده من الاعلى العرف ومن الاسفل الحافة العليا للحق الحرقفي ومن المتدم الحافة المقدمية ومن الخلف الحافة الخلفية. وترتبط به ثلاثة خطوط منحنية علوي ومتوسط وسفلي. فالخط العلوي المنحني اقصرها يبدأ عند الربع الخلفي للعرف ويسير الى الخلف والاسفل وينتهي في الجزء العلوي للشرم الكبير

شكل ٦٥ الوجه الظاهر العظم اللا اسم له الامين ١ الحرقفي ٢ الوركي ٣ العاني ٤ عرف الحرقفي ٥ الخط المنحني المتوسط ٦ الخط المنحني السفلي ٧ السطح الذي ترتبط به الاوية الكبيرة ٨ الشوكة المقدمية العليا للحرقفي ٩ الشوكة المقدمية السفلي ١٠ الشوكة الخلفية العليا ١١ الشوكة الخلفية السفلي ١٢ الشوكة الوركية ١٣ الشرم العظيم العجزوي الوركي ١٤ الشرم الصغير العجزوي الوركي ١٥ الحدبة الوركية ١٦ فرع الوركي ١٧ الزرع الاقنبي العاني ١٨ الفرع النازل للعاني ١٩ الحق الحرقفي ٢٠ الثقب الساد

البعيد سطح خشن مرتفع هلامي الشكل ترتكز عليه الكتلة الحساسة للانامل
اتصالها المفصلي . يتصل الصف الاول بالعظام المشطية والصف الثاني . ويتصل الصف
الثاني بالاول والثالث . والصف الثالث بالثاني
ارتباطاتها العضلية . ترتبط بقاعدة السلامية الاولى للابهام اربع عضلات المبعدة للابهام
والقابضة التصيرة له والمقربة له والباسطة الاولى له . وبالثانية للابهام ثنتان القابضة الطويلة
للابهام والباسطة الثانية له . وبالسلامية الاولى للاصابع الاولى والثانية والثالثة عضلة ظهرية
واحدة وراحية واحدة بين العظام لكل منهما . وبالاولى للخنصر المبعدة للخنصر والقابضة التصيرة له
وعضلة راحية بين العظام . وبالسلاميات الثواني القابضة السطحية للاصابع والباسطة المشتركة
لها . وبالسلاميات الاخيرة القابضة الغائرة للاصابع والباسطة المشتركة لها

في تعظم اليد

يتعظم كل من عظام الرسغ بنتظة واحدة وتكون جميعها غضروفية عند الولادة . ويبدأ
التعظم في العظم الكبير والكلافي في اثناء السنة الاولى . وفي الهربي في السنة الثالثة . وفي الهربي
والمربع المنحرف في الخامسة وفي الزورقي في السادسة . وفي الشبيه بالمربع في السابعة . وفي البسلي
في الثانية عشرة

ويتعظم كل من العظام المشطية بنتظتين واحدة للجسم واحدة للطرف السلامي الامشطي
الابهام فانه يشبه السلاميات بان نقطة الطرف للقاعدة . يبدأ التعظم في الجسم نحو الاسبوع
السادس للحياة الجنينية ونحو السنة الثالثة في الاطراف السلامية للمشطية الاربعة الانسية وفي
قاعدة مشطي الابهام . وتتصل الاطراف المذكورة بالجسم نحو السنة العشرين
ويتعظم كل من السلاميات بنتظتين واحدة للجسم واحدة للقاعدة . يبدأ التعظم في الصنف
الثلاثة نحو الاسبوع السادس وفي القواعد بين السنة الثالثة والرابعة . وتتصل القواعد بالاجسام
بين السنة الثامنة عشرة والعشرين

في الطرف السفلي

يُقسَم الطرف السفلي الى ثلاثة اقسام الفخذ والساق والقدم وهي بمنزلة العضد والساعد
واليد في الطرف العلوي . ويتصل بالجذع بواسطة العظم الحرقفي الذي هو بمنزلة الكتف في
الطرف العلوي

الى الاعلى وراء العظم الكبير. يتصل من الاعلى بالعظم الكبير ومن الوحشية بالمشطي الثاني ومن الانسية بواسطة سطحين صغيرين بالمشطي الرابع

ومشطي البنصر اقصر واصغر من سابقه. قاعدته صغيرة مربعة الجوانب وعليها من الاعلى سطحان يتصلان بالكلابي والكبير ومن الوحشية اي الجانب الكعبري سطحان يتصلان بالمشطي

الثالث ومن الانسية اي الجانب الزندي سطح واحد مقعر يتصل بالمشطي الخامس

ومشطي الخنصر قاعدته عليها من الاعلى سطح مقعر محدب يتصل بالكلابي وسطح واحد جانبي يتصل بالمشطي الرابع. والى جانبها الزندي حذبة بارزة يندغم بها وتر الباسطة الزندية

للسرع

اتصالها المفصلي. يتصل المشطي الاول بالمرجع المنحرف. والثاني بالمرجع المنحرف والشبيه به والكبير والمشطي الثالث. والثالث بالكبير والمشطي الثاني والرابع. والرابع بالكبير والكلابي

والمشطي الثالث والخامس. والخامس بالكلابي والمشطي الرابع

ارتباطاتها العضلية. ترتبط بمشطي الابهام ثلاث عضلات القابضة لمشطي الابهام (وهي المقاومة) والباسطة لمشطي الابهام والظهرية الاولى بين العظام. وبالمشطي الثاني خمس القابضة الكعبرية

للسرع والباسطة الكعبرية الطويلة للسرع والظهريتان بين العظام الاولى والثانية والراحية الاولى بين العظام. وبالمشطي الثالث خمس الباسطة الكعبرية القصيرة للسرع والقابضة

القصيرة للابهام والمقربة للابهام والظهريتان الثانية والثالثة. وبالمشطي الرابع ثلاث الظهريتان الثالثة والرابعة والراحية الثانية. وبالمشطي الخامس اربع الباسطة الزندية للسرع والقابضة

الزندية للسرع والقابضة لمشطي الخنصر والظهرية الثالثة

في السلاميات

السلاميات عظام الاصابع وهي اربع عشرة ثلاث لكل اصبع واثنان للابهام تعد صنفًا من الاعلى الى الاسفل. لكل سلامية جسم وطرفان. فالجسم يستدق من الاعلى الى الاسفل محدب

من الخلف مقعر من الامام عليه خطان جانبيان تندغم بهما الاغداد الليفية للاوتار القوابض. الطرف المشطي للصف الاول وهو القاعدة سطح مفصلي مقعر يتصل باحد العظام المشطية وفي


الصفين الباقيين تغير مزدوج مقسوم بواسطة خط من الامام الى الخلف. والطرف السلامي بكرتي الشكل عليه عقدتان جانبيتان صغيرتان في الصف الاول والثاني. والسلاميات

الظفرية وهي الصف الثالث الا في الابهام تتميز بصغر حجمها وعلى وجهها المقدم عند الطرف

الصفات العامة للعظام المشطية

لكل عظم مشطي جسم و طرفان رسغي وسلامي . فالجسم منشوري الشكل مقعر طولاً من المقدم محدب من الخلف وله وجهان جانبيان ووجه خلفي . فالوجهان الجانبيان منفصلان

شكل ٦٤



من المقدم بواسطة خط بارز مقعران ترتبط بهما العضلات بين العظام . والوجه الخلفي وهو الظهري تغطيه اوتار العضلات بواسطة نصفه العلوي مقسوم الى ثعيرين جانبيين ضيقين ترتبط بهما العضلات الظهرية بين العظام . والطرف الرسغي ويقال له القاعدة ايضاً مكعب الشكل يتصل من الاعلى بالرسغ ومن الجانبيين بالعظمين المشطيين المجاورين . والطرف السلامي ويقال له الراس ايضاً عليه سطح املس محدب مستطيل قطره الطويل من الامام الى الخلف يتصل بالسلامية الاولى . والى كل من جانبيه انخفاض غائر تعلوه حدة يرتبط بها الرباط الجانبي المشطي السلامي . تمر على وجهه الخلفي الاوتار بواسطة وعلى وجهه المقدم الاوتار القوابض

الصفات الخاصة بكل من العظام المشطية

مشطي الابهام اقصرها واعرضها واكثرها انفتاحاً بالنسبة الى الرسغ . جسمه منضغط قليلاً من الامام الى الخلف مسطح من الخلف محدب من الجانب الى الجانب من الامام . قاعدته تتصل بالمرجع المنحرف خالية من سطوح جانبية . راسه اقل تحديداً مما سواه وقطره الطويل من الجانب الى الجانب

ومشطي السبابة اطولها . ولقاعدها اربعة سطوح مفصلية احدها عند الطرف يتصل بالشبيه بالمرجع المنحرف . والثاني الى الوحشية يتصل بالمرجع المنحرف . والثالث الى الاعلى والانسية يتصل بالعظم الكبير . والرابع الى الانسية يتصل بالمشطي الثالث ومشطي الوسطى اصغر قليلاً من سابقه والى الجانب الوحشي لقاعدته نمو مخروطي يمتد

شكل ٦٤ الوجه المقدم وهو الراجح لليد اليسرى ١ الزورقي ٢ الملالتي ٣ المرمي ٤ السلي ٥ المربع المنحرف ٦ ميزاب على المربع المنحرف يمينه وتر القابضة الكعبرية للرسغ ٧ الشبيه بالمرجع المنحرف ٨ الكبير ٩ الكلاوي ١٠ و١١ العظام المشطية الخمسة ١١ و١١ الصف الاول من السلاميات ١٢ و١٢ الصف الثاني ١٣ و١٣ الصف الثالث ١٤ السلامية الاول للابهام ١٥ السلامية الثانية وهي الاخيرة اذ

للجسم مستد براملس يتصل بالهلالي . والوجه السفلي متسوم بواسطة خطين الى ثلاثة سطوح
تتصل بالمشطي الثاني والثالث والرابع . والوجه الخلفي عريض خشن والمقدم ضيق خشن ترتبط
بهما اربطة . والوجه الوحشي عليه سطحان يتصل العلوي منها بالزورقي والسفلي بالشبيه بالمربع
المنحرف . والوجه الانسي عليه سطح منفر مستطيل يتصل بالكلابي

اذا مسك بحيث يكون الراس الى الاعلى والوجه الظهرى العريض الخشن الى المقدم كان
اتجاه السطح الانسي المفصلي المنفر الى الجانب الذي يختص به هذا العظم
انصاله المفصلي بسبعة عظام . الزورقي والهلالي من الاعلى والمشطي الثاني والثالث والرابع
من الاسفل والشبيه بالمربع المنحرف من الوحشية والكلابي من الانسية
ترتبط به بعض القابضة القصيرة للابهام

والعظم الكلابي يتميز شكله الاسفني وتوّه الكلابي الذي يبرز من وجهه الراجي وضعه
في الزاوية الانسية والسفلى للرسغ بين العظم الكبير والهري قاعدته مستقرة على المشطيين الانسيين
وراسه متجه نحو الاعلى والوحشية . وجهه العلوي وهو راس الاسفين يتصل بالهلالي . والوجه السفلي
يتصل بالمشطي الرابع والخامس . والوجه الظهرى مثلث الشكل خشن . والوجه الراجي عليه من
الاسفل والانسية تنمو منحني هو النتو الكلابي اتجاهاً الى المقدم والوحشية . والنتو المذكور احد
الارتفاعات الاربعة التي يرتبط بها الرباط الحلقى المقدم والثلاثة الباقية هي البسلي من الانسية
والمربع المنحرف والزورقي من الوحشية . والوجه الانسي عليه سطح مستطيل يتصل بالهري .
والوجه الوحشي عليه سطح في قسمه العلوي والخلفي يتصل بالعظم الكبير

اذا مسك بحيث يكون راس الاسفين نحو الاعلى والوجه الظهرى العريض الى الخلف كان
اتجاه تغير النتو الكلابي الى الجانب الذي يختص به هذا العظم
انصاله المفصلي بخمسة عظام . من الاعلى الهلالي ومن الاسفل المشطي الرابع والخامس ومن
الانسية الهري ومن الوحشية العظم الكبير

ترتبط به القابضة القصيرة للخنصر والمقاومة للخنصر وهي المقربة له والرباط الحلقى

المقدم

في المشط

عظام المشط خمسة تعد من الوحشية الى الانسية وهي طويلة اسطوانية موضوعة بين

الصف السفلي للرسغ والسلاميات الاول

عظام رسغ اليد

عمودي يمر فيه وتر القابضة الكعبرية للرسغ وإلى الوحشية من الميزاب خط بارزا واحدة هو احد الارتفاعات الاربعة التي يرتبط بها الرباط الخلفي المقدم. وترتبط بهذا الوجه المبعدة للابهام والقابضة لمشطي الابهام (وهي المقاومة للابهام) والقابضة القصيرة للابهام. وجهه الخلفي وهو الظهري ووجهه الوحشي خشنان لارتباط الاربطة. وجهه الانسي عليه سطحان مفصليان العلوي منها كبير مقعر يتصل بالشبيه بالمربع والسفلي ضيق مسطح يتصل بقاعدة المشطي الثاني

اذا مسك بحيث يكون الوجه الراحي الذي عليه الميزاب الى الاعلى والوجه الوحشي العريض الى الخلف اتجه السطح السرحي الشكل نحو الجانب الذي يختص به هذا العظم اتصاله المفصلي باربعة عظام هي الزورقي من الاعلى والشبيه بالمربع المنحرف والمشطي الثاني من الانسية والمشطي الاول من الاسفل ترتبط به المبعدة للابهام والقابضة لمشطي الابهام وبعض القابضة القصيرة للابهام والرباط الخلفي المقدم

والشبيه بالمربع المنحرف يتميز بشكليه الاسفني قطره الطويل من الامام الى الخلف وضعة بين المربع المنحرف والكبير على نوع ان طرفه العريض يشغل الوجه الظهري لليد وطرفه الضيق الوجه الراحي. وجهه العلوي مربع الجوانب املس يتصل بالزورقي. وجهه السفلي محدب من الجانب الى الجانب مقسوم الى سطحين غير متساويين يتصلان بالمشطي الثاني. وجهه المقدم والخلفي خشنان والخلفي منها اكبر من المقدم. وجهه الوحشي محدب املس يتصل بالمربع المنحرف. وجهه الانسي مقعر املس من الاسفل يتصل بالعظم الكبير

اذا مسك بحيث يكون الوجه الظهري الى الاعلى والوجه السفلي الى المقدم كان اتجاه الوجه الانسي المقعر الى الجانب الذي يختص به هذا العظم اتصاله المفصلي باربعة عظام الزورقي من الاعلى والمشطي الثاني من الاسفل والمربع المنحرف من الوحشية والعظم الكبير من الانسية ترتبط به بعض القابضة القصيرة للابهام

والعظم الكبير يتميز بكونه اكبر عظام الرسغ وضعة في منتصف الرسغ بين الشبيه بالمربع المنحرف والكلاي يقسم الى راس وعنق وجسم. فالراس الى الاعلى مستدير الشكل يتصل بالتفكير المكون من الزورقي والهلالي. والعنق جزء مخنق واقع اسفل الراس. والوجه العلوي

اذا اريد معرفة اي يدٍ هو لها يُمسك بحيث يكون الوجه الظهري الى الاعلى والوجه المحذب
المفصلي الى الاسفل فيكون السطح المربع المفصلي متجهاً الى الجانب الذي يختص به هذا العظم
اتصاله المفصلي بخمسة عظام الكعبرة من الاعلى والكبير والكلاي من الاسفل والزورقي
من الوحشية والهرمي من الانسية

والهرمي يتميز بشكليه الهرمي وبان له سطحاً بيضي الشكل للاتصال بالعظم البسلي وضعه في
القسم العلوي والانسي للرسغ. وجهه العلوي عليه سطح مفصلي ينزلق على الغضروف الثالث المتوسط
بينه وبين الزند. وجهه السفلي مقعر يتصل بالكلاي. وجهه المقدم يتميز عن الخلفي بان عليه سطحاً
مفصلياً بيضي الشكل للاتصال بالبسلي وجهه الوحشي قاعدة المخروط عليه سطح مربع الجوانب
يتصل بالهلالي. وجهه الانسي قمة المخروط مستدق خشن يرتبط به الرباط الجانبي الانسي للرسغ
اذا اريد معرفة اليد التي هو لها يُمسك بحيث تكون القاعدة الى الخلف والسطح الذي
يتصل بالبسلي الى الاعلى فيكون السطح المفصلي المقعر متجهاً الى الجانب الذي يختص به هذا
العظم

اتصاله المفصلي بثلاثة عظام الهلالي من الوحشية والبسلي من الامام والكلاي من الاسفل
والبسلي يتميز بصغر حجمه وبان له سطحاً واحداً مفصلياً وضعه في القسم المقدم والانسي
للرسغ شكلة مستدق وعلى وجهه الخلفي سطح بيضي الشكل يتصل بالهرمي. وجهه المقدم مستدق
خشن يرتبط به الرباط الخلفي المقدم

اذا اريد معرفة اليد التي هو لها يُمسك بحيث يكون سطحه المفصلي الى الاسفل وما بقي من
وجهه الخلفي الى الخلف فيكون اتجاه الوجه الانسي المقعر نحو الجانب الذي يختص به هذا العظم
اتصاله المفصلي بعظم واحد هو الهرمي
ترتبط به عضلتان هما التابضة الزندية للرسغ والمبعدة للخنصر. ويرتبط به الرباط الخلفي
المقدم

عظام الصف السفلي

المربع المنحرف يتميز بان له ميزاباً غائراً وضعه في القسم الوحشي والسفلي للرسغ بين
الزورقي والمشطي الاول شكله غير منتظم. وجهه العلوي مقعر يتصل بالزورقي. وجهه السفلي
بيضي الشكل مقعر من الجانب الى الجانب محذب من الامام الى الخلف فيكون شكله كالسرج
يتصل بقاعدة المشطي الاول. وجهه المقدم وهو الراجي ضيق خشن عند اعلاه ميزاب غائر

الصفات العامة لعظم الرسغ

لكل عظم منها الابسلي ستة وجوه مقدم وخلفي وعلوي وسفلي وانسي وووحشي. فالوجوه المقدمة وهي الراحية والخلفية وهي الظهيرية خشنة ترتبط بها اربطة. والوجوه العليا والسفلى مفصلية العليا منها غالباً محدبة والسفلى مقعرة. والوجوه الانسية والوحشية مفصلية ايضاً ان كانت مجاورة لغيرها والافتكون خشنة. بناؤها جميعها من النسيج الاسفنجي مغطى بطبقة من المندمج ويتعظم كل منها بنقطة واحدة

عظام الصنف العلوي

الزورقي اكبر عظام الصنف العلوي ووضعه في القسم العلوي والوحشي للرسغ. وهو عريض من الطرف الواحد ضيق من الآخر ولذلك سموه بالزورقي. ووجهه العلوي محدب املس مثالث الشكل يتصل بالكعبرة. ووجهه السفلي محدب املس مقسوم بواسطة خط خفيف الى قسمين يتصل الوحشي بالمربع المنحرف والانسي بالشبيه به. ووجهه الخلفي وهو الظهيرى عليه ميزاب عرضي ضيق خشن ترتبط به اربطة. ووجهه المقدم وهو الراحي مقعر من الاعلى مرتفع من الاسفل والوحشية على هيئة حدبة بارزة يرتبط بها الرباط الخلفي المقدم. ووجهه الوحشي ضيق خشن يرتبط به الرباط الجانبي الوحشي للرسغ. ووجهه الانسي عليه سطحان مفصليان العلوي منها صغير مسطح هلالى الشكل يتصل بالعظم الهلالي والسفلى كبير مقعر يتكون منه ومن العظم الهلالي حفرة تتصل براس العظم الكبير

اذا اريد معرفة اليد التي يخضع هذا العظم بها يُمسك افقياً بحيث يكون الوجه المحدب نحو الماسك والحافة المحدبة نحو الاعلى فان كان الطرف العريض متجهاً الى اليمين كان لليد اليمنى وان كان الى اليسار فليسرى

انصالة المفصلي بخمسة عظام الكعبرة من الاعلى والمربع المنحرف والشبيه به من الاسفل والكبير والهلالي من الانسية

والهلالي يتميز بتغيره الغائر وشكله الهلالي ووضعه بين الزورقي والهرمي. ووجهه العلوي محدب مربع الجوانب يتصل بالكعبرة. ووجهه السفلي مقعر جداً يتصل براس العظم الكبير وله سطح ضيق طويل يتصل بالكلاي. ووجهه المقدم والخلفي وها الراحي والظهيرى خشان لا ترتباط الاربطة. ووجهه الوحشي عمودي يتصل بالزورقي. ووجهه الانسي املس مربع الجوانب يتصل بالهرمي

والباسطة للسبابة

بناؤه كبناء بقية العظام الطويلة

يتعظم بثلاث نقط واحدة لكل من الجسم والطرفين . عند الولادة يكون الجسم متعظماً والطرفان غضروفيين . ويبدأ التعظم في الطرف السفلي نحو نهاية السنة الثانية وفي العلوي في السنة الخامسة . ويتحد الطرف العلوي بالجسم عند زمن البلوغ والسفلي نحو السنة العشرين اتصاله المنفصلي بأربعة عظام هي العنق والزند والذورقي والهلالي ارتباطاً العضلية . بالحدبة العضلة ذات الرأسين . وبالخط المنحرف الباطنة القصيرة والقابضة السطحية للأصابع والقابضة الطويلة للإبهام . وبالجم من المقدم القابضة الطويلة للإبهام والكابة المربعة ومن الخلف الباسطة لمشطي الإبهام والباسطة الأولى للإبهام ومن الوحشية الكابة المستديرة . وبالتوا الأبري الباطنة الطويلة

في اليد

هي القسم الثالث من اقسام الطرف العلوي . تقسم الى ثلاثة اقسام الرسغ والمشط والسلاميات

في الرسغ

شكل ٦٢



عظام الرسغ ثمانية مصنوفة صفيين علوي وسفلي تُعد من الوحشية الى الانسية . فعظام الصف العلوي اربعة الذورقي والهلالي والهرمي والبسلي . وعظام الصف السفلي اربعة ايضاً المربع المنحرف والشبيه بالمربع والكبير والكلاي . الوجه الظهري للرسغ محذب والوجه الراحي مقعر من الجانب الواحد الى الاخر ويحد التقعر المذكور اربعة ارتفاعات واحد على كل من طرفي الصف الاول والصف الثاني اي اثنان الى الانسية واثنان الى الوحشية . ويرتبط بهذه الارتفاعات الرباط الحلقى المقدم ممتداً بينها بحيث يكون قناة تمر منها اوتار العضلات القوابض

شكل ٦٢ الوجه الظهري للرسغ الايمن واتصال عظامه المنفصلي ١ الطرف السفلي الزند ٢ الطرف السفلي للكعبرة ٣ الغضروف المتوسط بين الزند والرسغ ٤ المشطي الاول وهو الابهامي ٥ المشطي الثاني ٦ المشطي الثالث ٧ المشطي الرابع ٨ المشطي الخامس ٩ الذورقي ١٠ الهلالي ١١ الهرمي ١٢ البسلي ١٣ المربع المنحرف ١٤ الشبيه به ١٥ الكبير ١٦ الكلاي

الوحشية. له ثلاث حوافٍ مقدمة وخلفية وانسية فاصلة بين ثلاثة وجوه مقدم وخلفي ووحشي .
 الحافة المقدمة ممتدة من اسفل الحذبة في الاعلى الى مقدم التتوالابري في الاسفل . ثلثها العلوي
 بارز منحرف نحو الاسفل والوحشية هو الخط المنحرف للكعبرة ترتبط به من الوحشية الباطحة
 القصيرة ومن الانسية القابضة الطويلة للابهام وبها بينهما القابضة السطحية للاصابع . وربعا
 السفلي ترتبط به الكابة المربعة وينتهي بمجدبية يندغم بها وتر الباطحة الطويلة . والحافة الخلفية تبدأ
 عند مؤخر العنق وتنتهي عند مؤخر التتوالابري . والحافة الانسية رقيقة حادة في وسطها يتشعب
 طرفها السفلي شعبتين تنزلان الى الحافة المقدمة والحافة الخلفية للتجويف السيني . ويرتبط بمعظم
 طول هذه الحافة الغشاء بين العظمين . الوجه المتقدم ثلثاه العلويان ضيقان مقعران تنشأ
 منها القابضة الطويلة للابهام وثلثه السفلي عريض مسطح ترتبط به الكابة المربعة . ويشاهد
 نحو منتهى ثلثه العلوي الثقب الغذائي متجهاً نحو الاعلى . والوجه الخلفي ثلثه العلوي املس مستدير
 تغطيه الباطحة القصيرة وثلثه المتوسط مقعر ترتبط به من الاعلى الباسطة لمشطي الابهام ومن
 الاسفل الباسطة الاولى للابهام وثلثه السفلي محدب تغطيه الاوتار التي تسير في الميازيب الواقعة
 في الطرف السفلي . والوجه الوحشي مستدير محدب على جميع طوله . ثلثه العلوي ترتبط به الباطحة
 القصيرة وعند منتصفه خط خشن ترتبط به الكابة المستديرة وثلثه السفلي يغطيه وتر الباسطة
 لمشطي الابهام وتر الباسطة الاولى للابهام

والطرف السفلي كبير مربع الجوانب عليه سطحان مفصليان احدهما الى الاسفل يتصل
 بالرسغ والثاني الى الجاناب الانسي يتصل بالزند . فالسطح الرسغي مقعر مثلث الشكل يقسمه خط
 خفيف الى قسمين الوحشي منها كبير يتصل بالعظم الزورقي من عظام الرسغ والانسي اصغر
 من الوحشي يتصل بالهلالي من عظام الرسغ . والسطح الانسي وهو التجويف السيني للكعبرة ضيق
 مقعر يتصل براس الزند . ولحيط الطرف السفلي ثلاثة وجوه مقدم ووحشي وخلفي . فالوجه المقدم
 خشن يرتبط به الرباط المقدم لمفصل الرسغ . والوجه الوحشي يستطيل الى الاسفل على هيئة نتو
 مخروطي هو التتوالابري الذي يرتبط بقاعدته وتر الباطحة الطويلة وبتمته الرباط الجانبي
 الوحشي . وعلى الوجه الوحشي للتتوالابري المذكور ميزان يمر في المقدم منها وتر الباسطة لمشطي الابهام
 وفي الخلفي وتر الباسطة الاولى للابهام . والوجه الخلفي محدب يرتبط به الرباط الخلفي للرسغ وعليه
 ثلاثة ميازيب . فالميازيب الوحشي عريض قليل الغور يقسمه خط خفيف الى قسمين يمر فيهما
 وترا الباسطتين الكعبريتين للرسغ الطويلة والقصيرة . والميازيب المتوسط ضيق غائر يمر فيه
 وتر الباسطة الثانية للابهام . والميازيب الانسي عريض يمر فيه وترا الباسطة المشتركة للاصابع

المثلث الذي يفصل هذا العظم عن المفصل الرسغي ومن الوحشية سطح ضيق يتصل بالحفرة السينية للكعبرة. والتواالبري بارز الى الاسفل من الطرف الانسي والخلفي يرتبط بقمته الرباط الجانبي الانسي. ويفصل الراس عن التواالبري من الخلف ثلم يمر منه وتر الباسطة الزندية للرسغ

بناؤه كبناء العظام الطويلة

يتعظم بثلاث نقط واحدة لكل من الجسم والطرف السفلي والتواالبري. ويبدأ التعظم في الجسم في الشهر الثاني فيكون ممتداً الى جميع طوله عند الولادة واما الطرفان فيكونان غضروفيين. وفي السنة الخامسة يبدأ التعظم في الطرف السفلي وفي السابعة في الطرف العلوي. ويتحد الطرف العلوي بالجسم نحو السنة السادسة عشرة والطرف السفلي نحو العشرين

اتصاله المفصلي بالعضد والكعبرة


ارتباطاته العظمية. بالتواالبري ثلاثية الرؤوس والمرفقية واحداً راسي القابضة الزندية للرسغ. وبالتواالبري العظمية المقدمية والكعبرة المستديرة للكعبرة والقابضة السطحية للاصابع والقابضة الغائرة للاصابع. وبالجسم القابضة الغائرة للاصابع والكعبرة المربعة والقابضة الزندية للرسغ والباسطة الزندية للرسغ والمرفقية والباطحة القصيرة والباسطة لمشطي الابهام والباسطة الثانية للابهام والباسطة للسياه

الكعبرة

الكعبرة موضوعة في الجانب الوحشي للساعد على خط مواز للزند وهي اقصر واصغر منه. طرفها العلوي صغير يدخل في تكوين المفصل المرفقي وطرفها السفلي كبير يتكون منه معظم الرسغ. وهي من العظام الطويلة شكلها منشوري مخنجة قليلاً انحناءً طويلاً نحو الانسية ولها جسم وطرفان فالطرف العلوي يقسم الى راس وعنق وحذبة. الراس اسطواناني الشكل عليه من الاعلى سطح مقعر يتصل اتصالاً مفصلياً بالراس الكعبري للعضد. وحول محيطه سطح املس عريض الى الانسية يدور دوراً رحوياً في التجويف السيني الصغير للزند ضيق في ما بقي يدور داخل الرباط المحيط. والعنق اسطواناني الشكل مخنق حامل للراس وعليه من الخلف ارتفاع خفيف ترتبط به بعض الباطحة القصيرة. والحذبة ارتفاع خشن واقع اسفل العنق الى الانسية والمقدم يقسمها خط عمودي الى قسمين الخلفي منها خشن يندغم به وتر العضلة ذات الراسين والمقدم املس عليه كيس مخاطي متوسط بين العظم والوتر المذكور

والجسم منشوري الشكل اضيق في الاعلى منه في الاسفل مخنق قليلاً بحيث يكون تحديبه الى

الشكل واقع بين التوالمرفقي والتوالمقاري مخنق المنتصف عرضاً مقسوم طولاً الى شطرين بواسطة خط بارز ممتد من قمة التوالمرفقي الى راس التوالمقاري . وهذا شكل ٦٢



التجويف يتصل اتصالاً مفصلياً بالسطح البكري للعضد والجسم منشوري إلى ثلاثة ارباعه العليا ومنحن نحو المقدم واما ربعه السفلي فاسطواني مستقيم . وهو غليظ من الاعلى مستدق من الاسفل وله ثلاث حواف مقدمة وخلفية ووحشية وثلاثة وجوه مقدم وخلفي وانسي . فالحافة المقدمة مستديرة ترتبط بها من الاعلى بعض القابضة الغائرة للاصابع وربعها السفلي الكابة المربعة . والحافة الخلفية ثلاثة ارباعها العليا بارزة يرتبط بها وتر مشترك بين القابضة الزندية للرسغ والباسطة الزندية للرسغ والقابضة الغائرة للاصابع وربعها السفلي املس مستدير . والحافة الوحشية تبدأ من الاعلى بمخطين منحدرين من جانبي التجويف السيني الصغير ثم يجنهما على بعد نحو قيراط ونصف من منشأها فيحيطان بخلاء مثلث ترتبط به بعض الباطمة القصيرة . ربعها المتوسطان بارزان يرتبط بها

الغشاء بين العظمين وربعها السفلي املس مستدير . الوجه المقدم ثلاثة ارباعه العليا مقعرة تنشأ منها القابضة الغائرة للاصابع وربعه السفلي عليه خط منحرف ترتبط به الكابة المربعة . ويُشاهد في قسمه العلوي الثقب الغدائي متجهاً نحو الاعلى الى القناة النخاعية . والوجه الانسي مقعر من الاعلى تنشأ من ثلاثة ارباعه العليا القابضة الغائرة للاصابع وربعه السفلي لا يغطيه الا الجلد . والوجه الخلفي مشرف نحو الخلف والوحشية عليه من الاعلى خط منحرف منحدر من الطرف الخلفي للتجويف السيني الصغير تندغم بالسطح المثلث الذي اعلى الخط العضلة المرفقية وبالخط نفسه الباطمة القصيرة . وما بقي من هذا الوجه مقسوم بواسطة خط طولي الى قسمين ترتبط بالانسي منهما الباسطة الزندية للرسغ وبالوحشي من الاعلى الى الاسفل بعض الباطمة القصيرة والباسطة لمشطي الابهام والباسطة الثانية للابهام والباسطة للسبابه

والطرف السفلي صغير لادخله في تكوين المفصل الرسغي وهو مؤلف من راس الى الوحشية وتوابري الى الانسية . فالراس مستدير عليه من الاسفل سطح مفصلي يتصل بالغضروف الليفي

شكل ٦٢ مقدم عظمي الساعد ١ جسم الزند ١٢ التجويف السيني الكبير ٢ التجويف السيني الصغير الذي يتصل به راس الكعبه ٤ التوالمرفقي ٥ التوالمقاري ٦ الثقب الغدائي ٧ حافتا العظمين الثنائيت يرتبط بها الغشاء بين العظمين ٨ راس الزند ٩ التوالمقاري للزند ١٠ جسم الكعبه ١١ راس الكعبه ومحيطه الذي يدور داخل الرباط المحيط ١٢ عنقه ١٣ الحدبة التي ترتبط بها ذات الراسين ١٤ الخط المنحرف ١٥ الطرف السفلي للكعبه ١٦ التوالمقاري للكعبه

الزند (١)

الزند عظم طويل منشوري الشكل موضوع في الجانب الانسي للساعد على خط مواز للكعبرة وهو اطول واكبر منها . طرفه العلوي غليظ قوي يتكوّن منه جزء عظيم من المفصل المرفقي . طرفه السفلي صغير جداً لا يدخل في تكوين المفصل الرسغي بل يتوسط بينهما غضروف ليفي . اقسامه التشريحية جسم و طرفان

فالطرف العلوي مؤلف من تتوين كبيرين مخنيين هما التتوالمرفقي والتتوالمقاري وتجويفين مقعرين مفصليين هما التجويف السيني الكبير والتجويف السيني الصغير . فالتتوالمرفقي ارتفاع عظيم منحني نحو المقدم موضوع في القسم العلوي والخلفي للزند يستصيق عند اتصاله بالجسم بحيث اكثر الكسر الذي يقع في اعلى هذا العظم انما يكون في المضيق المذكور . وجهه الخلفي مثلث الشكل لا يغطيه الا الجلد وكيس مخاطي . وجهه العلوي مربع الجوانب عليه من الخلف اثر خشن تندغم به ثلاثية الرؤوس ومن المقدم بقرب الحافة ميزاب خفيف عرضي يرتبط به بعض الرباط المرفقي الخلفي . والوجه المقدم امس مقعر يكون الجزء العلوي والخلفي للتجويف السيني الكبير . ويدوم الميزاب المذكور آنفاً على الحافتين الجانبيتين فيرتبط به من الانسية الرباط الانسي الجانبي ومن الوحشية الرباط الخلفي . وهذا التتوالمقاري الرضفة في الطرف السفلي باعتبار الوضع والوظيفة وقد يكون منفصلاً عن الجسم . والتتوالمقاري ارتفاع خشن مثلث الشكل بارزاً فقيماً الى المقدم فيتكوّن من وجهه العلوي الجزء السفلي للتجويف السيني الكبير . قاعدته ممتدة من مقدم الجسم وراسه مستدق يدخل الحفرة المقارية للعضد عند قبض الساعد . وجهه السفلي عليه اثر خشن تندغم به العضدية المقدمية . وجهه الوحشي عليه انخفاض مفصلي ضيق مستطيل هو التجويف السيني الصغير الذي يتصل اتصالاً مفصلياً براس الكعبرة ويرتبط بجوافي التجويف المذكور الرباط المحيط . وجهه الانسي يرتبط بحافته البارزة بعض الرباط الانسي الجانبي . وعند مقدم هذا الوجه ارتفاع صغير مستدير يرتبط به احد رأسي القابضة السطحية للاصابع . والى وراء الارتفاع تعبير ترتبط به بعض القابضة الغائرة للاصابع ويرتبط بالخط النازل منه احد رأسي الكابة المستديرة للكعبرة . والتجويف السيني الكبير يشبه السين اليونانية وهو تعبير عظيم هلالى

(١) اذا كان الطرف العلوي مدلى على وضعه الطبيعي كان الابهام منجهاً الى المقدم والانسية ويقال للوضع المذكور الكتب غير التام . غير انه قد اصطلح المشرحون على وصف الساعد بمجاله البطح بحيث يكون الابهام منجهاً الى الوحشية وراحة اليد مشرفة نحو المقدم

الباسطة للساعد. والعقدة الانسية اكبر واشد بروزاً من العقدة الوحشية ويرتبط بها الرباط الجانبي الانسي للمرفق والوتر المشترك لبعض العضلات القابضة للساعد بناؤه. الطرفان مؤلفان من النسيج الاسفنجي مغطى بطبقة رقيقة من المندمج. والجسم مؤلف من النسيج المندمج وهو اغلظ في المركز منه في الطرفين وتخرقه على جميع طولها قناة كبيرة نخاعية

يتعظم بسبع نقط واحدة لكل من الجسم والراس والحذبة الكبيرة والراس الكعبري والجزء البكري والعقدتين. يبدأ التعظم في الجسم بعد الترقوة فيكون معظمة عظيماً عند الولادة. واما الطرفان فيكونان غضروفيين عند الولادة ثم يبدأ التعظم في الراس والحذبتين في السنة الثانية والثالثة وفي الراس الكعبري والبكرة في السنة الثالثة والسادسة وفي العقدتين في السنة الثانية عشرة والخامسة عشرة. ويتصل الطرفان بالجسم بين السنة السابعة عشرة والعشرين

اتصاله المفصلي بالحفرة العنابية للوح والزند والكعبرة

ارتباطاته العضلية. بالحذبة الكبيرة العضلة فوق الشوكة وتحت الشوكة والمستديرة الصغيرة. وبالحذبة الصغيرة العضلة تحت اللوح. وبالشفة الوحشية لميزاب ذات الراسين الصدرية الكبيرة وبشفته الانسية وارضه الظهيرية العريضة والمستديرة الكبيرة. وبالجسم الذالية والغرايبة العضدية والعضدية المقدمة والرأس الوحشي والراس الانسي لثلاثية الرؤوس. وبالعقدة الانسية الكابة المستديرة للكعبرة والوتر المشترك للقابضة الكعبرية للرسغ والراحية الطويلة والقابضة السطحية للاصابع والقابضة الزندية للرسغ. وبالشفة المقدمة لاسفل الحافة الوحشية الباطحة الطويلة والباسطة الطويلة الكعبرية للرسغ. وبالعقدة الوحشية الوتر المشترك للباسطة القصيرة الكعبرية للرسغ والباسطة المشتركة للاصابع والباسطة للخنصر والباسطة الزندية للرسغ والمرفقية والباطحة القصيرة

في الساعد


الساعد هو القسم الثاني من اقسام الطرف العلوي وموضوع بين المرفق والرسغ. عظامه اثنان الزند والكعبرة

الصغيرة الى العقدة الانسية . ثلثها العلوي بارز تكون منه الشفة الانسية لميزاب ذات الراسين وترتبط به من الاعلى الى الاسفل الظهرية العريضة والمستديرة الكبيرة وبعض الراس الانسي لثلاثية الرؤوس . وعند منتصفها خط خشن تندغم به الغرابية العضدية واسفل الخط الثقب الغذائي . وثلثها السفلي بارز مقسوم الى شفتين ترتبط بالمقدمة منها العضدية المقدمة وبالحلفية الراس الانسي لثلاثية الرؤوس وبالحلاء الذي بينها الصفاق الانسي بين العضلات . واما الوجه الوحشي فمن الاعلى متجه الى الوحشية املس مستدير تغطيه الذالية ومن الاسفل متجه نحو المقدم تنشأ منه بعض العضدية المقدمة . وعند منتصفه اثر خشن مثلث الشكل تندغم به الذالية واسفل الاثر الميزاب العضلي المغزلي . والوجه الانسي اعلاه ضيق يكون ارض ميزاب ذات الراسين ومنتصفه خشن قليلاً تندغم به الغرابية العضدية واسفله املس متجه قليلاً نحو الانسية ترتبط به العضدية المقدمة . والوجه الخلفي اعلاه متجه قليلاً نحو الانسية واسفله الى الخلف . والراس الوحشي والراس الانسي يغطيان هذا الوجه فيرتبط الراس الوحشي باعلاه والراس الانسي باسفله والميزاب العضلي المغزلي فاصل بينهما

والطرف السفلي مسطح من الامام الى الخلف ملتو قليلاً نحو المقدم وينتهي من الاسفل بسطح مفصلي عريض يقسمه حرف خفيف الى قسمين . والى كل من جانبي السطح المفصلي العقدة تان الانسية والوحشية . والسطح المفصلي اشد بروزاً الى الاسفل من العقدين وهو اعرض من الجانب الى الجانب مما هو من الامام الى الخلف . جزؤه الوحشي املس مستدير يقال له الراس الكعبري للعضد لانه يتصل اتصالاً مفصلياً بالانخفاض الكاسي الشكل الواقع على راس الكعبرة ولا يتجاوز الى الخلف كاجزاء الانسي . والى الانسية من الراس المذكور ميزاب قليل الغور يقبل الحافة الانسية لراس الكعبرة . والجزء الانسي للسطح المفصلي ويقال له البكري عليه ميزاب غائر يقسمه الى قسمين كميزاب البكرة . وهذا الجزء محدب ممتد من الامام الى الخلف يتصل اتصالاً مفصلياً محكماً بالحفرة السينية للزند . واعلى السطح البكري من الخلف حفرة غائرة مثلثة الشكل تقبل قمة التو المرفقي عند بسط الساعد يقال لها الحفرة المرفقية . واعلاه ايضاً من المقدم حفرة صغيرة تقبل التو المتقاري للزند عند قبض الساعد يقال لها الحفرة المنقارية . والحفرتان المذكورتان منفصلتان بواسطة صفيحة رقيقة قد تكون مثقوبة ببطنها الغشاء الزلالي للمفصل المرفقي ويرتبط بجوافيها الرباطان المقدم والخلفي للمفصل المذكور . واعلى مقدم الراس الكعبري حفرة تقبل الحافة المقدمة لراس الكعبرة عند القبض الشديد للساعد . واما العقدة الوحشية فاقبل بروزاً من العقدة الانسية ويرتبط بها الرباط الوحشي الجانبي للمرفق والوتر المشترك لبعض العضلات

به الرباط المحفظي وعليه ثقب كثيرة وعائية. ويقال له العنق التشريحي تمييزاً عن العنق الجراحي الموضوع اسفل الحدبتين وتسمى بالجراحي لكثرة وقوع الكسر فيه واعتبار الجراحين له. والحدبة الكبيرة موضوعة الى الجهة الوحشية من الراس والحدبة الصغيرة وعليها ثلاثة سطوح

يندغم بالمقدم منها وتر العضلة فوق الشوكة وبالمتوسط العضلة تحت شكل ٦١ الشوكة وبالخلفي المستديرة الصغيرة. والحدبة الصغيرة اصغر واشد بروزاً من الكبيرة وعلى قمتها سطح بارز يندغم به وتر العضلة تحت اللوح. والحدبتان المذكورتان منفصلتان بواسطة ميزاب غائر هو ميزاب ذات الراسين يستقر فيه الوتر الطويل للعضلة ذات الراسين. وهذا الميزاب يبدأ من الاعلى بين الحدبتين ويسير الى الاسفل منحرفاً قليلاً نحو الانسية وينتهي عند اتصال الثالث العلوي بالثالث المتوسط للجسم. تندغم بنحو مركزه بعض العضلة الظهرية العريضة



والجسم اسطواني في الاعلى منشوري مسطح في الاسفل. له ثلاث حوافٍ مقدمة ووحشية وانسية وثلاثة وجوه وحشي وانسي وخلفي. الحافة المقدمة ممتدة من مقدم الحدبة الكبيرة في الاعلى الى الحفرة المتقاربة في الاسفل فاصلة بين الوجه الانسي والوجه الوحشي. جزءها العلوي بارز خشن تتكوّن منه الشفة الوحشية لميزاب ذات الراسين ويرتبط به وتر الصدرية الكبيرة. عند منتصفها اثر خشن تندغم به الذالية. وجزءها السفلي املس مستدير تندغم به العضدية المتقدمة. والحافة الوحشية ممتدة بين مؤخر الحدبة الكبيرة والعقدة الوحشية فاصلة بين الوجه الوحشي والوجه الخلفي. نصفها العلوي قليل الوضوح يرتبط به الراس الوحشي لثلاثية الرووس. يقاطع مركزها انخفاض خفيف منحرف هو الميزاب العضلي المغزلي الذي يسير فيه العصب العضلي المغزلي والشريان الغائر العلوي. جزءها السفلي مقسوم الى شفتين ترتبط بالمقدمة منها الباطحة الطويلة من الاعلى وبالباطنة الطويلة الكعبرية للرسغ من الاسفل وبالخلفية لثلاثية الرووس وبالحلاء الذي بينها الصفاق الوحشي بين العضلات. والحافة الانسية ممتدة من الحدبة

شكل ٦١ الوجه المقدم للعضد الايمن ١ الجسم ٢ الراس ٣ العنق التشريحي ٤ الحدبة الكبيرة ٥ الحدبة الصغيرة ٦ ميزاب ذات الراسين ٧ الشفة الوحشية لميزاب ذات الراسين ٨ الشفة الانسية له ٩ الاثر الخشن الذي تندغم به العضلة الذالية ١٠ الثقب الغنائي ١١ الراس الكعبري ١٢ البكرة ١٣ العقدة الوحشية ١٤ العقدة الانسية ١٥ اسفل الحافة الوحشية ويقال له الحظ الغندي الوحشي ١٦ الحظ الغندي الانسي ١٧ الحفرة المتقاربة

الغرايى الاخرى ويرتبط بتمته الوتر المشترك بين الراس القصير لذات الراسين والعضلة الغرايية العضدية. وعند الجهة الانسية لاصل التواء الغرايى انخفاض خشن يرتبط به الرباط المخروطى ويسير منه نحو المقدم والوحشية على الوجه العلوي للقسم الاقنى خط منحرف يرتبط به الرباط المربع المنحرف

بناء الاجزاء الغليظة كالراس والتكوين من النسيج الاسفنجي مغطى بطبقة من المندمج وما بقي من المندمج الكثيف. وهو رقيق جداً عند مركزه بحيث يكون نصف شفاف

يتعظم بسبع نقط واحدة لكل من الجسم والحافة الخلفية والزاوية السفلى وثنان لكل من التكوين. يبدأ التعظم نحو الشهر الثاني فيكون عظيماً عند الولادة الاً التكوين والحافة الخلفية والزاوية السفلى التي تكون ضروفية. وفي السنة الاولى يبدأ التعظم في التواء الغرايى وبين الخامسة عشرة والسابعة عشرة يتصل بالجسم. وعند ذلك يبدأ التعظم في ما بقي من الاجزاء الغضروفية وبين السنة الثانية والعشرين والخامسة والعشرين تتصل بالجسم. وقد يبقى الاتصال بين التواء الاخرى والشوكة اتصالاً ليفياً

اتصاله المفصلي بالعضد والرقوة

ترتبط به من وجهه المقدم العضلة تحت اللوح ومن وجهه الخلفي العضلتان فوق الشوكة وتحت الشوكة. وبالشوكة المربعة المنحرفة والذالية. وبالحافة العليا الكتفية اللامية. وبالحافة الفقرية المسننة الكبيرة والرافعة لزاوية اللوح والمعينتان الصغيرة والكبيرة. وبالحافة الابطية ثلاثية الرؤوس والمستديرتان الصغيرة والكبيرة. وبالحفرة العنايةية الراس الطويل لذات الراسين. وبالتواء الغرايى الراس القصير لذات الراسين والغرايية العضدية والصدريية الصغيرة. وبالزاوية السفلى قد ترتبط بعض الياف الظهرية العريضة


في العَضد

العضد اطول واكبر عظام الطرف العلوي وضعه بين الكتف والساعد وله جسم وطرفان علوي وسفلي

فالطرف العلوي يتسم الى راس وعنق وحدبتين كبيرة وصغيرة. الراس نحو نصف كرة متجه الى الانسية والاعلى قليلاً الى الخلف امس يتصل اتصالاً مفصلياً بالحفرة العنايةية اللوح. والعنق اخنناق خفيف واقع عند محيط الراس تتكوّن من اتصاله بالجسم زاوية منفرجة يرتبط

في الزاوية السفلى . في هذه الحافة اسفل الحفرة العنابية اثر خشن طولهُ نحو قيراط يرتبط به
الراس الطويل لثلاثية الرؤوس . ومن طرف الاثر المذكور الى الثلث الاخير لهذه الحافة ميزاب
طولي ينشأ منه بعض العضلة تحت اللوح . والثلث السفلي رقيق ترتبط

شكل ٦ .



به بعض الياف العضلة تحت اللوح من المقدم وبعض المستديرة
الصغيرة من الخلف . والحافة الانسية هي الفقرية ويقال لها القاعدة
ايضاً اطول المحوافي الثلاث ممتدة من الزاوية العليا الى الزاوية السفلى
وعليها شنتان مقدمة وخلفية وخلاء متوسط بينهما . ترتبط بالشفة
المقدمة العضلة المسننة الكبيرة وبالخلفية العضلة فوق الشوكة الى السطح
المثلث والعضلة تحت الشوكة اسفل السطح المذكور وبالمخلا الذي بينها
العضلة الرافعة لزاوية اللوح الى السطح المثلث والمعينة الصغيرة بحافة
السطح . واما المعينة الكبيرة فترتبط بواسطة قوس ليفي بما دون السطح من
الاعلى وبالطرف السفلي للحافة الانسية من الاسفل

والزاويا ثلاث عليا وسفلى ومقدمة . فالعليا رقيقة مكوّنة من اتحاد

الحافة العليا بالحافة الانسية ترتبط بها بعض الياف العضلة الرافعة لزاوية اللوح . والسفلى غليظة
مكوّنة من اتحاد الحافة الانسية بالحافة الوحشية قد ترتبط بها بعض الياف الظهرية العريضة .
والمقدمة غليظة جداً يقال لها الراس . والراس المذكور عليه حفرة مفصلية قليلة الغور مخروطية
الشكل هي الحفرة العنابية التي تتصل اتصالاً منفصلاً براس العضد . قطرها الطويل من الاعلى
الى الاسفل ويرتبط بقمتهما من الاعلى الراس الطويل لذات الراسين ويحيطها الرباط العنابي
وهو جوهر غضروفي ليفي يزيد غور الحفرة . ويحيط بالراس اخنثاق خفيف هو العنق الذي
يبرز من قسمه العلوي تنو غليظ هو التنو الغرابي

التنو الغرابي سمي بذلك لان فيه بعض مشابهة لمنقار الغراب . وهو تنو عظمي غليظ منحني
ذو قاعدة عريضة بارزة من الجزء العلوي لعنق اللوح . قسمه الصاعد مسطح من الامام الى الخلف
وجهه المقدم مقعر امس تسير عليه العضلة تحت اللوح . وقسمه الافقي مسطح من الاعلى الى الاسفل .
حافته المقدمة خشنة ترتبط بها الصدرية الصغيرة وحافته الخلفية خشنة يرتبط بها الرباط

شكل ٦ . الحافة الابضية لوح اليمين ١ السطح المفصلي الذي يتصل بالترقوة ٢ التنو الاخري ٣ التنو الغرابي ٤ منشا
الراس الطويل لذات الراسين ٥ الحفرة العنابية ٦ منشا الراس الطويل لثلاثية الرؤوس ٧ الوجه المقدم وغور البطن ٨ السطح
الذي تنشا منه المستديرة الكبيرة ٩ السطح الذي تنشا منه بعض الياف الظهرية العريضة ١٠ منشا المستديرة الصغيرة

لهذه الحفرة العضلة تحت الشوكة وتغطي الربع الباقي . ويفصل هذا الوجه عن الحافة الابطية خط بارز ممتد من اسفل الحفرة العنابية نحو الاسفل والخلف الى الحافة الخلفية ويرتبط به صفاق متين فاصل بين العضلة تحت الشوكة والعضلتين المستديرتين . والخلاء الواقع بين الخط المذكور والحافة الابطية ضيق الى ثلثي مسافته العلويين ترتبط به العضلة المستديرة الصغيرة ويقاطع مركزه ثم تمر منه الاوعية اللوحية الظهرية . وثلاثة السفلي عريض ترتبط به المستديرة الكبيرة وتنزلق عليه الظهرية العريضة وقد تنشأ بعض اليافها منه . وبين الثلثين العلويين والثلث السفلي خط منحرف يرتبط به صفاق فاصل بين العضلتين المستديرتين

والشوكة صفيحة عظمية بارزة من الظهر نحو الخلف والاعلى فتقسمه الى خمس علوي هو الحفرة فوق الشوكة واربعه اخماس سفلى هي الحفرة تحت الشوكة . تبدأ عند الحافة الفقرية وهي الخلفية بسطح مثلث املس تنزلق عليه المربعة المنخرقة المنفصلة عنه بواسطة كيس مخاطي ثم ترتفع كلما تقدمت الى ان تنتهي بالتواخري الذي يعلو المفصل الكتفي . وهي مثلثة الشكل مسطحة من الاعلى الى الاسفل راس المثلث عند الحافة الخلفية وقاعدته مشرفة نحو عنق اللوح . لها وجهان وعرف فالوجه العلوي مقعر يدخل في تكوين الحفرة فوق الشوكة وترتبط به بعض العضلة فوق الشوكة . والوجه السفلي يدخل في تكوين الحفرة تحت الشوكة وترتبط به بعض العضلة تحت الشوكة . والعرف هو الحافة الخلفية للشوكة له شفتان عليا وسفلى ترتبط بالعليا المربعة المنخرقة وبالسفلى الذالية

والتواخري بارز من طرف الشوكة الى الوحشية والمقدم موضوع اعلى الحفرة العنابية والى الوراء منها تتكون منه قمة الكتف " وهو منضغط من الاعلى الى الاسفل . وجهه العلوي خشن تندغم به بعض الياف الذالية والسفلى مقعر املس . حافته الوحشية غلظية غير منتظمة ترتبط بها الذالية . وحافته الانسية ترتبط بها بعض المربعة المنخرقة وعند منتصفها سطح صغير بيضي الشكل يتصل بالطرف اللوحي للترقوة . ويرتبط بقمة الرباط الغرابي الاخري والحوافي ثلاث عليا ووحشية وانسية . فالحافة العليا اقصرها وارقبها وهي مقعرة وممعدة من الزاوية العليا الى التواخري . وعند طرفها الوحشي شرم هلالى غائر تكوّن بعضه قاعدة التواخري . يقال للشرم المذكور الشرم فوق اللوح ويتحوّل الى ثقب بواسطة الرباط المستعرض فيمر منه العصب فوق اللوح وترتبط بقربه في الحافة العليا العضلة الكتفية اللامية . والحافة الوحشية وهي الابطية اغلظ الحوافي الثلاث تبدأ من الحافة السفلى للحفرة العنابية في الاعلى وتنتهي


الثاني والسابع ومنه يتكوّن الجزء الخلفي للكنف. له وجهان مقدم وخلفي وثلاث حوافٍ وثلاث زوايا وتوان الاخري والغراي

فالوجه المقدم وهو البطن مقعر تتكوّن من هذا التعيير حفرة كبيرة تعرف بالحفرة تحت اللوح. ويشاهد عليه خطوط بارزة متجهة نحو الاعلى والوحشية ترتبط بالخلابا التي بينها الياف العضلة تحت اللوح وبالخطوط اوتارها المقاطعة لاليافها. ويفصل هذا الوجه عن الحافة الخلفية سطحٌ مثلث املس عند الزاوية العليا ومثلثه عند الزاوية السفلى متصلان بواسطة حرف ضيق ترتبط بجميع المساحة المذكورة العضلة المسننة الكبيرة

شكل ٥٩



شكل ٥٨



والوجه الخلفي وهو الظهر محدب من الاعلى الى الاسفل مقسوم بواسطة الشوكة الى قسمين غير متساويين هما الحفرة فوق الشوكة والحفرة تحت الشوكة. فالحفرة فوق الشوكة اصغرهما مقعرة ملساء ترتبط بثلاثيها الانسيين العضلة فوق الشوكة. والحفرة تحت الشوكة اكبر جداً من سابقتها وعليها عند مركزها تحديب بارز يقابل تقعر البطن. ترتبط بالارباع الثلاثة الانسية

شكل ٥٨ الوجه المقدم اللوح الايسر ١ او ١ خطوط مخرفة مقاطعة للحفرة تحت اللوح ٢ قسم من الوجه غير منغول بالعضلة تحت اللوح ٣ الحافة العليا ٤ الزاوية العليا ٥ الشرم فوق اللوح ٦ التواء الغراي ٧ التواء الاخري ٨ الشوكة ٩ السطح المنفصلي الذي يتصل بالترقوة ١٠ الحفرة العنابية ١١ رأس اللوح وهو الزاوية المقدّمة ١٢ عنق اللوح ١٣ الحافة السفلى وهي الابضية ١٤ الزاوية السفلى ١٥ الحافة الخلفية وهي الفترية ١٦ بروز يشير الى منشا الشوكة

شكل ٥٩ الوجه الخلفي اللوح الايسر ١ الحفرة فوق الشوكة ٢ الحفرة تحت الشوكة ٣ الحافة العليا ٤ الشرم فوق الشوكة ٥ الحافة الابضية ٦ رأس اللوح والحفرة العنابية ٧ الزاوية السفلى ٨ عنق اللوح وعند الرقم منشا الرأس الطويل لثلاثية الروس ٩ الحافة الفترية ١٠ الشوكة ١١ السطح الثالث الذي ينزلق عليه وتر المربعة المخرفة ١٢ التواء الاخري ١٣ احد الثقوب الغذائية ١٤ التواء الغراي

الوضع مشرف الى الخلف نحو اصل العنق تحته من الاعلى الحافة العليا ومن الاسفل الحافة السفلى ويشاهد نحو منتصفه الثقب الذي ينفذ منه الشريان الغذائي للعظم. والوجه السفلي تحته من المقدم الحافة المقدمة ومن الخلف الحافة السفلى وهو ممتد من الوجه السفلي للقسم الوحشي. يشاهد عليه عند الطرف القصي سطح مفصلي للاتصال بغضروف الضلع الاول والى الوحشية من ذلك اثر خشن طوله نحو قيراط يرتبط به الرباط الضلعي الترقوي وما بقي من هذا الوجه مشغول بميزاب طولي ترتبط به العضلة تحت الترقوة

الطرف الانسي للترقوة وهو القصي مثلث الشكل عليه سطح مفصلي يتصل بالقص. ومحيط السطح المذكور خشن ترتبط به اربطة كثيرة ويخاط به السطح الذي يتصل بغضروف الضلع الاول

والطرف الوحشي وهو الاخرى عليه سطح مفصلي متجه نحو الاسفل والانسية يتصل بالتو الاخرى للوح. ومن الاتجاه المذكور لهذا السطح يتأى ان خلع الطرف الوحشي للترقوة يكون غالباً على التو الاخرى لانه. ومحيط هذا السطح خشن ولا سيما من الاعلى لارتباط الرباطين الاخرين الترقوين

والترقوة اقل انحناءً واكثر ملاسةً وادق في الاناث منها في الذكور. وهي اغلظ واقصر واخشن واكثر انحناءً في الذين يتعاطون الاعمال الشاقة بايديم وفي الجانب الايمن منها في الايسر

بناءها من النسيج الشبكي مغطى بطبقة سميكة من النسيج المندمج ولا سيما عند منتصفها تتعظم بنقطتين واحدة للجسم واحدة للطرف القصي. وتظهر نقطة الجسم قبل جميع العظام وذلك نحو الاسبوع الخامس. وتظهر نقطة الطرف القصي بين السنة الثامنة عشرة والعشرين ثم تتحد الطرف بالجسم بعد ذلك بوضع سنين

انصاها المفصلي بالقص واللوح وغضروف الضلع الاول ترتبط بها العضلة القصية الترقوية الحلمية والمربعة المنخرقة والصدرية الكبيرة والذالية والعضلة تحت الترقوة والقصية اللامية

اللوح

اللوح عظم كبير مسطح مثلث الشكل موضوع على الوجه الخلفي والجانبى للصدر بين الضلع

العلوي والجذع ومؤلف من عظيمين الترقوة واللوح

الترقوة

الترقوة عظم طويل منحني على هيئة السين الافرنجية موضوع وضعاً عرضياً في القسم العلوي والمقدم للصدر اعلى الضلع الاول ويتكوّن منه الجزء المقدم للكتف. تتصل من طرفها الانسي بالحافة العليا للقص ومن طرفها الوحشي بالتواخري للوح. وعليها تحديدان احدهما انسي مشرف نحو المقدم والثاني وحشي مشرف نحو الخلف. ثلثها الوحشي مسطح من الاعلى الى الاسفل ممتد في الوضع الطبيعي للعظم من التواغراي الى الاخرم وثلاثاها الانسيان شكلهما اسطواني ممتدان من القص الى التواغراي للوح

فالقسم الوحشي وهو ثلث العظم مسطح من الاعلى الى الاسفل فيكون له وجهان علوي وسفلي وحافتان مقدمة وخلفية. فالوجه العلوي خشن ترتبط به الذالية من المقدم والمربعة المنحرفة من الخلف. والوجه السفلي مسطح وعلى حافته الخلفية عند اتصال القسم الانسي بالقسم الوحشي ارتفاع خشن هو الحدة المخروطية التي تعلو التواغراي ويرتبط بها الرباط المخروطي. ويمتد من الحدة المذكورة خط او انخفاض منحرف نحو المقدم والوحشية هو الخط المنحرف الذي يرتبط به الرباط المربع المنحرف. الحافة المقدمة مقعرة خشنة تحد ارتباط الذالية. والحافة الخلفية محدبة خشنة تحد ارتباط المربعة المنحرفة

شكل ٥٧



والقسم الانسي وهو ثلثا العظم اسطواني الشكل محدب من الامام مقعر من الخلف. عليه ثلاث حواف مقدمة وعليا وخلفية تقسمه الى ثلاثة وجوه مقدم وخلفي وسفلي. فالوجه المقدم واقع بين الحافة العليا والحافة المقدمة. وهو املس محدب في الجهة الوحشية لا يغطيه الا الجلد. وما بقي منه الى الانسية مقسوم الى خلاء مقدم اهليلجي الشكل خشن ترتبط به الصدرية الكبيرة والى جزء علوي خشن من الورا ترتبط به القصية الترقوية الحلمية. والوجه الخلفي املس عمودي

شكل ٥٧ الوجه العلوي والوجه المقدم للترقوة اليمنى ١ الطرف النقي ٢ السطح الذي يتصل بفضوف الضلع الاول و٢٠ الخلاء الاهليلجي الذي ترتبط به الصدرية الكبيرة ٤ الطرف الاخرى ٥ السطح الذي يتصل بالتواخري ٦ الحافة التي تحد ارتباط الذالية ٧ والحافة التي تحد ارتباط المربعة المنحرفة ٨ الخط الذي ترتبط به القصية الترقوية الحلمية

في الغضاريف الضلعية

الغضاريف الضلعية ابنية بيضاء اللون تزيد طول الاضلاع نحو مقدم الصدر وتعين كثيراً في لدونة الفص الصدري. عددها كالأضلاع وتتصل السبعة العليا منها بالقص والثلاثة التي أسفلها بغضروف الضلع السابع والآخران سايجان بين عضلات البطن. ويزيد طولها من الغضروف الأول إلى السابع ثم يتناقص إلى الأخير ويتناقص عرضها وعرض الأضلاع التي بينها من الأول إلى الأخير. ويختلف اتجاهها فالأول ينزل قليلاً والثاني أفقي وما بقي صاعد. لكل منها طرفان أحدهما متصل بالضلع والثاني متصل بالقص إلى الغضروف السابع والأطراف الأنسية للغضروف الثامن والتاسع والعاشر مستدقة متصلة بالغضروف السابع والطرفان الأنسيان للغضروف الحادي عشر والثاني عشر سائبان مستدقان. وأكثر لدونها مدة الشباب فانها في الشيخوخة يصفر لونها وتصلب وقد تتعظم ترتبط بها العضلة تحت الترقوة والقصبة الدرقية والصدرية الكبيرة والمنخرقة الباطنة والمستعرضة والمستقيمة البطنية والحجاب والمثلثة القصية والعضلات الظاهرة والباطنة بين الاضلاع

في الاطراف

الاطراف اضافات عظيمة مفصلية طويلة متصلة من طرفها الواحد بالجذع سائبة في ما بقي منها. وهي اربعة زوج علوي يقال له الصدري لانه متصل بالصدر بواسطة الكتف معظم منفعته المس والقبض وزوج سفلي متصل بالحوض منفعته حمل الجسد والحركة الانتقالية. وهذان الزوجان مركبان على صورة واحدة بحيث يحصل من ذلك مشابهة شديدة بينهما من وجوه ويختلفان من وجوه اخرى تبعاً للوظائف الخاصة بكل منهما

في الطرفين العلويين

الطرف العلوي مؤلف من ثلاثة اقسام وهي العضد والساعد واليد ويتصل بالجذع بواسطة الكتف الذي هو بمنزلة العظم المحرقفي في الطرف السفلي


في الكتف وهو المنكب

الكتف موضوع في القسم العلوي والجانب للصدر وهو علاقة الاتصال بين الطرف

الصفات الخاصة لبعض الاضلاع

فالضلع الاول اقصر الاضلاع واكثرها انحناءً وهو عريض مسطح موضوع وضعاً أفقيًا في اعلى الصدر بحيث يشرف وجهاه نحو الاعلى والاسفل وحافته نحو الظاهر والباطن. رأسه صغير وعليه سطح مفصلي غير مقسوم يتصل بالفقرة الظهرية الاولى. والعنق دقيق مستدير. والحذبة غليظة بارزة مستقرة على الحافة الظاهرة. وليس له زاوية والجسم غير ملتو على نفسه. وجهه العلوي عليه انخفاضان خفيفان يفصلها خط بارز نحو المقدم و سطح

شكل ٥٦



خشن نحو الخلف. ترتبط بالخط والسطح المذكورين العضلة الاخعية المقدمة ويستقر على الانخفاض الخلفي الشريان تحت الترقوة وعلى الانخفاض المقدم الوريد تحت الترقوة. وبين الانخفاض الخلفي والحذبة اثر ترتبط به العضلة الاخعية المتوسطة. ووجهه السفلي املس

خال من الميزاب الذي يُشاهد في غيره من الاضلاع. حافته الظاهرة محدبة غليظة وحافته الباطنة مقعرة رقيقة حادة

والضلع الثاني شبيه بالاول الا انه اطول منه ووجهه الظاهر محدب مشرف نحو الاعلى و قليلاً الى الظاهر عليه ارتفاع خشن ترتبط به بعض المسننة الكبيرة

والضلع العاشر على رأسه سطح واحد مفصلي. والحادي عشر والثاني عشر لهما سطح واحد ايضاً كبير الحجم. وليس لهما عنق وحذبة. وللحادي عشر زاوية قليلة الواضوح وميزاب قليل الغور في حافته السفلى. والثاني عشر خال منها واقصر جداً من الحادي عشر

بناء الاضلاع من النسيج الاسفنجي مغطى بطبقة رقيقة من المندهج

يتعظم كل ضلع بثلاث نقط الا الاخيران واحدة لكل من الجسم والراس والحذبة. ويبدأ التعظم

في اوائل الحيوه ولا يتصل الراس والحذبة بالجسم قبل السنة الخامسة والعشرين ترتبط بها العضلات بين الاضلاع والاشعيات الثلاث المقدمة والمتوسطة والخلفية والصدرية الصغيرة والمسنة الكبيرة والمنحرفة الظاهرة والمستعرضة والقطنية المربعة والحجاب والظهرية العريضة والمسنتان الخلفيتان العليا والسفلى والعجزية القطنية والظهرية الطويلة والعنقية الصاعدة والروافع للاضلاع

شكل ٥٦ الوجه العلوي للضلع الاول الايمن ١ الراس ٢ الحذبة ٣ الحافة الظاهرة ٤ الانخفاض الذي يستقر فيه الشريان تحت الترقوة ٥ الانخفاض الذي يستقر فيه الوريد تحت الترقوة ٦ الطرف المقدم الذي يتصل بالفصوص ٧ الخط الذي ترتبط به العضلة الاخعية المقدمة

السفلى مستديرة. والحذبة موضوعة على الوجه الخلفي للعنق عند اتصاله بالجسم وهي متجهة نحو الخلف وعليها سطح املس صغير بيضي الشكل

شكل ٥٥



يتصل بطرف التواء المستعرض للفقرة السفلى من الفقرتين الظهريتين اللتين يتصل بهما الراس. والى الوحشية من السطح المفصلي المذكور

ارتفاع خشن يرتبط به الرباط الضلعي المستعرض الخلفي. والحذبة اشد بروزاً في الاضلاع العليا منها في السفلى

والجسم جميع ما بقي من الضلع وهو رقيق مسطح له وجهان ظاهر وباطن وحافتان عليا وسفلى. فالوجه الظاهر محدب املس عليه عند مؤخره اي الى مقدم الحذبة خط منحرف الوضع متجه من الاعلى نحو الاسفل والوحشية يرتبط به وتر العضلة العجزية القطنية ويقال له الزاوية. وعند الزاوية ينحني الضلع بحيث اذا وُضع على حافته السفلى يشاهد ان القسم المقدم للجسم مستقر عليها وان القسم الفقري الى وراء الزاوية منحني نحو الباطن ومرتفع نحو الاعلى. والجزء المتوسط بين الحذبة والزاوية يزيد طولاً من الضلع الثاني الى العاشر وترتبط به العضلة الظهرية الطويلة. والوجه الباطن مقعر املس عليه خط يبدأ من الطرف السفلي للرأس شديد البروز الى الزاوية ثم ينحرف بروزه الى ان يغيب بالكلية عند التقاء الثلث المقدم بالثلث المتوسط للجسم. والخلاء الواقع بين الخط المذكور والحافة السفلى منحرف على هيئة ميزاب غائر يستقر فيه الشريان والعصب بين الاضلاع. وترتبط بالحرف العلوي للميزاب العضلة الباطنة بين الاضلاع وبالحرف السفلي الذي هو الحافة السفلى للضلع العضلة الظاهرة بين الاضلاع. والحافة العليا غليظة مستديرة لها شفة ظاهرة وشفة باطنة ترتبط بهما العضلتان الظاهرة والباطنة بين الاضلاع. والحافة السفلى رقيقة حادة ترتبط بهما العضلة الظاهرة بين الاضلاع. والطرف المقدم للضلع وهو النسي محفور لقبول الغضروف الضلعي

الصفات الخاصة لبعض الاضلاع

الاضلاع التي لها صفات خاصة بها خمسة وهي الاول والثاني والعاشر والحادي عشر والثاني عشر


شكل ٥٥ الطرف الفقري للضلع السابع اليمين ١ الزاوية ٢ الحذبة ٣ سطحها المفصلي ٤ العنق ٥ الراس وعليه سطحان مفصليان ٦ السطح الخشن الذي يرتبط به الرباط الضلعي المستعرض المتوسط ٧ العرف الذي يرتبط به الرباط الضلعي المستعرض المقدم ٨ الحافة العليا للجسم ٩ الحافة السفلى ١٠ الميزاب الذي على الوجه الباطن للحافة السفلى

والقصبة المثلثة والمستقيمة البطنية والحجاب وصفاق المنخرفة الظاهرة والمنخرفة الباطنة والمستعرضة

في الاضلاع

الاضلاع اقواس عظمية لدنة ممتدة من اجسام الفقرات الظهرية الى الوحشية والمقدم فيتكوّن

شكل ٥٤



منها معظم جدران الصدر. وهي اثنا عشر من كل جانب. فالسبعة العليا منها تتصل بالفقرات من الخلف وبالقص من المقدم الا انه يتوسط بينها وبين القص الغضاريف الضلعية فيقال للاضلاع المذكورة الصحيحة. ويقال للخمسة الباقية الاضلاع الكاذبة منها ثلاثة تتصل بغضاريف الاضلاع الصحيحة واثنان سائبان من طرفها المقدم فيقال لها السائبان. ويزيد طول الاضلاع من الاول الى الثامن ثم ينقص من الثامن الى الثاني عشر. وينقص عرضها من الاول الى الاخير. ويقال للخلايا الواقعة بينها الخلايا بين الاضلاع وهي اعرض في المقدم منها في الخلف وفي الاعلى منها في الاسفل

الصفات العامة للاضلاع

اكثر ظهور هذه الصفات في الاضلاع المتوسطة وهي ان لكل ضلع طرفين احدهما خلفي او فقري والثاني امامي او قصي وقسماً متوسطاً بينها هو الجسم. وللطرف الخلفي راس وعنق وحدبة فالراس عليه سطح مفصلي مقسوم بواسطة خط افقي الى قسمين يتصلان بالحفرة المكوّنة من اتصال فقرتين ظهريتين ويرتبط بالخط الافقي الرباط المفصلي المتوسط. والعنق مسطح ممتد من الراس الى الوحشية طوله نحو قيراط راکز على التواء المستعرض للفقرة السفلى من الفقرتين اللتين يتصل بهما الراس. وجهه المقدم املس ووجهه الخلفي خشن يرتبط به الرباط الضلعي المستعرض المتوسط. حافته العليا خشنة يرتبط بها الرباط الضلعي المستعرض المقدم وحافته

شكل ٥٤ مقدم الصدر ١ القطعة العليا للقص ٢ القطعة المتوسطة للقص وهي الجسم ٣ القطعة السفلى وهي التواء الخنجرية ٤ الفقرة الظهرية الاولى ٥ الفقرة الظهرية الاخيرة ٦ الضلع الاول ٧ راسه ٨ عنقه مستقراً على التواء المستعرض للفقرة الظهرية الاولى ٩ حدبته ١٠ الضلع السابع ١١ الغضاريف الضلعية للاضلاع الصحيحة ١٢ الضلعان الكاذبان الاخيران وهما السائبان ١٣ الميزاب الذي على الحافة السفلى للضلع

وحافتها السفلى عليها سطح خشن بيضي الشكل تغطيه طبقة غضروفية رقيقة في الحالة الحديثة يتصل بالقطعة المتوسطة. والحافتان الجانبيتان على كلٍ منهما في الاعلى حفرة مفصلية للاتصال بغضروف الضلع الاول وفي الاسفل حفرة صغيرة اذا اتصلت بمثلها في الزاوية العليا للقطعة المتوسطة كوّنت شراً للاتصال بغضروف الضلع الثاني

والقطعة المتوسطة وهي الجسم اطول واضيق وارق من القطعة العليا. ووجهها المقدم عليه ثلاثة خطوط مستعرضة دالة على القطع الاربع التي يتألف منها هذا القسم من النقص في اوائل الحيوة. وعند اتصال القطعة الثالثة بالرابعة يُشاهد احياناً فتحة ثاقبة العظم هي الثقب القصي. ويرتبط بكلٍ من جانبي هذا الوجه المنشأ القصي للصدرية الكبيرة. ووجهها الخلفي مقعر قليلاً عليه اثر الخطوط التي سبق ذكرها وترتبط به الى كل جانب القصية المثلثة. حافتها العليا عليها سطح بيضي الشكل يتصل بالقطعة العليا. وحافتها السفلى ضيقة تتصل بالتواخنجري. والحافتان الجانبيتان على كلٍ منهما في الاعلى حفرة صغيرة تلتقي بمثلها في القطعة العليا للاتصال بغضروف الضلع الثاني ثم اربع حفر للاتصال بغضاريف الضلع الثالث والرابع والخامس والسادس وفي الاسفل حفرة صغيرة تلتقي بمثلها في القطعة السفلى للاتصال بغضروف الضلع السابع والقطعة السفلى وهي التواخنجري اصغر القطع الثلاث. وهي رقيقة مستطيلة غضروفية البناء قبل البلوغ يتعظم اعلاها بعده. ووجهها المقدم يرتبط بكلٍ من جانبيه الرباط الضلعي الخنجري. ووجهها الخلفي يرتبط به بعض الياف الحجاب الحاجز والقصية المثلثة. وحافتها الجانبيتان يرتبط بهما صفاق العضلات البطنية. وتتصل من الاعلى بالقطعة المتوسطة ومن الاسفل سائبة مستدقة يرتبط بها الخط الابيض. وقد يكون الطرف السفلي عريضاً او مفروضاً او مقوّباً او منحرفاً الى احد الجانبين

بناؤه من النسيج الاسفنجي مغطى بطبقة رقيقة من المندمج

يتعظم بست نقط واحدة للقطعة العليا واربع للمتوسطة وواحدة للسفلى. فيكون غضروفياً

الى منتصف الحيوة الجنينية ثم يبدأ التعظم في القطعة العليا بين الشهر الخامس والسادس وفي المتوسطة بين السادس والسنة الاولى بعد الولادة وفي السفلى بين السنة الثانية والثامنة عشرة.

وتتصل القطع بعضها ببعض من زمن البلوغ الى الهرم

اتصاله المفصلي بالترقوتين واربعة عشر غضروفاً للاضلاع

ترتبط به العضلة الصدرية الكبيرة والقصية الحلمية والقصية اللامية والقصية الدرقية

نحو نهاية الحياة الجنينية وفي القرنين الصغيرين بعد الولادة بضع أشهر ترتبط به القصية اللامية والدرقية اللامية والكثفية اللامية وشفاق ذات البطنين والابرية اللامية والضرسية اللامية والذقنية اللامية والذقنية اللامية اللسانية واللامية اللسانية والمعاصرة المتوسطة للبعوم وقد ترتبط به بعض الياف اللسانية. ويرتبط به أيضاً الغشاء الدرقي اللامي والرباط الابري اللامي والدرقي اللامي واللامى المزماري

في الصدر

الصدر قفص عظمي غضروفي يتضمن الآلات الرئيسة للتنفس والدورة. والاجزاء التي تدخل في تأليفه هي القص والغضاريف الضلعية من المقدم والاضلاع من الجانبيين واجسام الفقرات الظهرية من الخلف

القص

القص عظم مسطح ضيق موضوع في الخط المتوسط لمقدم الصدر منحرف الاتجاه نحو الاسفل والمقدم وموَّلف من ثلاث قطع في البالغ. ولما كان شكلاً كما تخبر سموا القطعة شكل ٥٢ العليا النصاب والمتوسطة الجسم والسفلى التواخنجري. وهو مسطح من المقدم مقعر من الخلف عريض من الاعلى ثم يضيق عند اتصال القطعة الاولى بالثانية ثم يفرج قليلاً ثم يستدق عند طرفه السفلي. طوله في البالغ نحو ستة قراريط وهو اطول قليلاً في الذكور منه في الاناث

فالقطعة العليا وهي النصاب عريضة غليظة من الاعلى ضيقة من الاسفل عند اتصالها بالقطعة المتوسطة. وجهها المقدم محدب من الجانب الى الجانب مقعر من الاعلى الى الاسفل امس ترتبط به الى كل من الجانبيين الصدرية الكبيرة والطرف القصي للقصية الحليمية. ووجهها الخلفي مقعر امس ترتبط بكل من جانبيه القصية اللامية والقصية الدرقية. حافظها العليا مقسومة الى ثلاثة شروم غائرة. فالشروم المتوسط يقال له الشروم بين الترقوتين والشروم الجانبيين مشرفان نحو الاعلى والوحشية يتصلان بالترقوتين.



شكل ٥٢ الوجه المقدم للقص ١ القطعة العليا ٢ القطعة المتوسطة ٣ القطعة السفلى وهي التواخنجري ٤ وع الشروم اللذان يتصلان بالترقوتين وبينهما الشروم بين الترقوتين ٥ الحفرة التي تتصل بالضلع الاول ٦ الحفرة التي تتصل بالضلع الثاني ٧ و٩ و١١ الحفر التي تتصل بالاضلاع الخمسة السفلى الصحيحة

اوسع في الامام منه في الخلف وفيه من الامام الفتحة السفلى للقناة الدمعية

العظم اللامي

يُسمى هذا العظم باللامى لان فيه بعض مشابهة للام اليونانية ويقال له اللساني ايضاً لانه حامل للسان ولان العضلات اللسانية مرتبطة به. شكله كقوس وهو مؤلف من خمس قطع جسم وقرنان عظيمان وقرنان صغيران

فالجسم هو الجزء المتوسط. وجهة المقدم محدب يقسمه الى قسمين خط عمودي واقع في الخلف المتوسط ويقاطع هذا الخلف خط افقي بحيث يتم من ذلك اربع حفر عضلية. وعند ملتقى الخطين ارتفاع يُقال له حدة العظم اللامي. ترتبط بمعظم هذا الوجه

شكل ٥٢



الذقنية اللامية وباعلاه الذقنية اللامية اللسانية وباسفله الضرسية اللامية والابرية اللامية وشفق ذات البطنين وبما بينهما بعض اللامية اللسانية. والوجه الخلفي امس متعر يفصله عن لسان

المزمار الغشاء الدرقي اللامي ونسيج خلوي. الحافة العليا مستديرة يرتبط بها الغشاء الدرقي اللامي وبعض الذقنية اللامية اللسانية. والحافة السفلى ترتبط بها من الامام التصنية اللامية ومن الخلف بعض الدرقية اللامية وعند اتصالها بالقرن العظيم الكتفية اللامية. والوجهان الجانبيان حفرتان صغيرتان يضيئتا الشكل تتصلان بالقرنين العظيمين

والقرنان العظيمان يبرزان الى الخلف من الوجهين الجانبيين للجسم مسطحان من الانسية الى الوحشية ينتهيان الى الخلف مجدبة يرتبط بها الرباط الدرقي اللامي. ترتبط بوجهها الوحشي من كل جانب اللامية اللسانية وبخافتها العليا العاصرة المتوسطة للبعوم وبخافتها السفلى بعض الدرقية اللامية


والقرنان الصغيران ارتفاعان صغيران مخروطا الشكل تتصل قاعدة كل منهما بزاوية الاتحاد بين الجسم والقرنين العظيمين ويرتبط براسيها الرباط الابري اللامي. في مدة الشباب تتصل القرون بالجسم بواسطة وجوه غضروفية وفي الكهولة يتصل القرنان العظيمان بالجسم على الغالب وفي الشيخوخة تُحد جميع القطع فتصير عظاماً واحداً

يتعظم بخمس نقط واحدة للجسم وواحدة لكل قرن. ويبدأ التعظم في الجسم والقرنين العظيمين

شكل ٥٢ الوجه المقدم للعظم اللامي ١ الخلف العمودي الذي يقسمه الى قسمين ٢ القرن العظيم الايسر ٣ القرن الصغير. العظم الذي أخذت منه هذه الصورة ممتدة جميع قطعها فصارت عظاماً واحداً

العلوي والشوكة الانفية الخلفية. والجدار الانسي ويقال له الحاجر ايضاً فاصل رقيق عمودي الوضع يفصل الحفرة الانفية الواحدة عن الاخرى. وقد يكون مثقوباً احياناً فتتواصل الحفرتان وكثيراً ما يكون منحرفاً من الخط العمودي الى احد الجانبين. يكونه من الامام عرف العظمين الانفيين والشوكة الانفية للجبهى ومن الوسط الصفيحة العمودية للمصفوي ومن الخلف الميكة ومنقار الوتدي ومن الاسفل عرف الفك العلوي والحنكي. ويشاهد على هذا الجدار من الامام شرم كبير مثلث الشكل يقبل الغضروف المثلث للانف ومن الاعلى الفتحات السفلى للقنوات الشمية

شكل ٥١



ومن الخلف الحافة الخلفية السائبة للميكة. والجدار الوحشي يكونه من الامام التتوالانفي للفك العلوي والعظم الدمعي ومن الوسط المصفوي والوجه الانسي للفك العلوي وللقربنيين السفليين ومن الخلف الصفيحة العمودية للحنكي. ويشاهد على الوجه الباطن لهذا الجدار ثلاث قنوات طويلة غير منتظمة تسمى اصححة موضوعة بين ثلاث صفايح عظمية بارزة من الجدار المذكور. فالصااخ العلوي اصغرهما وضعه في الجزء

العلوي والخلفي لكل من الحفرتين الانفيتين شاغل للثلث الخلفي من الجدار الوحشي واقع بين القربني العلوي والقربني المتوسط المصفويين وفيه فتحتان احداها الوتدية الحنكية في الجزء الخلفي لجداره الوحشي والثانية فتحة الاخلية المصفوية الخلفية في الجزء المقدم للجدار العلوي. والصااخ المتوسط موضوع بين القربني المتوسط والقربني السفلي شاغل للثلثين الخلفيين للجدار الوحشي. وفيه فتحتان احداها الى الامام وهي فتحة القمع التي توصل الصااخ المتوسط بالاخلية المصفوية الامامية ثم بالجيب الجبهى. وعند مركز الجدار الوحشي الفتحة الثانية وهي فتحة كهف هيمور. والصااخ السفلي اكبرها وضعه بين القربني السفلي وارض الانف. يمتد على جميع طول الجدار الوحشي للانف وهو

شكل ٥١ قطع طولي لاحدى الحفرتين الانفيتين وقد رفع الفاصل لاطهار الجدار الوحشي للحفرة اليسرى ١ العظم الجبهى ٢ العظم الانفي ٣ عرف الديك ٤ الصفيحة الغريبالية المصفوي ٥ بعض الاخلية المصفوية ٦ التسم القاعدي للوتدي ٧ و٧ السطح المنفصل للتتوالانخي من العظم الفك العلوي ٨ الشوكة الانفية المقدمة ٩ الحافة الانسية للصفيحة الحنكية من العظم الحنكي ١٠ القربني العلوي للمصفوي ١١ الصااخ العلوي ١٢ الفتحة الخلفية للخلايا المصفوية ١٣ فتحة الخلايا الوتدية الى الصااخ العلوي ١٤ الثقب الوتدي الحنكي ١٥ القربني المتوسط المصفوي ١٦ و١٧ الصااخ المتوسط ١٨ ميل نافذ من فتحة القمع المستطرفة الى الجيب الجبهى والاخلية المصفوية المقدمة ١٩ القربني السفلي ٢٠ و٢١ الصااخ السفلي ٢٢ و٢٣ الصااخ السفلي ٢٤ و٢٥ من القناة الانفية مظهرها اتجاهها ٢٦ الصفيحة الانسية الجناحية ٢٧ نوحها الكلاوي ٢٨ الصفيحة الجناحية الوحشية ٢٩ قاعدتها ٣٠ الثقب الحنكي الخلفي ٣١ سقف الحاجج الايسر ٣٢ الثقب البصري ٣٣ ميزاب الشريان السباتي ٣٤ السرج التركي ٣٥ التتوالسريري الخلفي

انخفاض ترتبط به العضلة المنخرقة السفلى وبقرّب منتصفها الميزاب تحت الحجاج. والجدار الانسي
مكوّن من التتوالانفي للفك العلويّ والدمعيّ والعظم المسطح للمصفويّ وجزء صغير من جسم
الوتدي. وعليه الميزاب الدمعيّ والعرف الدمعيّ. والجدار الوحشيّ مكوّن الى المقدم من الصفيحة
الحجاجية للوجنيّ والى الخلف من الحجاج الكبير للوتدي. وتستطرق الى التجويف الحجاجيّ تسع
فتحات هي الثقب البصريّ لمرور العصب البصريّ والشريان العينيّ. والفرجة الوتدية لمرور
العصب الثالث والرابع والسادس والقسم العينيّ من الخامس والوريد العينيّ. والفرجة الوتدية
الفكية لمرور العصب الفكيّ العلويّ وهو القسم الثاني من الخامس والشريان تحت الحجاج. والقناة
تحت الحجاج لمرور الشريان تحت الحجاج ومعظم العصب الفكيّ العلويّ. والثقبان الوجيهان
لمرور خيوط من الفرع الحجاجيّ للعصب الفكيّ العلويّ وهذان الثقبان واقعان في الصفيحة الحجاجية
للعظم الوجنيّ. والثقبان المصفويان الواقعان بين العظم المسطح للمصفويّ والعظم الجبهيّ يمرّ من
المقدم منها العصب الانفيّ والشريان المصفويّ المقدم ومن الخلفيّ الشريان المصفويّ الخلفيّ.
والقناة الانفية لمرور القناة الدمعية. وثقب فوق الحجاج لمرور شريان وعصب فوق الحجاج

في الحفرتين الانفيتين

الحفرتان الانفيتان تجويفان كبيران غير منتظمين موضوعان في الخط المتوسط للوجه ممتدان
من قاعدة الخوذة الى سقف الفم منفصلان بواسطة حاجز رقيق عموديّ الوضع. لكلّ منهما
فتحتان مقدمة مستطرفة الى مقدم الوجه وخلفية مستطرفة الى البعوم. وتستطرق ايضاً
كلّ منهما الى اربعة تجاويف وهي الحجاج بواسطة القناة الدمعية والفم بواسطة القناة الحنكية
المقدمة والخوذة بواسطة الثقوب الشمية والحفرة الوتدية الفكية بواسطة الثقب الوتدي الحنكيّ.
وهاتان الحفرتان مكوّنتان من خمسة عشر عظماً هي الجبهيّ والوتديّ والمصفويّ من عظام
الخوذة وجميع عظام الوجه الا الوجنيّ والفك السفليّ. لكلّ حفرة منها قبوة وارض وجداران
فالقبوة طويلة ضيقة يكوّنها من الامام العظام الانفيان والشوكة الانفية للجبهيّ ومن
الوسط الصفيحة الغربالية للمصفويّ ومن الخلف الوجه السفليّ لجسم الوتديّ والعظم الاسفنجي
الوتديّ. والارض مقعرة من الجانب الى الجانب واوسع في الوسط منها في الطرفين. يكوّنها من
الامام التتوالانسي للفك العلويّ ومن الخلف الصفيحة الافقية للعظم الحنكيّ. يشاهد على هذا الوجه
من الامام الى الخلف الشوكة الانفية المقدمة. والى الخلف منها الفتحة العليا للقناة الحنكية المقدمة.
والى الانسية العرف المرتفع الذي يتصل بالميكعة. والى الخلف الدرز الواقع بين الحنكيّ والفك

وعند الثالث الانسي لهذه الحافة شرم فوق المحجاج لمروراوعية وعصب بهذا الاسم والى الانسية منه انخفاض خفيف لارتباط البكرة الغضروفية التي تمر منها العضلة المنحرفة العليا للعين . ثم تحت الحافة المذكورة فتحة التجويف المحجاجي التي يجدها من الوحشية الخط المحجاجي للوجني ومن الاسفل هذا الخط والفك العلوي ومن الانسية التتوالانفي للفك العلوي والتتوالمحجاجي الانسي للجبهوي .

شكل ٥ .



والى الوحشية من المحجاج الوجه المقدم للوجني . والى الاسفل من الحافة السفلى للمحجاج في الفك العلوي ثقب تحت المحجاج وتحت الحفرة النابية التي تندغم بها الرافعة لزاوية الفم . وتحت الحفرة التتوان السخنيان للفكين . وتحت القوس السخي للفك السفلي الثقب الذقني والخط المنحرف الظاهر والفم الذي عند الزاوية لمرور الشريان الوجي

في التجويفين المحجاجيين

التجويفان المحجاجيان موضوعان في القسم العلوي والمقدم من الوجه تشغلهما المقلتان والعضلات والاوعية والاعصاب الخاصة بهما والغدتان الدمعيتان . كل منهما على هيئة مخروط اجوف محوره المركزي متجه نحو الوحشية وموآف من سبعة عظام الجبهوي والتوندي والمصنوي والفك العلوي والوجني والدمعي والحنكي غير انه لما كانت ثلاثة منها مفردة تدخل في تكوين المحجاجيين فيكون عدد العظام الداخلة في تكوينها احد عشر . لكل منهما سقف وارض وجداران انسي ووحشي . فالسقف مكوّن الى المقدم من الصفيحة المحجاجية للجبهوي والى الخلف من الجناح الصغير للتوندي . وعليه من الانسية الانخفاض الذي ترتبط به بكرة المنحرفة العليا للعين ومن الوحشية الانخفاض الذي تستقر فيه الغدة الدمعية . والارض معظمها مكوّن من الصفيحة المحجاجية للفك العلوي وما بقي من الوجني والحنكي . وعليها في جزئها المقدم والانسي الى الوحشية من القناة الدمعية

شكل ٥ . مقدم الجبمية ١ القسم الجبهوي للعظم الجبهوي ٢ الارتفاع الانفي ٣ الحافة العليا للمحجاج ٤ الثقب البصري ٥ الفرجة التودية ٦ الفرجة التودية الفكية ٧ بداية القناة الانفية ٨ الميكة الفاصلة بين الحفرتين الانفيين ٩ الثقب تحت المحجاج ١٠ العظم الوجني ١١ الارتفاع الذقني ١٢ الثقب الذقني ١٣ فرع الفك السفلي ١٤ العظم الجداري ١٥ الدرزاكليلي ١٦ العظم الصدغي ١٧ الدرزاكليلي ١٨ الجزء العلوي للجناح الكبير التوندي ١٩ بداية الخط الصدغي ٢٠ التتوالزوجي للصدغي الذي يدخل في تكوين القوس الزوجي ٢١ التتوالجولي

تتصل بالفرجة الجناحية الفكية على زاوية قائمة. ويمرّ من الفرجة المذكورة العصب الفكي العلوي والشريان تحت الحجاج وفروع صاعدة من عقدة ميكل والفرجة الجناحية الفكية عمودية الوضع نازلة على زاوية قائمة من الطرف الانسي لسابقتها. وهي مكونة من انفراج الفك العلوي عن التتو الجناحي للوتدي وفائدتها انها استطراق بين الحفرة الوتدية الفكية والحفرة الزوجية وتمرّ منها فروع من الشريان الفكي الباطن واما الحفرة الوتدية الفكية فصغيرة مثلثة الشكل موضوعة عند زاوية اتصال الفرجة الوتدية الفكية بالفرجة الجناحية الفكية اسفل قمة التجويف الحجاجي. وهي مكونة الى الاعلى من الوجه السفلي للوتدي وإلى المقدم من الفك العلوي وإلى الخلف من التتو الجناحي للوتدي وإلى الانسية من الصفيحة العمودية للعظم الحنكي. يستطرق اليها الثقب المستدير الذي يمرّ منه القسم الثاني من العصب الخامس

في الجهة المقدمة للجمجمة

هذا القسم من اقسام الجمجمة يكون الوجه. وهو يبضي الشكل غير منتظم السطح موضوع فيه آلة البصر والة الشم. بجده من الاعلى الارتفاعان الانفيان والحافتان العلويتان للحجاج ومن الاسفل البروز الذقني ومن كل جانب العظم الوجني والحافة المقدمة لفرع الفك السفلي. ويشاهد على الخط المتوسط من الاعلى الى الاسفل القوسان الحاجبيان اللذان يشيران الى وضع الجيبين الجبهيين. وتحتها القوس الانفي المكوّن من العظمين الانفيين والتوين الانفيين للفك العلوي. وتحت القوس المذكور فتحة قلبية الشكل طرفها الضيق للاعلى وطرفها الواسع للاسفل هي فتحة الحفرتين الانفيتين المقدمتين التي يرتبط بحافتيها الغضروفان الجانبيان للانف. وعلى الخط المتوسط من الاسفل لهذه الفتحة الشوكة الانفية المقدمة يجدها من كل جانب شرم عميق. وإلى الاسفل من الشوكة المذكورة الدرز بين الفكين الى كل جانب منه الحفرة التي فوق الاسنان القواطع والتي تندغم بها الحافضة لجناح الانف. وتحت هذه الحفرة التتوان السنخيان للفك العلوي والسفلي اللذان تستقر فيهما الاسنان القواطع. وفي الطرف السفلي للخط المتوسط الارتفاع الذقني الذي تحده من كل جانب الحفرة التي تحت القواطع والتي ترتبط بها الرافعة للذقن واخيراً البروز الذقني

ومن الاعلى الى الاسفل الى كل من الجانبيين اولاً الحافة العليا للحجاج التي تنتهي من الوحشية في التتو الحجاجي الوحشي عند اتصاله بالعظم الوجني ومن الانسية في التتو الحجاجي الانسي.

الكلام على العظم المؤخري

في الجهة الجانبية للجمجمة

الجهة الجانبية للجمجمة مثلثة الشكل يكون قاعدتها خط ممتد من التواخج الوحشي للجبي على الخط الصدغي الى الطرف الوحشي للخط المنحني العلوي المؤخري. ويكون الجانبين خط ممتد من التواخج الوحشي للجبي الى زاوية الفك السفلي وخط اخر ممتد من الزاوية المذكورة الى الطرف الوحشي للخط المنحني العلوي المؤخري. ونقسم هذه الجهة الى ثلاثة اقسام صدغي وحلي وزوجي

فالحفرة الصدغية يحدها من الاعلى والخلف الخط الصدغي ومن الامام هذا الخط ايضاً والحافة الخلفية للعظم الوجي ومن الظاهر القوس الزوجي ومن الاسفل الخط الجناحي الذي على الوجه الظاهر للجناح الكبير الوتدي. وهذه الحفرة مقعرة من الامام محدبة من الخلف عليها ثلوم تمر فيها فروع الشريان الصدغي الغائر وتما لها العضلة الصدغية والقسم الحلي. يحده من الامام الاصل المقدم للتو الزوجي ومن الاعلى خط يمر من الاصل الخلفي للتو الزوجي الى طرف الدرز الحلي الجداري ومن الخلف والاسفل الدرز الحلي المؤخري. ويشاهد عليه من الخلف الى الامام الثقب الحلي والتواخج والفتحة السبعية الظاهرة التي يحيطها التو السبعي والحفرة العنابية التي يحدها من الامام الارتفاع المفصلي ومن الخلف التو الغدي


والحفرة الزوجية غير منتظمة الشكل وضعها تحت القوس الزوجي والى الانسية منه. يحدها من الامام حدبة الفك العلوي والخط النازل من تنوء الوجي ومن الخلف الحافة الخلفية للتو الجناحي ومن الاعلى الخط الجناحي الذي على الوجه الظاهر للجناح الكبير والقسم التشري للصدغي ومن الاسفل الحافة السخية للفك العلوي ومن الانسية الصفيحة الوحشية للتو الجناحي ومن الوحشية التو الزوجي وفرع الفك السفلي. وفي هذه الحفرة الجزء السفلي للعضلة الصدغية والجناحيتان الانسية والوحشية والشريان الفكي الباطن والعصب الفكي السفلي وفروعها. ويشاهد في جزءها العلوي والانسي فرجتان هما الوتدية الفكية والجناحية الفكية

فالفرجة الوتدية الفكية افقية الوضع مستطرفة الى الجزء الوحشي والخلفي لتجويف الجناح. وهي مكونة في الاعلى من الحافة السفلى للوجه الجناحي من الجناح الكبير وفي الاسفل من الحافة الوحشية للصفيحة الجناحية من الفك العلوي والى الوحشية من العظم الوجي والى الانسية

الراسيتين الاماميتين الكبرى والصغرى. وعند قاعدة الصفيحة الوحشية للتو الجناحي الثقب البيضي والى الخلف منه الثقب الشوكي ثم التتو الشوكي للوتدي الذي يرتبط به الرباط الانسي الجانبي للفك السفلي والراخية للطلبة. والى الوحشية من التتو الشوكي الحفرة العناية التي تقسمها فرجة كلاسير يوس الى قسمين يتصل القسم الامامي بالتتو اللقي للفك السفلي والقسم الخلفي تستقر عليه بعض الغدة النكفية. ويبرز من بين الصفيحتين للتتو الغدي الحجري للتتو الابري الذي عند قاعدته الثقب الابري الحلبي الخارج منه العصب الوجهي والداخل اليه الشريان الابري الحلبي. والى الوحشية من الثقب الابري الحلبي الفرجة الاذنية لمرور الفرع الاذني للعصب الرئوي المعدي. والى الجانب الانسي للتتو الحلبي الحفرة ذات البطنين والى الانسية من ذلك الميزاب الذي يمر فيه الشريان المؤخري. وعند قاعدة الصفيحة الانسية للتتو الجناحي فتحة كبيرة مثلثة الشكل هي الثقب الممزق المتوسط الذي يحدّه من الامام الجناح الكبير للوتدي ومن الخلف قمة القسم الحجري للصدغي ومن الانسية جسم الوتدي والتتو القاعدي للمؤخري والثقب المذكور مسدود بمادة غضروفية. والى مقدم هذا الثقب الفتحة الخلفية لقناة قديان والى الوحشية من الدرز الحجري الوتدي الذي عند طرفه الوحشي تشاهد فتحة قناة اوستاكيوس. والى الخلف من هذا الدرز الوجه السفلي للجزء الحجري عليه من الانسية الى الوحشية السطح المربع الجوانب الخشن الذي ترتبط ببعضه الرافعة للهاة والشادة للطلبة والى الوحشية من هذا السطح فتحة القناة السباتية وفتحة قناة التوقعة. والى الخلف من القناة السباتية فتحة كبيرة هي الحفرة الوداجية مكونة من الجزء الحجري للامام ومن المؤخري للخلف ومنقسمة الى قسمين يمر من المقدم منها وهو الاصغر العصب الثامن ومن الخلفي الوريد الوداجي الباطن وفروع شريانية. وعلى الخط البارز العظمي الفاصل بين القناة السباتية والحفرة الوداجية الثقب الصغير لمرور عصب الطلبة وعلى الجدار الوحشي للثقب الوداجي بقرب اصل التتو الابري الفتحة الصغيرة التي يمر منها عصب ارنولد. والى الخلف من الوجه القاعدي للمؤخري الثقب العظيم يحدّه من الجانبيين التتوان المقيان وهما خشنان من الانسية لاجل ارتباط الرباطين الناييين ومنها الى الوحشية سطح خشن هو التتو الوداجي ترتبط به الراسية المستقيمة الجانبية. والى جانب هذين التتوين للامام الحفرة اللقمية الامامية فيها الثقب اللقي الامامي لمرور عصب تحت اللسان. والى الخلف من التتوين الثقبان المقيان الخلفيان وقد لا يوجد الا واحد يمر منها ويريد للجيب الجانبي. والى الخلف من الثقب العظيم العرف المؤخري الظاهر الذي ينتهي من الاعلى في الحدة المؤخرية والى كل جانب منه الخيطان المتخيان ترتبط بها وبالسطح الذي بينها عضلات مر ذكرها في

مقعرة مثقوبة ثقوباً كثيرة وعليها تقاير للغدد الحنكية يقاطعها تدرج صليبي يشير الى العظام الاربعية التي تتألف القبة منها. وعند مؤخر القبة الى الوحشية الثقب الحنكي الخلفي الذي تمر منه الاوعية التي بهذا الاسم والعصب الحنكي الامامي. ويمر من هذا الثقب الى الامام والانسية ميزاب تستقر فيه الاوعية المذكورة. والى الخلف منه

شكل ٤٩



الحدبة الحنكية للعظم الحنكي مثقوبة ثقباً واحداً واكثر تمر منه الاوعية الاضافية الحنكية الخلفية. وعلى الحافة الخلفية للحنك خط عرضي متجه الى الانسية يندغم به وتر الشادة للهاء. ويبرز الى الخلف من مركز الحافة المذكورة الشوكة الانفية الخلفية التي ترتبط بها العضلة الغلصمية. والى الخلف والاعلى من الحنك الصلب الفتحة الخلفية للانف تنقسم الميكة الى قسمين كل قسم منها طولاً الى الجهة العمودية نحو قيراط وعرضه نصف ذلك وعند قاعدة الميكة جناحاهما المنفرجان اللذان يدخل بينهما مفار الوتدي. ويقرب كل حافة

جانبية للميكة عند اصل التو الجناحي القناة الجناحية الحنكية. وعند قاعدة هذا التوقناة قد يان. كل تو منها مؤلف من صفيحتين تنقسمان عند الطرف المقدم لقبول حدبة الحنكي وتفصلها من الخلف حفرة تستقر فيها الجناحية الانسية. الصفيحة الانسية طويلة ضيقة على الوجه الوحشي لقاعدتها الحفرة الزورقية التي ترتبط بها الشادة للهاء وعند طرفها التو الكلاي الذي تدور عليه العضلة المذكورة. والصفيحة الوحشية عريضة تكون الحد الانسي للحفرة الزوجية وترتبط بها الجناحية الوحشية

والى الخلف من الحفرتين الانفيتين في الخط المتوسط الوجه القاعدي للمؤخري على مركزه الشوكة الغلصمية التي ترتبط بها العاصرة العليا للبلعوم والى كل جانب منها تقعران لاندغام


شكل ٤٩ الوجه الظاهر وهو السفلي لقاعدة الجمجمة ١ الحنك وهو قبة الفم ٢ والحرقم موضوع على التو الحنكي للفك العلوي ٣ الحفرة الحنكية المتقدمة ٤ الصفيحة الانفية للعظم الحنكي والثقب الذي الى بين الرقم هو ثقب القناة الحنكية الخلفية ٥ الشوكة الانفية الخلفية. والخط المنحني هو الخط المستعرض ٦ الميكة الفاصلة بين التختين الانفيتين الخلفيتين ٧ الصفيحة الانسية الجناحية ٨ الحفرة الزورقية ٩ الصفيحة الوحشية الجناحية. والحفرة التي بين ٦ و ٨ هي الحفرة الجناحية ٩ الحفرة الزوجية ١٠ التو القاعدي للمؤخري ١١ الثقب العظيم ١٢ الثقب البضي ١٣ الثقب الشوكي ١٤ الحفرة العنابية ١٥ القناة السعوية الظاهرة ١٦ الثقب المنزق المتوسط ١٧ ثقب القناة السباتية ١٨ الثقب المنزق الخلفي وهو الوداجي ١٩ الثقب الابرسي الحلي ٢٠ التو الخلفي ٢١ التو القاعدي للمؤخري ٢٢ الحفرة التلمية الخلفية

والحفرة الخلفية اكبر الحفر الثلاث متعرة جداً واقعة على مساحة اوطى من الحفرتين السابقتين مكونة من المؤخري والقسم الحجري والقسم الحلي للصدغي والزاوية الخلفية السفلى للجداري . يمر فيها ثلاثة دروز وهي الحجري المؤخري والحلي المؤخري والحلي الجداري ويستقر عليها الخنج وجسر فارولوبوس والنخاع المستطيل . ويفصلها عن الحفرة المتوسطة في الخط المتوسط الدرز الناعدي ومن الجانبين الحافة العليا للقسم الحجري التي تندغم بها خيمة الخنج وعليها من الوحشية ميزاب يستقر فيه الجيب الحجري العلوي وعند طرفها الانسي شرم يستقر عليه العصب الخامس . ويحد محيطها من الخلف ميزابا الجيبين الجانبيين . واما الاجزاء التي تشاهد في هذه الحفرة فهي اولاً في مركزها الثقب العظيم المؤخري والى كل من جانبيه حدة خشنة يرتبط بها الرباط النابي والى الاعلى منها الفتحان الباطنتان للثقبين اللقبين الامامين . ثم الى مقدم الثقب العظيم التواءناعي الذي يسند النخاع المستطيل وجسر فارولوبوس ويتصل من جانبه بالقسم الحجري فيتكوّن من ذلك الدرز الحجري المؤخري الذي نصفه المقدم محفور لاستقرار الجيب الحجري السفلي ويزاحمه من نصفه الخلفي الثقب الممزق الخلفي وهو الثقب الوداجي . وكان هذا الثقب الوداجي منقسم الى قسمين يمر من القسم الخلفي وهو الاكبر الوريد الوداجي ومن القسم المقدم العصب الثامن . والى الاعلى من الثقب الوداجي الثقب الباطن السمعي يمر منه العصب السمي والعصب الوجهي والشريان السمي . والى الورا والوحشية من ذلك الفرجة التي تذهب الى قناة الدهليز وما بين الثقب الباطن السمي والفرجة المذكورة انخفاض صغير مثلث تستقر عليه زائدة من الام الجافية . والى الورا من الثقب العظيم الحفرتان المؤخريتان السفليتان اللتان يستقر عليهما الفصان الجانبيان للخنج يفصلهما العرف المؤخري الباطن الذي يندغم بجافتيه منجل الخنج ويستقر فيه الجيب المؤخري . ويعلوها تين الحفرتين الميزابان المستعرضان للجيبين الجانبيين

واما الوجه الظاهر لقاعدة الجمجمة فغير منتظم بحدّه من الامام الاسنان القواطع للفكين العلويين ومن الخلف الخطان المنحنيان العلويان للمؤخري ومن الجانبين القوس السنخي والحافة السفلى للوجني والقوس الزوجي وخط وهي يمتد منه الى التواء الحلي . ويشاهد على هذا الوجه الى الخلف من الاسنان القواطع الحفرة المقدمة الحنكية وفي قعر هذه الحفرة يشاهد غالباً اربع فتحات فتحان جانبيتان تذهبان الى ارض الانف تمرّ منها الاوعية الحنكية المقدمة وفتحان في الخط المتوسط يمرّ منها العصبان الانفيان الحنكيان وقد لا توجدان او تشتركان . والقبوة الحنكية

والى كل من جانبي السرج التركي الميزاب الكهفي الذي يبدأ من الخلف عند الثقب الممزق المتوسط وينتهي عند الجهة الانسية للتو السريري المقدم ويستقر فيه الجيب الكهفي والشريان السباتي

شكل ٤٨



الباطن والاعصاب المحجاجة. وجانباً الحفرة عيقان عليها نقاعير وارتفاعات لمقابلة الدماغ وتلوم لمرور فروع الشريان السحائي المتوسط الذي يخرج من الثقب الشوكي وينقسم الى فرع امامي وفرع خلفي. وتشاهد في هذه الحفرة الثقوب الاتي ذكرها معدودة من الامام الى الخلف اولاً الثقب الممزق الامامي وهو الفرجة الوندية التي يكونها من الاعلى الجناح الصغير للوندي ومن الاسفل الجناح الكبير ومن الانسية جسم الوندي ومن الوحشية الصفيحة المحجاجة للجيمي ويمر منها العصب الثالث والرابع والقسم العيني من الخامس

والسادس والوريد العيني. ثم الى الطرف الانسي والى الخلف من هذه الفرجة الثقب المستدير يمر منه القسم الثاني للعصب الخامس. ثم الى الخلف من هذا الثقب ثقب فيساليوس يمر منه وريد صغير. ثم الى الخلف والوحشية من ثقب فيساليوس الثقب البيضي يمر منه القسم الثالث للعصب الخامس والشريان السحائي الصغير والعصب الحجري الصغير. ثم الى الوحشية من الثقب البيضي الثقب الشوكي الذي يمر منه الشريان السحائي المتوسط. ثم الى الانسية من الثقب البيضي أيضاً الثقب الممزق المتوسط. ويشاهد على الوجه المقدم للقسم الحجري من الصدغي من الوحشية الى الانسية الارتفاع الناتج عن بروز القناة الهلالية العليا ثم الميزاب الذي يذهب الى فتحة فلوپوس التي يمر منها الفرع الحجري لعصب فديان ثم عند راس العظم المذكور التغير الذي تستقر عليه عقدة كاسيريوس ثم فتحة القناة السباتية التي يمر منها الشريان السباتي الباطن والصفيرة العصبية السباتية

شكل ٤٨ الوجه الباطن وهو الدماغي لقاعدة الجمجمة ١ الحفرة المقدمة والرقم موضوع على الصفيحة المحجاجة للجيمي ٢ الجناح الصغير ٣ عرف الديك ٤ الثقب الاعور ٥ الصفيحة الغرابالية للصفوي ٦ التوازيتوني ٧ الثقب البصري ٨ التوازيتوني المقدم ٩ الميزاب الكهفي الواقع الى جانب السرج التركي ١٠ والحفرة المتوسطة ١١ الجناح الكبير ١٢ القسم القنري للصدغي ١٣ القسم الحولي للصدغي ١٤ السرج التركي ١٥ القسم القاعدية الوندي والمؤخري ١٥ الثقب المستدير ١٦ الثقب البيضي ١٧ الثقب الشوكي ١٨ الحفرة الخلفية التي يستقر عليها الخنج ١٩ و٢٠ ميزاب الجيب الجاني ٢١ الخط الذي يندغم به النجل الشعبي ٢٢ الثقب العظم ٢٣ القناة السمعية الباطنة ٢٤ الثقب الوداجي

الميزاب نقاعير لقبول اجسام پاكيونوس والى الخلف الفتحان الباطنتان للثقبين الجداريين
في قاعدة الجمجمة

هي الجزء السفلي للجمجمة ولها وجهان باطن وظاهر

فالوجه الباطن ويقال له الدماغى ايضا عليه الى كل من جانبيه ثلاث حفر تُسمى

حفر الخوذة مقدمة ومتوسطة وخلفية

فالحفرة المقدمة مكونة من الصفيحة الحجاجية للجبهة والصفيحة الغربالية للصفوي والتو
المصفوي والجنج الصغير للموتدي. وهي اعلى الحفر الثلاث يستقر عليها الفص المقدم للسخ. عليها في
الخط المتوسط من الامام الى الخلف بداءة الميزاب الذي يستقر فيه الجيب الطولي العلوي
والعرف الذي يندغم به منجل الخ والتقب الاعور المكون من الجهي وعرف الديك للمصفوي
الذي يمر منه اذا كان مفتوحا ويريد صغير من الانف الى الجيب الطولي العلوي. والى الخلف من
الثقب الاعور عرف الديك الذي يرتبط به منجل الخ. والى كل من جانبي عرف الديك الميزاب
الذي يسند بصلة العصب الشهي وعليه ثلاثة صفوف ثقب ترم منها فروع العصب المذكور
والى الامام منه فرجة ضيقة يمر منها الفرع الانفي للعصب العيني. والى الخلف من كل ذلك على
الخط المتوسط الشوكة المصفوية للموتدي فاصلة بين ميزابين طويلين يسندان العصيين
الشبيين. والى جانبي الحفرة ارتفاعات وانخفاضات تقابل تلافيف الدماغ وميازيب تستقر فيها
الشرايين السحائية المقدمة

والحفرة المتوسطة اعتمق من السابقة ضيقة في الوسط ثم تسع اذا انفجرت نحو الجانب .
يحدّها من الامام الحافة الخلفية للجنج الصغير والتو السريري المقدم والحافة المقدمة للميزاب
البصري ومن الخلف القسم الحجرى للصدغي والدرز القاعدية . ومن الوحشية القسم القشري
للصدغي والزاوية المقدمة السفلى للجداري . وعليها في الخط المتوسط من الامام الى الخلف الميزاب
البصري الذي يسند الجبع البصري والى كل من جانبيه الثقب البصري المار منه العصب
البصري والشريان العيني . والى الخلف من هذا الميزاب التوازيتوني وعلى جانبيه التتوان
السريريان المقدمان اللذان ترتبط بهما ثنيات الأم الجافية التي يتكون منها الجيبان الكهفيان .
ويفصل هذه الحفرة عن رفيقتها من الجانب المخالف السرج التركي وهو انخفاض عميق يستقر
فيه الجسم النخامي ويحدّه الى الامام من كل جانب التتوان السريري المتوسط والى الخلف صفيحة
يعلو زاويتها العلويتين التتوان السريريان الخلفيان واسفلها شرم يمر منه العصب السادس .

انصال القسم القشري للصدغي بالقسم المتوسط من الحافة السفلى للجداري بحيث تركب حافة
القسم القشري حافة الجداري. والدرز الحلي الجداري غليظ مسنن يوصل الزاوية الخلفية السفلى
للجداري بالحافة العليا من القسم الحلي للصدغي

ودروز قاعدة الجحمة خمسة احدها مركبة والاخرى جانبية. فالمرکزي هو القاعدي
المكوّن من اتصال الوجه المقدم للتو القاعدي الموّخري بالوجه الخلفي لجسم الوتدي.
والانصال المذكور غرضوني في اوائل الحيوة ثم يصير بعد البلوغ عظيماً لا ينفك. والدروز
التي الى كل من جانبيه اربعة هي الحجري الموّخري والحلي الموّخري والحجري الوتدي
والقشري الوتدي تُعلم من اسمائها العظام التي تدخل في تاليفها وجميعها قليل الاهمية
واما دروز الوجه فكثيرة وليس لها اسماء خاصة بها الا واحد يقال له المستعرض يمتد من
التو الحجاجي الوحشي للجبهى الى التو الاخر الذي يقابله. وهو عبارة عن خط الاتصال بين
الجبهى من الاعلى والوجني والوتدي والمصفوي والدمعي والفك العلوي والانفي من الاسفل
الى كل من جانبي الخط المتوسط

كلام كلي في الجحمة

تقسم الجحمة على وجه كلي الى خمسة اقسام قسم علوي هو القمة وقسم سفلي هو القاعدة
وقسمان جانبيان وقسم مقدم هو الوجه

في قمة الجحمة

قمة الجحمة وهو قسمها العلوي لها وجه ظاهر ووجه باطن. فالوجه الظاهر محدب بحدّه من
الامام القوسان الحاجبيان ومن الخلف الحدبة الموخرية والحيطان المنخيان العلويان ومن
الجانبين خط وهي ممتد من الطرف الوحشي للخط المنخني العلوي على الخط الصدغي الى التو
الحجاجي الوحشي للجبهى. ويحتوي هذا السطح الجزء العمودي للجبهى ومعظم الجداريين والثالث
العلوي للموخري. وهو بيضي الشكل يقاطعه عرضاً الدرزا الكلي وطولاً الدرز السهمي الذي
ينتهي من الخلف باللامى. ويشاهد عليه من الامام الارتفاع الجبهى واثر الدرز الجبهى ومن
الجانبين الثقبان الجداريان والارتفاعان الجداريان ومن الخلف السطح الاملس المحدب للموخري.
والوجه الباطن مقعر عليه ارتفاعات وانخفاضات لمقابلة تلافيف المخ وتلوم تستقر فيها فروع
الشرايين السحائية. وعلى الخط المتوسط ميزاب ضيق من الامام ينتهي في العرف الجبهى واسع
من الخلف يستقر فيه الجيب الطولي العلوي ويندغم بمخالفته منخيل المخ. والى كل من جانبي

في الارتفاق الذقني. وتتصل القطعتان في السنة الأولى بعد الولادة. تنبيه. هذا العظم يصغر حجمه جداً في الشيوخ لأنه إذا سقطت الأسنان يفتى مع الزمان الجزء السنخي من المضغ فلا يبقى إلا الجزء القاعدي وهو ما دون الخط المنحرف فيصير الثقب الذقني والثناة السنوية الناهبة منه بقرب الحافة السنخية وينحرف اتجاه الفرعين فتتفرج الزاوية المكوّنة من ملتقاهما بالجسم اتصاله المنفصلي بالحفرتين العنابيتين للعظمين الصدغيين

ترتبط بوجهه الظاهر من الارتفاق الذقني إلى الورا الرافعة للذقن والخافضة للشفة السفلى والخافضة لزاوية الفم والجلدية والمبوقة والمضغية. وبوجهه الباطن من الارتفاق إلى الورا الذقنية اللامية اللسانية والذقنية اللامية والضرسية اللامية وذات البطنين والعاصرة العليا والصدغية والجناحيتان الانسية والوحشية

في الدروز


تتصل عظام الجمجمة بعضها ببعض من حوافها بواسطة تسنّات يقال لخطوط الاتصال دروز. غير أن التسنن المذكور واقع في الصفيحة الظاهرة دون الباطنة التي إنما يكون اتصالها على سبيل مجاورة الحوافي. وتنقسم دروز الخوذة إلى ثلاثة مجاميع هي دروز قمة الجمجمة ودروز جانبها ودروز قاعدتها

فدروز قمة الجمجمة ثلاثة سهمي واكليلي ولامي. الدرز السهمي وهو الجداري مكوّن من اتصال العظمين الجداريين وممتد من منتصف العظم الجبهي إلى الخلف حتى الزاوية العليا للعظم المؤخري. وأما في الأطفال فيمتد إلى جذر الأنف فاصلاً العظم الجبهي إلى شطرين وقد يدوم الفصل المذكور مدة الحياة. والدرز الاكليلي وهو الجبهي الجداري ممتد عرضاً على قمة الجمجمة يوصل العظم الجبهي بالعظمين الجداريين. يبدأ من طرف الجناح الكبير للوتدي خلف التنق المحجّاجي الوحشي للجبهي بنحو قيراط وينتهي في ما يقابل ذلك على الجانب المخالف. والدرز اللامي وهو المؤخري الجداري يشبه اللام اليونانية Δ ويوصل المؤخرية بالجداريين. والقسم المحلي للعظم الصدغي يحدّ طرفيه الجانبيين

ودروز جانب الجمجمة ثلاثة أيضاً هي أقسام درز واحد مكوّن من اتصال الحافة السفلى للجداري بالصدغي والوتدي ممتد من الطرف السفلي للدرز اللامي إلى الطرف السفلي للدرز الاكليلي. فالدرز الوتدي الجداري خط الاتصال بين الجداري وطرف الجناح الكبير للوتدي طولاً نحو نصف قيراط وقد لا يوجد. والدرز التشري الجداري قوسي الشكل مكوّن من

خطوط بارزة تندغم بمعظم سطحه العضلة المضغية . وجهه الباطن عليه عند نحو مركزه الفتحة المنحرفة للقناة السنية السفلى تمرّ منها اوعية وعصب بهذا الاسم الى الاسنان السفلى وحافة هذه الفتحة غير منتظمة عليها من الامام خط بارز تعلوه شوكة حادة يندغم بها الرباط الجانبي الانسي للفك السفلي ومن الاسفل والخلف شرم يخرج منه الميزاب الضرسى اللامي تمرّ فيه اوعية وعصب

شكل ٤٧



بهذا الاسم . والى الخلف من الميزاب سطح خشن تندغم به الجناحية الانسية . حافته العليا رقيقة عليها تتوان يفصلهما الشرم السيني . التتوالمقدم هو التتوالمقاري والتتو الخلفي هو التتو اللقي . فالتتوالمقاري رقيق مسطح مثلث الشكل معظم فائدته ارتباط الصدغية به . وجهه الوحشي املس تندغم به المضغية والصدغية . وجهه الانسي ترتبط به الصدغية وعليه بداءة خط طولي ينتهي في الجهة الخلفية

للتتو السنجي . والى الوحشية من هذا الخط ميزاب عميق يمتد الى الوحشية والاسفل من التتو السنجي يرتبط بهذا الخط وبعض الميزاب من الاعلى المضغية ومن الاسفل المبوقة . والتتو اللقي اقصر واغاط من المقاري مؤلف من عنق لقيمة وعنق . فالعقدة القيمة مستطيلة قطرها الطويل من الجانب الواحد الى الاخر محدبة من الامام الى الخلف ومن الجانب الى الجانب تتصل بالحفرة العنابية للصدغي . والعنق مسطح من الامام الى الخلف . حافته الجانبيتان ضيقتان على الوحشية منها حدة لاندغام الرباط الجانبي الوحشي . وجهه الخلفي محدب . وجهه المقدم محفور الى الانسية ترتبط بالحفرة المذكورة الجناحية الوحشية . والحافة السفلى للفرع استدامة الحافة السفلى للجسم من ملتقاها تتكوّن زاوية الفك وعليها من كل جانب خطوط منحرفة خشنة ترتبط بها من الانسية الجناحية الانسية ومن الوحشية المضغية وبها بين ذلك الرباط الابري الفكي . والحافة المقدمه استدامة الخط المنحرف الظاهر . والحافة الخلفية غليظة مستديرة ملساء تغطيها الغدة النكفية . والشرم السيني الفاصل بين التتوين انخفاض هلالى الشكل يمرّ منه الشريان والعصب المضغيان

يتعظم في الجبين بعد الترقوة وذلك على الارحج بنقطتين واحدة لكل قطعة جانبية تلتقيان

شكل ٤٧ الفك السفلي ١ الجسم ٢ الفرع ٣ الارتفاق الذقني ٤ الحفرة التي تندغم بها العضلة الرافعة للذقن ٥ الثقب الذقني ٦ الخط المنحرف الظاهر ٧ الميزاب الذي يمرّ فيه الشريان الوجهي ٨ زاوية الفك ٩ طرف الخط المنحرف الباطن وهو الضرسى اللامي ١٠ التتوالمقاري ١١ التتو اللقي ١٢ الشرم السيني ١٣ الثقب السني السفلي ١٤ الميزاب الضرسى اللامي ١٥ التتو السنجي ١ سنان قاطعان من كل جانب C الثاب B الضرسان الصغيران M الاضراس الثلاثة الكبيرة

الفك السفلي

الفك السفلي أكبر وأقوى عظام الوجه حامل للأسنان السفلى . وهو مؤلف من جزء أفقي
منحنٍ يُسمى بالجسم وجزئين عموديين يسميان بالفرعين يتحدان بالجسم من الخلف على زاوية
يقرب من القائمة

فالجسم محدب منحنٍ هلالى الشكل له وجهان ظاهر وباطن وحافتان عليا وسفلى .
فالوجه الظاهر عليه في الخط المتوسط خط عمودي هو الارتفاق الذقني ممتد من الحافة العليا
الى الحافة السفلى ويشير الى نقطة اتحاد بين القطعتين المؤلفين العظم منها في الاصل . وينتهي هذا
الخط من الاسفل بحدبة بارزة مثلثة هي التتو الذقني . والى كل جانب منه تحت جذور الاسنان
القواطع حفرة تندغم بها الرافعة للذقن والى الوحشية منها الثقب الذقني الذي يمر منه العصب
والشريان الذقنيان وضعه تحت جذر الضرس الثاني ذي الحدين . ويذهب من قاعدة التتو
الذقني نحو الوحشية خط بارز هو الخط المنحرف الظاهر لانه في مسيره يتجه نحو الاعلى والخلف
الى ان يخلط بالحافة المقدمة للفرع تندغم به الخافضة للشفة السفلى والخافضة لزاوية الفم وبما
دونه العضلة الجلدية . والوجه الباطن مقعر من الجانب الى الجانب عليه في الخط المتوسط اثر
خط غائر يقابل الخط البارز في الوجه الظاهر . الى جانبي هذا الخط وتحت مركزه اربع حديبات
اثنان علويتان واثنان سفليتان تُسمى بالذقنية ترتبط بالعلويتين الذقنيتان اللسانيتان
وبالسفليتين الذقنيتان اللاميتان وقد تخلط هذه الحديبات بعضها ببعض . والى كل جانب
من الحديبات المذكورة حفرة بيضية الشكل تستقر فيها الغدة تحت اللسان . وتحت الحفرة اثر
خشن يرتبط به البطن المقدم لذات البطنين والى الخلف منها يبدأ الخط المنحرف الباطن سائراً
الى الوحشية والاعلى وهذا الخط والخط المنحرف الظاهر الذي مر ذكره يقسمان الجسم الى قسم
سفلي وقسم قاعدي . ترتبط بجميع طولها الضرسية اللامية وبما فوقه من طرفه الخلفي بقرب الحافة
السفحية العضلة العاصرة العليا والقسم الذي اعلى الخط املس يغطيه الغشاء المخاطي للفم والقسم الذي
اسفله عليه انخفاض مستطيل واسع من الجهة الخلفية تستقر فيه الغدة تحت الفك . الحافة العليا
للجسم ويقال لها السفحية اعلاظ في الخلف منها في الامام فيها حفر لسته عشر سناً . والحافة السفلى
مستديرة واعلاظ في الامام منها في الخلف . عليها عند اتحاد الجسم بالفرع ميزاب قليل الغور
يرفاه الشريان الوجهي

والفرع مربع الجوانب له وجهان واربع حوافٍ وتوان . فالوجه الظاهر مسطح عليه

يتعظم بنقطة واحدة تظهر نحو منتصف الحيوة الجنينية


اتصاله المنفصلي بعظم من الخوذة هو المصفوي وثلاثة من الوجه الفك العلوي والدمعي

والحنكي

الميكعة

الميكعة عظم مفرد موضوع وضعاً عمودياً في مؤخر الحفرتين الانفيتين فيكون بعض الفاصل الانفي . وهو رقيق فيه بعض مشابهة لسكة الحراث ومنها اسمه عند المشرحين الافرنج وضعه في الخط المتوسط ولكنه يميل غالباً الى احد الجانبين . له وجهان واربع حواف . فالوجهان الجانبيان املسان عليهما ثلوم للاوعية الدموية وميزاب يكون احياناً قناة ينحدر بانحراف الى الاسفل والامام الى الدرزين الفكين متوسطاً بين القناتين الاماميتين الحنكيتين يرفيه العصب

شكل ٤٦



الانفي الحنكي . الحافة العليا اغلظها عليها ميزاب عميق يحدّه من كل جانب جناح بارز الى الافقية . فيدخل في الميزاب منقار الوتدي ويدخل الجناحان تحت الصفيحين اللتين تبرزان من الوجه السفلي لجسم الوتدي

عند قاعدة التوين الجناحيين . والحافة السفلى اطولها تتصل من الامام بالميزاب المكوّن من ملتقى التوين الحنكيين للفكين العلويين ومن الخلف بالعظمين الحنكيين . والنصف العلوي للحافة المقدمة مؤلف على الغالب من صفيحين تدخل بينهما الصفيحة العمودية للمصفوي ونصفها السفلي يتحد بالغضروف المثلث للانف . والحافة الخلفية قصيرة غليظة مفروضة من الاعلى رقيقة من الاسفل سائبة تفصل الحفرتين الانفيتين من الخلف

يتعظم بنقطة واحدة تظهر عند بداءة تعظم الفقرات

اتصاله المنفصلي بستة عظام اثنين من الخوذة الوتدي والمصفوي واربعة من الوجه الفكين

العلويين والحنكيين وبغضروف الانف

شكل ٤٦ الوجه الايسر للميكعة ١ حافتها العليا وجناحها ٢ حافتها السفلى ٣ حافتها الخلفية ٤ والنصف العلوي للحافة المقدمة الذي يتصل بالصفيحة العمودية للمصفوي ٥ والنصف السفلي للحافة المقدمة الذي يتصل بالغضروف المثلث الانفي ٦ ارتفاع يدل على انفصال العظم الى صفيحين كما يشاهد من ٤ الى ٥

ترتبط به العضلة الشادة للهاء والغصصية والجناحيتان الانسية والوحشية

القرينيان السفليان

القرينيان السفليان صفيحتان رقيقتان اسفجيتان موضوعتان واحدة الى كل جانب في الجدار الوحشي للفتحتين الانفيتين ممتدة افقياً من الامام الى الخلف اسفل فتحة الكهف فاصلة بين الصماخ السفلي والصماخ المتوسط. شكل كلٍ منهما ملتوي على نفسه كرقٍ ولذلك سميا بالقرينيين. لكلٍ منهما وجهان وحافتان وطرفان

شكل ٤٥



شكل ٤٤



فالوجه الانسي محدد مثقوب ثقوباً كثيرة تقاطعه طولاً ميازيب وقنوات لمرور شرايين واوردة يغطيها الغشاء المبطن للانف. - والوجه الوحشي مقعر يكون بعض الصماخ السفلي. حافته العليا رقيقة غير منتظمة متصلة بعظام الجدار الوحشي للحفرة الانفية وتقسّم الى ثلاثة اقسام. فالقسم المقدم يتصل بالعرف القريني السفلي للفك العلوي. والخلفي بالعرف القريني السفلي للحنكي. والمتوسط عليه ثلاثة نتوءات الدمعي والمصفوي والفكي. فالنتوء الدمعي اصغرها موضوع الى مقدمها بارز عند ملتقى الربع المقدم بما بقي من هذه الحافة ويتصل بالزاوية المقدمة السفلى للعظم الدمعي وبالميازيب الواقعة في مؤخر التتوالفكي للفك العلوي فيعين في تكوين القناة الدمعية. والتتوالمصفوي بارز الى الاعلى من منتصف الحافة ويتصل بالنتوء الكلاي للعظم المصفوي. والتتوالفكي صفيحة رقيقة منحنية نحو الاسفل والوحشية بارزة من الحافة السفلى للتتوالمصفوي تثبت العظم بالجدار الوحشي للحفرة الانفية. والحافة السفلى سائبة غليظة خلوية البناء. والطرفان ضيقان مستدقان. اذا مسك هذا العظم بحيث يكون وجهه الوحشي المقعر نحو الماسك وحافته العليا نحو الاعلى كان اتجاه التتوالمصفوي نحو الجانب الذي يختص به العظم

شكل ٤٤ الوجه الوحشي للقريني السفلي الايمن ١ الطرف المقدم الذي يتصل بالعرف القريني السفلي للفك العلوي ٢ الطرف الخلفي الذي يتصل بالعرف القريني السفلي للعظم الحنكي ٣ التتوالفكي الذي يستقر على الحافة السفلى لفتحة الكهف ٤ الحافة السفلى السائبة

شكل ٤٥ الوجه الانسي للقريني السفلي الايمن ١ الوجه الانسي ٢ و٣ قناة لمرور شريان ٤ الحافة الخلفية ٥ والحافة السفلى ٦ الطرف المقدم ٧ الطرف الخلفي ٨ زاوية عليا ٩ التتوالمصفوي ١٠ التتوالمصفوي ١١ قسم من التتوالمصفوي يتصل بالعظم المصفوي ١٢ فتحة مستطرفة الى الكهف

العظم الحنكي

منها اوعية وعصب عظيم بهذا الاسم . حافته المقدمة رقيقة غير منتظمة عليها حذاء العرف القربني السفلي صفيحة بارزة الى المقدم هي التتو الفكي الذي يسد الجزء السنلي والحلني لفتحة الكف . وحافته الخلفية عليها ميزاب غائر مسنن الحرفين للاتصال بالتتو الجناحي للوتدي . وعند اسفل هذه الحافة تتوهرمي يدخل في الخلاء الذي عند الطرف السنلي للصفينيين الجناحيين من العظم الوتدي . وحافته السفلى ممتدة بالصفيحة الافقية . وحافته العليا مؤلفة من نتوين يفصلها شرم او ثقب يقال للتتو المقدم وهو الاكبر والاعلى التتو الحجاجي والحلني التتو الوتدي فالتتو الحجاجي متجه الى الاعلى والوحشية شكلة كهرم مقلوب قاعدته الى الاعلى ورأسه الى

شكل ٤٢



الاسفل يتصل بالصفيحة العمودية . وله خمسة سطوح اثنان هما العلوي والوحشي سائبان والثلاثة الباقية مفصلية . فالسطح العلوي يكون الزاوية الخلفية لارض الحجاج والوحشي مشرف نحو الحفرة الوتدية الفكية والمقدم يتصل بالفك العلوي والانسي بالكتلة الجنابية للمصفوي والحلني بالعظم الاسفنجي الوتدي . والتتو الوتدي بارز من القسم الخلفي للصفيحة العمودية منح نحو الاعلى والانسية . سطحه العلوي وهو الوحشي ملاس للعظم الاسفنجي الوتدي ولقاعدة الصفيحة الجناحية الانسية ومحفور

فيدخل في تكوين القناة الجناحية الحنكية . وسطحه السنلي وهو الانسي يكون بعض الجدار الوحشي للحفرة الانفية . وعند قاعدته سطح ثالث متجه نحو المقدم والوحشية مشرف على الحفرة الوتدية الفكية . والطرف الانسي للتتو ملاس لجناح الميكة

والثقب الوتدي الحنكي مكون من الشرم الغائر الفاصل بين التتو الحجاجي والتتو الوتدي ويكملة من الاعلى العظم الاسفنجي الوتدي . وهو مستطرق من الحفرة الوتدية الفكية الى موخر الصباخ العلوي وتر منه الاعصاب الانسية من عقدة ميكل والفرع الانفي من الشريان الفكي الباطن

يتعظم بنقطة واحدة عند زاوية التقاء الصفيحين

اتصاله المنفصلي بستة عظام الوتدي والمصفوي والفك العلوي والتربني السنلي والميكة

ورقيقه الحنكي

شكل ٤٢ الوجه الظاهر للصفيحة العمودية من العظم الحنكي الابن ١ السطح الخشن الذي يتصل بالفك العلوي ٢ القناة الحنكية الخلفية التي تكملها حدة الفك العلوي والتتو الجناحي . والسطح الخشن الذي الى يسار القناة يتصل بالصفيحة الجناحية الانسية ٣ الثقب الوتدي الحنكي ٤ و ٧ التتو الحجاجي ٢ التتو الوتدي ٨ التتو الهرمي وهو الحدة الجناحية

افقية سفلى وصفيحة عمودية عليا

فالصفيحة الافقية غليظة مربعة الجوانب لها وجهان واربع حواف . فالوجه العلوي مقعر من الجانب الى الجانب يكون مؤخر ارض التجويف الانفي . والوجه السفلي خشن يكون مؤخر سقف الفم وعليه يقرب حافته الخلفية خط مستعرض يرتبط به صفاق الشادة للهاء . والى الطرف الوحشي من هذا الخط ميزاب غائر تحول من اتصاله بمجذبة الفك العلوي الى قناة هي القناة الحنكية الخلفية . ويقرب الميزاب قد يشاهد ثقب او ثقبان مستطرقان الى قناتين صغيرتين هما القناتان الحنكيتان الخلفيتان الاضافيتان . الحافة المقدمة مسننة تتصل بالثنى الحنكي للفك العلوي . والحافة الخلفية سائبة ترتبط بها اللهاة طرفها الانسي مستدق اذا انصل العظام الحنكيتان تكون من ذلك تنو بارز هو الشوكة الانفية الخلفية التي ترتبط بها العضلة الغلصمية . والحافة الوحشية متحدة بالصفيحة العمودية على زاوية تقرب من القائمة . والحافة الانسية تتصل برقيقتهما من الجانب المخالف حرفها العلوي مرتفع اذا انصل برقيقه صار عرقاً يتصل بالميكعة

والصفيحة العمودية رقيقة مستطيلة متجهة الى الاعلى وقليلاً الى الانسية . لها وجهان واربع حواف . فالوجه الانسي عليه في الاسفل انخفاض عريض قليل الغور يكون الجزء الخلفي

شكل ٤٢




للسماخ الانفي السفلي . والى الاعلى منه خط بارز هو العرف القربني السفلي الذي يتصل بالبعظ القربني السفلي . والى الاعلى من العرف انخفاض اخر يكون بعض الصماخ المتوسط . ويعلو ذلك عرف اقل بروزاً من العرف السفلي يتصل بالقربني المتوسط . والى الاعلى منه ميزاب ضيق افقي يكون بعض الصماخ العلوي . والوجه الوحشي معظمه خشن يتصل بالوجه الباطن للفك العلوي وهو املس عند جزءه العلوي والخلفي فيدخل في

تكوين الحفرة الزوجية واملس ايضاً عند مقدمه حيث يغطي فتحة الكهف . وعند مؤخر هذا الوجه ميزاب غائر اذا انصل بالفك العلوي تحول الى قناة هي القناة الحنكية الخلفية التي تمر

شكل ٤٢ العظم الحنكي الامين من الخلف وقد انحرف قليلاً لاجل اظهار الوجه الباطن للصفيحة العمودية ١ الوجه العلوي وهو الانفي الصفيحة الافقية ٢ الوجه الباطن وهو الانفي للصفيحة العمودية ٣ التنورمري ٤ الحافة الانسية للصفيحة الافقية التي تتصل برقيقتهما فيتكون العرف الذي يتصل بالميكعة ٥ التنور الذي يتكون منه ومن رقيقته الشوكة الانفية الخلفية ٦ العرف الذي يتصل بالقربني السفلي والتعبير الذي اسفله يدخل في تكوين الصماخ السفلي والذي اعلاه في تكوين الصماخ المتوسط ٧ الثقب التودي الجناحي واسفله العرف الذي يتصل بالقربني المتوسط ٨ والتنور الجناحي ٩ قسم من التنورمري يدخل في تكوين الحفرة الجناحية ١١ قسم اخر منه يتصل بالصفيحة الجناحية الانسية

بالجناح الكبير للوتدي فيتكوّن منها الجدار الوحشي للحجاج . سطحه السفلي املس محدب يكون

شكل ٤١



بعض الحفرة الصدغية . حافته المقدمة ملساء مستديرة
تكوّن بعض محيط الحجاج . حافته العليا خشنة افقية تتصل
بالعظم الجبهي وراء التوائحجاجي الوحشي . حافته الخلفية
خشنة مسننة تتصل بالوتدي ومن الانسية تتصل بالوجه
الحجاجي للفك العلوي . وعند زاوية الاتصال بين القسم
الوتدي والقسم الفكي العلوي حافة سائبة مستديرة قصيرة
هي الحد المقدم للفرجة الوتدية الفكية وقد لا توجد .
ويشاهد على الوجه العلوي للتوائحجاجي ثقب واثنان احدها

يستطرق الى الوجه الخلفي والاخر الى الوجني تمرّ منها خيوط من العصب الفكي العلوي .
والتوائفكي خشن مثلث الشكل يتصل بالفك العلوي . والتتو الزوجي طويل ضيق مسنن
يتصل بالتتو الزوجي للعظم الصدغي . وحوافيه اربع عليا وسفلى ومقدمة وخلفية . فالحافة
العليا وهي الحجاجية ملساء قوسية الشكل يتكوّن منها قسم عظيم من محيط الحجاج . والسفلى وهي
الزوجية متصلة بالحافة السفلى للقوس الزوجي وترتبط بها بعض الياف العضلة المضغية . والحافة
المقدمة وهي الفكية خشنة تتصل بالفك العلوي وترتبط بها عند اتصالها بالفك الرافعة للشفة
العليا . والحافة الخلفية وهي الصدغية منحنية متصلة من الاعلى ببداية الخط الصدغي ومن الاسفل
بالحافة العليا للقوس الزوجي وترتبط بها اللقافة الصدغية

يتعظم بنقطة واحدة نحو مدة تعظم الفقرات

اتصاله المفصلي بثلاثة عظام من الخوذة الجبهي والوتدي والصدغي وبعض واحد من

الوجه الفك العلوي

ترتبط به الرافعة للشفة العليا والزوجيتان الكبيرة والصغيرة والمضغية والصدغية

العظام الحنكيان

العظام الحنكيان موضوعان في مؤخر الحفرتين الانفيتين واحد من كل جانب بين
الفك العلوي والتتو الحجاجي للعظم الوتدي . شكل الواحد منهما كاللام العربي ويُقسَم الى صفيحة

شكل ٤١ الوجه الظاهر للعظم الوجني الايمن ١ زاوية المقدمة ٢ التتو الحجاجي ٣ التتو الجبهي ٤ التتو الزوجي ٥ الزاوية
السفلى ٦ التتو الفكي ٧ الثقب الوجني

العظم الوجني

وبما يليه من الوجه الحجاجي لهذا العظم العضلة الشادة للعضروف الجفني. وينتهي الخط المذكور من الاسفل بتوصيف كلابي الشكل يتصل بالحديبية الدمعية للفك العلوي فيكمل الفتحة العليا للقناة الدمعية. وقد يكون هذا التوقف قطعة قائمة بنفسها فيقال لها العظم الدمعي الصغير. والوجه الباطن وهو الانفي عليه ثلم غائر يقابل الخط البارز الذي على الوجه الظاهر فيتكون من السطح الذي الى مقدم الثلم بعض الصماخ المتوسط للانف ويتصل السطح الخلفي بالعظم المصفوي فيسد الخلايا المصفوية المقدمة. حافته المقدمة اطولها تتصل بالتوالي للفك العلوي. وحافته الخلفية رقيقة تتصل بالعظم المسطح المصفوي. والعليا اقصرها واغظها تتصل بالتوالي الحجاجي الانسي للجبهي. والسفلى منقسمة بواسطة الطرف السفلي للعرف العمودي الى قسمين يتصل الخلفي منها بالصفية الحجاجية للفك العلوي واما المقدم فيستطيل الى الاسفل ويصير نتوءاً مستديماً يتصل بالتوالي الدمعي للعظم القربني السفلي فيعين في تكوين القناة الدمعية يتعظم بنقطة واحدة تظهر بعد بداءة تعظم الفقرات

اتصاله المنفصلي بعظمين من الخوذة الجبهي والمصفوي وعظمين من الوجه الفك العلوي والقربني السفلي ارتباطاً عضلية. ترتبط به العضلة الشادة للعضروف الجفني

العظمان الوجنيان

العظمان الوجنيان موضوعان في القسم العلوي والوحشي للوجه فيتكون منها بروز الوجنة وبعض الجدار الوحشي للحجاج وارضه وبعض الحفرتين الصدغية والزوجية. كل عظم منها مربع الزوايا له وجهان ظاهر وباطن واربعه نتوات الجبهي والحجاجي والفكي والزوجي واربع حواف

فالوجه الظاهر امس محذب عليه بقرب مركزه الثقب الوجني وهو ثقب صغير يرميه شريان وعصب. وتغطي الوجه المذكور المحيطة الجفنية وتندغم به العضلتان الزوجيتان الكبيرة والصغيرة والوجه الباطن مقعر عليه الى الانسية سطح مثلث خشن يتصل بالفك العلوي والى الوحشية سطح امس مقعر يكون من الاعلى الحد المقدم للحفرة الصدغية ومن الاسفل بعض الحفرة الزوجية. ويشاهد عليه اعلى مركزه الثقب الوجني وتندغم به من الاعلى بعض العضلة الصدغية ومن الاسفل بعض المضغية. التوالججهي غليظ مسنن يتصل بالتوالي الحجاجي الوحشي للجبهي. والتوالي الحجاجي صفيحة غليظة متجهة الى الخلف. سطحه العلوي امس مقعر يتصل

العظم الدمعي

الفتحة السفلى للقناة الحنكية المقدمة . حافته الانسية مرتفعة على هيئة خط بارز يتكوّن منه ومن رفيقه عند اتصال الفكّين ميزاب لقبول الميكعة . وحافته المقدمة رقيقة مقعرة يتكوّن منها الحد السفلي لفتحة المنخر وتستطيل من الانسية الى المقدم فتصير مع ما يقابلها من الفك المخالف تنوّاً بارزاً هو الشوكة الانفية المقدمة . وحافته الخلفية مسننة تتصل بالصفيحة الافقية للعظم الحنكي

يتعظم باربع نقط . واحدة لمقدم الحنك ومقدم التتو السنخي وتبقى هذه القطعة عظماً مستقلاً في بعض الحيوانات فيقال لها العظم بين الفكّين . وواحدة للقسم الانفي والوجي . وواحدة للقسم الحجاجي والوجي . وواحدة للتتو الحنكي الاجزء المقدم

اتصاله المفصلي بعظمين من الخوذة هما الجبهي والمصفوي وبسبعة من عظام الوجه وهي الانفي والوجي والدمعي والتريني السفلي والحنكي والميكعة ورفيقه من الجانب المخالف . وقد يتصل بالصفيحة الحجاجية للعظم الوتدي

ارتباطاته العضلية . ترتبط به المحيطة الجفنية والمخرقة السفلى للعين والرافعة للشفة العليا وجناح الانف والرافعة للشفة العليا والرافعة لزاوية الفم والضاغطة للانف والخافضة لجناح الانف والمضغية والمبوقة

العظمان الدمعيان

العظمان الدمعيان اصغر عظام الوجه وارقتها . وهما موضوعان في مقدم الجدار الانسي للتجويف الحجاجي وفيهما بعض مشابهة للظفر باعتبار الشكل والرقعة والحجم فيسميان احياناً بالعظمين الظفريين . لكل منهما وجهان واربع حواف فالوجه الظاهر وهو شكل ٤٠ الحجاجي يقسمه خط عمودي الى قسمين امامي وخلفي . فالقسم الامامي املس مقعر على هيئة ميزاب طولي تتصل حافته السائبة بالتتوالانفي للفك العلوي فيتم من هذا الاتصال الميزاب الدمعي الذي يستقر في جزءه العلوي الكيس الدمعي واما جزءه السفلي فيدخل في تكوين القناة الانفية . والقسم الخلفي املس فيه بعض ثقير ويدخل في تكوين الجدار الانسي للتجويف الحجاجي . وتندغم بالخط العمودي



شكل ٤٠. العظم الدمعي الايمن من وجوه الظاهر وهو الحجاجي ١ القسم الحجاجي ٢ القسم الدمعي والخط العمودي الفاصل بين القسمين هو العرف ٣ الطرف السفلي للعرف وهو التتو الكلابي ٤ الحافة العليا التي تتصل بالعظم الجبهي ٥ الحافة الخلفية التي تتصل بالمصفوي ٦ الحافة المقدمة التي تتصل بالتتوالانفي للفك العلوي ٧ الحافة السفلى التي تتصل بالصفيحة الحجاجية للفك العلوي وبالتريني السفلي

المرضية التي تتكوّن فيه أحياناً تدفع العظم وتبرز الى التجويف الحجاجي او باطن الانف او
الوجنة او الفم

والتو الوجني ارتفاع خشن مثلث الشكل موضوع عند الزاوية الفاصلة بين الوجه الظاهر
والوجه الخلفي . وهو مقعر من الامام يكون بعض الوجه الظاهر ومقعر من الخلف ايضاً يكون
بعض الحفرة الزوجية وخشن من الاعلى مسنن يتصل بالعظم الوجني . وعليه من الاسفل خط
بارز يفصل الوجه الظاهر عن الوجه الخلفي الزوجي


والتو الانفي صفيحة مثلثة الشكل بارزة الى الاعلى والانسية والخلف الى جانب الانف
فتكوّن بعض جداره الوحشي . وجهه الظاهر مقعر فيه ثقب كثيرة ترتبط به الرافعة للشفة
العليا وجناح الانف والمحيطة الجفنية ووتر العين . وجهه الباطن يتصل من الاعلى بالعظم الجبهي
وعليه سطح خشن يتصل بالمصفوي فيسدّ الخلايا المصفوية المقدمة . واسفل ذلك خط مستعرض
هو العرف القربني العلوي الذي يتصل بالقربني المتوسط المصفوي ويجده من الاسفل تعبير
املس يتكوّن منه بعض الصماخ المتوسطة واسفل ذلك عرف اخر يتصل بالقربني السفلي بجده
من الاسفل التعبير الذي يكون بعض الصماخ السفلي . حافته المقدمة رقيقة مسننة تتصل
بالعظم الانفي . وحافته الخلفية غليظة مغمورة على هيئة ميزاب تسير فيه القناة الانفية وله حافتان
تتصل الباطنة منها بالعظم الدمعي والظاهرة تكوّن بعض محيط الحجاج . وعند نقطة اتصال
الحافة الظاهرة بالوجه الحجاجي حدة صغيرة هي الحديدية الدمعية التي يستدل بها الجراح في
العمل للناسور الدمعي . والميزاب الدمعي يصير عند الاتصال بالعظم الدمعي والتو الدمعي
للقربني السفلي قناة اتجاهها الى الاسفل قليلاً الى الخلف والوحشية قطرها نحو ريشة الاوز اصبغ
في الوسط من الطرفين تستقر فيها القناة الانفية

والتو السنخي غليظ اسفنجي البناء فيه حفر غائرة هي الاسناخ التي تتركز فيها الاسنان .
والاسناخ المذكورة ثمانية من كل جانب اشدها غوراً سخّ الناب واعرضها اسناخ الاضراس
والتو الحنكي غليظ متين بارز من الوجه الباطن افقياً الى الانسية حيث يلتقي برفيقه
فيتكوّن منها نحو ثلاثة ارباع ارض الانف وسقف الفم . وجهه العلوي املس مقعر من الجانب
الى الجانب يدخل في تكوين ارض الانف . يشاهد في مقدمه الفتحة العليا للقناة الحنكية المقدمة
المكوّنة من اتصال الفكين الموضوعه وراء السنين القاطعين المركز بين وتمر منها الاوعية الحنكية
المقدمة . والوجه السفلي خشن مقعر يدخل في تكوين سقف الفم مثقوب ثقباً كثيرة لمرور اوعية
غذائية . وعليه ميزاب طولي او قناة لمرور الاوعية الحنكية الخلفية وعصب كبير والى مقدمه

دقيق تنشأ منه العظمة المنخرقة السفلى للعين

والوجه الباطن وهو الانفي منقسم الى قسمين غير متساويين بواسطة بروزاقي هو التتو الحنكي
فا كان اعلاه يكون الجدار الوحشي للانف وما كان اسفله يكون بعض تجويف الفم . فالقسم
العلوي من هذا الوجه يشاهد فيه فتحة كبيرة غير منتظمة مستطرفة الى كهف هي مور . واسفل الفتحة
المذكورة تقع املس يتكون منه بعض الصماخ السفلي للانف ونقاطه الفرجة الفكية التي سيرها
منحرف نحو الاسفل والمقدم وثقل التتو الفكلي للعظم الحنكي . والى

شكل ٢٩



الخلف منها سطح خشن يتصل بالصفحية العمودية للعظم الحنكي عليه
ميزاب منحرف نحو الاسفل والمقدم اذا اتصل بالعظم الحنكي صار
قناة هي القناة الحنكية الخلفية . والى الامام من الفتحة ميزاب غائر
يصير قناة عند اتصاله بالعظم الدمعي والقربني السفلي هي القناة
الانفية . والى مقدم الميزاب خط خشن يتصل بالعظم القربني
السفلي فالتهجير الذي اعلى الخط يكون بعض الصماخ المتوسط
للانف والذي اسفله بعض الصماخ السفلي . والقسم السفلي من
الوجه الباطن وهو ما كان اسفل التتو الحنكي مقعر خشن غير متساو فيه ثقب كثيرة صغيرة
تمر منها اوعية غذائية

وكهف هي مور وهو الجيب الفكلي تجويف كبير مثل الشكل واقع في باطن جسم الفك .
راسه متجه الى الوحشية مكون من التتو الوجني وقاعدته من الجدار الوحشي للانف وسقفه من
الصفحية الحجاجية وارضه من التتو السنخي وجدرانه جميعها رقيقة جداً . في جداره الانسي فتحة
كبيرة مستطرفة الى باطن الانف مسدودة من الاعلى بالعظم المصفوي ومن الاسفل بالقربني
السفلي ومن الخلف بالحنكي . وما بقي من الفتحة مسدود مدة الحيوة بغشاء مخاطي مثقوب في
الاعلى ثقباً صغيراً . ويشاهد في جداره المقدم القناة السنية المقدمة وفي جداره الخلفي القنوات
السنية الخلفية التي تسير فيها اوعية واعصاب اسنان الفك العلوي . وتشاهد في ارضه بروزات
مخروطية ناشئة عن جذور الضرس الاول والثاني . ومن رقة جدران الكهف يعلم كيف ان السلع

شكل ٢٩ الوجه الباطن للفك العلوي الايمن ١ كهف هي مور ٢ التتو الانفي ٣ العرف الذي يتصل بالقربني المتوسط
٤ الصماخ المتوسط ٥ العرف الذي يتصل بالقربني السفلي ٦ الصماخ السفلي ٧ القناة الدمعية ٨ الثرم الذي يتصل بالعظم
الدمعي ٩ الحافة العليا التي يشاهد فيها ثلاث خلايا مصفوية ١٠ او ١١ الحافة الخلفية ١١ ميزاب القناة الحنكية الخلفية ١٢ الحافة
المقدمة ١٣ و ١٤ التتو الحنكي ١٤ العرف الذي يتكون منه ومن رقبته ميزاب لقبول الميكة ١٥ الشوكة الانفية المتقدمة
١٦ القناة الحنكية المتقدمة ١٧ فتحتها السفلي ١٨ و ١٨ التتو السنخي

انخفاض هو الحفرة الآسية تنشأ منها الحافضة لجناح الانف وإلى الأعلى والوحشية منها منشأ

شكل ٢٨



الضاغطة للانف . وإلى الوحشية منها حفرة اعتمى من الآسية هي الحفرة النابية منفصلة عنها بخط بارز يدل على جذر السن النابي وتنشأ من الحفرة النابية الرفاعة لزواية الفم . وإلى الحفرة النابية الثقب تحت الحجاج هو منفذ قناة يمر منها عصب وشريان تحت الحجاج . وإلى الثقب المذكور حافة الحجاج التي يرتبط بها بعض الرفاعة للشفة العليا

والوجه الخلفي وهو الزوجي يتكوّن منه بعض الحفرة الزوجية وعليه نحو مركزه ثقب جملة مستطرفة إلى قنوات في جوهر العظم

هي القنوات السنية الخلفية التي تمرّ فيها اوعية واعصاب بهذا الاسم . وعند اسفل هذا الوجه بروز مستدير هو الحدبة الفكّية خشنة نحو الباطن تنصل بمجدة العظم الحنكي . وإلى السطح الخشن ميزاب ممتد بانحراف على الوجه الباطن يتحول عند اتصال الفك العلوي بالحنكي إلى قناة هي القناة الحنكية الخلفية

والوجه العلوي وهو الحجاجي رقيق املس مثلث الشكل يكون بعض ارض الحجاج . حافته الانسية تنصل من المقدم بالدعوى ومن الوسط بالعظم المسطح المصنوي ومن الخلف بالتق الحجاجي للعظم الحنكي . وحافته الوحشية ملساء مستديرة تدخل في تكوين الفرجة الوتدية الفكّية . وحافته المقدمة تكون بعض محيط الحجاج فتخلط من الانسية بالتوالي ومن الوحشية بالتوالي الوجني . وبجانب الخط المتوسط للوجه الحجاجي ميزاب غائر هو ميزاب تحت الحجاج يمرّ فيه عصب وشريان تحت الحجاج . والميزاب المذكور يبدأ عند منتصف الحافة الوحشية لهذا الوجه ويسير إلى المقدم وينتهي بقناة تنقسم إلى فرعين احدهما القناة تحت الحجاج التي ثقبها الظاهر اسفل حافة الحجاج والاخر قناة اصغر من سابقتها تسير في جوهر الجدار المقدم للكهف يقال لها القناة السنية المقدمة التي تمرّ فيها الاوعية والاعصاب السنية المقدمة إلى الاسنان المقدمة في الفك العلوي . وعند الجزء الانسي والمقدم للوجه الحجاجي وإلى الوحشية من القناة الدعوية انخفاض

شكل ٢٨ الفك العلوي الايمن كما يشاهد من جانبه ١ الوجه الظاهر او الوجني والرقم موضوع في الحفرة النابية ٢ الوجه الخلفي او الزوجي ٣ الوجه العلوي او الحجاجي ٤ ثقب تحت الحجاج وضعة تحت الرقم ٥ القناة تحت الحجاج المستطرفة إلى الثقب تحت الحجاج ٦ الحافة السفلى للحجاج ٧ التتوالوجني ٨ التتوالانفي ٩ التفتير الذي يتكوّن منه الحد الجانبي للفتحة الافقية المقدمة ١٠ التوتوة الانفية المقدمة ١١ الحفرة الآسية ١٢ التتوالسنخي ١٣ الحافة الانسية للوجه الحجاجي ١٤ الحدبية الدعوية ١٥ الميزاب الحنكي الذي يتصل بالميكمة ١ السنان القاطعان ٢ الناب ٣ الضراسان الصغيران ٤ الضراس الثلاثة الكبيرة

والحافة العليا ضيقة غليظة مسننة تتصل بالشرم الانفي للعظم الجبهي. والحافة السفلى عريضة رقيقة يرتبط بها الغضروف الجانبي للانف وفي منتصفها شرم يمر منه فرع من العصب الانفي. والحافة الوحشية مسننة تتصل بالتواانفي للفك العلوي. والحافة الانسية تتصل برفيقتها من

شكل ٢٧



شكل ٢٦



الجانب المخالف وعليها من الخلف عرف عمودي يتكوّن منه بعض فاصل الانف ويتصل من الاعلى بالشوكة الانفية للعظم الجبهي ومن الاسفل بالصفحة العمودية للعظم المصفوي يتعظم كل منهما بنقطة واحدة. ويتصل بعظمين من الخوذة هما الجبهي والمصفوي وعظمين من الوجه هما الانفي المخالف والفك العلوي

الفكان العلويان

الفك العلوي من عظام الوجه الرئيسة وهو اكبرها الا الفك السفلي وله اهمية عظيمة باعتبار الامراض الجراحية التي تعرض عليه. جميع اسنان القوس العلوي راكزة فيه وله دخل في تكوين الحنك وارض الحجاج وارض التجويف الانفي وجداره الوحشي. ينقسم الى جسم واربع نتوات وجني وانفي وسنني وحنكي

فالجسم غير منتظم الشكل مجوف يقال لتجويفه كهف هيمور. له اربعة وجوه ظاهر او ورجي وخلفي او زوجي وعلوي او حجاجي وباطن او انفي فالوجه الظاهر وهو الوجي الى المقدم وعليه عند الخط المتوسط فوق الاسنان القواطع

شكل ٢٦ الوجه الظاهر للعظم الانفي الايسر ١ الطرف الخلفي السفلي ٢ الحافة الانسية التي تتصل برفيقتها من الجانب المخالف ٣ الحافة الوحشية التي تتصل بالتواانفي للفك العلوي ٤ يشير الى الميزاب الذي على الوجه الباطن لمرور العصب الانفي ٥ الحافة العليا التي تتصل بالعظم الجبهي ٦ الثقب الوعائي

شكل ٢٧ الوجه الباطن للعظم الانفي الايسر ١ الطرف الخلفي السفلي ٢ الحافة الانسية التي تتصل برفيقتها ٣ الحافة الوحشية التي تتصل بالتواانفي للفك العلوي ٤ الميزاب الذي يمر فيه العصب الانفي ٥ الحافة العليا التي تتصل بالعظم الجبهي ٦ الجزء السفلي لميزاب العصب الانفي

وعليها ميازيب وقنوات لخيوط العصب الشبي. وهي منقسمة عند مؤخرها بواسطة قناة عريضة متجهة نحو الاعلى والمقدم هي الصماخ العلوي للانف المستطرق الى الخلايا المصفوية الخلفية .
والحافة القصيرة التي تعلق الصماخ هي العظم القربني العلوي او الاستفني . واسفل الصماخ حافة ملتوية سائبة من المقدم هي العظم القربني المتوسط او الاستفني وهو اطول من سابقه ويعلو الصماخ المتوسط للانف . وفي مقدم الصماخ المتوسط التمع وهو استطراق نحو الاعلى والمقدم الى الخلايا المصفوية المقدمة ومنها الى الجيب الجبهي

يتعظم المصفوي بثلاث نقاط واحدة للصفحة العمودية وواحدة لكل من الكتلتين الجانبيتين . وعند الولادة يكون العظم مؤلفاً من الكتلتين الجانبيتين . وفي السنة الاولى يبدأ التعظم في الصفحة العمودية والغربالية وتحد الكتلتان بالصفحة الغربالية . ويتكامل التعظم بين السنة الخامسة والسادسة

اتصاله المفصلي بعظمين من الراس وهما الوتدي والجبهي وباحد عشر من الوجه وهي الانفان والفكان العلويان والدمعيان والحنيكيات والقربنيان السفليان والميكة في عظام ورميوس

تُسب هذه العظام للمشرح الذي وصفها اولاً وهي نادرة الوجود تشاهد في دروز الجمجمة ولا سيما في الدرز اللامي وقد تشاهد في البافوخين واقعة بين العظام التي سبق ذكرها . وكيفية حدوثها انه في اثناء التعظم قد يُترك خلاه غشائي يتعظم بنقطة خاصة يو فيصير عظماً مستقلاً شاغلاً بعض المساحة التي تشغلها عظام الخوذة عادة

في عظام الوجه


عظام الوجه اربعة عشر وهي الانفان والفكان العلويان والدمعيان والوجنيان والحنيكيات والقربنيان السفليان والميكة والفك السفلي

العظام الانفان

العظام الانفان صغيران مستطيلان يختلف حجمهما وشكلهما تبعاً للشخص . وهما غليظان ضيقان في الاعلى عريضان رقيقان في الاسفل موضوعان في اعلى الوجه يتكوّن من اتصاليهما في الخط المتوسط جسر الانف . لكل منهما وجهان واربع حواف . فالوجه الظاهر متعر من الاعلى الى الاسفل محذب من الجانب الى الجانب تغطيه العضلة الضاغطة للانف وعليه ثلوم صغيرة شريانية وثقب صغير نحو مركزه يمر منه وريد . والوجه الباطن محذب من الاعلى الى الاسفل متعر من الجانب الى الجانب عليه ثلم طولي او قناة يمر منها فرع من العصب الانفي .

لهذه الصفيحة الى الاعلى توغليظ املس مثلث الشكل يقال له عرف الديك لمشاہتہ به . حافة العرف الخلفية طويلة رقيقة يرتبط بها المنجل المخي . وحافته المقدمة قصيرة غليظة تتصل بالعظم

شکل ٢٥



الجهمي ولها جناحان صغيران بارزان يتصلان بالعظم الجهمي فيكملان الثقب الاعور من الخلف . والى كل من جانبي العرف الصفيحة الغربالية ضيقة محفورة يستقر عليها العصب الشهي ومنقوبة ثقوباً كثيرة لمرور خيوط العصب المذكور الى باطن الانف . وهذه الثقوب مصفوفة ثلاثة صفوف فالمتوسطة منها ثقوب بسيطة والانسية والوحشية فوهات قنوات صغيرة نازلة على وجهي الصفيحة العمودية والكتلتين الجانبيتين . وعند الطرف المقدم من الصفيحة الغربالية

الى كل جانب من العرف بقرب قاعدته فرجة صغيرة يمر منها الفرع الانفي للعصب العيني . وعند طرفها الخلفي شرم مثلث الشكل يقبل الشوكة المصفوية للعظم الوتدي

والصفيحة العمودية رقيقة تُخدر من الوجه السفلي للصفيحة الغربالية وتعين في تكوين الفاصل الانفي . تتصل من حافتها المقدمة بالشوكة الجهمية وعرف العظمين الانفيين . ومن حافتها الخلفية نصفها العلوي بمنقار الوتدي ونصفها السفلي بالميكعة . وحافتها السفلى يرتبط بها الغضروف الثالث للانف . ويشاهد على جانبيها ميازيب وقنوات تمر فيها خيوط العصبين الشمين

والكتلتان الجانبيتان تتضمنان خلايا غير منتظمة الشكل هي الخلايا المصفوية التي يطنها امتداد من الغشاء المخاطي الانفي . على الوجه الوحشي لكل من الكتلتين الجانبيتين صفيحة رقيقة ملساء مربعة الجوانب يقال لها الصفيحة المحجاجة او العظم المسطح الذي يغطي الخلايا المصفوية ويكون جزءاً عظيماً من الجدار الانسي للحجاج . وتتصل الصفيحة المذكورة من المقدم بالعظم الدمعي ومن الخلف بالوتدي ومن الاعلى بالجهمي ومن الاسفل بالوجهين المحججين للفك العلوي والحنكي . ويرز من الجزء السفلي للكتلة الجانبية اسفل العظم المسطح التو الكلاي وهو صفيحة طويلة رقيقة منحنية نحو الاسفل والوحشية والخلف تسد الجزء العلوي من الكهف وتتصل بالنتو المصفوي للعظم القربني السفلي . والوجه الانسي للكتلة الجانبية يكون بعض الجدار الوحشي للحفرة الانفية وهو مؤلف من صفيحة رقيقة غير متساوية تتصل من الاعلى بالصفيحة الغربالية

شکل ٢٥ العظم المصفوي كما يشاهد من الاعلى والخلف ١ الصفيحة العمودية ٢ والكتلتان الجانبيتان ٣ عرف الديك ٤ الصفيحة الغربالية للجانب الايسر ٥ الصماخ العلوي وهو الى الاعلى واليسار من الرق ٦ القربني العلوي ٧ القربني المتوسط . وقد وضعت الارقام ٥ و٦ و٧ على الوجه الانسي للكتلة الجانبية بقرب مؤخرها ٨ الوجه الوحشي للكتلة الجانبية وهو العظم المسطح ٩ الحافة العليا وهي الجبهة للكتلة الجانبية محفورة بالفتاتين المصفويتين للمقدمة والخلفية

تنشأ منها الشادة للهاء وتشاهد اعلاها الفتحة الخلفية لقناة فديان . والوجه الانسي للصفحة المذكورة يكون الحد الوحشي للفتحة الانفية الخلفية . والوجه المقدم للتو الجناحي عريض القاعدة يتكوّن منه الجدار الخلفي للفرجة الوندية الفكّية ويسند عقدة ميكل . ويشاهد عليه من الاعلى الفتحة المقدمة لقناة فديان ومن الاسفل حافة خشنة تتصل بالصفحة العمودية للعظم الحنكي الفرجة الوندية خلاء مستطيل واقع بين الجناح الكبير والجناح الصغير ويقال لها الثقب الممزق المقدم . وقناة فديان تخترق قاعدة الصفحة الانسية الجناحية افقياً من الامام الى الخلف فتحتمل المقدمة نحو الفرجة الوندية الفكّية وفتحتمل الخلفية نحو الثقب الممزق المتوسط ويمرّ منها عصب واوعية فديان .

يتعظم الوندي باثنتي عشرة نقطة اربع للجسم واربع للاجنحة الاربعة واثنان للصفحين الانسيين الجناحيين واثنان للعظمين الاسفنجيين الونديين . ويكون العظم عند الولادة مؤلفاً من خمس قطع وهي الجسم مع الجناحين الصغيرين والجناحان الكبيران مع الصفحين الانسيين الجناحيين والعظام الاسفنجيان . فتتحد الجناحان الكبيران بالجسم في السنة الاولى والعظام الاسفنجيان به بعد البلوغ . وجسم الوندي بالتو القاعدي للعظم المؤخري بين السنة الثامنة عشرة والخامسة والعشرين .

انصاله العظمي بجميع عظام الخوذة وبخمسة من عظام الوجه وهي الوجنيان والحنكيان والميكة

ارتباطاته العضلية . ترتبط به الصدغية والجناحيان الوحشية والانسية والعاصرة العليا والشادة للهاء والراخية للطلبة والرافعة للجن العلووي والمنخرقة العليا والمستقيمة العليا والمستقيمة الانسية والمستقيمة السفلى والمستقيمة الوحشية

العظم المصفوي

المصفوي عظم في غاية ما يكون من الخفة مكعب الشكل موضوع في مقدم قاعدة الخوذة بين التجويفين المحجابين عند اصل الانف فيدخل في تكوين الخوذة والمحجابين والحفرتين الانفيتين . وهو مؤلف من صفحة افقية يتكوّن منها بعض قاعدة الخوذة وصفحة عمودية يتكوّن منها بعض الفاصل الانفي وكتلتين جانبيتين خلويتين

فالصفحة الافقية ويقال لها الغربالية ايضاً تكون جزءاً من الحفرة المقدمة لقاعدة المحجمة وتشغل الشرم المصفوي الواقع بين الصفحين المحجابين للعظم الجبهي . ويبرز من الخط المتوسط

العظم الوتدي


يتكوّن منه الجزء الخلفي للجدار الوحشي المحجّاجي تحدّه من الاعلى حافة مسننة تتصل بالعظم الججمي ومن الاسفل حافة مستديرة داخله في تكوين الفرجة الوتدية الفكّية ومن الانسية يدخل في تكوين الفرجة الوتدية ومن الوحشية له حافة مسننة تتصل بالعظم الوجني. والمحيط فن الجسم الى التتوالشوكي النصف الانسي يكون الحد المقدم للثقب المنزق المتوسط وتُشاهد فيه الفتحة الخلفية لقناة فديان والنصف الوحشي مسنن يتصل بالقسم الحجري للصدغي. والى مقدم التتوالشوكي حافة المحيط مسننة تتصل بالقسم القشري للصدغي. وعند راس الجناح يشاهد جزءاً مثلث مسنن يتصل بالزاوية المقدمة السفلى للعظم الجداري. والى الانسية من ذلك يتصل المحيط بالعظم الججمي

والجناحان الصغيران يبرزان افقياً الى الوحشية من مقدم الوجه العلوي للجسم. طرف كلٍ منهما دقيق مستدق يقارب الجناح الكبير بدون ان يمسه. الوجه العلوي يكون بعض الحفرة المقدمة لقاعدة الخوذة والوجه السفلي يعلو الفرجة الوتدية وموخر الحجاج. والفرجة الوتدية ويقال لها ايضاً الثقب المنزق المقدم مثلثة الشكل وهي استطراق بين التجويف الججمي والتجويف المحجّاجي يحدّها من الانسية جسم العظم الوتدي ومن الاعلى الجناح الصغير ومن الاسفل الوجه المحجّاجي للجناح الكبير وتحوّل الى ثقب بواسطة اتصال الوتدي بالججمي. ويمرّ منها العصب الثالث والرابع والسادس والقسم العيني من الخامس والوريد العيني. والحافة المقدمة للجناح الصغير مسننة تتصل بالعظم الججمي والخلفية مستديرة ملساء تدخل فرجة سلفيوس الفاصلة النص المقدم عن النص المتوسط للسخ. ومن الطرف الانسي للحافة الخلفية يتكوّن التتوالسريري المقدم. ويتصل الجناح الصغير بالجسم بواسطة اصلين احدها علوي رقيق مسطح والاخر سفلي غليظ وبين الاصلين الثقب البصري الذي يمرّ منه العصب البصري والشريان العيني

والتتوان الجناحيان يبرزان عمودياً الى الاسفل من نقطة اتصال الجسم بالجناحين الكبيرين. كل منهما مؤلف من صفيحتين متصلتين من الامام منفصلتين من الخلف بواسطة شرم هو الحفرة الجناحية. فالصفيحة الوحشية وجهها الوحشي يكون بعض الجدار الانسي للحفرة الزوجية وترتبط به العضلة الجناحية الوحشية ووجهها الانسي يكون بعض الحفرة الجناحية ويرتبط به بعض العضلة الجناحية الانسية. والصفيحة الانسية اطول واضيق من الوحشية ينتهي طرفها السائب بتودقيق متجه نحو الوحشية هو التتوالكلالي الذي يحيطه ميزاب يدور فيه وتر العضلة الشادة للهاء. وعند قاعدة هذه الصفيحة انخفاض صغير خفيف يبزي الشكل هو الحفرة الزورقية

مثلثة الشكل يقال لها المنقار وهي استدامة الصفيحة العمودية التي على الوجه المقدم وتدخل في فرجة غائرة بين جناحي الميكة. وإلى كل جانب من المنقار صفيحة بارزة نحو الوحشية عند قاعدة التوين الجناحين تتصل بحافة الميكة. وعند أصل التواجناحي ميزاب يتحول إلى قناة عند اتصال التوا الوتدي للعظم الحنكي وهي القناة الجناحية الحنكية التي تمرّ منها أوعية بهذا الاسم والعصب البلعوي

شكل ٣٤




والجناحان الكبيران تتوان قويان بارزان من جانبي الجسم إلى الوحشية والأعلى ينتهيان من الخلف بطرف دقيق يسمى التوا الشوكي. لكل جناح ثلاثة وجوه ومحيط. فالوجه العلوي وهو الدماغى مقعر يستقر عليه الدماغ وتكون منه بعض الحفرة المتوسطة للمخيمية. يشاهد في جزئه المقدم والأنسي الثقب المستدير الذي يمرّ منه القسم الثاني من العصب الخامس. وإلى الخلف والوحشية منه الثقب البيضي الذي يمرّ منه القسم الثالث من العصب الخامس والشريان السحائي الصغير والعصب الحنجري الصغير. وإلى الجانب الأنسي من الثقب البيضي قد يشاهد ثقب صغير هو ثقب فيساليوس يمرّ منه وريد صغير. وفي قمة التوا الشوكي الثقب الشوكي الذي يمرّ منه الشريان السحائي المتوسط. والوجه الظاهر وهو السفلي محدب يقسمه خط بارز هو المخط الجناحي إلى قسمين. القسم العلوي أكبرها يدخل في تكوين الحفرة الصدغية ويرتبط به بعض العضلة الصدغية. والقسم السفلي يدخل في تكوين الحفرة الزوجية وترتبط به الجناحية الوحشية ويشاهد في جزئه الخلفي التوا الشوكي الذي يرتبط به الرباط الجانبي الباطن للفك السفلي والعضلة الراحية للطلبة. ويرتبط بالمخط الجناحي الفاصل بين القسم الصدغي والقسم الزوجي بعض العضلة الجناحية الوحشية. والوجه المقدم وهو الحجاجي أملس مربع الجوانب

شكل ٣٤ الوجه المقدم السفلي للعظم الوتدي ١ الذوكة المصفوية ٢ المنقار ٣ العظم الأسفنجي الوتدي ٤ الجناح الصغير ٥ الثقب البصري بين أصلي الجناح الصغير ٦ الفرجة الوتدية بين الجناح الصغير والجناح الكبير ٧ الثقب المستدير ٨ الوجه الحجاجي للجناح الكبير ٩ وجهه الصدغي ١٠ المخط الجناحي الفاصل بينها ١١ القناة الجناحية الحنكية ١٢ ثقب مدخل قناة فديان ١٣ الصفيحة الأنسية الجناحية ١٤ التوا الكلاوي ١٥ الصفيحة الجناحية الوحشية ١٦ الثقب الشوكي ١٧ الثقب البيضي ١٨ طرف التوا الشوكي للعظم الوتدي

العظم الوتدي

من المقدم ارتفاعان صغيران واحد من كل جانب هما التوان السريريان المتوسطان وتحتها من الخلف صفيحة عظمية مربعة الشكل تنتهي عند كل من زاويتيها بمجذبة صغيرة هما التوان السريريان الخلفيان وترتبط بالتوات السريرية المذكورة الخيمة المخيخية. والصفيحة مشرومة من

شكل ٢٢



جانبيها لمرور الزوج السادس من الاعصاب الحنجيرية. والى الخلف منها تغير خفيف متصل بالميزاب القاعدي للعظم المؤخري يستقر عليه النخاع المستطيل. والى كل من جانبي الجسم ميزاب عريض منحني يستقر فيه الشريان السباتي والجيب الكهفي فيقال له الميزاب الكهفي. والوجه الخلفي مربع الجوانب يتصل بالتوا القاعدي للمؤخري اتصالاً غضروفياً قبل البلوغ وعظماً بعده. والوجه المقدم عليه في الخط المتوسط صفيحة عمودية تتصل من المقدم بالصفيحة العمودية للعظم المصفوي فيتكوّن من ذلك بعض الفاصل الانفي. والى كل جانب من هذه الصفيحة الجيبان الوتديان الواقعان في باطن الجسم. وهذان الجيبان لا يوجدان قبل البلوغ وهما مسدودان من المقدم والاسفل بواسطة صفيحتين رقيقتين مخنبتين مثقوبتين من الاعلى فيستطرقان الى الجزء العلوي والمؤخر من الانف. ويقال للصفيحتين المذكورتين العظمان الاسفنجيان الوتديان الا انه يندر مشاهدتهما لانهما ينكسران في تفصيل العظام فلا يبقى من كل جانب الا فتحة كبيرة مستطرفة الى باطن الجيب والوجه السفلي عليه في الخط المتوسط شوكة

شكل ٢٢ الوجه العلوي وهو الخي للعظم الوتدي ١ التوا الزينوثي ٢ الشوكة المصفوية ٣ الجناح الصغير الايسر ٤ الجناح الكبير الايسر ٥ التوا الشوكي ٦ طرف التوا الجناحي ٧ الثقب البصري ٨ التوا السريري المقدم ٩ الميزاب الكهفي الذي يستقر فيه الشريان السباتي الباطن والصفيحة الكهفية والجيب الكهفي والاعصاب الحنجيرية ١٠ السرج التركي. والمجدبتان اللتان الى مقدم الرقم هما التوان السريريان المتوسطان ١١ الصفيحة التي تكوّن الحد الخلفي للسرج التركي. وزاويتها البارزان هما التوان السريريان الخلفيان ١٢ الجزء القاعدي للعظم الوتدي ١٣ بعض الفرعة الوتدية ١٤ الثقب المستدير ١٥ الثقب البضي ١٦ الثقب الشوكي ١٧ الخلاء الزاوي الذي يقبل فيه القسم الخجري للعظم الصدغي ٨ شوكة التوا الشوكي التي يرتبط بها الرباط الانسي الجانبي للفك السفلي ١٩ حافة الجناح الكبير والتوا الشوكي التي تتصل بمقدم القسم التشري للعظم الصدغي ٢٠ الحافة الانسية للنس الشوكي التي تعين في تكوين الثقب المهزق المتوسط ٢١ جزء الجناح الكبير الذي يتصل بالزاوية المقدمه السفلى للعظم الجداري ٢٢ جزء الجناح الكبير الذي يتصل بالصفيحة الحنجيرية للعظم الجبهوي

يتعظم بخمس نقط واحدة لكل من القسم القشري والتوالملي والقسم الحجري والتو
الابري والتو السعي الذي يكون في الجنين على هيئة حلقة غير كاملة من الاعلى شكل ٢٣
يرتبط بها الغشاء الطيلي . يبدأ التعظم نحو الشهر الثالث . وعند الولادة يكون العظم
مؤلفاً من اربع قطع القسم القشري مع التو الزوجي والقسم الحجري مع القسم الملمي
والتو السعي والتو الابري ثم تاخذ هذه الاجزاء بالاتصال الى ان تصير عظماً
واحدًا

اتصاله المنصلي بخمسة عظام الجداري والمؤخري والوتدي والفك السفلي والوجني

ارتباطاته العظمية . بالقسم القشري العظمة الصدغية . وبالتو الزوجي المضغية . وبالقسم
الملمي المؤخرية الجبهية والقصبية الحلمية والطحالية والقنوية الحلمية وذات البطنين والاذنية
الخلفية . وبالتو الابري الابرية البلعومية والابرية المسانية والابرية اللامية . وبالقسم الحجري الرافعة
للهاة والشادة الطيلة والركابية

العظم الوتدي

هذا العظم موضوع عرضاً في قاعدة الحجمة بقرب منتصفها ويتصل بجميع عظام الخوذة
فيربطها بعضها ببعض ولذلك كان اسمه في الاصل اليوناني العظم الاسفيني . شكله غير منتظم الا
انه اشبه بجناش باسط جناحيه . اقسامه التشريحية جزء مركزي هو الجسم وجناحان كبيران
وجناحان صغيران بارزة من جانبي الجسم الى الوحشية وتوان جناحيان بارزان الى الاسفل
فالجسم كبير الحجم مربع الجوانب مجوّف الباطن له اربعة وجوه علوي وسفلي ومقدم وخلفي .
الوجه العلوي يشاهد عليه من الامام الى الخلف اولاً شوكة بارزة هي الشوكة المصفوية التي
تتصل بالعظم المصفوي . والى الخلف منها سطح امس عليه في الخط المتوسط ارتفاع خفيف طولي
بجده من الجانبين انخفاضان يستقر فيهما العصبان الشميان . ويحد هذا السطح من الورااء ميزاب
ضيق عرضي هو الميزاب البصري الذي يستقر فيه المجمع البصري ينتهي من الجانبين
بالثقبين البصريين اللذين يمرّ منهما العصبان البصريان والشريانان العينيان . والى الورااء من
ذلك ارتفاع صغير زيتوني الشكل هو التو الزيتوني يليه انخفاض غائر يقال له السرج التركي
او الحفرة النخامية يستقر فيه الجسم النخامي . والحفرة المذكورة مثقوبة بثقوب كثيرة غذائية بجدها

الحلمي يمرّ منها ويريد من الفوقمة الى الوداجي الباطن. رابعاً وراء الفتحين المذكورتين حفرة غائرة هي الحفرة الوداجية التي يستقر فيها الوريد الوداجي الباطن ويقابلها حفرة مثلها في حافة العظم المؤخري فيتكوّن من الحفرتين الثقب الممزق الخلفي.

شكل ٢١



خامساً ثقب صغير الى مقدم الخط العظمي الفاصل بين القناة السباتية والحفرة الوداجية يمرّ منه عصب يعقوب وهو الفرع الطبلي للعصب اللساني البلعومي. سادساً ثقب صغير في الجدار الانسي

لحفرة الوداجية يدخل منه عصب ارنولد وهو الفرع الاذني للعصب الرئوي المعدي. سابعاً الى الوحشية من الحفرة الوداجية سطح يتصل بالتو الوداجي للعظم المؤخري. ثامناً التو الغمدي وهو صفيحة عريضة ممتدة من القناة السباتية الى التو الحلمي تنفصل في الوحشية الى قسمين. تاسعاً التو الابري الواقع بين القسمين المذكورين وهو شوكة طويلة حادة طولها نحو قيراط ممتدة من التو الغمدي متجهة نحو الاسفل والمقدم والانسية. ترتبط بالتو المذكور ثلاث عضلات وهي الابرية البلعومية والابرية اللسانية والابرية اللامية. عاشراً الثقب الابري الحلمي الموضوع بين التو الابري والتو الحلمي وهو منتهي قناة فلويوس ينفذ منه العصب الوجهي والشريان الابري الحلمي. الحادي عشر الفرجة الاذنية الواقعة بين التو الغمدي والتو الحلمي ينفذ منها الفرع الاذني من العصب الرئوي المعدي

حوافيه ثلاث عليا وخلفية ومقدمة. فالحافة العليا اطولها محفورة للجيب الحجري العلوي ترتبط بها الخيمة المنخية وعند طرفها الانسي شرم هلاي يستقر فيه العصب الخامس. والحافة الخلفية متوسطة الطول بين العليا والمقدمة تتصل بالتو القاعدي للعظم المؤخري وتحد الثقب الممزق الخلفي. والحافة المقدمة قصيرة جداً من اتصالها بالقسم القشري تتكوّن زاوية تشاهد فيها فتحة قناة اوستاكيوس المستطرفة من البلعوم الى التجويف الطبلي. والى الاعلى من الفتحة المذكورة فتحة اخرى اصغر منها مستطرفة الى قناة تمرّ منها العضلة الشادة للثبلة. والفتحتان منفصلتان بواسطة صفيحة رقيقة يقال لها التو القوعي

بناؤه. بناء القسم القشري كبناء بقية عظام الخوذة. والقسم الحلمي خلوي البناء والحجري كثيف

صاحب

شكل ٢١ قطع العظم الصدغي الايمن يشاهد فيه الاتجاه المتخرف للصاخ السعي الظاهر ١ حرف التو السعي ٢ ميزاب يرتبط به الغشاء الطبلي. انحراف الخط من ٢ الى ٣ يدل على انحراف منتهي الصاخ ومرتبطة الغشاء الطبلي ٤ والتجويف الطبلي ٥ فتحة قناة اوستاكيوس ٦ بعض قناة فلويوس ٧ بعض القناة السباتية

لقناة السباتية التي جدارها في المقدم غير كامل . سادساً انخفاض اعلى الراس يدل على وضع عقدة كاسيريوس

والوجه الخلفي ممتد من الوجه الباطن للقسم الحلي ويشاهد فيه ثلاثة اشياء اولاً فتحة كبيرة

شكل ٢٠



نحو المركز مستطرفة الى قناة قصيرة سائرة نحو الوحشية هي الصماخ السبعي الباطن . وهذا الصماخ ينتهي بصفيحة غربالية في جزءها السفلي ثقب صغيرة تمر منها خيوط العصب السبعي الى باطن الاذن وفي جزءها العلوي بداية قناة فلوبيوس التي يسير فيها العصب الوجهي . وقناة فلوبيوس متعرجة السير تذهب اولاً الى الوحشية والخلف اعلى التيه ثم نحو الاسفل فتنتهي في الثقب الابري الحلي . ثانياً وراء الصماخ السبعي شق صغير مستطرق الى قناة الدهليز تكاد تحجب صفيحة رقيقة يمر منه شريان صغير ووريد . ثالثاً بين الصماخ والشق الى الاعلى ثقب صغير يمر منه وريد الى جوهر العظم

والوجه السفلي خشن غير منتظم يتكوّن منه بعض قاعدة الجمجمة . يشاهد عليه احد عشر شيئاً نعد من الراس الى القاعدة وهي : اولاً سطح خشن مربع الجوانب ترتبط به الرافعة للهاة والشادة للطلبة . ثانياً الثقب السباتي الذي يمر منه الشريان السباتي الى القناة السباتية . وهذه القناة تنحى اولاً الى الاعلى ثم تنعكف الى الانسية وتنفذ عند الراس في الوجه المقدم . ثالثاً قناة التوقعة وهي فتحة صغيرة مثلثة الشكل واقعة الى مقدم الثقب السباتي بقرب الحافة الخلفية للقسم

شكل ٢٠ الوجه الباطن للعظم الصدغي الايسر ١ القسم القشري ٢ القسم الحلي وعليه الفتحة الباطنة للثقب الحلي ٣ القسم الحجري ٤ نلم لترع من الشريان السحائي المتوسط ٥ الحافة العليا للقسم القشري ٦ التورزوجي ٧ حفرة ذات البطين ٨ نلم الشريان المؤخري ٩ ميزاب الحجب الجاني ١٠ ارتفاع على الوجه المقدم للقسم الحجري يدل على وضع القناة الملالية العليا ١١ الفتحة الانتهاية للقناة السباتية ١٢ فتحة الصماخ السبعي الباطن ١٣ خط يمتد الى الشق المستطرق الى قناة الدهليز ١٤ التور الابري ١٥ الثقب الابري الحلي ١٦ الثقب السباتي ١٧ الحفرة الوداجية ١٨ الثرم الذي يمر منه العصب الخامس الموضوع على الحافة العليا للقسم الحجري بقرب الراس ١٩ طرف القسم الحجري وهو قبة

العظم الصدغي

أكبرها الثقب الحلبي الموضوع عند الحافة الخلفية يمر منه ويريد الى الجيب الجانبي وشريان صغير. وينتهي هذا القسم من الاسفل بتو محروطي الشكل يسمى التو الحلبي لمشايمته بحملة الندي ترتبط به العضلة القصية الحلمية والطحالية الراسية والقفوية الحلمية. والى الورا من التو المذكور ميزاب كبير غائر هو حفرة ذات البطنين ترتبط فيها العضلة ذات البطنين. والى الورا من هذا الميزاب ثم مواز له يمر فيه الشريان المؤخري. ووجهه الباطن عليه ميزاب منحني يستقر فيه بعض الجيب الجانبي وتشاهد فيه الفتحة الباطنة للثقب الحلبي. واذا قطع التو الحلبي شوهدان في باطنه خلايا يستطرق بعضها الى بعض يقال لها الخلايا الحلمية. وهذه الخلايا مستطرفة الى مؤخر الطلبة مبطنة بغشاء ممتد من غشائها

حوافيه. الحافة العليا غليظة خشنة مسننة تتصل بالزاوية الخلفية السفلى للعظم الجداري. وحافته الخلفية تتصل بالحافة الخلفية للعظم المؤخري بين زاويتي الجانبية وتو الوداجي

والقسم الحجري سمي بذلك لصلابته الشديدة وهو توهرمي الشكل يتضمن آلة السمع موضوع في قاعدة الحجمة بين الودي والمؤخري اتجاهاً الى المقدم والباطن وقليلاً الى الاسفل. له قاعدة ورأس وثلاثة وجوه وجهان مشرفان نحو باطن الحجمة ووجه نحو الاسفل فالقاعدة مستقرة على الوجه الباطن للقسم القشري والقسم الحلبي. وعند القاعدة الى الظاهر فتحة واسعة بيضية الشكل مستطرفة بواسطة قناة هي الصماخ السمي الظاهر الى الطلبة. وضع هذا الصماخ بين التو الحلبي والاصل الخلفي والمتوسط للتو الزوجي حافته العليا ملساء وما بقي من دائرتها محاط بصفيحة عظمية منحنية يقال لها التو السمي الذي يرتبط بحافته غضروف الاذن الظاهرة. والراس خشن غير مستوي داخل بين التو الشوكي للودي والتو القاعدي للمؤخري. تُشاهد فيه الفتحة المقدمة للقناة السباتية ويتكوّن منه الحد الخلفي والوحشي للثقب المهزق المتوسط

والوجه المقدم مهتمد من الوجه الباطن للقسم القشري والفاصل بينهما اثر درز يبقى ظاهراً الى زمن الشينوخة. يشاهد في هذا الوجه ستة اشياء اولاً ارتفاع بقرب المركز يدل على وضع القناة الهلالية العليا. ثانياً انخفاض الى الوحشية من الارتفاع المذكور يدل على وضع الطلبة والصفيحة التي تفصل الطلبة عن التجويف الحجيمي رقيقة جداً. ثالثاً ثلج خفيف سائر الى الخلف ينتهي بفتحة قناة فلوبويوس يمر فيه الفرع الحجري لعصب فديان. رابعاً قد يوجد فتحة اصغر الى الوحشية من السابقة يمر منها العصب الحجري الصغير. خامساً بقرب الراس الفتحة الانتهائية

من الجزء السفلي لهذا الوجه تتو طويل قوسي هو التوازوجي حافته العليا طويلة ترتبط بها اللبنة الصدغية وحافته السفلى قصيرة ترتبط بها بعض الياف العضلة المضغية ووجهه الظاهر محدب لا يغطيها الا الجلد ووجهه الباطن مقعر ترتبط به العضلة المضغية وطرفه مسنن يتصل

شكل ٢٩



بالعظم الوجي. والتوا المذكور بارز من العظم الصدغي بثلاثة اصول مقدم ومتوسط وخلفي يقال لها اصول التوازوجي. فالاصل المقدم قصير عريض متجه نحو الباطن ينتهي بارتفاع مستدير هو الارتفاع المفصلي الذي يكون الحد المقدم للحفرة العنابية. والاصل المتوسط يكون الحد الوحشي للحفرة المذكورة وينتهي عند بداية فرجة واضحة هي فرجة كلاسير يوس. والاصل الخلفي يسير من الحافة العليا للتوازوجي نحو الاعلى والخلف فيكون

الجزء الخلفي للخط الصدغي. وعند نقطة انفصال الاصل المقدم عن المتوسط حدبة صغيرة يرتبط بها الرباط الظاهر الجانبي للفك السفلي. وبين الاصل المقدم والاصل المتوسط الحفرة العنابية التي تقسمها فرجة كلاسير يوس الى قسمين القسم المقدم منها مكون من الجزء التشريحي يتصل اتصالاً منفصلاً بالتوا القمي للفك السفلي والقسم الخلفي مكون من التوا القمي للجزء الخلفي يستقر عليه بعض الغدة النكفية. وفرجة كلاسير يوس مستطرفة الى التجويف الطبلي يستقر فيها التوار الرقيق المطرقي وتر منه العضلة الراحية للطبلة والشريان الطبلي المقدم والوجه الباطن للقسم التشريحي مقعر عليه ثلثان تمر فيهما فروع من الشريان السحائي المتوسط وانخفاضات تقابل تلافيف الخ


والحافة العليا رقيقة مبرية من الباطن الى الظاهر بحيث تتركب على الحافة السفلى للعظم الجداري فيتكون من ذلك الدرز التشريحي. والحافة المقدمة غليظة مسننة تتصل بالجنجاف الكبير للعظم الوتدي

والقسم الخلفي موضوع في مؤخر العظم الصدغي. ووجهه الظاهر خشن عليه ثقب كثيرة

شكل ٢٩ الوجه الظاهر للعظم الصدغي الايمن ١ القسم التشريحي ٢ القسم الخلفي ٣ رأس القسم الخلفي ٤ التوازوجي ٥ الحدبة الزوجية ٦ الاصل الخلفي للتوازوجي الذي يتكون من الجزء الخلفي للخط الصدغي ٧ الاصل المتوسط للتوازوجي الذي ينتهي في الحفرة العنابية ٨ الثقب الخلفي ٩ الصباخ السحائي الظاهر الذي يحيطه التوا السحائي ١٠ حفرة ذات البطنين ١١ التوا الابري ١٢ التوا القمي ١٣ فرجة كلاسير يوس ١٤ قناة اوسناكوس

المصفوي يستقر عليها الفصان المقدمان للسخ
حوافيه. حافة التسم العمودي غليظة مسننة تتصل من الاعلى بالعظمين الجداريين ومن
الاسفل بالجناح العظيم للوتدي. وتتصل حافة التسم الاقفي بالجناح الصغير للوتدي
بناؤه. قسمة العمودي وتوه الحجاجي الوحشي غليظان مؤلفان من صفيحتين مندمجين
تتوسط بينهما الطبقة الاسفنجية المزروجة. والتسم الاقفي مؤلف من النسيج المندمج رقيق فيسهل
ثقب الخوذة منه بألة حادة

شكل ٢٨



يتعظم بنقطتين واحدة لكل شطر جانبي. ويتبدى التعظم
في القوسين الحجاجيين في الادوار الاولى من الحيوة الجنينية.
وعند الولادة يكون العظم مؤلفاً من نصفين جانبيين ويبقى
الدرز الفاصل بينهما الى بضع سنين وقد يدوم الى الشيخوخة
اتصاله المفصلي باثني عشر عظماً وهي الجداريان والوتدي
والمصفوي والانفيان والفكان العلويان والدمعيان
والوجنيان

ارتباطاته العضلية. ترتبط به من كل جانب المجعدة للحاجب والمحطة الجفنية والصدغية

العظمان الصدغيان

هذان العظمان موضوعان في جانبي الجمجمة وقاعدتها ويتضمنان في باطنها آلة السمع.
ينقسم كل منهما الى ثلاثة اقسام احدهما مقدم علوي منتشر الشكل يقال له القشري والثاني خلفي
غليظ هو الحلبي والثالث موضوع اسفلها وبينهما هرمي الشكل مثلث الجوانب يشاهد عند
قاعدته الى الظاهر فتحة الاذن بارز نحو المقدم والباطن يقال له الحجري


فالقسم القشري يمتد الى الاعلى والمقدم وهو قشري الشكل رقيق نصف شفاف خالٍ
من الطبقة الاسفنجية التي تتوسط بين طبقتي عظام الجمجمة المسطحة له وجهان ظاهر وباطن
وحافتان عليا ومقدمة

وجهه الظاهر امس يكون بعض الحفرة الصدغية وترتبط به العضلة الصدغية. ويشاهد
على جهته الخلفية ثلم يمر فيه الشريان الصدغي الغائر وخط بارز منحني هو جزء من الخط
الصدغي تندغم فيه اللقافة الصدغية ويفصل القسم القشري عن القسم الحلبي. وبرز نحو الانسية

شكل ٢٨ العظم الجبهي في الجنين بقرب الولادة a الشطر الجانبي الايمن b الشطر الجانبي الايسر

السحائية المقدمة. وإلى كل جانب من الميزاب حفر غير منتظمة لقبول اجسام باكيونيوس في القسم الافقي. هذا القسم مؤلف من صفيحتين

شكل ٢٧



رقبتين مثلتتين تتكوّن منها قبوتا التجويفين الحجاجيين. ويفصل الصفيحة الواحدة عن الأخرى الشرم المصفوي وهو مربع الجوانب تملأه الصفيحة الغريالية للعظم المصفوي. ولكل من الصفيحتين الحجاجيتين وجهان ظاهر وهو السفلي وباطن وهو العلوي. فالوجه الظاهر مقعر عليه عند المقدم والوحشية تحت التتو الحجاجي الوحشي انخفاض هو الحفرة الدمعية تستقر فيه الغدة الدمعية وإلى المقدم


والانسية حفيرة او حديبة ترتبط بها البكرة اللبية التي يمرّ منها وتر العضلة المنخرقة العليا للعين. وعلى حافتي الشرم المصفوي نصف ثقب اذا التقت بمثلها في الصفيحة الغريالية تكوّنت ثقب كاملة هي الثقب المصفوي. ويقاطع عرضاً حافتي الشرم ميزابان اذا اتصلا بالمصفوي صارا قناتين هما القناتان المقدمة والخلفية المصفويتان تنهيان بثقين على الجدار الانسي للتجويف الحجاجي. تمرّ من القناة المقدمة الاوعية المصفوية المقدمة والعصب الانفي ومن القناة الخلفية الاوعية المصفوية الخلفية. وإلى مقدم الشرم المصفوي الشوكة الانفية وهي تتو بارز الى الاسفل والمقدم ويتصل من المقدم بعرف العظمين الانفيين ومن الخلف عليه ميزابان يفصلهما خط بارز عمودي فيتصل الخط بالصفيحة العمودية للمصفوي ويتكوّن من الميزابين بعض قبوة الانف. وإلى جانبي قاعدة الشوكة الانفية فتحة الجيبين الحجاجيين. والجيبان الحجاجيان تجويفان غير متظمين يمتدان الى الاعلى والوحشية بين طبقتي الحجابية منفصلان بواسطة حاجز عظمي رقيق يتكوّن منها الارتفاعان الانفياں والقوسان الحجاجيان وهما مبطنان بغشاء مخاطي ويستطرقان الى باطن الانف بواسطة القمع

والوجه الباطن وهو العلوي للقسم الافقي محدب ويفصل الصفيحتين في الخط المتوسط الشرم

شكل ٢٧ الوجه الباطن للعظم الجبهي ١ الميزاب الذي يستقر فيه الجيب الطولي العلوي ويرتبط به النجل الخفي ٢ الثقب الاعور ٣ الحافة العليا الاكليلية ٤ الحافة السفلى ٥ الصفيحة الحجاجية اليسرى ٦ حافة الشرم المصفوي من اليسار ٧ الثقبان المصفويان المقدم والخلفي ٨ ويتشاهد في الشكل ان المقدم منها مستطرق الى قناتو ٨ الشوكة الانفية ٩ الحفرة الدمعية ١٠ انخفاض ترتبط به بكرة العضلة المنخرقة العليا للعين. الى اليسار منه الشرم فوق الحجاج وإلى اليمين التتو الحجاجي الانسي ١١ القمع المستطرق الى الجيب الجبهي ١٢ التتو الحجاجي الوحشي

عظيمة من النمو. وتحت الارتفاع الجبهي القوس الحاجبي الذي ينفصل عنه بواسطة انخفاض خفيف. والقوس المذكور عريض ظاهر في الانسية قليل الوضوح في الوحشية مكون من بروز الجيب الجبهي. وبين القوسين في الخط المتوسط ارتفاع خفيف عند اصل الانف يقال له الارتفاع الانفي. واسفل القوس الحاجبي قوس اخر هو القوس الحجاجي وهو حافة منحنية بارزة يتكوّن منها الحد العلوي للتجويف الحجاجي فاصلة

شكل ٢٦



بين القسم العمودي والقسم الافقي لهذا العظم. وهذا القوس اشد بروزاً في الوحشية منه في الانسية لوقاية العين من الافات التي تحدث عليها من هذه الجهة. وفي الثلث الانسي للقوس الحجاجي شرم او ثقب يقال له الشرم او الثقب اعلى الحجاج يرمّ منه الشريان والعصب اعلى الحجاج. وينتهي القوس الحجاجي بطرفين مشرفين نحو الاسفل هما التتوان الحجاجيان الانسي والوحشي. فالوحشي منها متين بارز يتصل بالعظم

الوجني ويذهب منه عرف حاد منحني نحو الاعلى والخلف يقال له الخط الصدغي تندغم فيه اللقافة الصدغية. واسفل الخط الصدغي تعبير خفيف يتكوّن منه مقدم الحفرة الصدغية التي تنشأ منها العضلة الصدغية. واما التتوان الحجاجي الانسي فاقبل بروزاً من الوحشي ويتصل بالعظمين الدمعيين وبين التتوين الانسيين الشرم الانفي الذي يتصل عند الخط المتوسط بالعظمين الدمعيين ومن كل جانب بالتتوان الانفي للعظم الفك العلوي. ويمتد من الشرم المذكور الى الاسفل تتو طويل مستدق يقال له الشوكة الانفية

والوجه الباطن للقسم العمودي يشاهد عليه في الخط المتوسط ميزاب عمودي الوضع تختلط حافته في الاسفل فيتكوّن من ذلك خط هو العرف الجبهي يستقر في الميزاب الجيب الطولي العلوي ويرتبط بحافته المنجل الخني. وينتهي العرف الجبهي من الاسفل بثقب مسدود غالباً هو الثقب الاعور وقد يكون مفتوحاً فيهرّ منه وريد من باطن الانف الى الجيب الطولي العلوي. والوجه الباطن مقعر عليه انخفاضات مقابلة لتلافيف الخ وثلوم صغيرة تسير فيها الفروع

شكل ٢٦ الوجه الظاهر للعظم الجبهي ١ وضع الارتفاع الجبهي على الجانب الايمن ٢ القوس الحجاجي ٣ القوس الحجاجي ٤ التتوان الحجاجي الوحشي ٥ التتوان الحجاجي الانسي ٦ الشرم فوق الحجاج الذي يرمّ منه الشريان والعصب فوق الحجاج ٧ الارتفاع الانفي. والارتفاع الواقع في هذه الجهة يدل على وضع الجيبين الجبهيين ٨ الخط الصدغي مبتدئاً من التتوان الحجاجي الوحشي. والى الخلف منه بعض الحفرة الصدغية ٩ الشوكة الانفية

الجداري الاخر الواقع في الجانب المخالف تكوّن منها ميزاب يستقر فيه الجيب الطولي العلوي ويرتبط بمخافتي الميزاب المنجل المخي. وبقرب الميزاب انخفاضات تستقر فيها اجسام باكيونيوس حوافيه اربع عليا وسفلى ومقدمة وخلفية. فالخافة العليا اطولها واغظها وهي مسننة تتصل برفيقتها من الجانب المخالف فيتكوّن من ذلك الدرّز السهمي. والسفلى مقسومة الى ثلاثة اقسام يتصل المقدم منها بالوتدي والمتوسط بالقسم القشري للصدغي والخلفي بالقسم الحلي للصدغي. والمقدمة مسننة تتصل بالجبهي فيتكون من ذلك الدرّز الاكلي. والخلفية شديدة التسنن تتصل بالمؤخري فيتكون الدرّز اللامي

زواياه اربع مقدمة عليا ومقدمة سفلى وخلفية عليا وخلفية سفلى. فالزاوية المقدمة العليا رقيقة مستدقة مشرفة في الجنين على اليافوخ الامامي. والمقدمة السفلى رقيقة طويلة تدخل الخلاء الذي بين الجناح الكبير للوتدي والجبهي وعلى وجهها الباطن ثلم غائر يسير فيه الفرع المقدم للشريان السحائي المتوسط. والخلفية العليا واقعة عند اتصال الدرّز السهمي باللامبي. وهذا الجزء من الجبهة غشائي في الجنين يقال له اليافوخ الخلفي. والخلفية السفلى تتصل بالقسم الحلي للصدغي وعلى وجهها الباطن غالباً ميزاب يستقر فيه بعض الجيب الجبهي

يتعظم الجداري بنقطة واحدة في الارتفاع الجداري. ويبتدئ ذلك نحو الاسبوع السادس من الحيوة الجنينية ثم يمتد نحو محيط العظم في الغشاء الاصلي فلا تتعظم الزوايا الاخيراً وهذا هو السبب في وجود اليافوخين في الجنين عند الولادة قبل كمال التعظم انصالة المنصلي بخمسة عظام وهي رفيقة الجداري والمؤخري والجبهي والصدغي والوتدي ارتباطاته العظمية. ترتبط به عظمة واحدة فقط هي الصدغية

العظم الجبهي

هذا العظم فرد موضوع في الجهة المقدمة من الخوذة ومولّف من قسمين احدها عمودي تتكوّن منه الجهة والاخر اقي تتكوّن منه قبة المحاجين منقسم الى جزئين منفصلين بواسطة شرم كبير يقال له الشرم المنصفي

في القسم العمودي. له وجهان ظاهر وباطن. فالوجه الظاهر قد يشاهد عليه في الخط المتوسط من الاعلى الى الاسفل بروز خفيف في الباعين ودرز في الصغار يظهر منها انه كان مولفاً في الادوار الاولى للحيوة من شطرين جانبيين. والى كل جانب من هذا البروز نحو مركز القسم العمودي ارتفاع مستدير يقال له الارتفاع الجبهي وهو اظهر في الذين ادمغتهم على درجة

والصغيرة. وبالتوالي الوداجي المستقيمة الجانبية. وبالتوالي القاعدي المستقيمان الرأسيتان المقدمتان الكبيرة والصغيرة والمعاصرة العليا للبلعوم


العظمان الجداريان

يتكوّن من اتصال هذين العظمين قبوة الجبهة ومعظم جانبيها . فيتصلان الواحد منهما بالآخر من الاعلى في الخط المتوسط ومن المقدم بالعظم الجبهي ومن الخلف بالمؤخري ومن الاسفل بالوندي والصدغي. كل عظم منها مربع الجوانب له وجهان واربع حواف واربع زوايا فالوجه الظاهر محدب امس عليه نحو مركزه ارتفاع هو الارتفاع الجداري. وفي الارتفاع المذكور يتدنى التعظم وهو غليظ لمقاومة الاخطار التي تعرض لجانب الراس . واسفل الارتفاع الجداري خط منحني ممتد طولاً يقال له الخط الصدغي ترتبط به اللقافة الصدغية. والسطح الذي اعلى الخط الصدغي خشن يغطيه صفاق العضلة المؤخرية الجبهية والسطح الذي اسفله امس لتكوّن منه بعض الحفر الصدغية وترتبط به العضلة الصدغية. وعند مؤخر الحافة العليا الثقب الجداري الذي يرمونه ويريد الى الجيب الطولي العلوي. وقد يكون هذا الثقب مفقوداً

شكل ٢٥



شكل ٢٤



والوجه الباطن مقعر عليه حفر اصبعية تستقر فيها تلافيف المخ وتلوم كثيرة متجهة نحو الاعلى والخلف تستقر فيها فروع الشرايين السخائية. ويُشاهد على الحافة العليا ثلم اذا اتصل بثلمه من

شكل ٢٤ الوجه الظاهر للجداري الايسر ١ الحافة العليا وهي السهمية ٢ الحافة السفلى وهي القشرية ٣ الحافة المقدمة وهي الاكليلية ٤ الحافة الخلفية وهي اللامية ٥ الخط الصدغي ٦ الثقب الجداري ٧ الزاوية المقدمة السفلى ٨ الزاوية الخلفية السفلى

شكل ٢٥ الوجه الباطن للجداري الايسر ١ الحافة العليا وهي السهمية ٢ الحافة السفلى وهي القشرية ٣ الحافة المقدمة وهي الاكليلية ٤ الحافة الخلفية وهي اللامية ٥ بعض الميزاب للجيب الطولي العلوي ٦ الفتحة الباطنة للثقب الجداري ٧ الزاوية المقدمة السفلى وعليها ثلم الشريان السخائي المتوسط ٨ الزاوية الخلفية السفلى وعليها بعض الميزاب للجيب الجانبي


ذهب بعض المشرحين الى ان المُوَّخري والوتدي عظم واحد. والزويتان الجانبيتان واقعتان عند الطرفين الوحشيين للميزابين العرضيين وتدخلان بين الزويتين السفليتين للجدارين والقسم الحلي من الصدغي

حوافيه . الحافة العليا واحدة من كل جانب ممتدة من الزاوية العليا الى الزاوية الجانبية وهي مسننة تتصل بالعظم الجداري فيتكوّن من ذلك التدرز اللامي. والحافة السفلى واحدة من كل جانب ممتدة من الزاوية الجانبية الى الزاوية السفلى. نصفها العلوي يتصل بالقسم الحلي للعظم الصدغي فيتكوّن من ذلك الدرز الحلي المُوَّخري ونصفها السفلي يتصل بالقسم الحجري للصدغي فيتكوّن من ذلك الدرز الحجري المُوَّخري والفاصل بين هذين النصفين التو

الوداجي

بناؤه من صفيحتين مند مجنبتين ظاهرة وباطنة تتوسط بينهما طبقة اسفنجية يقال لها المزدوجة.

شكل ٢٢



وتسمى الباطنة منها بالزجاجية لرقتها وقبولها للكسر يتعظم بسبعة مراكز اربعة منها للقسم المنتشر المتقسم الى اربعة اقسام بواسطة الخط الصليبي ومركزان للتوئين اللقيمين ومركز للتو القاعدي. يتبدى التعظم في القسم المنتشر نحو الاسبوع العاشر ثم في التوئين اللقيمين ثم في التو القاعدي. وعند الولادة يكون العظم مؤلفاً من اربع قطع يتصل بعضها ببعض بين السنة الرابعة والسادسة. ونحو السنة العشرين يتصل التو القاعدي بجسم العظم الوتدي اتصالاً عظيماً


اتصاله المفصلي بستة عظام وهي الجداريان والصدغيان والوتدي والحاملة

ارتباطاته العضلية . ترتبط بالخط المنحني العلوي المُوَّخري الجبهية والمربعة المنحرفة والقصية الترقوية الحليمية. وبالخلاء الواقع بين الخطين المنحنيين المضاعفة والطحالية والمنحرفة العليا. وبالخط المنحني السفلي والخلأ الذي بينه وبين الثقب العظيم المستقيمتان الرأسيتان الخلفيتان الكبيرة


شكل ٢٢ في تعظم العظم المُوَّخري الى زمن الولادة A نحو الاسبوع العاشر من الحيو الجينية a القسم المنتشر من العظم او مراكزه الاربعة b تغطتا تعظم التوئين اللقيمين B ثالثة من اربع قطع عند الولادة a القسم المنتشر a التوئين اللقيمان c التو القاعدي

عليه احياناً ميزاب غائر يستقر فيه الجيب الطولي العلوي ويرتبط بجافتيه المنجل المخي (شرشنة).

شكل ٢٢



شكل ٢١



والخط السفلي وهو العرف المُوخري الباطن يسير الى الحافة الخلفية للثقب العظيم ويستقر فيه الجيب المُوخري ويرتبط بجافتيه المنجل المخي. والخطان المستعرضان يسيران الى الوحشية الى الزاويتين الجانبيتين يستقر فيهما الجيبان الجانبيان وترتبط بجوافيهما الخيمية. وعند مجتمع الميازيب المذكورة انخفاض يقال له مجتمع هيروفيلوس . والى المقدم الثقب العظيم على جانبيه الفتحتان الباطنتان للثقبين اللقميين المقدمين والى الوحشية والخلف منها الفتحتان الباطنتان للثقبين اللقميين الخلفيين. والى مقدم الثقب العظيم التو القاعدي الذي عليه الميزاب القاعدي يستقر عليه الخناز المستطيل . والى كل جانب من هذا الميزاب ثلم ضيق يتصل به ثله في القسم المحجري للعظم الصدغي يستقر فيه الجيب المحجري السفلي

زوواياه. الزاوية العليا داخلية بين الزاويتين الخلفيتين العلويتين للعظمين الجداريين واليا فوخ الخلفي في الجنتين مشرف على هذه الزاوية. والزاوية السفلي هي الطرف المقدم للتو القاعدي الذي يتصل بالوندي قبل البلوغ اتصالاً غضروفياً وبعده اتصالاً عظيماً بحيث

شكل ٢١ الوجه الظاهر للعظم المُوخري ١ الخط المخي العلوي ٢ الحدبة المُوخرية الظاهرة ٣ العرف ٤ الخط المخي السفلي ٥ الثقب العظيم ٦ التوالقي الايمن ٧ الحفرة الخيمية الخلفية التي فيها الثقب اللقي الخلفي ٨ الثقب اللقي المقدم نتجة حافة التو ٩ التوالودي ١٠ الشرم الوداجي ١١ التوالقاعدي ١٢ البروزان الخنثان اللذان يرتبط بهما الرباطان النابيان ١٣ الحافة العليا ١٤ الحافة السفلي

شكل ٢٢ الوجه الباطن للعظم المُوخري ١ الحفرة الخيمية اليسرى ٢ الحفرة الخيمية اليسرى ٣ ميزاب الجزء الخلفي لليبس الطولي ٤ العرف الذي يرتبط به المنجل المخي والذي يجري فيه الجيبان المُوخريان ٦ الحدبة المُوخرية الباطنة ومجتمع هيروفيلوس ٧ الثقب العظيم ٨ التوالقاعدي ٩ منتهى ميزاب الجيب الجانبي ١٠ الحفرة الوداجية التي يكملها القسم المحجري للعظم الصدغي ١١ الحافة العليا ١٢ الحافة السفلي ١٣ الحافة التي تتصل بالنسب المحجري للصدغي ١٤ الثقب اللقي المقدم

فالوجه الظاهر محدب عليه حدة بارزة واقعة بين قمتي والحافة الخلفية للثقب العظيم نحو المنتصف يقال لها الحدة الظاهرة للمُوخري ويرتبط بها الرباط القفوي . وينحدر منها الى الثقب العظيم خط عمودي بارز هو العرف الظاهر للمُوخري . ويخرج من الحدة المُوخرية نحو الوحشية خط من كل جانب هلامي الشكل يُسمى بالخط المنحني العلوي ومن منتصف العرف خط اخر مواز له هو الخط المنحني السفلي . ترتبط بالعلوي منها الى الانسية المربعة المنحرفة والى الوحشية المُوخرية الجبهية والقصية الترقوية الحلمية وبالاخفاض الواقع بين الخطين المضاعفة الى الانسية والطحالية والمنحرفة العليا الى الوحشية وبالخط المنحني السفلي المستقيمتان الرأسيتان الخلفيتان الكبيرة والصغيرة

والثقب العظيم فتحة كبيرة بيضية الشكل قطرها الطويل من الامام الى الخلف يمر منها النخاع الشوكي واغشيته والعصبان الشوكيان الاضافيان والشريبانان الفقريان . والى جانبي الثقب التوان القيمان اللذان يتصلان بالحمامة اتصالاً مفصلياً وهما محدبان مستطيلان متجهان نحو الاسفل والوحشية . وعلى الحافة الانسية لكل تنومنها حدة خشنة يرتبط بها الرباط النابي الذي يربط التوانابي للمحور بالعظم المُوخري . والى الوحشية من التوان القيمان بروز خشن هو التوان الوداجي عليه شرم غائر يتكوّن منه بعض الثقب الوداجي . فالوجه السفلي للبروز المذكور ترتبط به المستقيمة الرأسية الجانبية ووجهه العلوي وهو الدماغى محفور يستقر فيه بعض الجيب الجانبي قبل مصبه في الثقب الوداجي وطرفه يتصل بالقسم الحجري للعظم الصدغي . والى الوحشية من التوان القيمي بقرب مقدمه ثقب هو الثقب القيمي المقدم يمر منه العصب تحت اللسان والى موخر التوان المذكور حفرة فيها ثقب هو الثقب القيمي الخلفي يمر منه ويريد الى الجيب الجانبي . والى مقدم الثقب العظيم صفيحة عظم متينة مربعة الجوانب هي التوان القاعدي وهو اعرض في الخلف منه في المقدم ووجهه السفلي خشن يتكوّن منه السقف العظمي للبلعوم عليه حدة في الخط المتوسط يقال لها الشوكة البلعومية يرتبط بها القيد الوتري للبلعوم والعاصرة العليا له . وعلى كل من جانبي هذه الشوكة اثر خشن ترتبط به الرأسيتان المستقيمتان المقدمتان الكبيرة والصغيرة

والوجه الباطن مقعر جداً منقسم في ما يلي الثقب العظيم الى اربع حفر بواسطة خط صليبي . يستقر في الحفرتين العلويتين الفصان الخلفيان للسخ . وفي السفليتين الفصان الجانبيان للسخ وتلتقي الخطوط الاربعة الصليبية في حدة مركزية هي الحدة الباطنة للمُوخري التي تقابل الظاهرة . فيصعد الخط العلوي من الحدة المذكورة الى الزاوية العليا للعظم المُوخري ويشاهد

القناة الشوكية الى باطن الجمجمة . وهي محفظة للدماغ وآلات الحس الخاص والعمود الفقري محفظة للتحاع الشوكي والموصل بينهما الثقب العظيم الواقع في العظم المؤخري عند قاعدة الجمجمة . شكلها كروي منضغط الجانبين وهي اعرض في الخلف منها في الامام وتستقر على العمود الفقري . وتنقسم الجمجمة عند المشرحين الى خوذة وهي جزءها العلوي ووجه وهو جزءها السفلي . فعظام الخوذة ثمانية وعظام الوجه اربعة عشر وهي

المؤخري	عظام الخوذة ٨	عظام الجمجمة ٢٢
الجداريان		
الجبهي		
الصدغيان		
الوندي		
المصفوي		
الانفيان		
الفكان العلويان		
الدمعيان	عظام الوجه ١٤	
الوجنيان		
الحنكيان		
القرينيان السفليان		
الميكعة		
الفك السفلي		

فيرى من ذلك ان بعض العظام فراد وبعضها ازواج . فالفراد المؤخري والجبهي والوندي والمصفوي من عظام الخوذة والميكعة من عظام الوجه . والازواج ما بقي منها . ولم تدخل في هذا العدد العظيات الاذنية والاسنان وعظام ورمبوس

العظم المؤخري

العظم المؤخري موضوع في الجهة السفلى والخلفية للخوذة . شكله مربع منحرف منحرف على نفسه فيه ثقب كبير يضي الشكل مستطرق بين التجويف الجبهي والقناة الشوكية . له وجهان واربع زوايا واربع حواف


وإثبت ذلك بكيلارد بأنه شاهد ان الانحناء في العسر يكون نحو اليسار وللعمود أيضاً وجه مقدم ووجه خلفي ووجهان جانبيان وقاعدة وقمة وقناة. فالوجه المقدم مؤلف من اجسام الفقرات المنفصلة بواسطة القطع الغضروفية الواقعة بينها. والاجسام المذكورة عريضة في الجهة العنقية ضيقة في الجهة العليا للظهر وكثيرة العرض في الجهة القطنية. والوجه محدب من الجانب الى الجانب ومقعر في الجهة الظهرية محدب في العنقية والقطنية من الاعلى الى الاسفل. والوجه الخلفي عليه في الخط المتوسط التواءات الشوكية وهي قصيرة افقية مفروضة الطرف في الجهة العنقية ومنحرفة في الجهة العليا للظهر وتكاد تكون عمودية في منتصفها وافقية في منتهيها وفي الجهة القطنية. وقد يكون احد التواءات منحرفاً عن الخط المتوسط كما يحدث في الكسر والخلع فيجب الانتباه الى ذلك. والى كل من جانبي التواءات الشوكية على طول جميع العمود الميزاب الفقري وهو قليل الغور مكون من الصنائح في الجهة العنقية والقطنية وغائر عريض مكون من الصنائح والتواءات المستعرضة في الجهة الظهرية. وتستقر في الميزاب المذكور العضلات الغائرة للظهر. والى الوحشية من الميزاب الفقري التواءات المفصلية والى الوحشية منها التواءات المستعرضة. والتواءات المستعرضة موضوعة في الجهة العنقية الى مقدم التواءات المفصلية وبين الثقوب بين الفقرات وفي الجهة القطنية الى مقدم التواءات المفصلية ووراء الثقوب بين الفقرات وفي الجهة الظهرية وراء التواءات المفصلية والثقوب والوجهان الجانبيان منفصلان عن الوجه الخلفي بواسطة التواءات المفصلية في الجهة العنقية والقطنية والتواءات المستعرضة في الجهة الظهرية. ويشاهد عليهما من المقدم جوانب اجسام الفقرات وعليهما في الجهة الظهرية الحفر التي تتصل برؤوس الاضلاع. والى الخلف من الحفر الثقوب بين الفقرات المكونة من اتصال الشروم بين الفقرات. وهي بيضية الشكل صغيرة في الجهة العنقية والجزء العلوي من الجهة الظهرية ثم يزداد حجمها شيئاً فشيئاً الى الثقب وموضوعة في التواءات المستعرضة في العنق والى مقدمها في الظهر والقطن وتمر منها الاعصاب الشوكية. وقاعدة العمود مكونة من الوجه السفلي للفقرة القطنية الخامسة وقمته من الوجه العلوي للاطلس. والقناة الشوكية تتضمن الحبل الشوكي واغشيتة وهي منحنية كالحناء العمود واسعة مثلثة الشكل في العنق والقطن وضيقة مستديرة في الظهر

في الجمجمة

الجمجمة انبساط العمود الفقري الى الاعلى بحيث يتكون من ذلك تجويف واحد ممتد من

كلام كلي في العمود الفقري

شكل ٢٠



بحسب طول القامة على ان معظم طول الشخص يعود الى طول الطرفين السفليين

اذا نُظِرَ الى العمود من المقدم شوهد انه مكوّن من هرمين متصلين عند قاعدتهما يتألف العلوي منها من الفقرة العنقية الثانية الى القطنية الاخيرة والسفلي من العجز والعصعص. واذا حقتنا النظر الى الهرم العلوي راينا انه مؤلف من ثلاثة اهرام راس العلوي منها المحور وقاعدته الظهرية الاولى. والثاني مقلوب قاعدته الظهرية الاولى ورأسه الظهرية الرابعة. والثالث رأسه الظهرية الرابعة وقاعدته القطنية الخامسة


واذا نُظِرَ اليه من الجانب شوهد انه مؤلف من اربعة خطوط منحنية وهي العنقي والظري والقطني والحوضي. فالخط المنحني العنقي يبدأ عند قمة التوالتالي وينتهي في منتصف الفقرة الظهرية الثانية وهو محدب من المقدم واقل انحناء من بقية الخطوط. والظري مقعر من المقدم يبدأ عند منتصف الفقرة الظهرية الثانية وينتهي في منتصف الفقرة الثانية عشرة واشده بروزاً في الوراة نقطة تقابل الظهرية السابعة او الثامنة. والقطني محدب من المقدم يبدأ عند منتصف الفقرة الاخيرة وينتهي عند الزاوية العجزية الفقرة. والحوضي مقعر من المقدم يبدأ عند المفصل العجزية الفقري وينتهي في راس العصعص. وانحناء الخطوط المذكورة موقوف على شكل اجسام الفقرات وعلى سماكة الغضاريف المتوسطة بينها كما سيأتي في الكلام على مفاصل العمود

وللعمود انحناء اخر خفيف جانبي تجديبه مشرف نحو اليمين وقد علل بيشات اولاً عن ذلك بانه حادث عن العمل العضلي اذ الجانب الاعظم من البشر يستعملون ايديهم اليمنى اكثر من اليسرى.

شكل ٢٠ منظر جانبي للعمود الفقري وخطوطه المنحنية بعد نشره طولاً ١ الاطلس ٢ المحور ٣ البارزة وهو الفقرة السابعة العنقية ٤ الفقرة الظهرية الثانية عشرة ٥ الفقرة القطنية الخامسة ٦ القطعة الاولى من العجز ٧ القطعة الاخيرة من العجز ٨ العصعص ٩ تتوشكي ١٠ او ١٠ ثوب بين الفقرات

العصص

العصص عظم صغير موضوع في الطرف السفلي للعمود مثلث الشكل يتصل من قاعدته براس العجز. وهو مؤلف في الاصل من اربع فقرات اثرية يشاهد في الثلاث العليا منها رسم الجسم والتواتر المفصلي والمستعرضة واما الرابعة فكتلة عظمية لاشيء فيها من الرسوم المذكورة. له وجه مقدم ووجه خلفي وحافتان جانبيتان وقاعدة ورأس. فالوجه المقدم



شكل ١٩

مقعر قليلاً عليه ثلاثة ميازيب مستعرضة تدل على خطوط الاتصال بين القطع الاصلية ويتدغم به الرباط العجزي العصصي المقدم والعضلة الرافعة للاست ويسند الطرف السفلي للمستقيم. والوجه الخلفي محدب عليه ميازيب مستعرضة كالوجه المقدم وعلى جانبيه صف حديبات هي رسوم التواتر المفصلي الزوج العلوي منها كبير يُسَمَّى بقرفي العصص

يتصلان بقرفي العجز فيتم من الاتصال المذكور الثقبان العجزيان الخامسان يمرّ منهما الفرعان الخلفيان للعصبين العجزيين الخامسين. والحافتان الجانيتان رقيقتان يرتبط بهما من كل جانب الرباطان العجزيان الوريكان والعضلة العصصية. والقاعدة عليها سطح بيضي الشكل يتصل بالعجز. والرأس مستدير يرتبط به وتر العضلة العاصرة الظاهرة للاست

يتعظم باربع نقط واحدة لكل قطعة. ويتبدى التعظم في القطعة الاولى عند الولادة وفي القطعة الثانية بين السنة الخامسة والعاشره وفي الثالثة من السنة العاشرة الى الخامسة عشرة وفي الرابعة من السنة الخامسة عشرة الى العشرين. ثم تتصل القطع بعضها ببعض فتصير عظماً واحداً يتصل بالعجز اتصالاً عظماً بين السنة الاربعين والستين

اتصاله المنصلي بالعجز فقط

وتندغم به العضلة العصصية من جانبه والالوية الكبيرة من الخلف والعاصرة للاست من راسه والرافعة للاست من المقدم

كلام كلي في العمود الفقري

العمود الشوكي مؤلف من اتصال الفقرات وموضوع في الخط المتوسط في الجزء الخلفي من العنق والصدر والبطن والمحوض. طوله الاعتيادي نحو ثمانية وعشرين قيراطاً ويختلف

شكل ١٩ الوجه المقدم للعصص ١ و٢ و٣ والقطع الاربع الموائف منها العظم ٥ و٦ التواتر المستعرضان للقطعة الاولى ٦ الملعق المنصلي الذي يتصل براس العجز ٧ و٨ الترنان اللذان يتصلان بقرفي العجز

الرباطان العجزيان المحرقفیان الخلفیان . والنصف السفلي رقيق حاد يرتبط به الرباطان العجزيان الوركيان الكبير والصغير وبعض الياف من العضلة الالوية الكبيرة . ويشاهد عند اسفله شرم اذا اتصل بالعصص يتحول الى ثقب يمر منه الفرع المقدم للعصب العجزي الخامس والقاعدة عريضة مشرفة نحو الاعلى والمقدم يشاهد في منتصفها سطح بيضي الشكل يتصل بجسم الفقرة القطنية الاخيرة وتحدّه من الخلف فتحة مثنائة كبيرة مستطرفة الى القناة العجزية . والفتحة المذكورة مكونة الى الخلف من صفيحتي الفقرة الاولى العجزية وبرز من جانبيها التوان المفصليان العلويان المشرفان نحو الخلف والانسية كالتوات المفصالية العليا لل فقرات القطنية . والى مقدم التوات المفصلي من كل جانب شرم يكون النصف السفلي للثقب الاخير بين الفقرات والراس مكوّن من الوجه السفلي للفقرة الاخيرة العجزية وهو بيضي الشكل عرضاً يتصل بالعصص

والقناة العجزية كبيرة مثلثة الشكل في الاعلى صغيرة مسطحة من الامام الى الخلف في الاسفل . تستقر فيها الاعصاب العجزية وتستطرق اليها الثقوب العجزية المقدمة والخلفية التي تمرّ منها الاعصاب


بناء العجز من النسيج الاسفنجي مغطى بطبقة رقيقة من النسيج المندمج ويختلف العجز في الاناث عنه في الذكور من جملة وجوه وهي اولاً انه اعرض بالنسبة الى طوله ثانياً انه اقل انحناءً ثالثاً ان اتجاهه الى الخلف اكثر انحرافاً فيزيد اتساع التجويف الحوضي وبروز الزاوية العجزية الفقرية . وقد يكون العجز مولفاً من ست فقرات ويندرنا اليه من اربع

يتعظم العجز بخمس وثلاثين نقطة . ويتبدى^١ التعظم نحو الاسبوع الثامن من التكوين الجنيني في مركز اجسام الفقرات . وبين الشهر السادس والثامن في الصفايح . ونحو السنة الثانية لتحذ الصفايح من الوراثة والى السنة السادسة تحذ بالاجسام . وفي السنة السادسة عشرة تظهر الصفايح العليا والسفلى للاجسام . وتتصل الاجسام بعضها ببعض من الاسفل الى الاعلى وينتهي الاتصال المذكور بين السنة الخامسة والعشرين والسنة الثلاثين


اتصاله المفصلي باربعة عظام وهي الفقرة القطنية الاخيرة من الاعلى والعصص من الاسفل والمحرقفيين من الجانبين وتندغم به من العضلات الهرمية من المقدم والعصصية من الجانب والالوية الكبيرة والناصبة الشوكية من الخلف

الفقرة الخامسة العجزية وعلى جانبيها حديتان بارزتان الى الاسفل هما القرنان العجزيان اللذان

شكل ١٨



شكل ١٧



يتصلان بقربي العصعص. وعلى جانبي الحرف البارز سطح املس متعر مكوّن من الصفائح يقال له الميزاب العجزى يتصل من الاعلى بالميزاب الفقري وتنشأ منه العضلة الناصبة الشوكية. والى الوحشية من هذا الميزاب حديتان غير واضحة موضوعة على هيئة خط طوي بمزلة التوات المفصلة لل فقرات الصحيحة الزوج العلوي منها كبير يتصل بالفقرة القطنية الاخيرة. والى الوحشية منها التتوب العجزية الخلفية وهي اصغر من المقدمة تمر منها الفروع الخلفية للاعصاب العجزية. والى الوحشية من التتوب حديتان بمزلة التوات المستعرضة الزوج العلوي منها كبير تتكوّن منه الزاويتان العلويتان للعجز والزوج الثاني يدخل في تكوين المفصل العجزى الحرقفي والثالث يرتبط به الرباطان المنحرفان العجزيان الحرقفيان والرابع والخامس يرتبط بهما الرباطان العظامان العجزيان الوركيان

الوجهان الجانبيان عريضان من الاعلى رقيقان حادان من الاسفل. النصف العلوي يشاهد عليه الى المقدم سطح على هيئة الاذن يقال له السطح الاذني مغطى اذا كان حديثاً بغضروف ويتصل اتصالاً مفصلياً بالعظم الحرقفي. والى الوراء اثار غائرة خشنة يرتبط بها

شكل ١٧ الوجه المقدم للعجز. ١ او او او المخطوط العرضية الدالة على بناء العجز من خمس قطع في الاصل ٢ و ٢ و ٢ و ٢ و ٢ التتوب العجزية المقدمة ٣ الزاوية العجزية القترية ٤ السطح الاذني الذي يتصل بالحرقفي ٥ الحرف الحاد الذي يرتبط به الرباطان العجزيان الوركيان ٦ السطح المفصلي الذي يتصل بالفقرة القطنية الاخيرة ٧ السطح المثلث الذي يسند العضلة الصليبية ٨ التتو المفصلي الايمن ٩ رأس العجز او قبة ١٠ احد القرنين العجزيين ١١ اللحم الذي يصير نقياً عجزياً خامساً

شكل ١٨ الوجه الخلفي للعجز او او او التوات الشوكية الاثرية الاربعة ٢ و ٢ و ٢ و ٢ و ٢ التوات المفصلة الاثرية ٤ التوات السفلي منها وهو القرن العجزى ٥ و ٥ و ٥ و ٥ و ٥ التتوب العجزية الخلفية ٦ و ٦ و ٦ و ٦ و ٦ الحديتان المستعرضة الخلفية ٧ الوجه الاذني ٨ الحرف الحاد ٩ السطح المفصلي الذي يتصل بالفقرة الاخيرة ١٠ او ١٠ حفرتان للتتوين المفصليين ١١ قمة العجز التي تتصل بالعصعص ١٢ السطح الحشن الذي يرتبط به الرباط العجزى الحرقفي الخلفي

العجز

اجزاء عظيمة منفصلة وهي الجسم وقطعتان جانبيتان للقوس . وفي السنة الاولى تتصل صفيحتا القوس من الورا عند التوالشوكي فيصير القوس قطعة واحدة . وفي السنة الثالثة يتصل القوس بالجسم بواسطة جوهر غضروفي . ومن هذ السنة الى البلوغ تتعظم التوات الفقرية الا ان اطرافها تبقى غضروفية الى السنة السادسة عشرة فتتكوّن لها حينئذ نقط ثانوية . وفي السنة المحادية والعشرين تتكوّن صفيحتان عظمتان على الوجه العلوي والسفلي للجسم . ولا يتم الانصال العظمي بين جميع الاجزاء المذكورة الا نحو السنة الثلثين

العجز

العجز عظم كبير مثلث الشكل موضوع في الطرف السفلي للعمود الفقري اسفل الفقرة القطنية الاخيرة اعلى العصعص وبين العظمين الحرقفيين قاعدته الى الاعلى ورأسه الى الاسفل يتكوّن منه القسم العلوي والخلفي من الحوض . وهو مؤلف من خمس فقرات كاذبة في الاصل ثم تتحد وتصبح عظماً واحداً في البالغ . وهو متعراملس من الامام لاجل اتساع التجويف الحوضي محدب خشن من الخلف منحرف الوضع طرفه العلوي بارز الى المقدم فيتكون من انصاله بالقرة القطنية الاخيرة زاوية شديدة البروز يقال لها الزاوية العجزية الفقرية . اقسامه التشريحية وجه مقدم ووجه خلفي ووجهان جانبيان وقاعدة وراس وقناة مركزية

فالوجه المقدم وهو الحوضي متعر من الاعلى الى الاسفل و قليلاً من الجانب الى الجانب . ويقاطع منتصفه اربعة خطوط مستعرضة تدل على اتصال اجسام الفقرات الخمس الاصلية التي يتألف منها العجز . ويشاهد عند اطراف الخطوط المذكورة اربعة ثقوب من كل جانب يقال لها الثقوب العجزية المقدمة وهي بمنزلة الثقوب بين الفقرات تقرب ان تكون مستديرة الشكل متجهة الى الوحشية والمقدم ويصغر حجمها من الاعلى الى الاسفل تمرّ منها الفروع المقدمة للاعصاب العجزية . والى الوحشية من الثقوب العجزية الكتلة الجانبية وهي عبارة عن اخلاط التوات المستعرضة في البالغ . ويقاطع الكتلة الجانبية اربعة ميازيب من كل جانب عريضة منفصلة بواسطة اربعة خطوط بارزة تمرّ من الميازيب الاعصاب العجزية المقدمة في سيرها الى الوحشية وترتبط بالخطوط العضلة الهرمية

والوجه الخلفي وهو الظهري محدب غير مستواضيق من الوجه الحوضي . يشاهد عليه في الخط المتوسط اربع حدبات صغيرة هي اثار التوات الشوكية وتكون غالباً متصلة على هيئة حرف بارز . واسفل التوالشوكي الاخير فتحة مثلثة الشكل هي منتهى القناة الشوكية مكونة من صفيحتي

السطيحات المفصليّة للاتصال بالاضلاع . الجسم كبير عريض قطره المستعرض اطول من قطره الامامي الخلفي وقاعدته متسعة لحمل الثقل الواقع عليها . والعنقان قويان جداً والصفيحتان قصيرتان غليظتان عريضتان والشرم العلوي بين الفقرات قليل الغور والسفلي كثير النور كالقنطرة الظهرية والثقب الشوكي كبير مثلث الشكل . والنور الشوكي غليظ عريض افقي

شكل ١٤




الاتجاه الى الورااء . والتوان المستعرضان طويلان منضغطان رقيقان من الاعلى والاسفل بارزان الى الوحشية وبعض المشرحين يعتبرها بمنزلة ضلعين . والتوات المفصليّة العلويان منها مقعران مشرفان نحو الخلف والانسية . والسفليان محدبان مشرفان نحو الامام والوحشية . ويبرز من التوات المفصلي العلوي الى الخلف والاعلى حذبة قصيرة مسطحة يقال لها التوات المستعرض الخلفي وقد يوجد عند قاعدتها حذبية اخرى متجهة نحو الاسفل


والفقرة الخامسة لها صفات خاصة بها وهي ان جسمها اغلظ جداً في الامام منه في الخلف فينسب عن ذلك بروز المفصل العجزي الفقري وتنويرها المستعرضين اكبر واغلظ من التوات المستعرضة للفقرات الاخر

في تعظم الفقرات . تتعظم كل فقرة بثلاث نقط اصلية بين الاسبوع السادس والثامن للحيوة

شكل ١٦



شكل ١٥



الجينية واحدة للجسم وواحدة لكل من جانبي القوس . عند الولادة تكون الفقرة مؤلفة من ثلاثة

شكل ١٤ منظر جانبي لفقرة ظهرية ١ الجسم ٢ وجهه العلوي ٣ الشرم العلوي بين الفقرات ٤ الشرم السفلي بين الفقرات ٥ التوات الشوكي ٦ التوات المستعرض ٧ التوات المفصليان العلويان ٨ التوات المفصليان السفليان

شكل ١٥ تعظم الفقرات A النقط العظمية الثلاث عند الولادة ١ و ٢ جانبا القوس ٣ الجسم B من السنة الثالثة الى السادسة عشرة تولد التوات وتعظمها الاطرافها ١ و ٢ التوات ٣ الجسم

شكل ١٦ من السنة السادسة عشرة الى الحادية والعشرين تعظم اطراف التوات والوجه العلوي والسفلي للجسم ٤ و ٥ طرفا التواتين المستعرضين ٦ طرف التوات الشوكي ٧ الصفيحة العليا للجسم ٨ الصفيحة السفلي ٩ و ١٠ طرفا التواتين المفصليين السفليين

صفات الفقرات الظهرية

الفقرات الظهرية اثنتا عشرة ويرتكز عليها اثنا عشر ضلعاً من كل جانب. وهي متوسطة
الوضع والحجم بين الفقرات العنقية والقطنية. جسمها اغلظ قليلاً
في الخلف منه في الامام وقطر الجسم من الامام الى الخلف كقطره
تقريباً من الجانب الى الجانب وهو قلبي الشكل وعليه من كل
جانب نصف حفرة من الاعلى ونصف حفرة من الاسفل اذا
انصلت الفقرات بعضها ببعض تألف من ذلك حفر كاملة
ترتكز عليها رؤوس الاضلاع وتتصل بها اتصالاً مفصلياً. والحفر
المذكورة صفة مميزة للفقرات الظهرية. والعنقان متجهان الى
الوراء والشروم السفلي بين الفقرات كبيرة غائرة. والصفحتان عريضتان غليظتان والثقب
الشوكي صغير مستدير. والتتواتر المفصلي مسطحة عمودية الاتجاه تقريباً بارزة من العنقين
والسطحان المفصليان العلويان مشرفان نحو الخلف والسفليان نحو الامام. والتتواتر المستعرضان
غليظان قويان متجهان الى الوحشية والخلف وعلى مقدم طرفها سطح للاتصال بمجدبة الضلع.
والتتواتر الشوكي طويل مثلث الجوانب متجه بالخراف الى الاسفل وينتهي بمجدبة صغيرة. ويركب
بعضها فوق بعض من الفقرة الخامسة الى الثامنة

والفقرات الظهرية التي نتميز عن اخواتها هي الاولى والتاسعة والعاشر والحادية عشرة
والثانية عشرة. فالاولى لها حفرة كاملة للضلع الاول ونصف حفرة للثاني وجسمها اطول من
الجانب الى الجانب مما هو من الامام الى الخلف فهو كالفقرات العنقية. والتاسعة لها نصف حفرة
من الاعلى فقط. والعاشر لها حفرة كاملة من الاعلى وليس لها نصف حفرة من الاسفل.
والحادية عشرة والثانية عشرة لكل منهما حفرة كاملة على كل جانب وتواترها المستعرضة خالية
من السطحات المفصليّة. وهما اشبه بالفقرات القطنية. وتتميز الثانية عشرة عن الحادية عشرة بان
تتويها المفصليين السفليين محدبان ومتجهان الى الوحشية كالفقرات القطنية

صفات الفقرات القطنية


الفقرات القطنية خمس وتتميز عن بقية فقرات العمود بانها اكبرها جرماً وبانها خالية من

شكل ١٢ - منظر جانبي لفقرة ظهرية ١ الجسم ٢ و٣ حفر مفصليّة للاتصال برؤوس الاضلاع ٤ الوجه العلوي للجسم
٥ الثرم العلوي بين الفقرات ٦ التتواتر الشوكي ٧ طرف التتواتر المستعرض واليو سطح مفصلي
للاتصال بمجدبة الضلع ٨ السطحان المفصليان العلويان مشرفين الى الوراء ٩ السطحان المفصليان السفليان مشرفين الى الامام

قطعتان غليظتان قويتان موضوعتان بين القوسين تملان ثقل الرأس. والتوات المفصالية راكزة عليهما فالعلويان منها مقعران تقيماً يضي الشكل يتصلان اتصالاً مفصلياً بالعظم المؤخري والسفليان مستديران مسطحان وضعهما افقي يتصلان بالمحور فتتم من الاتصال المذكور حركة رحوية من الحاملة على المحور. واسفل التوين المفصليين العلويين الى الانسية حدة يرتبط بها الرباط المستعرض الذي يمتد من الحدة الواحدة الى الاخرى فيقسم الحلقة الى قسمين غير متساويين مقدمها الاصغر يشغله التو النابي للمحور والخلفي اكبرها يمر منه الحبل الشوكي واغشيته. والتوان المستعرضان كبيران تندغم بهما عضلات معينة في تدوير الرأس وهما طويلان غير مفروضين يخترقهما الثقب الفقري

والمحور سمي بذلك لان الرأس يدور حوله دوراً رحوياً وتسمى هذه الفقرة بالنايبة ايضاً لان لها تواء نابي الشكل فهو النقطة التي يدور الرأس حولها. الجسم مثلث الشكل وعلى وجهه المقدم خط طولي فاصل بين فقيرين جانبيين يندغم بهما بعض العضلات العنقية الطويلتين.

شكل ١٢




والتو النابي بارز من الجسم الى الاعلى على وجهه المقدم سطح امس يتصل بالحاملة وعلى وجهه الخلفي ميزاب امس يرف فيه الرباط المستعرض. وترتبط بفتحة الارتباط النابية التي تربط المحور بالمؤخري. والصفيحتان كبيرتان قويتان تحدان في الوراثة فيتكوّن من ذلك التو الشوكي وهو طويل مفروض مقعر من الاسفل. والتوان

المستعرضان قصيران غير مفروضين والتوان المفصليان العلويان مستقران على جانبي قاعدة التو النابي وموضوعان الى مقدم الشرمين بين الفقرات كالحاملة وسطحها المفصليان مستديران مشرفان نحو الاعلى وقليلاً الى الوحشية. والتوان المفصليان السفليان منفصلان عن الجسم بشرم ومشرفان نحو الاسفل والمقدم كبقية الفقرات العنقية

والبارزة وهي الفقرة العنقية السابعة صفتها الخاصة ان تنوها الشوكي بارز طويل جداً. وهي اكبر الفقرات العنقية وشبيهة بالظهرية. تنوها الشوكي غليظ يكاد يكون اتجاهه افقياً غير مفروض يرتبط به الرباط الفقري الذي يعين في حفظ الرأس منتصباً. تنوها المستعرض كبير غالباً والثقب الفقري صغير وقد يكون مفقوداً في الجانب الواحد والجانبين وفي الغالب لا يمر منه الشريان والوريد الفقريان بل يبدآن من الثقب الواقع في الفقرة العنقية السادسة

شكل ١٢ منظر جانبي للمحور ١ الجسم الذي تندغم به العضلة العنقية الطويلة ٢ التو النابي ٣ السطح الامس الواقع على الوجه المقدم للتو النابي الذي يتصل بانوس المقدم للحاملة ٤ الثقب الفقري ٥ التو الشوكي ٦ السطح المفصلي السفلي ٧ السطح المفصلي العلوي ٧

شكل ١٠




الثقب الفقري وهو ثقب كبير مستدير يمر منه الشريان والوريد الفقريان والضفيرة الفقرية العصبية. وكل من التوئين المذكورين ينشأ باصليين احدهما مقدم يبرز من جانب الجسم فهو شبيه بالضلع في الفقرات الظهرية والاخر خلفي يبرز من ملتقى العنق بالصفحة فيشبه التوات المستعرضة للفقرات الظهرية. ومن الخلاء الواقع بين الاصليين يتكوّن الثقب الفقري. والتوات المفصلية كبيرة مسطحة منحرفة الوضع فيشرف العلويان منها نحو الخلف والاعلى والسفليان نحو المقدم والاسفل

واما الفقرات العنقية التي لها صفات خاصة بها فهي الاولى ويقال لها الاطلس والثانية ويقال لها المحور والسابعة ويقال لها البارزة

فالاطلس ويقال لها الحاملة ايضاً لانها حاملة للراس ليس لها جسم ولا نتوشوكي بارز بل هي اشبه بحلقة بسيطة مؤلفة من قوسين احدهما مقدم والاخر خلفي وكتلتين جانبيتين. فالقوس المقدم بمنزلة الجسم على وجهه الامامي حدة ترتبط بها العضلة العنقية الطويلة وعلى وجهه الخلفي حفرة ملساء للاتصال المفصلي بالتو الثاني للمحور. والقوس الخلفي اطول وادق من القوس

شكل ١١



المقدم مسطح من الاعلى الى الاسفل وينتهي من الورا بحدبة هي اثر نتوشوكي تنشأ منها العضلة الراسية المستقيمة الخلفية السفلى. على الوجه العلوي من كل جانب عند اتصال القوس بالكتلتين الجانبيتين ميزاب قليل الغور قد يتحول الى ثقب بواسطة قوس عظمي يمر فيه الشريان

الفقري قبل دخوله الحجمة والعصب تحت المؤخري. والميزاب المذكور بمنزلة الثقب بين الفقرات الا انه موضوع وراء التوات المفصلية لا امامها كبقية الفقرات. والكتلتان الجانبيتان

شكل ١٠ الوجه العلوي لفقرة من الفقرات العنقية المتوسطة. ١ الجسم مقعر في الوسط مرتفع الجانبين على هيئة حرف حاد ٢ الثقب الشوكي ٣ العنق مقعر بواسطة الشرم العلوي بين الفقرات ٤ التوات الشوكي المقروض ٥ التوات المستعرض ٦ الثقب الفقري ٧ التوات المفصلي العلوي ٨ التوات المفصلي السفلي. واما الصفحة فتشاهد بين التوات الشوكي والتوئين المفصليين

شكل ١١ الوجه العلوي للحاملة وهي الاطلس ١ الحدبة البارزة من الوجه الامامي للقوس المقدم ٢ السطح المفصلي على الوجه الخلفي للقوس المقدم الذي يتصل بالتوات الثاني للمحور ٣ القوس الخلفي ونبوة الشوكي الاثري ٤ الشرم بين الفقرات ٥ التوات المستعرض ٦ الثقب الفقري ٧ السطح المفصلي العلوي الذي يتصل بالعظم المؤخري ٨ الحدبة التي يرتبط بها الرباط المستعرض

بعض تكوّن من الشروم المذكورة ثقب هي الثقب بين الفقرات . وهذه الثقب مستديرة مستطرفة الى القناة الشوكية ثم منها الاعصاب والوعية الشوكية . والصفحة قطعة من العظم عريضة اذا التقت برفيقتها من الجانب الخالف اكملت القوس . وهي خشنة من الاعلى والاسفل ترتبط بها الاربطة الصفراء

والتوات زوائد عظمية نائمة من القوس وهي سبعة تتوشوكي وتوان مستعرضان واربعة مفصلية . فالتوات الشوكي بارز الى الورا من القوس عند التقاء الصفيحين في الخط المتوسط . والتوان المستعرضان واحد من كل جانب يبرزان من جانبي القوس الى الوحشية . فائدة هذه التوات الثلاثة ارتباط العضلات بها . والتوات المفصلية اربعة بارزة من الصفيحين اثنان منها علويان واثنان سفليان . وعليها سطوح مفصلية فالسطحان العلويان مشرفان نحو الخلف والسفليان نحو الامام يتصل العلويان من الفقرة الواحدة بالسفليين من الفقرة التي اعلاها والسفليان بالعلويين من الفقرة التي اسفلها . فائدة هذه التوات الاتصال المفصلي بين الفقرات لاجل تكوين العمود

والثقب الذي تكتنفه الحلقة يحدّه من المقدم الجسم ومن الخلف والجانبين القوس . ثم اذا انصلت الحلقات بعضها ببعض بواسطة الاربطة تكوّنت من الثقب المذكورة قناة طولية هي القناة الفقرية او الشوكية الموضوع فيها الحبل الشوكي بناء جسم الفقرات من النسيج الاسفنجي مغشّى بطبقة رقيقة جداً من النسيج المندمج . واما القوس فنسجته الاسفنجي اقل وطبقة المندمجة اغلظ مما يشاهد في الجسم

صفات الفقرات العنقية

الفقرات العنقية سبع منها ثلاث لها صفات خاصة بها وهي الاولى والثانية والسابعة واما ما بقي منها فصفتها مشتركة وهي ان الجسم صغير بالنسبة الى بقية الفقرات اعرض من الجانب الواحد الى الاخر ما هو من الامام الى الخلف . وجهه العلوي مقعر عرضاً وعلى كل من جانبيه شفة بارزة . وجهه السفلي محدب من الجانب الى الجانب مقعر من الامام الى الخلف وعلى جانبيه ثلم لقبول الشفة البارزة من الفقرة السفلى . والصفيحان مسطحان طويلتان والثقب الشوكي كبير مثلث الشكل . والتوات الشوكي قصير بارز الى الورا اقلياً او منخفض قليلاً مفروض عند طرفه ويستطيل من الفقرة الرابعة الى السابعة . والتوان المستعرضان قصيران مفروضان عند طرفها وعليها من الاعلى ميزاب غائر تستقر فيه الاعصاب الشوكية . ويخترق قاعدتها

العدد وسياقي الكلام عليها. وحذف أيضاً المعلم كروفيليه العظام الاذنية فجعل عدد العظام ١٩٨. وحذفها المعلم كواين واطاف الرضفتين فكان العدد ٢٠٠

في العمود الفقري

العمود الفقري اساس لجميع الهيكل وذلك اولاً لانه يشاهد في جميع الحيوانات التي لها جهاز عظمي وثانياً لانه المركز الذي تتكون وتجتمع حوله بقية اجزاء الجسد. وهو حامل للجمجمة من الاعلى وتتصل الاضلاع بجانبه فيحمل بواسطتها ثقل الطرفين العلويين ويستقر بقرب طرفه السفلي على العظمين الحرقفيين الذين يحملها الطرفان السفليان. وتخرقه قناة عظمية واقية للحمى الشوكي الموضوع فيها. وهو سلس الحركة مولف من ستة وعشرين عظماً تُسمى بالفقرات منها اربع وعشرون فقرة صحيحة واثنان كاذبان هما العجز والعصعص وتقسّم الفقرات تبعاً للجهة الواقعة فيه الى عنقية وهي سبع فقرات وظهرية وهي اثنتا عشرة وقطنية وهي خمس وعجزية وهي خمس في الاصل ثم تُنحد وتصبح واحدة في البالغ وعصعصية وهي اربع في الاصل ثم تصبح واحدة في البالغ. ويندران يخرج هذا العدد عن ما ذكر ولا سيما في الفقرات العنقية

وللفقرات صفات عامة مشتركة بينها تميزها عن بقية العظام وصفات خاصة بكل قسم من اقسامها العنقية والظهرية والقطنية. ولبعض الفقرات من كل قسم صفات خاصة بها

الصفات العامة للفقرات

القرة على هيئة حلقة مؤلفة من جسم وقوس وتوات

فالجسم كتلة غليظة على هيئة اسطوانة قصيرة موضوعة في الجزء المقدم من القرة. ووجهه المقدم محذب من الجانب الى الجانب مقعر قليلاً من الاعلى الى الاسفل. ووجهه الخلفي يكون بعض الحلقة وهو مقعر قليلاً من الجانب الى الجانب. ووجهه العلوي ووجهه السفلي يقربان من المسطح ترتبط بهما الصفائح الغضروفية التي تتوسط بين كل فقرتين والاتصال المذكورين اجسام الفقرات يعين في تكوين العمود. ويشاهد على وجهه المقدم والخلفي ثقب لمرور اوعية دموية اكثرها اوردة منها ثقب واحد في الوجه الخلفي يقرب المنتصف اكبر من الثقب الاخر والقوس مؤلف من نصفين متناسبين يبرزان من جانبي الوجه الخلفي للجسم ويلتقيان في الخط المتوسط الى الورا. كل نصف منها يقسم الى جزء مقدم يقال له العنق وجزء خلفي يقال له الصفيحة. فالعنق مقعر من الاعلى والاسفل ولا سيما من الاسفل اذا اتصلت الفقرات بعضها

في السنة التاسعة. في العظم الشبيه بالمرجع المنحرف
 في السنة الثانية عشرة. في البسلي من رسغ اليد والقطعة الثالثة للعصص
 في السنة الثامنة عشرة. في القطعة الرابعة للعصص
 ثم ان العظام الاذنية وحدها يكون قد تكامل تعظها عند الولادة. واما الفقرات فلا
 يتكامل تعظها الا نحو السنة الخامسة والعشرين. ومعرفة الازمنة التي فيها يتم الاتصال العظمي
 بين الاطراف واجسام العظام الطويلة تعين الجراح في تشخيص بعض افات المفاصل لان قبل
 الاتصال المذكور يكون الاتصال غضروفياً فاذا وقع الانفصال حينئذ لعل ما قد يتوهم
 الجراح الكسر

في عدد العظام. قد اختلف المشرحون في عدد عظام الهيكل فحذف بعضهم العظام
 السمائية ومنها الرضفة بناءً على انها عظام تتولد في الاوتار العرضية فلا دخل لها في الهيكل
 وحذفوا ايضاً الاسنان لانها تختلف عن العظام من جهة بنائها وتولدتها وكيفية نموها واطافوها
 الى الجهاز الهضمي. فكان عدد عظام الهيكل على مذهبهم مائتين واربعة وهي

٢٦	العمود الفقري (مع العجز والعصص)
٨	الراس
٦	العظام الاذنية
١٤	الوجه
٢٦	اللامي والقص والاضلاع
٦٤	الطرفان العلويان
٦٠	الطرفان السفليان
٢٠٤	

واضاف غيرهم العظام المحذوفة وهي

٢	الرضفتان
٨	العظام السمائية
٢٢	الاسنان
٢٤٦	

فكان عدد جميع العظام مائتين وستة واربعين. واما عظام ورميوس فلم تدخل في هذا

امتداد الترسيب العظمي اليها وغلظاً بواسطة ترسيب عظمي حديث على السطح الظاهر . واما
القناة النخاعية فتتكوّن وتُتسع بواسطة الامتصاص من باطن العظم

واما دور التعظم فلا يكون في جميع العظام في زمن واحد وانما على سبيل التتابع وذلك
على الكيفية الآتية

في الاسبوع الخامس . يبتدىء التعظم في الرقوة والفك السفلي والفك العلوي .

في الاسبوع السادس . في الفخذ والعضد والقصبة والكعبرة والزند

في الاسبوع السابع والثامن . في الشظية والجبهية والموخرية والوتدي والاضلاع والجداري
والصدغي والافني والميكة والحنكي والفقرات والقطع الثلاث العليا للعجز والوجني والعظام
المشطية والسلاميات الثوالت لليدين والرجلين والحرقفي

في الشهر الثالث . في السلاميات الاوائل والثواني لليدين والرجلين والدمعي والموري
في الشهر الخامس . في الجزء الحلي من العظم الصدغي والمصفوي والقربني السفلي والقص

والعاني والقطعتين الاخيرتين للعجز

في الشهر السادس . في جسم المحور وتوّه النابي والعقب

في الشهر السابع . في الكعب

في الشهر الثامن . في اللامي

وعند الولادة ما يبقى من غير تعظم اطراف جميع العظام الطويلة الا الفخذ والقصبة فانها
قد تكون تعظمت وجميع عظام رسغ اليد والخمسة الصغرى من عظام رسغ القدم والرضفة
والعظام السمسانية

وفي السنة الاولى . في التواغراي للوح والقطعة الاولى للعصعص والقطعة الاخيرة للقص
والقوس المقدم للحاملة وفي العظم الكبير والكلاّبي من رسغ اليد وفي المكعب والاسفني الوحشي
من رسغ القدم


في السنة الثالثة . في الهرمي من رسغ اليد والاسفني الانسي من رسغ القدم والرضفة

في السنة الرابعة . في الاسفني المتوسط والزورقي من رسغ الدم

في السنة الخامسة . في المربع المنحرف والمهلاّلي من رسغ اليد


في السنة السابعة . في القطعة الثانية للعصعص

في السنة الثامنة . في الزورقي من رسغ القدم



واما التعظم فيتم بتكوين الياف في غاية ما يكون من الدقة واللطافة في جوهر الغشاء الفاصل بين الكريات ويتدئ هذا العمل عند نقطة التعظم ثم يمتد منها الى جميع اجزاء العظم طولاً في العظام الطويلة ومشعماً في العظام المسطحة. وذلك على شكل ان الالياف تحيط بكل من مجاميع الكريات على حدها وترسل فواصل بين افراد الكريات التي يتألف منها المجموع فيتكوّن من اجتماع الالياف النسيج الشبكي المميز للعظام ومن اتصال الكريات الخلايا

شكل ٩




الدائمة وقنوات هافرس . غير انه اذا نظّر الى الالياف الدقيقة العظمية بكرسكوب شديد القوة شوهد انها مؤلفة من كريات دقيقة اهليجية الشكل لها نوى مركزية تجذب الى باطنها الاملاح الكلسية من الدم

وتنتهي استحالة المادة الهلامية الى الجواهر الغضروفية نحو الاسبوع السادس في الجنين البشري واول نقطة من نقط التعظم تظهر في الترقوة نحو الاسبوع الخامس. ثم ان التعظم يبدأ في المركز ومنه يتقدم نحو السطح فان كان العظم مسطحاً تشعّع النسيج العظمي بين غشائين من نقطة مركزية نحو المحيط وان كان قصيراً تشعّع من المركز الى المحيط وان كان طويلاً من مركز الجسم نحو نقطة مركزية ثانوية موضوعة عند كل من الطرفين. وللتنوعات الكبيرة كمدوربي عظم الفخذ مراكز خاصة بها . ونمو العظم طولاً عند طرفي الجسم بواسطة

شكل ٨ قطعة من الغضروف نفسه عند نقطة التعظم . يشاهد فيها ان مجاميع الكريات مرتبة على هيئة عمود . ويشاهد الى يسار الشكل اخلية بين العمود وان يمينه الياف عظمية شاغلة للاخلية المذكورة وفاصلة العمود فصلاً طويلاً ثم ترسل زوائد فتفصل كل كرية على حدها . وظلام الطرف الايمن من الشكل عائد الى ثلاثة اسباب الاول زيادة الالياف العظمية الثاني ظلام ما تتضمنه الكريات الثالث زيادة الكريات الرقيقة


شكل ٩ عظم الفخذ قبل كمال التعظم . ١ الرأس ٢ المدور الكبير ٣ المدور الصغير ٤ الجسم ٥ الطرف السفلي

شكل ٦



وفي خلال تكوين نقطة التعظم نأخذ الكريات الغضروفية في الانتقال الى حالة جديدة وهو انها تكون في الاصل بسيطة نووية مستديرة الشكل فاذا تقدم النمو صار شكلها مستطيلاً وشوهد انه قد تولدت في كل نواة نويتان او ثلاث تتكون حولها كريات صغيرة. ثم اذا اقتربنا الى نقطة التعظم وجدنا ان الكريات الحديثة النامية قد بلغ جرمها قدر الكريات

شكل ٧




التي تولدت منها وهو $\frac{1}{300}$ من القيراط. وهكذا كلما زدنا اقتراباً الى نقطة التعظم رأينا ان عدد الكريات المتولدة قد تزايد وحجمها تعاظم وانه قد تكوّن غشاء فاصل بينها وان جدار الكريات المولدة قد انفجر وهلك. وتترتب الكريات على شكل مجاميع تزداد حجماً كلما تقاربت الى نقطة التعظم فتتألف اخيراً من ثلاثين الى خمسين كرية. وشكل المجاميع المذكورة بيضي قطرها الطويل نحو $\frac{1}{30}$ من القيراط موضوعة وضعاً موازياً للمحور الطويل للعظم. واما الكريات التي تتألف منها المجاميع فموضوعة وضعاً مستعرضاً للمحور المذكور

شكل ٦ في تكوين العظم. مكبر ١٥٥ قطراً. A نقطة غضروف بعيدة عن نقطة التعظم. كرياتها بسيطة نووية قطرها الطويل نحو $\frac{1}{300}$ جزء من القيراط B قطعة من ذلك الغضروف ندم اقرب الى نقطة التعظم. كل كرية بسيطة قد صارت اثنتين أكبر من الكريات المرسومة في شكل A


شكل ٧ قطعة من الغضروف نفسه اقرب الى نقطة التعظم من القطعة السابقة في شكل ٦. كل كرية بسيطة من الكريات المرسومة في قطعة B قد ولدت اربع او خمس اوست كريات منظومة على هيئة مجاميع. وبشاهد في الجهة اليمنى للشكل ان المجاميع قد تعاظمت وان كرياتها قد زادت عدداً وجرماً فيبلغ قطرها الطويل $\frac{1}{100}$ جزء من القيراط

حوصلات دقيقة يقال لها كريات مؤلفة من غشاء رقيق على هيئة جدار محيط بسائل او مادة حبيبية ويتضمن السائل المذكور كتلة صغيرة مستديرة يقال لها النواة تتضمن نوية او اكثر. فالليضة التي يتولد منها الحيوان تكون اولاً كرية واحدة والجنين يكون في اول ادواره مؤلفاً بالكلية من الكريات النووية. والكريات باعتبار نسبتها بعضها الى بعض على اربعة انواع. الاول اذا كانت منفردة مستقلة كالكريات الكيلوسية والليمفاوية والدموية. الثاني اذا كانت متصلة بعضها ببعض بواسطة جدرانها او حوافها كما لبشرة والكريات القشرية. الثالث اذا

شكل ٤



شكل ٥



كانت متصلة بواسطة جوهر اخر كما يشاهد في الغضروف والعظم. الرابع اذا اتصلت على هيئة صفوف وسالت وجوها المتصلة فتتكون من ذلك انايب مجوفة كالوعية الشعرية والانايب العصبية. ومن خواص الكريات انها تولد كريات مثلها في باطنها فالعظم في اول ادواره مؤلف من مجاميع هذه الكريات الدقيقة التي تكون حينئذ لينة شفافة شاغلة محل الهيكل العظمي. ويقال لهذا الدور من ادوار التكوين الهلامي. ويعقبه الدور الغضروفي وذلك ان الكريات التي كانت متصلة بعضها ببعض اتصالاً خفيفاً في الدور الهلامي تنفصل في هذا الدور بواسطة غشاء يكون اولاً سائلاً ثم يتجمد ويتصلب. وفي اثناء هذا الدور تتكون في جوهر الغضروف قنوات وعائية وذلك بان بعض الكريات تتصل على هيئة صفوف ثم تسيل سطوحها المتصلة على ما تقدم. ويعقب ذلك تغيير اخر وهو ان القنوات الوعائية نجه نحو نقطة معلومة وتجمع فيها وهناك يتبدى التعظم اي تحويل الجوهـر الغضروفي الى جوهر عظمي فيقال للنقطة المذكورة نقطة التعظم او مركزه. وكل ذلك من الاعمال الحيوية التي لا تعلم علماً طبيعياً

شكل ٤ كريات منفردة يظهر فيها الجدار والمادة الحبيبية التي تتضمنها والنواة والنوية ١ و ٢ ايمتة الاصلية للكريات وما بقي خارج عنها بواسطة الضغط
شكل ٥ كريات نووية مانصق بعضها ببعض بواسطة جدرانها

الأ عند اطرافها الغضروفية وعند ارتباط الاوتار القوية. ناليفة من طبقتين ملتصقتين الظاهرة

شكل ٢



منها مكوّنة من نسيج موصل قد تخالطه بعض كريات دهنية والباطنة مكوّنة من الياف لدنة تتصلب فتكون شبكة غشائية متينة. وهو كثير الاوعية الدموية التي منها ما هو خاص به ومنها ما يدخل من ثقوب دقيقة في الوجه الظاهر للعظم ويتوزع في الجواهر المندمج فيغذيه. فاذا عرض في بعض الافات والامراض نزع السمحاق عن سطح العظم كان ذلك سبباً لتوقف التغذية فيقع الموت في العظم وانفصال ما حلّ به الفساد. والغشاء النخاعي بمنزلة سمحاق باطن للعظم فانه يبطّن القناة النخاعية في العظام الطويلة وتجاوريف الجواهر الشبكي وقنوات هافرس الكبيرة. وهو مجتمع الاوعية الدموية التي تغذي المادة النخاعية الشاغلة لجميع التجاويرف المذكورة والجواهر العظمي المجاور لها. والنخاع مادة زيتية لونها يميل الى الحمرة في الاطفال اصفر في البالغين مكوّنة من كريات دهنية وسائل حامل كريات كثيرة النوى

في اوعية العظام. الاوعية الدموية للعظام كثيرة العدد وهي على نوعين. الاول ينشأ من الشبكة الوعائية التي تتخلل النسيج السمحاقى الظاهر على هيئة اوعية دقيقة تدخل الثقوب الواقعة على ظاهر العظم وتسير في قنّيات مخترقة الجواهر المندمج فتتوزع فيه وفي الجواهر الاسفنجي. والثاني ينشأ من الشريان العظيم الذي يسير على ظاهر العظم على هيئة وعاء واحد يدخل من الثقب الغذائى ويخترق الجواهر المندمج ويتوزع في الغشاء النخاعي متفهماً بفروع الشرايين التي تتوزع في الجواهر المندمج والجواهر الشبكي. والثقب الغذائى المذكور واقع غالباً في نحو منتصف جسم العظام الطويلة وما يقابله في غيرها متجه اتجاهاً منحرفاً. والاوردة تنفذ من العظام على طرق مختلفة. فمنها وريد كبير يصاحب الشريان الغذائى ومنها فروع دقيقة تنفذ من ثقوب عند الطرفين المفصلين للعظام الطويلة او من سطح الجواهر المندمج. والوعية الليففاوية قد استقصاها المعلم كرويكشانك الى باطن العظام وانكرها المعلم كوليكرو. والاعصاب كثيرة في السمحاق تصاحب الشرايين الغذائية الى باطن العظم

في تكوين العظم. جميع الانسجة نباتية كانت او حيوانية انما تتكوّن في اول الامر من


البناء المكرسكوبي للعظم

اليها بالمكروسكوب شوهد انها مؤلفة من ثقب محاطة بصفائح متعاقبة الوضع حولها نقط سود صغيرة مرتبة على شكل حلقي. فالثقب المذكورة فوهات قنوات تُسمى قنوات هافرس وهن

شكل ١



شكل ٢



الذي اكتشفها ووصفها أولاً. وهذه القنوات محفورة في جوهر النسيج المندمج مُبطَّنة بغشاء لطيف ممتد من السحماق تسير فيها الاوعية الدموية التي تغذي العظم. وهي طويلة الاتجاه وضعها موازٍ للمحور الطويل للعظم ويستطرق بعضها الى بعض بواسطة قنوات مستعرضة او منحرفة ويستطرق بعضها الى الوجه الظاهر للعظم فتدخلها اوعية دموية من السحماق وبعضها الى القناة النخاعية فتدخلها الاوعية من الباطن فتتكون من الاستطراق المذكور مواصلة شديدة بين اوعية السحماق واوعية الغشاء النخاعي. والصفائح العظمية موضوعة وضعاً حلقياً حول قنوات هافرس الواحدة بعد الاخرى الى ان يبلغ عددها من عشر الى خمس عشرة. والنقط السود خلايا او تجاوير دقيقة جداً تذهب منها قنيات كثيرة تقاطع الصفائح وتستطرق الى تجاوير اخرى. وكل واحدة من الخلايا المذكورة تتضمن كُرْبَةً حاوية سائلاً صافياً هي الكريات العظمية على ما حَقَّقَهُ المعلم فيرشو

في السحماق. هو غشاء متين ليفي التركيب يغطي العظام ويلتصق بها على جميع مساحتها

شكل ١. البناء المكرسكوبي للعظم. مكرر ٣٠٠ قطر ١ قناة من قنوات هافرس محاطة بالصفائح الحلقيّة ٢ قناة اخرى يشاهد حولها الصفائح والخلايا والقنيات الداخلة منها ٣ سطح احدي القنوات

شكل ٢ قنوات هافرس تشاهد في قطع طولي من الجوهر المندمج لجسم عظم طويل ١ قناة شريانية ٢ قناة وريدية ٣ تدد قناة وريدية

الهيئة الظاهرة للعظام

والتصير والمسطح وغير المنتظم. فالعظام الطويلة خاصة بالاطراف وفائدتها حمل الجذع والحركة وهي مولفة من جزء متوسط هو الجسم وطرفين. فالجسم طويل اسطواناني الشكل اجوف تتكوّن من تجويفه القناة النخاعية. والطرفان احدهما قريب وهو الاقرب لمركز الجسد والاخر بعيد وهو الابدع عن المركز وهما منتشران املسان لاجل الاتصال المفصلي بالعظام المجاورة. والعظام الطويلة هي الترقوة والعضد والزند والكعبرة والفخذ والقصبة والسظبية والعظام المشطية والسلاميات. والعظام القصيرة عظام الرسغ اليدي والرسغ القدي وهي اسفنجية البناء تغطيها قشرة رقيقة من الجوه المندمج. والعظام المسطحة رقيقة منتشرة على هيئة صفائح فيتكوّن من ذلك سطح متسع لاجل اندغام العضلات كعظم النوح اولوقاية عضو كعظام الجمجمة. وهي مكوّنة من طبقتين من الجوه المندمج يتوسط بينهما نسيج شبكي. فالطبقة الباطنة منها في عظام الجمجمة رقيقة كثيفة سريعة الكسر ولذلك سموها الزجاجية ويقال للنسيج الشبكي المتوسط بينها وبين الطبقة الظاهرة المزدوجة. والعظام المسطحة هي الموخرية و**الجداري** و**الجحبي** و**الانفي** و**الدمعي** و**الميكعة** و**اللوح** و**الحرقي** و**القص** و**الاضلاع**. والعظام غير المنتظمة لا تدخل تحت شكل من الاشكال السابقة وهي الفقرات و**العجز** و**العصعص** و**الصدغي** و**الوندي** و**المصفوي** و**الفكي العلوي** و**الفكي السفلي** و**الحنكي** و**القريبي السفلي** و**اللامي**

ويشاهد على سطوح العظام ارتفاعات وانخفاضات تنقسم الى مفصلية وغير مفصلية. فالارتفاعات المفصلية تُسمى بالرووس وما دونها بالاعناق والانخفاضات المفصلية بالحقاق او الحفر كراس الفخذ وعنقه و**الحق** و**الحرقي** و**راس العضد** و**عنقه** و**الحفرة العنابية**. والارتفاعات غير المفصلية لها اسماء بحسب شكلها منها التنوّات كال**تنوّ الحلي** و**الابري** و**الغرابي** و**التنوّات الفقرية** و**العقد** ك**عقد العضد** و**الفخذ** و**المحدرات** ك**المحذبة** و**الموخرية** و**الاعراف** كال**عرف** و**الحرقي** و**الخطوط** ك**الخط الحشن**. وكذلك الانخفاضات على اشكالها منها الحفر ك**الحفرة الصدغية** و**الميازيب** ك**ميازيب ذات الرأسين** و**الشروم** كال**شروم فوق الحجاج** و**الشفوق** ك**شق كلاسيروس**. وفائدة الارتفاعات ومعظم الانخفاضات غير المفصلية اتساع السطح لاجل اندغام الاربطة والعضلات وهي كثيرة الظهور في الذين عضلاتهم على درجة عظيمة من التميّن فتكون اظهر في الرجال منها في النساء وفي الذين يتعاطون الاعمال الشاقة منها في غيرهم

في البناء المكرسكوبي للعظم. اذا قُطعت عرضاً قطعة من جسم عظم طويل ونظر

التركيب الكيماوي للعظم

والشبيكي يشغل الوجه الباطن. وإنما الاختلاف المذكور في البناء هو بحسب الظاهر فقط لانه يظهر لدى التحقيق ان النسيج المندمج كثير الخلايا لانها قليلة العدد وصغيرة الحجم بالنسبة الى خلايا النسيج الشبيكي فهي متغلبة في النسيج الشبيكي كما ان كمية المادة الجامدة متغلبة في النسيج المندمج

التركيب الكيماوي. العظم مولف من مادتين الواحدة اليه او حيوانية والاخرى غير الية او ترابية. فالآلية جوهر جلاتيني او هلامي يكتسب العظم منها لدونته. وغير الآلية جوهر ترابي معظمه من فصنات الكلس تتوقف عليها صلابة العظم. وقد تُفصل المادة الواحدة عن الاخرى فاذا اريد النظر الى المادة الحيوانية تُقع العظم في حامض نيتريك او هيدروكلوريك مخفف بالماء فيحل الحامض المادة الترابية ويبقى الجزء الحيواني على هيئة العظم الاصلية خالياً من الصلابة في غاية ما يكون من اللدونة. واذا اريد النظر الى المادة الترابية يوضع العظم في نار مكشوفة فتحترق المادة الحيوانية ويبقى العظم على هيئة الاصلية الا انه يصير هشاً خفيفاً قصياً سريع الانكسار. واما نسبة المادة الواحدة الى الاخرى فنسبة نحو ثلث من الجوهر الحيواني الى ثلثين من الجوهر الترابي كما يظهر من الجدول الآتي لبرزيلوس الكيماوي

٢٣٠٢٣.

مواد آلية

مواد ترابية:

٥١٤٠٤

فصنات الكلس

١١٤٣٠

كربونات الكلس

٢٤٠٠

فلوريد الكلسيوم

١٤١٦

فصنات المغنيسيا

١٤٣٠

أكسيد الصوديوم وكلوريد

١٠٠٤٠٠

الآن النسبة المذكورة بين المادتين تختلف بحسب السن فانه يظهر ان المادة الحيوانية تتناقص والمادة الترابية تزايد مع تقدم العمر لان عظام الاطفال والشبان الدن من عظام الكهول والشيوخ ولذلك كانت الصدمات الميكانيكية سبباً للكسر في الشيوخ اكثر مما تكون في الاطفال

في الهيئة الظاهرة للعظام. تقسم العظام باعتبار شكلها الى اربعة انواع وهي الطويل

الفصل الاول

في العظام

العظام آلات لحمل الجسد ووقاية الاعضاء اللطيفة واندغام العضلات التي تتم بها الحركة على انواعها المختلفة. وهي جهاز صلب يكتسب منه الجسد قوة وقواماً وشكلاً خاصاً به. فالعظام الواقعة في الاطراف اسطوانية مجوّفة في غاية ما يكون من الموافقة لحمل الثقل والحركة والمدافعة. والعظام الواقعة في الجذع والراس مسطّحة قوسية تتكوّن منها تجاويف تُوعى فيها الاعضاء اللطيفة التركيب السريعة العطب كالدماغ الموضوع في باطن الجمجمة والنخاع الشوكي الموضوع في القناة الشوكية والقلب والرئتان الموضوعتان في التجويف الصدري. وكثير من العظام بمنزلة الخمال اذا فعلت عليها العضلات حدثت الحركة الخاصة بالحَيوان.

وتتركب العظام بعضها مع بعض بواسطة المفاصل والاربطة. فاذا كان التركيب المذكور شاملاً لجميع العظام سمي المجموع عند العرب بالهيكل اشارة الى كونه البناء الذي يُلقَى عليه جميع الجسد وعند الافرنج بكلمة مأخوذة عن اللغة اليونانية تدل على انه الجزء الجاف. ويسمى احياناً الجهاز اللازم للحركة تمييزاً له عن الجهاز المتعدي وهو المجموع العضلي.

بناء العظم وصفاته الطبيعية. العظم جسم شديد الصلابة فيه بعض لدونة. لونه ابيض اذا كان قديماً وابيض يميل الى الحمرة في الظاهر وشديد الحمرة في الباطن اذا كان حديثاً. وهو مبني من نسيجين احدهما كثيف صلب كالعاج يقال له المندمج والثاني ذو خلايا كثيرة مؤلف من اليف دقيقة وصفائح اذا اتصلت تكوّن منها بناء شبكي فيقال له النسيج الشبكي او الاسفنجي. وهذان النسيجان موضوعان على شكل ان المندمج منها يشغل الوجه الظاهر للعظم

والآخر سفلي يجمع الدم من الجزء السفلي للجسد ويصبه في القلب . والقلب عضلة مجوفة منقسمة الى قسمين ايمن وايسر لكل منهما تجويفان احدهما علوي هو الاذنين والآخر سفلي هو البطين ٤. الجهاز التنفسي المؤلف من الرئتين وها عضوان اسفنجيان موضوعان على جانبي القلب شاغلان للتجويف الصدري . ويدخلها الهوا من قناة مشتركة بينهما هي القصبة التي ترتكز عليها آلة الصوت وهي المخجرة المستطرفة الى الخارج بواسطة الانف والفم

٥. الجهاز الشرياني . وهو مجموع الشرايين التي تنشأ من جذع واحد يُسمى الاورطي الخارج من البطين الايسر للقلب . ووظيفة الشرايين حمل الدم وهو السائل الغذائي لجميع اجزاء الجسد :

٦. الجهاز البولي . وهذا الجهاز مؤلف اولاً من الكليتين وها آلتان تفرزان البول من الدم . ثانياً الحالبين وها قناتان تحملان البول من الكليتين الى المثانة . والمثانة حوصلة كبيرة يجتمع فيها البول ثم يُدفع منها الى الخارج بواسطة قناة يقال لها المجرى

في الجهاز التناسلي . الاجهزة التي سبق ذكرها تتعلق بحفظ الفرد من افراد النوع وهذا يتعلق بدوام النوع . ويختلف في الذكر عنه في الانثى

فالاعضاء التي يتالف منها هذا الجهاز في الذكور هي اولاً الخصيتان وها غدتان تفرزان السائل المنوي لاجل الالتحاق . ثانياً القناتان الناقلتان اللتان تحملان المنى من الخصيتين الى الحويصلات المنوية . ثالثاً الحويصلتان المنويتان وها حاصلان موضوعان عند قاعدة المثانة يجتمع فيهما المنى . رابعاً القناتان الناذقتان اللتان يُقذف منها المنى الى المجرى . خامساً القضيب الذي يوصل المنى الى باطن الآلات التناسلية في الانثى

واما الاعضاء التي يتالف منها هذا الجهاز في الاناث فهي اولاً المبيضان وها عضوان تتولد وتجتمع فيهما البيوض التي تتكوّن منها الاجنة . ثانياً قناتا فلوبيوس اللتان تنقلان البيوض المذكورة الى الرحم . ثالثاً الرحم الذي يحمل الجنين الى زمن الولادة . رابعاً المهبل وهو قناة مستطرفة من الرحم الى الخارج يُدفع منها الجنين عند الولادة . خامساً الثديان وها غدتان تفرزان اللبن لتغذية الطفل المولود حديثاً

اربع منها موضوعة في الوجه بقرب الدماغ فتصل به بواسطة الاعصاب التي تحمل التأثيرات منها اليه

جهاز الحركة . هذا الجهاز مؤلف من قسمين . الاول متعدد له خاصة الانقباض وهو العضلات التي تنتهي بالاورار المندغمة في العظام . والثاني لازم وهو العظام وهي امحال حنقبة يتركب منها هيكل الجسد وتصل من اطرافها فتتكون من ذلك المفاصل . ويدخل في تكوين المفاصل الغضاريف التي تغطي اطراف العظام وتبدد الصدمات القوية والسائل الزلالي الذي يسهل حركة السطوح المفصالية بعضها على بعض وهو سائل زبتي تفرزه اغشية خاصة به يقال لها الاغشية الزلالية والاربطة وهي اغشية متينة تربط اطراف العظام بعضها ببعض في جهاز التغذية . لهذا الجهاز اقسام كثيرة وهي

١ . الجهاز الهضمي . هو قناة واحدة طويلة ممتدة من الفم الى الاست يقال لها القناة الغذائية او الهضمية وهي مؤلفة من اقسام كثيرة يتصل بعضها ببعض الا انها تختلف في البناء والشكل والوظيفة . والاقسام المذكورة الفم والبلعوم والمرى والمعدة والامعاء . ونقسم الامعاء الى دقيقة وهي الاثنا عشري والصائم واللفائفي وغيلظة وهي الاعور والقولون والمستقيم . ومعظم هذه القناة موضوع في البطن متلفة على نفسها . ولها اعضاء اضافة هي اولاً الكبد وهو غدة كبيرة تفرز الصفراء موضوعة في القسم العلوي واليمين للبطن . ثانياً الطحال الذي وظيفته غير معلومة بالتحقيق الى الان وضعة في الجانب الايسر . ثالثاً البنكرياس الذي يفرز سائلاً خاصاً به ويصبه في الاثني عشري من ثقب مشترك بينه وبين القناة الصفراوية

٢ . الجهاز الكيلوسي ويقال له الماص ايضاً . وهو مؤلف من اوعية دقيقة تبتدئ في الحمل الذي يشاهد في الوجه الباطن للامعاء ولا سيما الدقيقة منها فتحمل السوائل الغذائية التي يجهزها العمل الهضمي الى القلب وهناك تخنلط بالدم لاجل تغذية الجسد . ويقال لهذه الاوعية احياناً اللبنة لمشابهة لون السائل الذي تحمله بلون اللبن . ويضاف الى هذا الجهاز الاوعية الليمفاوية . وهي اوعية منتشرة في الجسد حاملة سائلاً لالون له يقال له الليمفا تذهب به الى القلب . وتتحرق الاوعية اللبنة والليمفاوية في اثناء سيرها غدداً هي الغدد الماسارية والغدد الليمفاوية

٣ . الجهاز الوريدي الذي ينشأ من الاوعية الشعرية فيحمل الدم من جميع اجزاء الجسد وينتهي بوريد بن عظيمين يقال لها الاجوفان احدها علوي يجمع الدم من الجزء العلوي للجسد

ويقال لهذه العضلات العضلات الجلدية ويتكوّن منها في الحيوانات البسيطة التركيب كالديدان جميع جهاز الحركة

وفي جوهر النسيج الخلوي المذكور تسير الاوردة السطحية والوعية الليمفاوية . وهذه الوعية الليمفاوية تخرق في اثناء سيرها الغدد الليمفاوية الواقعة في بعض جهات الجسد على هيئة مجاميع

وتحت النسيج الخلوي العضلات وهي حزم لحمية حمراء موضوعة على هيئة طبقات مغلّفة بغلاف واحد صفائي تُرسَل منه زوائد فاصلة العضلات بعضها عن بعض . ويقال للغلاف المذكور في اصطلاح المشرحين الانكليزيين اللفافة الفائرة وللنسيج الخلوي المذكور آنفاً اللفافة السطحية . واما العظام فموضوعة في مركز جميع هذه الابنية وهي عمد صلبة حاملة جميع ما يحيط بها . والوعية والاعصاب موضوعة بقرب العظام فهي بعيدة الوضع عن الافات الظاهرة هنا من جهة بناء الاطراف العام . واما الجذع فجدراثة شبيهة البناء بما سبق وفي باطنه تجاوير مبطنّة باغشية رقيقة شفافة يقال لها الاغشية المصلية لانها منناة بسائل مصلي والتجاوير المذكورة تتضمن الاحشاء

ثم ان جميع الاجسام الآلية ومنها الجسد البشري مؤلفة من اعضاء و آلات يختلف بعضها عن بعض في البناء والوظيفة ولكنها تشترك معاً في حفظ الفرد ودوام النوع . ولجل اتمام هذين المقصدين ترتبت الاعضاء على هيئة مجاميع يقال لكل مجموع منها جهاز وكل جهاز له وظيفة . فالاجهزة التي تتعلق بحفظ الفرد منها ما هو خاص بنسبته الى الاجسام الخارجة عنه فيقال له جهاز النسبة ومنها ما هو خاص بتعويض الانحلال القائم على الدوام في الجسد فيقال له جهاز التغذية . ويقال للجهاز الذي يتعلق بحفظ النوع جهاز التناسل

اما جهاز النسبة فينقسم الى قسمين وهما جهاز الحس وجهاز الحركة

جهاز الحس . هذا الجهاز مؤلف اولاً من آلات الحس ثانياً الاعصاب ثالثاً الدماغ والحبل الشوكي . فالآلات الحس اولاً الجلد وهو مجلس الحس العام الذي منه يتأتى اللمس بواسطة الانامل . ثانياً اللسان وهو مع ما يجاوره من التجوير الفني مجلس حاسة الذوق وموضوع عند مدخل الفناة الهضمية . ثالثاً الحفر الانفية وهي مجلس حاسة الشم وموضوعة عند مدخل المسالك التنفسية . رابعاً الاذن وهي آلة السمع موضوعة على نوع موافق لمقابلة التموجات الهوائية . خامساً العين وهي آلة البصر . وآلات الحواس هذه تقبل التأثيرات من الخارج

كلام عام في الجسد البشري

بالشرح العملي فكانوا يجلبون اليها ما يحتاجون اليه على سبيل الخفية . ولما بلغ ذلك اولياء الامور غصوا الطرف ولا عنه ثم اباحوا لهم علناً استحضار الموتى من البيهرستانات ممن لا يكون لهم اهل يطلبهم . وعلى ذلك الامر جارٍ الان في المدارس الاوروبية والاميريكانية . ولسبب التسهيل المذكور لدراسة التشريح قد اتقنوا العلم في هذا القرن الى درجة يكاد لا يكون عليها مزيد . ومع هذا التقدم في اتقان العلم وتسهيل الوسائط ماهر المدرسون في صناعة التدريس والمصنفون في الوصف المدقق الجلي وكثر عددهم وزادت مصنفاتهم الى ان صار علم التشريح الآن اوضح واثبت العلوم الطبية

كلام عام في الجسد البشري^(١)

قبل الشروع في الكلام بالتفصيل على الاعضاء الكثيرة التي يتركب منها جسد الانسان يصح ان يُنظر اليها اولاً نظراً عاماً . فان التامل بها في الجملة لا يلبك الطالب بل يوضحها له من حيث نسبتها بعضها الى بعض ومن حيث الغاية المقصودة بهذا العلم اذا نظرنا الى الجسد من الظاهر راينا انه مغلف بلقافة عامة محكمة الوضع حول جميع اجزائه فاللقافة المذكورة هي الجلد مع توابعه وهي الاظفار والشعر . ويشاهد فيه فتحات معلومة كالقلم يحصل بواسطتها استطراق بين ظاهر الجسد وباطنه . غير ان هذه الفتحات ليست ثقباً حقيقية او تفرق اتصال في الجلد ولكنها مكونة من انعكاس الجلد الى الباطن فتتغير حينئذ بنيتها وتتكون منه الاغشية المخاطية التي هي بمنزلة جلد باطن ممتد من اللقافة الظاهرة . وبناء على ذلك يُعتبر الجسد البشري من حيث بنائه الجوهري انه مكون من اثناء الجلد على نفسه . ويُحَقَّق ذلك من النظر الى الحيوانات الدنية الرتبة التي يقتصر تركيبها على كونها قناة بسيطة . ثم كلما صعدنا في السلم الحيواني وجدنا ان الطبقات التي تفصل اللقافة الظاهرة عن الباطنة قد زادت سماكتها الى اننا نرى اخيراً انه قد تكوّنت تجاوير بينها . الا انه مما تباعدت اللقافتان وتغير منظرهما الظاهر فاصلهما وجوهرهما واحد

وتحت الجلد طبقة من النسيج الدهني الخلوي ترفعه قليلاً وتملأ الانخفاضات الواقعة تحته فتكتسب جميع الحيوانات من ذلك شكلاً مستديراً مميّزاً لها ولا سيما النوع البشري . وتحت الجلد في وجه الانسان وعنقه عضلات مرتبطة من طرفها الواحد بالجلد ومن طرفها الاخر بالعظام اذا عملت احدثت تغييراً عجيباً في هيئة الوجه دالاً على جميع الانفعالات النفسانية .

بنحو ثلاثمائة سنة. وكانت هذه المدرسة اول مدارس العالم في ذلك الوقت وبقيت هكذا زمناً طويلاً فجمعت فيها مكتبة عظيمة وادوات التعليم في الهندسة والهيئة والطب ودُعِيَ اليها المعلمون وامرت الحكومة بدفع جنث المتولين لسبب جرائمهم الى المدرسة الطبية لاجل التشريح. واشتهر حينئذ بين معلمي هذا الفن ايراسيستراتوس وهيروفيلوس فاطهرا اشياء كثيرة من مكوناتِه ووضعوا كثيراً من اصوله الاولية. فمن الجملة استقصيا الاعصاب الى الدماغ الا انها لم يميزاها عن الاوتار. ووصف هيروفيلوس الدماغ وصفاً دقيقاً لم يسبقه اليه احد واطهر الغشاء العنكبوتي والبطينات الدماغية التي ذهب الى ان مقر النفس فيها والى الآن يُعرف عند المشرحين بمجتمع الجيوب التي تصب فيها اوردة الدماغ بمجتمع هيروفيلوس واكتشف الاوعية اللبنة ولكن لم يعرف فائدتها واثبت ان القسم الاول من القناة المعوية لا يتجاوز طوله اثني عشر اصبعاً ولذلك يُسمى بالاثني عشري. قيل انه شرّح سبعائة جثة بشرية وكتب كتباً كثيرة فقدت جميعها الا بقايا منها مذكورة في مصنفات سلسوس الروماني. وهكذا بقي الاسم الاول لهذه المدرسة الى بعد التاريخ المسيحي بثلاثمائة سنة ويظهر ان جميع معارف الرومانيين بالتشريح كانت منقولة عنها. ثم من القرن السابع المسيحي الى القرن الثاني عشر اضمحلت العلوم في المغرب فاخذها الاسلام في المشرق وازهرت بينهم الى انهم بلغوا فيها الرتبة الاولى الا انهم لم يتقدموا على من سبقهم في علم التشريح بل اکتفوا بما نقلوه عن الكتب اليونانية لانهم كانوا يابون تشريح الموتى. ومن القرن الثاني عشر الى القرن الخامس عشر بنيت عدة من المدارس الكلية في اوربا وازيف لكل واحدة منها مدرسة طبية. وكان اول من شرّح الجثة البشرية فيها تشریحاً مشتهراً الملم مونديني مدرس التشريح في مدرسة بولونيا وذلك نحو سنة ١٢١٥ للتاريخ المسيحي. ومن ذلك الوقت اخذ علم التشريح في التقدم الى يومنا هذا ولا سيما في القرن السادس عشر عندما قام فيساليوس وكانت له رغبة شديدة في هذا الفن واقدم عجيب على تحضير الجثث لاجل التشريح فدخل مرة الخدمة العسكرية في جرمانيا اذ كانت الحرب منتشرة بينها وبين فرنسا لاجل الحصول على اجساد المتولين. ثم اشتغل بالتدريس زمناً طويلاً الى ان اتخذه الامبراطور كارلوس الخامس ليكون طبيبه الخاص وكتب كتباً عديدة في التشريح. ومن الذين اشتهروا في هذا العلم في زمن فيساليوس وبعده سلفيوس وفلوبوس واوستاكيوس وملفيجي وبرثولين وفيوسنس والينوس وويلس وغيرهم والهم تنسب بعض اسما تشريحية

غير ان تشریحهم للاجساد كان مقتصرآ في المدارس الى بدائة هذا القرن على عدد معلوم من جنث المتولين يدفع لها بامر الحكومة. ولما كان هذا العدد دون المطلوب لاشتغال التلاميذ

اضطرار الطبيب والجراح الى هذا العلم

مبنى على ما اظهره المكرسكوب مما لا تراه العين المجردة. وقد ادرجنا منه في هذا التشریح الخاص ما كانت معرفته ضرورية للطالب

والتشریح اقسام اخرى. منها التشریح الفيسيولوجي الذي يراد به وصف الاعضاء باعتبار وظيفتها وهي في حال الصحة. والتشریح الپاثولوجي وهو النظر الى الاعضاء وهي في حالة المرض. ومنها التشریح الوصفي الذي يصف كل جزء بمفرده باعتبار اسمه وشكله ووضعه ومجاوراته الى غير ذلك. والتشریح الموضعي الذي يتعلق بالبحث عن مجموع الاجزاء الواقعة في موضع واحد دون غيره. والتشریح الجراحي الذي يصف الاجزاء بالنظر الى الافات التي قد تعرض عليها او الاعمال الجراحية التي يدعو اليها مقتضى الحال

العلوم الطبية سلسلة يرتبط بعضها ببعض بحيث يفتقر الطبيب والجراح الى معرفتها معرفة جيدة ولا يستغنيان عن شيء منها. غير ان للتشریح المحل الاول والاهم فيها وذلك لانه القاعدة التي يبني عليها الفيسيولوجيا فان التشریح يبحث عن بناء الاعضاء والفيسيولوجيا عن وظيفتها ولا يمكن معرفة الوظيفة ان لم يسبقها معرفة البناء. وعلم الطب باسره مبنى على التشریح والفيسيولوجيا لان المرض انما يستدل عليه بواسطة الخلل الذي يعرض على الوظائف والخلل المذكور لا يعرف الا اذا عرفت اولاً الوظائف وهي في حال الصحة ومعرفة الوظائف الصحية موقوفة على معرفة بناء الاعضاء وهو علم التشریح. ولما كان مجلس اكثر الامراض في الاعضاء الموضوعة في باطن الجسد فالامر ظاهر ان التوصل الى معرفتها ومداركتها بالعلاج للطبيب لا يتأتى الا بواسطة معرفة علم التشریح. وعلى نوع ابلغ من ذلك حاجة الجراح الى هذا العلم لانه لا يستطيع ان يعمل عملاً واحداً من اعمال صناعته بدون خطر عظيم الا اذا كانت معرفته بتشریح الاعضاء معرفة تامة دقيقة كما يظهر حالاً من التأمل ببعض الاعمال الجراحية كالبتير وربط الشرايين واستخراج الحصاة. ولنا دليل واضح على ذلك في عمل ربط الشرايين في بعض الامراض او الافات فان التزيف الذي يشاهد حينئذ هائل المنظر شديد الخطر يجبر الجراح فيرنبك في امره الا اذا عرف الوعية المقطوعة ومنشأها فيستقصيها الى الجذع الاصلي الذي تنبت منه ويضغطه من الظاهر او يصل اليه بواسطة القطع وربطة. وهذا لا يتم الا بمعرفة الشرايين الكبيرة وفروعها وسيرها ومجاوراتها للعظام والعضلات. وهكذا في ما بقي من الاعمال الجراحية

وكانت صناعة التشریح معدومة في الازمنة القديمة الى ان قامت مدرسة الاسكندرية الشهيرة التي انشأها بطليموس الاول الذي تولى مصر بعد الاسكندر الكبير وذلك قبل التاريخ المسيحي

المقدمة

نقسم جميع الاجسام الى قسمين عظيمين آليّة وغير آليّة. فالاجسام الالية مؤلفة من اعضاء
او آلات لها وظائف خاصة بها تجريها بواسطة العمل الحيوي. ولذلك كانت الصفة الرئيسية
للاجسام الالية الحية وكان هذا القسم شاملاً للنبات والحيوان. واما الاجسام غير الالية فلا شيء
فيها من ذلك لانه لا يشاهد فيها اعضاء مختلفة البناء والوظيفة. وان زاد جرمها فلا يكون ذلك
على سبيل النمو الحيوي وانما على سبيل الالتصاق الميكانيكي. وهي منحصرة على عالم الجهاد
كالحجر والهوا

كلمة التشريح ترجمة حرفية عن اليوناني ومعناها في الاصل تقطيع الشيء الى اجزاء.
فكانت تدل اولاً على تشريح الجثث ثم وُضعت للعلم الذي حصلة المشرحون من العمل
المذكور. ولذلك يقسم التشريح الى عملي وهو صناعة التشريح ونظري وهو علم التشريح

علم التشريح يبحث عن الاجزاء التي تتألف منها الاجسام الالية باعتبار بنائها ووضعها
ونسبتها الى الاجزاء المجاورة لها. ولذلك يُقسم الى تشريح نباتي وتشريح حيواني. فالتشريح النباتي
يتعلق بالبحث عن الاجزاء التي يتألف منها النبات كالجذر والساق والورق والزهر والثمر.
والحيواني يبحث عن الاجزاء التي يتألف منها الحيوان لا بحسب ما يشاهد في الظاهر ولكن بحسب
ما بظهره التشريح العملي. ويقسم التشريح الحيواني الى تشريح المقابلة والتشريح الخاص.
فالاول يتعلق بالحيوانات ومقابلة اجزائها بما يشبهها او يختلف عنها في الجسد البشري. والثاني
خاص بنوع واحد من الحيوانات دون غيره كالتشريح البشري الذي يقتصر على وصف الاجزاء
التي يتركب منها الجسد الانساني وهو موضوع هذا الكتاب. واما التشريح العام فيبحث عن
المبادئ العامة الاساسية في بناء الانسجة الالية. وهو علم حديث العهد الا انه عظيم الفائدة اكثره

الفصل الثاني عشر

في التشرىح العملي

صفحة

٦٩٩

٧٠٢

٧١٢

تشرىح الصدر

تشرىح البطن والحوض

تشرىح الطرفين السفليين

صفحة

٦٧٦

٦٧٧

٦٩١

مبادئ التشرىح العملي

تشرىح الراس والعنق

تشرىح الطرفين العلويين

صفحة

٧٢٦

الفهرس الخاص

صفحة

٧٢٢

بيان الخطا والصواب

صفحة		صفحة	
٦٠٧	الكايتان	٥٧٦	الصدر
٦١٠	الحا لبان	٥٧٦	النامور
٦١١	المحفظتان اعلى الكايتين	٥٧٧	القلب
٦١٣	المائة	٥٨٥	الصفات المميزة للمجموع الوعائي في الجنين
٦١٧	مجرى البول في الذكور	٥٨٦	الدورة الجنينية
٦٢٠	اعضاء التناسل في الذكور	٥٨٩	اعضاء الصوت والتنفس
٦٢٠	البروستنا	٥٨٩	الحنجرة
٦٢١	الفضيب	٥٩٣	عضلات الحنجرة
٦٢٣	الخصيتان	٥٩٦	الفصبة
٦٢٩	المحويصلتان المتويتان	٥٩٨	البلورثان
٦٣٠	هبوط الخصيتين	٦٠٠	الحجاب النصف
٦٣٣	اعضاء التناسل في الاناث	٦٠٠	الرتان
٦٣٥	المهبل	٦٠٤	الغدة الدرقية
٦٣٦	الرحم	٦٠٥	الغدة التيموسية
٦٣٩	قناتا فلويبوس	٦٠٧	اعضاء البول
٦٤٠	المبيضان		
٦٤٢	التديان		

الفصل العاشر

في التشريح الجراحي للفتق الاربي والفخذي

صفحة

٦٥٤

صفحة

٦٤٥

التشريح الجراحي للفتق الاربي | التشريح الجراحي للفتق الفخذي

الفصل الحادي عشر

في التشريح الجراحي للعجان والقسم الوركي المستقيمي

صفحة

٦٦٤

صفحة

٦٦٢

التشريح الجراحي للعجان | التشريح الجراحي للقسم الوركي المستقيمي

صفحة		صفحة	
٤٩٠	عقدة الفظنية	٤٨٤	عقدة الراسية
٤٩١	عقدة العجزية	٤٨٤	عقدة العنقية
٤٩٢	الضفيرة المخنلية السفلى	٤٨٨	عقدة الصدرية

الفصل الثامن

في اعضاء الحواس

صفحة		صفحة	
٥٠٤	طبقات العين	٤٩٣	الجلد وهو عضو اللمس
٥١٠	رطوباتها وهي اوساطها الكاسرة	٤٩٦	اجزائه الاضافية
٥١٣	الاجزاء الاضافية للعين	٤٩٦	الاذفار والشعر
٥١٥	الجهاز الدمعي	٤٩٧	الغدد الشممية والعرقية
٥١٦	الاذن وهي عضو السمع	٤٩٨	اللسان وهو عضو الذوق
٥١٧	الاذن الظاهرة	٥٠٠	الانف وهو عضو الشم
٥١٩	الاذن المتوسطة وهي الطيلة	٥٠٣	المخترتان الانفيان
٥٢٢	الاذن الباطنة وهي التيه	٥٠٤	العين وهي عضو البصر
٥٢٦	التيه الغشائي		

الفصل التاسع

في الاحشاء

صفحة		صفحة	
٥٤٥	البريتون	٥٣٩	اعضاء الهضم وتوابها
٥٤٩	المعدة	٥٣٩	القناة الهضمية
٥٥٣	المعا الدقيق	٥٣٠	الفم
٥٥٧	المعا الغليظ	٥٣١	الاسنان
٥٦١	الايثيليوم	٥٣٧	المخك
٥٦٣	الكبد	٥٣٩	الغدد اللعابية
٥٧٠	الحوصلة المرارية	٥٤١	البلعوم
٥٧١	البنكرياس	٥٤٢	المرية
٥٧٢	الطحال	٥٤٢	البطن واقسامه

الفصل السادس

في الاوعية والغدد الليمفاوية

صفحة	صفحة	
٢٨٤	٢٧٩	كلام عام في المجموع الليمفاوي
٢٨٦	٢٨١	القناة الصدرية
٢٨٨	٢٨٢	القناة الليمفاوية اليمنى
٢٨٩	٢٨٢	الغدد والاعوية للراس والوجه والعنق
		الغدد والاعوية للطرف العلوي والسفلي
		الغدد والاعوية للحوض والبطن
		المجموع الليمفاوي واللمبي للامعا
		الغدد والاعوية للصدر

الفصل السابع

في المجموع العصبي

صفحة	صفحة	
٤٤٢	٢٩١	كلام عام في المجموع العصبي
٤٤٢	٢٩٩	المركز الدماغي الشوكي
٤٤٦	٢٩٩	اغشية الحبل الشوكي
٤٤٦	٤٠١	الحبل الشوكي
٤٤٨	٤٠٢	اغشية الدماغ
٤٥١	٤٠٦	الدماغ
٤٥١	٤٠٧	النخاع المستطيل
٤٥٤	٤٠٩	جسر فرويلوس
٤٥٥	٤١٠	الخنج
٤٥٦	٤٢٢	الخنج
٤٥٦	٤٢٧	الاعصاب المجتمعية
٤٥٩	٤٢٨	الاول وهو الشهي
٤٧٠	٤٣٠	الثاني وهو البصري
٤٧٠	٤٣١	الثالث وهو المحرك للقلنة
٤٧٥	٤٣٢	الرابع وهو الاشفاقي
٤٧٦	٤٣٢	الخامس وهو الثلاثي الوجبي
٤٨٣		
		السادس وهو المبعد للذئابة
		السابع وهو الوجبي
		الثامن وهو السعبي
		التاسع وهو اللساني الباعومي
		العاشر وهو الرئوي المعدي
		الحادي عشر وهو الشوكي الاضافي
		الثاني عشر وهو تحت اللسان
		الاعصاب الشوكية
		الاعصاب العنقية
		الضفيرة العنقية
		الضفيرة العضدية
		الاعصاب القطنية
		الضفيرة القطنية
		الاعصاب العجزية
		الضفيرة العجزية
		العصب السهباتوي

صفحة		صفحة	
٢٢١	الحرقفيان الاصليان	٢١٢	الشران العضدي
٢٢٢	الحرقفي الباطن	٢١٥	الكعبري
٢٢٣	فروعه	٢١٨	الزندي
٢٢٤	الاستحياني الباطن	٢٢٠	الاورطي الصدري
٢٢٧	الوركي والالوي	٢٢١	فروعه
٢٢٨	الحرقفي الفطفي والعجزية الجانبية	٢٢٢	الاورطي البطني
٢٢٩	الحرقفي الظاهر	٢٢٣	فروعه
٢٤٠	الفخذي	٢٢٣	الخور البطني
٢٤١	فروعه	٢٢٤	المعدي
٢٤٤	المماضي والخلاه المماضي	٢٢٤	الكبدي
٢٤٦	الفصي المقدم	٢٢٥	الطحالي
٢٤٨	الظهري للقدم	٢٢٦	المساريقي العلوي
٢٤٩	الفصي الخلفي	٢٢٧	المساريقي السفلي
٢٥٠	الشظوي	٢٢٩	الشريانان فوق الكلية والكلويان والمنويان
٢٥٢	الرتوي	٢٣٠	المجاريان والقطنية
		٢٣١	العجزية المتوسط

الفصل الخامس

في الاوردة

صفحة		صفحة	
٢٦٩	الاجوف العلوي	٢٥٢	الاوردة (كلام كلي)
٢٧١	اوردة الطرف السفلي	٢٥٥	اوردة ظاهر الراس
٢٧٣	الاجوف السفلي	٢٥٨	اوردة العنق
٢٧٥	المجموع الباي	٢٦٠	الاوردة الدماغية
٢٧٦	الاوردة القلبية	٢٦١	جيوب الام الجافية
٢٧٧	الاوردة الرئوية	٢٦٤	اوردة الطرف العلوي

صفحة		صفحة	
٢٤٨	الجهة الخلفية المقدمة	٢٢٢	الجهة العضدية الخلفية
٢٥٢	الجهة الخلفية الانسية	٢٢٤	الجهة المقدمة للساعد
٢٥٤	الجهة الالوية	٢٢٨	الجهة الكعبرية
٢٥٨	الجهة الخلفية للغذ	٢٢٩	الجهة الخلفية المساعد
٢٦٠	مقدم الساق	٢٤٢	عضلات اليد ولفائفها
٢٦٢	موخر الساق	٢٤٧	عضلات الطرف السفلي ولفائفه
٢٦٧	القدم ولفائفها	٢٤٧	الجهة الحرقفية

الفصل الرابع

في الشرايين

صفحة		صفحة	
٢٩٥	السباتي الباطن	٢٧٢	الشرايين (كلام كلي)
٢٩٦	فروع السباتي الباطن	٢٧٥	الاورطي
٢٩٦	العيني	٢٧٦	فوس الاورطي
٢٩٩	الخيطان المقدم والمتوسط	٢٧٨	فروع الاورطي
٢٩٩	شرايين الطرف العلوي	٢٧٨	الاكيليان
٣٠٠	الشريانان تحت الترقوة	٢٧٨	اللا اسم له
٣٠٢	فروعها	٢٧٩	السباتيان الاصيلان
٣٠٢	الفكري	٢٨٠	السباتي الظاهر
٣٠٤	القاعدي	٢٨١	فروع السباتي الظاهر
٣٠٥	دائرة ويليس	٢٨١	الدرقي العلوي
٣٠٥	المحور الدرقي	٢٨٢	اللساني
٣٠٦	الدرقي السفلي	٢٨٣	الوجهي
٣٠٦	فوق اللوح	٢٨٥	المؤخري
٣٠٧	العنقي المستعرض	٢٨٦	الاذلي الخلفي
٣٠٧	الندي الباطن	٢٨٦	البلعومي الصاعد
٣٠٨	العلوي بين الاضلاع	٢٨٧	الصدعي
٣٠٩	التشريح الجراحي للابط	٢٨٨	الفكي الباطن
٣١٠	الابطي	٢٩١	التشريح الجراحي لثلث العنق
٣١٢	فروع الابطي		

arteries

صفحة	صفحة
١٥٩	١٤٩
١٥٩	١٥٠
١٦١	١٥٠
١٦٤	١٥٢
١٦٥	١٥٢
١٦٧	١٥٥
١٦٩	١٥٦
١٧٠	١٥٧
١٧٠	١٥٩

مفاصل الطرف السفلي

مفصل الورك

مفصل الركبة

اتصال الفصبة بالمشطية

المفصل الرسغي

مفاصل الرسغ

المفاصل الرسغية المشطية

المفاصل المشطية السلامية

المفاصل السلامية

المفصل اللوحي الترقوي

اربطة اللوح

المفصل الكففي

المفصل المرفقي

اتصال الكعبرة بالزند

المفصل الرسغي

اتصال عظام الرسغ

اتصال الرسغ بالمشط

اتصال المشط بالسلاميات

الفصل الثالث

في العضلات واللفائف

Muscles & Integument

صفحة	صفحة
١٩٤	١٧١
١٩٥	١٧٤
١٩٧	١٧٤
١٩٩	١٧٥
٢٠١	١٧٦
٢٠٢	١٧٨
٢٠٤	١٧٨
٢١٤	١٨٠
٢١٩	١٨٣
٢٢١	١٨٣
٢٢٢	١٨٤
٢٢٣	١٨٥
٢٢٥	١٨٦
٢٢٦	١٨٧
٢٢٧	١٨٩
٢٢٧	١٨٩
٢٢٩	١٩٢

العضلات (كلام كلي)

الاورار

اللفائف وهي الصفوق

عضلات ولفائف الراس والوجه

الجهة الخوذية

الجهة الاذنية

الجهة الجفنية

الجهة الحاجبية

الجهة الانفية

الجهة الفكية العليا

الجهة الفكية السفلى

الجهة بين الفكين

الجهة الصدغية الفكية

الجهة الجناحية الفكية

عضلات ولفائف العنق

الجهة العنقية السطحية

الجهة اللامية السفلى

عضلات الجذع ولفائفه

عضلات الظهر

عضلات البطن

عضلات الصدر

الحجاب الحاجز

عضلات الطرف العلوي ولفائفه

الجهة الصدرية المقدمة

الجهة الصدرية الجانبية

الجهة الاخرية

الجهة المقدمة للوح

الجهة الخلفية للوح

الجهة العضدية المقدمة

صفحة		صفحة	
٨٣	اللوحي	٥٦	العظام المحيكية
٨٧	العضد	٥٩	القرينيان السفليان
٩١	الزند	٦٠	الميكعة
٩٣	الكعبرة	٦١	الفك السفلي
٩٥	عظام رسغ اليد	٦٣	دروز الجحيمية
٩٩	عظام مشط اليد	٦٤	قبة الجحيمية
١٠١	سلاميات اليد	٦٥	قاعدة الجحيمية
١٠٣	عظام الطرف السفلي	٧٠	جانب الجحيمية
١٠٣	المحرفي	٧١	مقدم الجحيمية
١٠٨	المحوض	٧٢	التجويفان المحجاجيان
١١٠	عظم الفخذ	٧٣	المخفرتان الانفييتان
١١٤	الرضفة	٧٥	العظم اللامي
١١٥	الفصية	٧٦	عظام الصدر
١١٧	الشظية	٧٦	الفص
١١٩	عظام رسغ القدم	٧٨	الاضلاع
١٢٤	عظام مشط القدم	٨١	الغضاريف الضلعية
١٢٥	سلاميات القدم	٨١	عظام الطرف العلوي
١٢٧	قنطرة القدم	٨٢	الترقوة
١٢٧	العظام السهمانية		

الفصل الثاني

في المفاصل والاربطة *Joints & Ligament*

صفحة		صفحة	
١٣٩	المفصل الصدغي الفكي	١٢٨	المفاصل والاربطة (كلام كلي)
١٤٠	اتصال الاضلاع بالفقرات	١٣١	انواع المفاصل وحركتها
١٤٣	اربطة الغضاريف الضلعية بالنص	١٣٣	مفاصل الجذع
١٤٣	اربطة النص	١٣٣	اربطة العمود الفقري
١٤٤	اتصال المحوض بالعمود	١٣٦	اربطة الحاملة بالمحور
١٤٤	اربطة المحوض	١٣٧	اربطة الحاملة بالموخرى
١٤٧	مفاصل الطرف العلوي	١٣٨	اربطة المحور بالموخرى
١٤٨	المفصل الفصي الترقوي		

فصول الكتاب وفهرسه العام^(١)

المقدمة

صفحة	صفحة
٢	١
٤	٢

تاريخه في الأزمنة القديمة والحديثة

كلام عام في الجسد البشري

حقيقة التشريح واقسامه

اضطرار الطبيب والجراح اليه

الفصل الاول

في العظام

Bones

صفحة	صفحة
٢٧	٨
٢٧	٨
٢٩	٩
٢٠	٩
٢٠	١٠
٢٤	١١
٢٥	١٢
٢٨	١٢
٤٢	١٥
٤٧	١٧
٤٩	١٧
٤٩	١٩
٥٠	٢٢
٥٤	٢٢
٥٥	٢٥

كلام كلي في العظام والهيكل

بناء العظم وصفاته الطبيعية

تركيبه الكيماوي

هيئته الظاهرة واشكاله

بناؤه الميكروسكوبي

الاستحقاق

اوعية العظام

تكوين العظم

العظم وادواره

عدد العظام

العمود الفقري

الصفات العامة للفقرات

الفقرات العنقية

الفقرات الظهرية

الفقرات القطنية

العجز

(١) ولهذا الكتاب فهرس اخر خاص مفصل (انظر صفحة ٧٢٦)

فاتحة الكتاب

بِسْمِ اللَّهِ الْمُبْدِيِّ الْمَعِيدِ

اما بعد فيقول العبد الفقير جامع هذا الكتاب اني لما دُعيت لتدريس علم التشريح في المدرسة الكلية التي اُنشئت حديثاً في بيروت رايت اني اخدم ابناء اللغة العربية بوضع كتاب جديد منقول عن احدث الكتب المعول عليها في المدارس الانكليزية والاميركانية. فشرعت في هذا التأليف وافرغت كل جهدي مدة اكثر من ثلاث سنين جامعاً فيه جميع مسائل التشريح التي تحتاج اليها الطلبة وقاصداً ان يكون صحيحاً واضحاً خالياً من التعقيد والابهام سهل الترتيب والفهم والحفظ. وقد اعنيت فيه بتسهيلات كثيرة معينة للتلميذ تشاهد لدى المطالعة

واما الكتب التي نقلت عنها فهي تصانيف كراي وهولدن وولسن وكواين وكان اكثر اعتمادي على الاول الذي اشتهر في كل مدرسة طبية تعويلها على اللغة الانكليزية حتى يكاد يصح القول ان هذا الكتاب مترجم منه. وقد اخذت عن العلامة كروفيليه فصلاً مختصراً في الكلام الكلي على الجسد وترجمت الفصل الاخير في التشريح العملي ترجمة حرفية من كتاب العلامة كواين. ولم آتِ بعبارة الا وقد اسندتها الى كتب اساتيد هذا الفن ولم يكن القصد بالاشكال المرسومة في الكتاب ان يستغنى بها عن التشريح العملي وانما هي معونة للتلميذ وتذكرة للطبيب والمجراح. وقد اخذت معظمها من كتاب الفاضل ولسن وبعضها من غيره

وقد وافقت كتب المدرسة المصرية في التسمية التشريحية غالباً واضطرت الى مخالفتها احياناً ايثاراً للتسمية الانكليزية او لاسباب اخرى على اني نهيت المطالع على الاختلاف عند الاقتضاء. هذا وانني اعترف بفضل الكتب المذكورة وبالاسعاف الذي نلتها منها مثنياً ثناء جليلاً على الدولة الخديوية المعظمة التي اهدت الاتقان الحديث في العلوم الى ابناء الوطن العربي

SL

ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS LIBRARY	
CLASS	611
ACCN.	40837
SOURCE	
DATE	

كتاب
التوضيح
في
اصول التشریح

اشكاله ثلاثمائة واربعة وستون شكلاً

المدكتور يوحنا ورتبات
مدرس التشریح والفيسيولوجيا في المدرسة السورية الكلية
جمعة نقلاً عن الكتب الحديثة من اللغة الانكليزية
الى اللغة العربية


طُبع في بيروت


١٨٧١


تمت اربعون فرنكا



عضلات مقدم الجسد السطحية







Presented by Dr. Moberg to the
Royal College of Physicians.

1874.

TRITTON p 29

WORTABET (John)

(46)

(18)

